

NAME- Akash Kumar Sahu

ID- 2019kuec2026

Q-

$$x(t) = \sin(2\pi f_m t);$$

Time period of $x(t) = 4$ s

- i) Critical nyquist sampling
- ii) oversampling($f_s = 8f_m$)
- iii) undersampling ($f_s = 1.5f_m$)

CODE-

```
clc
clear;
t=-5:0.01:5;
fm=0.25;
x=sin(2*pi*t*fm);
subplot(2,2,1);
plot(t,x)
xlabel('Time')
ylabel('x(t)')
title('Cn tinuous time signal')

fs1=0.375;      %fs<2fm
n=-4:4;
x1=sin(2*pi*fm*n/fs1);
subplot(2,2,2);
stem(n,x1)
hold on
subplot(2,2,2)
plot(n,x1,':')
xlabel('n')
ylabel('x(n)')
title('discrete time signal x(n) for
fs1<2fm')
```

```

fs2=0.25;      %fs2=2fm
n1=-5:5;
x2=sin(2*pi*fm*n1/fs2);
subplot(2,2,3);
stem(n1,x2)
hold on
subplot(2,2,3)
plot(n1,x2,':')
xlabel('n1')
ylabel('x2(n)')
title('discrete time signal x2(n) for
fs2=2fm')

fs3=2;      %fs3>2fm
n2=-50:50;
x3=sin(2*pi*fm*n2/fs3);
subplot(2,2,4);
stem(n2,x3)
hold on
subplot(2,2,4)
plot(n2,x3,':')
xlabel('n2')
ylabel('x3(n)')
title('discrete time signal x3(n) for
fs3>2fm')

```

OUTPUT-

