# BASE POLYAMILASE AT ESPECIAL 150

Preparación de amilase para el desencolado textil solubilizando féculas que contiene el urdido. Aplicable desde 25ºC a 95ºC básicamente en prenda y jet.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Fabricación de enzima comercial
- Desencolado de prenda confeccionada a 50 – 60ºC
- Desencolado en barca o jet hasta 100ºC para facilitar los posibles encolantes sintéticos que acompañan a la fécula, como PVA o acrílicos.
- Pad-steam a 95ºC
- Actúa hidrolizando las féculas y mejorando la aptitud a la tintura, tacto e hidrofilidad.
- Para procedimientos en pad-batch recomendamos el uso de POLYAMILASE FREDA por ser más eficaz.

## PROPIEDADES

| | |
|---|---|
| Aspecto: | Líquido transparente marrón claro |
| Composición química: | Amilase en solución acuosa. |
| pH | 6,30 ± 0,50 |
| Disolución: | en agua dura o descalcificada |
| Máxima eficacia: | 50 – 90ºC |
| Rango operacional: | 25 – 95ºC |
| pH de trabajo óptimo: | 5 – 7 |
| pH operacional: | 5 – 8 |
| Estabilidad | |
| Agua dura: | Los iones cálcicos favorecen la actividad |
| Ácido: | Hasta pH 5 |
| Álcalis: | Hasta pH 8 |
| Metálicos: | $Cu^{++}$ y $Fe^{+++}$ son tóxicos para la enzima. |
| Tensoactivos no iónicos: | Buena |
| Tensoactivos aniónicos: | Alguno puede bajar la eficacia |


LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

*THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.*







## DILUCIÓN PARA PREPARAR EL PRODUCTO COMERCIAL

*Solución estabilizante:*

| | |
|---|---|
| 12% | Sal fina (ClNa) |
| 0,22% | Biocida 1618 |
| 0,002% | Tiosulfato sódico (Hiposullfito) |
| 87,778% | Agua dura |
| | Ajustar pH a 6 – 6,5 con ácido acético |

*Fabricación*

| | |
|---|---|
| X% | Solución estabilizante |
| 100 – X | **BASE POLYAMILASE AT ESPECIAL 150** |
| | Mezclar y controlar pH (6,25 ± 0,25) |
| | Como referencia: 2,67% daría 40 KNU/gr a 60ºC |
| | 8% daría 120 KNU/gr. |


LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

*THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.*