

**OLIMPIADE SAINS 2012  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
BIDANG INFORMATIKA/KOMPUTER**

**Lembar Peraturan dan Peringatan Selama Ujian**

1. Model ujian ini adalah pilihan berganda: memilih **maksimum SATU jawaban** untuk setiap soal dan jika peserta memilih lebih dari satu jawaban untuk satu soal, maka jawaban tersebut akan dinilai SALAH.
  2. **Jawaban BENAR** bernilai **4**, jawaban **SALAH** bernilai **-1** dan jawaban **kosong (tidak menjawab)** bernilai **0**.
  3. **Jumlah Soal 50**, untuk dikerjakan **dalam 2½ JAM (atau 150 menit)**.
  4. Notasi algoritma pada bagian algoritmika menggunakan **pseudopascal** yang pada intinya seperti pascal tetapi tidak serinci pascal karena diutamakan pada konsep logika di dalam algoritma.
  5. Jawaban yang akan dinilai adalah yang ada di **BAGIAN JAWABAN** di halaman kedua. Jadi jawaban yang baru dituliskan di bagian soal (tidak dipindahkan) dianggap tidak menjawab dan tidak akan dinilai.
  6. Beberapa soal/pilihan ditulis dalam **dua kolom**, jadi harap peserta memperhatikan nomor soal dan nomor pilihan jawaban terkait.
  7. Halaman-halaman yang berisi **pertanyaan ada di halaman no 3 sampai dengan 9** Jika berkas anda tidak lengkap/rusak/cacad/tak terbaca, mintalah kepada panitia untuk penggantian berkas.
  8. Peserta **DILARANG** :
    - a. menggunakan perangkat komputasi (laptop, kalkulator, komputer)
    - b. menggunakan alat komunikasi (handphone, pager, PDA, dll) selama mengerjakan ujian ini,
    - c. menggunakan buku/referensi/catatan selain berkas soal ini, serta
    - d. bekerja sama dengan atau mencontek hasil pekerjaan peserta lain.
- Pelanggaran terhadap larangan ini oleh seorang peserta berakibat yang bersangkutan untuk dibatalkan dari kutsertaan ujian.
9. Berkas soal **BOLEH** digunakan untuk coretan tetapi **TIDAK BOLEH** dilepas dari bundelannya. Jika bundelan lepas secara tidak disengaja, pengawas diharapkan membundelnya kembali atau diganti dengan berkas baru.
  10. Berkas soal **TIDAK BOLEH** dibawa pulang dan panitia setempat harus menghancurkannya atau menyimpannya hingga seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia selesai melaksanakan OSK ini.

**Penjelasan sejumlah notasi yang digunakan dalam naskah soal.**

- $N!$  adalah bilangan faktorial  $N$  yang berharga hasil perkalian semua bilangan bulat mulai dari 1 sampai dengan  $N$ .
- Notasi " $A \bmod B$ ", dengan  $A$  dan  $B$  bilangan-bilangan bulat menghasilkan sisa pembagian  $A$  dengan  $B$ , misalnya  $10 \bmod 3 = 1$  karena 10 jika dibagi 3 akan menyisakan 1.
- Notasi " $\sqrt[A]{A}$ " dengan  $A$  bilangan nyata non-negatif maka menghasilkan akar dari  $A$  (atau  $\sqrt{A}$ ), misalnya  $\sqrt{9} = 3$ .
- Notasi " $A \text{ shl } N$ " dengan  $A$  bilangan biner (terdiri dari angka 0 dan 1) akan menambah  $N$  angka 0 di sebelah kanan bilangan  $A$  semula, misal  $01 \text{ shl } 2 = 0100$ .
- Notasi " $A \text{ shr } N$ " dengan  $A$  bilangan biner (terdiri dari angka 0 dan 1) akan membuang  $N$  angka dari sebelah kanan bilangan  $A$  semula, misal  $0101 \text{ shr } 2 = 01$ .
- Notasi " $A \text{ XOR } B$ ", bila  $A$  dan  $B$  bilangan-bilangan bulat, adalah operasi biner antara tiap bit bilangan  $A$  dan  $B$ , dimana untuk setiap operasi bitnya akan berharga 1 jika hanya tepat ada satu bit bernilai 1, misal  $1 \text{ XOR } 3 = 01_2 \text{ XOR } 11_2 = 10_2 = 2$ .

**LEMBAR JAWABAN DAN PENILAIAN**  
**OSK 2012 - BIDANG INFORMATIKA/KOMPUTER**  
**VERSI IF02**

**Identitas Peserta (Diisi Peserta)**

No Kursi/Peserta: \_\_\_\_\_ Nama: \_\_\_\_\_

Alamat Rumah: \_\_\_\_\_

Sekolah: \_\_\_\_\_ Kelas: \_\_\_\_\_

Alamat Sekolah: \_\_\_\_\_

Beri **tanda silang (x)** pada huruf pilihan di baris sebelah kanan dari nomor soal ybs.

**No**

**Soal**      **Pilihan Jawaban**

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

**No**

**Soal**      **Pilihan Jawaban**

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

**Kotak Penilaian**  
**(Diisi Oleh Juri Penilai)**

Jml Benar = \_\_\_\_\_ (A)

Jml Salah = \_\_\_\_\_ (B)

Nilai  $(4 \times A - B) =$

\_\_\_\_\_

(Tanda tangan dan  
nama Ketua Juri Penilai)

### **BAGIAN A: ARITMATIKA DAN LOGIKA (30 SOAL)**

1. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, ..., ..., ...  
A. 7, 8, 14  
B. 7, 9, 13  
C. 7, 9, 22  
D. 8, 9, 15  
E. 9, 10, 20
2. Jika  $N!$  adalah  $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$ , berapakah angka terakhir bukan 0 dari  $20!$   
A. 1  
B. 2  
C. 4  
D. 6  
E. 8
3. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang hanya habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Ada berapa banyak bilangan prima pada rentang 1..100?  
A. 25  
B. 24  
C. 23  
D. 22  
E. 21
4. Berapa jumlah kemungkinan kata (kombinasi huruf) yang bisa dibentuk dari huruf-huruf ini: 't', 'u', 'g', 'u'?  
A. 12  
B. 14  
C. 20  
D. 22  
E. 24
5. Budi memiliki  $x$  es krim dan setiap es krim ada batangnya. Budi menyimpan setiap batang es krim yang telah dimakannya. Jika Budi sudah mengumpulkan  $y$  buah batang es krim, maka dia bisa menukarkannya dengan satu buah es krim. Untuk  $x = 100$  dan  $y = 5$  maka berapakah total es krim yang dimiliki budi?  
A. 100  
B. 114  
C. 120  
D. 124  
E. 125
6. Tidak ada yang *finish* bersamaan  
A. 720  
B. 120  
C. 60  
D. 30  
E. 5
7. Tidak ada yang *finish* bersamaan dan pembalap yang start pada posisi **ganjil harus** finish pada posisi **ganjil** juga  
A. 8  
B. 12  
C. 16  
D. 24  
E. 36
8. Tidak ada yang *finish* bersamaan dan pembalap yang start pada posisi **genap tidak boleh** finish pada posisi **genap**  
A. 86  
B. 66  
C. 46  
D. 36  
E. 26
9.  $x = 0.147$ ;  
 $y = \sqrt{0.147}$ ;  $\{\sqrt{A}\}$  adalah akar dari  $A$   
 $z = 0.147^2$ ;  
maka  
A.  $x > y > z$   
B.  $x > z > y$   
C.  $y > x > z$   
D.  $y > z > x$   
E.  $z > x > y$
10. Ada sebuah dadu ajaib 6 sisi yang *imbalance* (tidak seimbang). Peluang munculnya angka 1..6 jika melempar dadu tersebut berbeda-beda, sesuai dengan fungsi  $p(x) = x/21$ , untuk  $0 < x < 7$ . Jika dadu tersebut dilempar 2 kali dan hasilnya dijumlahkan, berapa nilai total yang peluang munculnya paling besar?  
A. 5  
B. 6  
C. 7  
D. 8  
E. 9

#### **Deskripsi berikut untuk nomor 6-8**

Pada suatu balap mobil diketahui ada 5 pembalap yang ikut serta. Jika tidak ada yang *start* bersamaan berapa kemungkinan urutan *finish* jika:

**Deskripsi berikut untuk nomor 11-13**

Ada 4 orang yang diinterview mengenai penghasilannya. Sebut saja namanya A,B,C,D dan profesi mereka E,F,G,H.

Setiap orang memberikan 2 pernyataan. Namun, pernyataan yang dapat dipercaya hanyalah pernyataan yang membicarakan pekerjaan asli orang tersebut. Pernyataan lain bisa benar maupun salah.

Berikut pernyataan keempat orang tersebut:

A: G memiliki penghasilan 3 kali lipat dari penghasilan F.

E memiliki penghasilan lebih besar daripada saya.

B: F memiliki penghasilan lebih besar daripada G.

C pekerjaannya adalah H atau E.

C: Saya memiliki penghasilan lebih besar daripada E.

F memiliki penghasilan paling rendah.

D: G memiliki penghasilan 2 kali lipat dari penghasilan F.

Saya memiliki penghasilan lebih besar daripada H.

11. Siapakah yang perkerjaannya adalah E?

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. C atau D

12. Apakah pekerjaan dari D?

- A. E
- B. F
- C. G
- D. H
- E. G atau H

13. Manakah pernyataan berikut yang benar?

- A. Jika A adalah seorang H, maka C adalah seorang F
- B. Jika A adalah seorang H, maka D adalah seorang E
- C. Jika B adalah seorang F, maka C adalah seorang H
- D. Jika C adalah seorang G, maka B adalah seorang H
- E. Jika D adalah seorang E, maka C adalah seorang G

14. Pada suatu hari, si **a** memilih 11 bilangan secara acak di antara 1..21. Kesebelas bilangan tersebut tidak ada yang sama. Selanjutnya **a** akan menghitung ada berapa pasang bilangan **a** dan **b** pada 11 bilangan tersebut yang memenuhi  $a \bmod b = 0$  dan **a** tidak

sama dengan **b**. Pernyataan manakah di bawah ini yang benar?

- A. Bisa saja tidak ada satu pasang bilangan pun yang memenuhi syarat tersebut.
- B. Minimal ada 1 pasang bilangan yang memenuhi syarat tersebut.
- C. Minimal ada 2 pasang bilangan yang memenuhi syarat tersebut.
- D. Minimal ada 3 pasang bilangan yang memenuhi syarat tersebut.
- E. Minimal ada 4 pasang bilangan yang memenuhi syarat tersebut.

15. Suatu negara hanya memiliki pecahan uang 11, 12, dan 13. Berapakah nominal yang tidak bisa dinyatakan dengan pecahan-pecahan tersebut?

- A. 37
- B. 46
- C. 53
- D. 69
- E. 74

16. Diketahui  $FPB(a,b)=c$ . Jika  $a>b$  dan  $b=210$ , berapakah nilai **a** dan **c** yang mungkin sehingga **c** merupakan nilai terbesar dari pilihan di bawah ini?

- A. 216 dan 6
- B. 294 dan 7
- C. 426 dan 6
- D. 637 dan 7
- E. 637 dan 14

17. Pada suatu hari, **a**, **b**, **c**, dan **d** pergi ke pasar. Mereka melihat ada 4 barang yang sedang didiskon 90% dan mereka memutuskan untuk membeli keempat barang tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu teman mereka, **e** yang ternyata sedang membutuhkan keempat barang tersebut. **e** ingin mengetahui harga masing-masing barang tersebut dan menyanyakannya pada **a**, **b**, **c**, dan **d**. Sayangnya mereka berempat sudah lupa harga masing-masing barang tersebut sehingga mereka hanya memberitahukan jumlah masing-masing barang yang dibeli beserta total harganya. Setelah mendapat informasi tersebut, **e** berkata, “wah, sayang sekali, saya masih belum dapat menentukan harga setiap barang tersebut hanya berdasarkan keterangan dari kalian.”. **e** merupakan orang yang pandai menghitung dan informasi yang diperolehnya adalah:

- **A** membeli **x** barang **i**, 2 barang **ii**, 1 barang **iii**, dan 3 barang **iv** seharga Rp 15.000,00.
- **B** membeli 3 barang **i**, 1 barang **ii**, 3 barang **iii**, dan 4 barang **iv** seharga Rp 25.000,00.

- C membeli 4 barang i, 2 barang ii, 3 barang iii, dan 5 barang iv seharga Rp 31.000,00.
- D membeli 2 barang i, 1 barang ii, 2 barang iii, dan 3 barang iv seharga Rp 18.000,00.

Berapakah nilai x?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

18. Ibu Martha sedang belanja di pasar. Ia hendak berbelanja tepung untuk membuat kue. Ia hanya membawa uang Rp 10.000,00. Sementara itu ia melihat 5 merk tepung, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk	Harga	Jumlah kue yang dapat dihasilkan
A	Rp 1.000,00	2
B	Rp 3.000,00	5
C	Rp 4.000,00	7
D	Rp 2.000,00	5
E	Rp 2.000,00	6

Toko yang Ibu Martha datang hanya memiliki tepat satu unit tepung untuk setiap merknya. Berapa kue yang dapat Ibu Martha hasilkan dengan batasan uang yang ia miliki?

- A. 17
- B. 18
- C. 20
- D. 21
- E. 25

19. Suatu keluarga yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita menghabiskan 7 pasta gigi selama 120 hari. Suatu keluarga lain yang terdiri dari 2 wanita dan 3 orang pria menghabiskan 3 pasta gigi selama 20 hari. Berapa pasta gigi yang dihabiskan oleh sebuah keluarga yang terdiri dari 4 wanita dan seorang pria selama 60 hari?

- A. 11
- B. 12
- C. 10
- D. 9
- E. 8

20. Dalam sebuah ruang terdapat 6 komputer dan 2 kabel yang identik. Sebuah kabel dapat menghubungkan tepat 2 komputer. Dua komputer hanya dapat terhubung oleh maksimal 1 kabel. Ada

berapa macam pemasangan kabel yang mungkin dalam ruangan tersebut?

- A. 12
- B. 24
- C. 75
- D. 105
- E. semua salah

21. Ada 100 orang yang sedang mengantri untuk menggunakan toilet umum. Ternyata ada tepat 4 orang di antara mereka yang lahir pada tanggal 1. Pernyataan manakah di bawah ini yang paling benar
- A. Tidak mungkin ada 4 orang yang berulang tahun pada tanggal yang sama (selain tanggal 1) di antara 100 orang tersebut.
  - B. Tidak mungkin ada  $x$  ( $x > 4$ ) orang yang berulang tahun pada tanggal yang sama di antara 100 orang tersebut.
  - C. Mungkin ada  $x$  ( $x > 4$ ) orang yang berulang tahun pada tanggal yang sama di antara 100 orang tersebut.
  - D. Pasti ada 4 orang yang berulang tahun pada tanggal yang sama (selain tanggal 1) di antara 100 orang tersebut.
  - E. Ada lebih dari 2 pernyataan (antara A - D) yang benar.

#### Deskripsi berikut untuk nomor 22-24

Di negeri tempat Ali tinggal, terdapat 5 kota: kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Ali memiliki sebuah jam pasir ajaib. Ketika jam pasir itu dibalik, ia dapat berpindah tempat secara seketika, namun tidak semua rute perpindahan tempat dari setiap kota yang ada tersedia. Jam pasir ajaib tersebut juga memiliki batasan pemakaian. Rute perpindahan kota yang disediakan oleh jam pasir tersebut adalah : A ke B, A ke C, B ke C, C ke E, D ke E, D ke A, dan E ke B.

22. Saat ini Ali berada di kota D. Jika jam pasir tersebut hanya dapat dipakai maksimum 2 kali, kota mana sajakah yang dapat dicapai oleh Ali?

- A. A
- B. B
- C. C
- D. E
- E. Semua salah

23. Jika jam pasir tersebut dapat dipakai tanpa batas, rute perjalanan manakah yang dapat ditambahkan dalam layanan jam pasir tersebut, supaya Ali dapat menempuh perjalanan dari kota manapun menuju kota manapun?

- A. Dari kota A ke kota D
  - B. Dari kota B ke kota E
  - C. Dari kota C ke kota D
  - D. Dari kota D ke kota B
  - E. Dari kota E ke kota A
24. Jika jam pasir tersebut dapat dipakai tanpa batas, perjalanan manakah yang tidak dapat Ali lakukan dengan menggunakan jam pasir tersebut?
- A. Dari kota A menuju kota D
  - B. Dari kota D menuju kota C
  - C. Dari kota A menuju kota E
  - D. Dari kota E menuju kota B
  - E. Dari kota C menuju kota B
25. Bilangan kuadrat A adalah bilangan dimana terdapat bilangan bulat B sehingga  $B \cdot B = A$ . Ada berapa bilangan kuadrat antara 212 hingga 2012?
- A. 20
  - B. 25
  - C. 30
  - D. 44
  - E. 49
26. Semua bilangan di bawah ini bisa dihasilkan dari penjumlahan dua buah bilangan prima, kecuali:
- A. 46
  - B. 59
  - C. 61
  - D. 73
  - E. 84

**Deskripsi berikut untuk nomor 27-30**

Sebuah pohon keluarga terdiri dari 10 anggota keluarga A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Diketahui beberapa fakta sebagai berikut

- E adalah ibu dari I
- B adalah ibu menantu dari F
- J adalah anak tunggal. Dia juga keponakan dari C

- A dan B adalah pasangan suami-istri yang memiliki dua anak. Keduanya laki-laki.
- H adalah seorang perempuan, sedangkan adik dan kakaknya semuanya laki-laki.
- G memiliki paman D
- D adalah kakak ipar E

Semua orang terhubung dalam pohon keluarga dan tidak ada orang yang hilang.

27. Siapakah yang tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya?
- A. A
  - B. C
  - C. F
  - D. I
  - E. J
28. Yang mungkin menjadi adik dari H adalah?
- A. C
  - B. E
  - C. F
  - D. I
  - E. J
29. Ayah dari J adalah?
- A. A
  - B. C
  - C. F
  - D. D
  - E. G
30. Siapakah yang pasti lebih tua dari C?
- A. A
  - B. D
  - C. E
  - D. F
  - E. G

**BAGIAN B: ALGORITMIKA (20 SOAL)****[Peringatan: Seluruh penulisan notasi algoritma menggunakan Pseudopascal]**

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 31, 32)

```

x := x xor y;
x := y xor x;
x := x xor y;

```

31. Jika nilai awal x dan y adalah 3 dan 4, maka setelah kode di atas dijalankan nilainya adalah:
- x=4, y=3
  - x=4, y=4
  - x=5, y=4
  - x=6, y=4
  - x=7, y=4
32. Jika nilai awal x dan y adalah 1 dan 0, maka setelah kode di atas dijalankan nilainya adalah:
- x=1, y=0
  - x=0, y=1
  - x=0, y=0
  - x=1, y=1
  - x=1, y=2

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 33)

```

A := 0
for i := C to D do
    A := (A+i) mod 5
output (A)

```

33. Jika output yang muncul di layar adalah 3 dan nilai variabel C dan D hanya boleh berada di antara 0..255, ada berapa banyak kemungkinan pasangan nilai C dan D yang menghasilkan output tersebut?
- 2
  - 5
  - 1326
  - 2652
  - 5253

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 34, 35)

```

a:=7; b:=1;
while(a<=n) do
    begin
        a:=a+b;
        b:=b+1;
    end;
writeln(a);

```

34. Berapakah nilai n yang tidak mungkin supaya output program tersebut adalah 52?
- 41
  - 45
  - 49
  - 50
  - semua mungkin
35. Jika nilai n adalah 200, berapakah nilai variabel b di akhir potongan program?
- 25
  - 24
  - 23
  - 22
  - 21

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 36 s.d 38)

```

procedure swap(a,b,c:integer);
var
    temp : array[1..20]:integer;
    i,j : integer;
begin
    j := 1;
    for i := b+1 to c do
        begin
            temp[j] := x[i];
            j := j+1;
        end;
    for i := a to b do
        begin
            temp[j] := x[i];
            j := j+1;
        end;
    j := 1;
    for i := a to c do
        begin
            x[i] := temp[j];
            j := j+1;
        end;
    end;
end;

```

36. Jika array x berisi (1,2,3,4,5,6). Dan dilakukan pemanggilan swap(2,4,6) maka akan menghasilkan output :
- 1,6,5,4,3,2
  - 1,5,6,4,2,3
  - 1,4,5,6,2,3
  - 1,5,6,2,3,4
  - 1,2,5,6,3,4

37. Jika array x berisi (6,4,3,5,1,2). Dan dilakukan pemanggilan swap(1,2,4) dan swap(3,4,5) maka akan menghasilkan output :

- A. 1,3,6,4,5,2
- B. 3,5,1,4,6,2
- C. 3,5,1,6,4,2
- D. 4,3,1,5,6,2
- E. 4,3,5,1,6,2

38. Jika array x berisi (5, 8, 10, 11, 25, 30, 33, 42, 49, 54, 63, 64, 66, 75, 78, 84, 93, 96). Dan diinginkan baris tersebut tersusun terbalik. Berapa kali minimal pemanggilan swap dilakukan?

- A. 16
- B. 17
- C. 18
- D. 19
- E. 20

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 39, 40)

```
for i:=1 to 4 do begin
  for j:=1 to x do write(' ');
  for j:=y downto i do write('*');
  writeln;
end;
```

39. Untuk menghasilkan output seperti di bawah ini:

```
*****
*****
***
*
```

Nilai x dan y harus diganti dengan ...

- A. i dan 4
- B. i dan 7
- C. i-1 dan 4-i
- D. i-1 dan 7-i
- E. i-1 dan 8-i

40. Untuk menghasilkan output seperti di bawah ini:

```
*
**
***
****
```

Nilai x dan y harus diganti dengan ...

- A. 4 dan  $2*i$
- B.  $4-i$  dan  $2*i$
- C. 4 dan  $2*i-1$
- D.  $4-i$  dan  $2*i-1$
- E. Semua salah

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 41 s.d 44)

```
for i := 0 to ((1 shl n) - 1) do
begin
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
    if((i and (1 shl j)) <> 0) then
      write('1')
    else
      write('0');
  end;
  writeln;
end;
```

41. Jika kode di atas dijalankan dengan  $n = 3$ , maka banyak angka 0 yang dihasilkan oleh instruksi pada baris ke-8 adalah:

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1

42. Untuk setiap baris hasil keluaran, selisih jumlah angka 1 paling banyak adalah:

- A. n
- B.  $n*n$
- C.  $n*(n-1)/2$
- D.  $\log(n)$
- E.  $\log(n)/2$

43. Agar keluaran kode di atas menjadi angka 0 semua pada baris ganjil dan hanya sebuah angka 1 pada baris genap paling kiri, maka baris kelima harus diganti menjadi:

- A.  $\text{if}((i \text{ and } (1 \text{ shl } j)) = 1) \text{ then}$
- B.  $\text{if}((i \text{ or } (1 \text{ shl } j)) = 0) \text{ then}$
- C.  $\text{if}((j \text{ and } (1 \text{ shl } i)) = 1) \text{ then}$
- D.  $\text{if}((j \text{ or } (1 \text{ shl } i)) = 0) \text{ then}$
- E.  $\text{if}((j \text{ xor } (1 \text{ shl } i)) = 0) \text{ then}$

44. Agar keluaran kode di atas sama dengan 1100, maka nilai n yang harus diinput adalah:

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1



Diberikan potongan pseudocode berikut (no 45, 46)

```
b = 0
while c > 1 do
  b = b + (a mod 2) * c
  a = a/2
  c = c/2
b = b + (a mod 2) * c
```

45. Nilai variabel a hanya dapat berada di antara 0..255 dan nilai variabel c hanya dapat berada di antara 0..65535. Jika c diinisialisasi dengan 512 dan nilai akhir b adalah 20, berapa nilai awal a?
- A. 5  
B. 10  
C. 96  
D. 160  
E. 192
46. Jika nilai awal a adalah 107 dan nilai akhir b adalah 13, berapa nilai awal c?
- A. 32  
B. 16  
C. 8  
D. 4  
E. 2

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 47, 48)

```
function yo (m,n:integer):integer;
begin
  if n=1 then yo := m
  else if (n and 1)=0 then
    yo := yo(m,n shr 1) *
      yo(m,n shr 1)
  else
    yo := yo(m,n shr 1) *
      yo(m,n shr 1) * m;
end;
```

47. Berapa hasil yo(2,10)?
- A. 20  
B. 128  
C. 1024  
D. 1280  
E. 2048
48. Berapa kali fungsi yo dijalankan jika m=4 dan n=10?
- A. 16  
B. 15  
C. 13  
D. 10  
E. 8

Diberikan potongan pseudocode berikut (no 49, 50)

```
procedure semu(d:string);
var
  i:integer;
  tmp:string;
begin
  if (length(d)=n) then
    writeln(d)
  else
    for i:=1 to n do
      begin
        str(i,tmp);
        haha(d+tmp);
      end;
end;
```

catatan :

- length() digunakan untuk menghitung panjang suatu string, contoh : length("TOKI") = 4
- str() digunakan untuk mengubah variabel bertipe integer menjadi bertipe string

49. Jika n bernilai 4, apakah 4 baris pertama dari output yang diberikan oleh pemanggilan semu("12")?

- A. 1211  
1212  
1213  
1214
- B. 1211  
1212  
1221  
1222
- C. 1212  
1213  
1214  
1221
- D. 1234  
1243  
1324  
1342

50. Untuk mencetak seluruh permutasi urutan bilangan asli  $\leq n$ , bagaimana seharusnya prosedur semu dipanggil?

- A. semu ('0')  
B. semu ('1')  
C. semu ('012')  
D. semu ('123')  
E. semua salah