滑囊炎（关节肿痛）

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/bone-joint-and-muscle-disorders/muscle-bursa-and-tendon-disorders/bursitis
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

黏液囊炎
滑囊炎是滑囊的疼痛性炎症，滑囊是一个充满液体的扁囊，可在皮肤、肌肉、肌腱和韧带与骨骼的摩擦处提供缓冲。
症状 |
诊断 |
治疗 |
多媒体 |
运动时通常疼痛，接近皮肤的滑囊可产生肿胀和压痛。
运动时通常疼痛，接近皮肤的滑囊可产生肿胀和压痛。
滑囊周围的疼痛可提示诊断，但有时需抽出滑液分析和影像学检查。
滑囊周围的疼痛可提示诊断，但有时需抽出滑液分析和影像学检查。
休息后进行物理治疗、夹板固定、使用非甾体类抗炎药（NSAID），有时还需要注射类固醇（有时称为皮质类固醇或糖皮质激素），通常可以缓解症状。
休息后进行物理治疗、夹板固定、使用非甾体类抗炎药（NSAID），有时还需要注射类固醇（有时称为皮质类固醇或糖皮质激素），通常可以缓解症状。
正常情况下，滑囊内有少量滑液，起到缓冲作用。滑囊可以减少摩擦，防止组织结构相互摩擦造成的磨损和撕裂。有些滑囊正好位于皮肤下方（表浅滑囊）。其他滑囊则位于肌肉和肌腱下方（深部滑囊）。如果损伤或过度使用，滑囊可产生炎症，过多的液体会积聚在滑囊内。
滑囊炎 的病因通常是
异常使用或过度使用产生的刺激
异常使用或过度使用产生的刺激
它也可能由损伤、 痛风 、 假性痛风 、 类风湿性关节炎 、骨关节炎、 银屑病关节炎 或某些感染引起，尤其是由 金黄色葡萄球菌 引起的感染。但通常原因不明。
肩部最易产生滑囊炎，而肘部、髋部（转子间滑囊炎）、骨盆、膝关节、足趾、足跟（ 跟腱滑囊炎 ）等部位滑囊也经常受累。肩部的滑囊炎一般也是由肩关节周围的肌腱的炎症引起（ 肩袖肌腱炎 -活动、围绕并稳定住肩关节的肌腱和其他组织称为肩袖）。
滑囊炎的症状
滑囊炎可产生疼痛并容易使得活动受限，但特殊的症状取决于滑囊的部位。如当肩关节的滑囊产生炎症时，抬起上肢并外展的动作会受限并产生困难与疼痛（如穿衣时的动作）。然而，肘部的滑囊炎虽然可引起肿胀，但没有或仅有一些不适或活动受限。
这张照片显示发红发炎的肘部。
科学图片库
急性滑囊炎 可持续几小时或数天。炎症区域可有活动时的疼痛或压痛。覆盖在滑膜上的皮肤，如膝关节和肘关节附近的皮肤，可发红和肿胀。由感染或 痛风 引起的急性滑囊炎可能特别痛苦，受累的部

位可能发红并发热。
这张照片显示患有髌前滑囊炎（女佣膝）的人的红色和发炎膝盖的侧视图。
科学图片库
慢性滑囊炎 由反复或持续性急性滑囊炎发作或反复损伤引起。有时，滑囊壁会增厚。损伤的滑囊容易受到不正常的锻炼和拉伤影响，炎症也较重。长期存在的疼痛和肿胀会限制活动，导致肌肉萎缩。慢性滑囊炎的发作可能持续数月，并可能经常复发。
滑囊炎的诊断
医师的评估
医师的评估
有时需要影像学检查
有时需要影像学检查
有时要检查滑液
有时要检查滑液
当患者滑囊周围部位感到疼痛、触痛，或关节活动引起疼痛时，医生应考虑滑囊炎的诊断。
如果浅表滑囊（特别是膝关节或肘关节的滑囊）明显肿胀，医生可能会用针头从滑囊中抽取一份液体样本。样本将用于检测炎症的原因，如感染或 痛风 。
X 光检查 通常是在滑囊炎治疗效果不佳或复发的情况下需要，或者如果医生怀疑关节出现问题（如关节炎）。
磁共振成像（MRI）或 超声检查 可用于帮助确诊深部滑囊炎。
滑囊炎的治疗
止痛药、消炎药和休息
止痛药、消炎药和休息
治疗任何痛风或感染
治疗任何痛风或感染
有时会注射类固醇
有时会注射类固醇
急性滑囊炎， 如果不是感染引起，通常可采用下列方法治疗：
受累关节的临时休息和制动（如夹板固定）
受累关节的临时休息和制动（如夹板固定）
疼痛区域冰敷
疼痛区域冰敷
非甾体类抗炎药（NSAID）
非甾体类抗炎药（NSAID）
休息和制动后进行物理治疗
休息和制动后进行物理治疗
有时需要更强的止痛药。医生经常会将局麻药和类固醇类药物混合后注射入滑囊内，特别是肩关节受累时。这种治疗一般在注射后几天缓解症状，但几个月后可能需要重复注射。用针头吸出积液也可能有助于减轻疼痛。
有严重急性滑囊炎的病人有时可以给予类固醇，如泼尼松，口服几天。当疼痛消退后，患者应进行特殊的锻炼来增加关节的活动范围。
慢性滑囊炎， 如果不是由感染引起，可采用相同的方法治疗，尽管休息和制动效果不那么明显。很少需要外科手术切除滑囊。
通常， 物理治疗 能帮助恢复关节功能。锻炼可以增加萎缩肌肉的力量，恢复关节的全活动范围。
感染性滑囊炎 必须抽吸滑液，并给予适当的抗生素，通常是抗 金黄色葡萄球菌 的。

如果滑囊炎的病因如 痛风 、 类风湿性关节炎 、慢性过度使用等因素没有治疗或纠正，则通常会复发。