肝脏血液检测

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/liver-and-gallbladder-disorders/diagnosis-of-liver-gallbladder-and-biliary-disorders/liver-blood-tests
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

肝脏血液检测
多媒体 |
肝脏检测是一种血液检查，是以一种非侵入性方式来筛查一些肝脏疾病（例如，输血性 病毒性肝炎），并衡量肝脏疾病的严重程度和进展情况，以及对治疗的反应。
实验室检查通常可有效检测以下项目：
检测肝脏炎症或损伤
检测肝脏炎症或损伤
评估肝脏合成蛋白质的功能状态（即“合成”功能）
评估肝脏合成蛋白质的功能状态（即“合成”功能）
评估胆汁在肝脏、胆囊和胆道系统中的处理与运输效率
评估胆汁在肝脏、胆囊和胆道系统中的处理与运输效率
评估 肝损伤 的严重程度
评估 肝损伤 的严重程度
监测肝病病程和患者对治疗的反应
监测肝病病程和患者对治疗的反应
重新界定诊断
重新界定诊断
肝脏检测是用血液样本测定肝脏所产生的酶和其他物质的水平。这些物质包括：
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)
白蛋白
白蛋白
碱性磷酸酶 (ALP)
碱性磷酸酶 (ALP)
甲胎蛋白 (AFP)
甲胎蛋白 (AFP)
天冬氨酸氨基转移酶 (AST)
天冬氨酸氨基转移酶 (AST)
胆红素
胆红素
γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)
γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)
乳酸脱氢酶 (LDH)
乳酸脱氢酶 (LDH)

5’-核苷酸酶
5’-核苷酸酶
凝血酶原时间（PT）和国际标准化比值（INR）
凝血酶原时间（PT）和国际标准化比值（INR）
部分凝血活酶时间（PTT）
部分凝血活酶时间（PTT）
某些物质的水平可反映肝脏炎症和肝细胞损伤的存在及其程度（例如 ALT、AST）。其他物质的水平反应了肝脏执行其正常蛋白质合成（例如 白蛋白 ）和胆汁处理及分泌（例如胆红素）功能的情况。在患有其他非肝脏相关性疾病的患者中，这些值中的一些值也会高于正常范围。
总体而言，肝损伤和炎症可通过 ALT 和 AST 反映；肝脏合成蛋白质的能力可通过 白蛋白 和 PT 体现；而处理和/或运输胆汁的能力则可通过胆红素、GGT、5'-核苷酸酶和 ALP 来评估。这些检查之间存在一定程度的重叠。
凝血酶原时间（PT）用于计算国际标准化比值（INR）。PT和INR都用于测定血液凝成块所需的时间（肝脏会合成血液凝结所需的某些蛋白质，称为凝血因子）。PT 或 INR 结果异常，则为急性或慢性肝病。而在急性和慢性肝病中，PT 或 INR 值升高通常表明已进展至 肝衰竭 。
为确定任何肝脏检查异常的可能原因，医生还将采集病史，并可能 进行影像学检查 和/或进行 肝活检 。