蒙脱石散

知识类别：药品说明书
资料来源：中国医药信息查询平台（经审核认证词条，逐字转载）
来源 URL：https://www.dayi.org.cn/drug/1025700.html
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

蒙脱石散
蒙脱石散，西药名。为止泻药。适用于成人及儿童急、慢性腹泻。
英文名称
汉语拼音
药品类型
处方类型
医保类型
参考价格
成分
性状
适应症
规格
用法用量
不良反应
禁忌
注意事项
药物相互作用
药理作用
贮藏方法
有效期
执行标准
批准文号
附注
成分
本品每袋含主要成份蒙脱石3克。
辅料为葡萄糖、糖精钠、香兰素。
性状
本品为类白色或灰白色或微黄色或微红色细粉，味香甜。
适应症
本品适用于成人及儿童急、慢性腹泻。
规格
每袋含蒙脱石3g。
用法用量
口服，成人每次1袋（3克），一日3次。
儿童1岁以下每日1袋，分3次服；

1-2岁每日1-2袋，分3次服；
2岁以上每日2-3袋，分3次服。
服用时将本品倒入半杯温开水（约50毫升）中混匀快速服完。治疗急性腹泻时首次剂量应加倍。
不良反应
少数人可能产生轻度便秘。
禁忌
对本品及所含成份过敏者禁用。
注意事项
1、治疗急性腹泻时，应注意纠正脱水。
2、如出现便秘，可减少剂量继续服用。
3、需同服肠道杀菌药时，请咨询医师。
4、儿童用量请咨询医师或药师。
5、儿童急性腹泻服用本品1天后，慢性腹泻服用2-3天后症状未改善，请咨询医师或药师。
6、如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8、本品性状发生改变时禁止使用。
9、请将本品放在儿童不能接触的地方。
10、儿童必须在成人监护下使用。
11、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
药物相互作用
如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
药理作用
本品为天然蒙脱石微粒粉剂，具有层纹状结构和非均匀性电荷分布；对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素、气体等有极强的固定、抑制作用，使其失去致病作用；此外对消化道黏膜还具有很强的覆盖保护能力，修复、提高黏膜屏障对攻击因子的防御功能，具有平衡正常菌群和局部止痛作用。
贮藏方法
密封，在干燥处保存。
有效期
执行标准
《中国药典》2025年版二部及YBH05932019（粒度，干燥失重）。
批准文号
国药准字H20074198。
附注
请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。