广泛性焦虑障碍

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/mental-health-disorders/anxiety-and-trauma-and-stressor-related-disorders/generalized-anxiety-disorder
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

广泛性焦虑障碍
广泛性焦虑障碍包括对多种活动或事情的过分紧张和担心。在 6 个月或更长时间内，患者焦虑的天数比不焦虑的天数多。病因不明，但 酒精使用障碍 、 重度抑郁症 或 惊恐障碍 的患者通常同时存在广泛性焦虑障碍。
症状 |
诊断 |
治疗 |
了解更多信息 |
患者会因为各种各样的问题、活动和情境而感到焦虑和担忧。
患者会因为各种各样的问题、活动和情境而感到焦虑和担忧。
诊断该疾病时，除焦虑外还需具备其他症状（如容易疲劳、难以集中注意力和肌肉紧张）。
诊断该疾病时，除焦虑外还需具备其他症状（如容易疲劳、难以集中注意力和肌肉紧张）。
常需联合药物治疗（常使用抗焦虑药，有时也可使用抗抑郁药）和心理咨询进行治疗。
常需联合药物治疗（常使用抗焦虑药，有时也可使用抗抑郁药）和心理咨询进行治疗。
广泛性焦虑障碍是一种常见的 焦虑障碍 。全球每年约有 2% 的成年人和美国 3% 至 4% 的人患有此病症。女性的发病率是男性的两倍。这种疾病更常开始于成年期，但也可能始于任何年龄（参见 儿童广泛性焦虑障碍 ）。
对大多数人来说，这种病症会持续多年，并且会波动，有时会加重（尤其是在应激的时候）。
广泛性焦虑障碍的症状
广泛性焦虑障碍的患者常常感到担心或苦恼，觉得很难控制自己的情绪。担忧的严重程度、频率或持续时间远超情境所需。
焦虑的内容很广泛，涉及多个主题，且常随着时间变换主题。常见的担心包括工作和家庭责任、金钱、健康、安全、车辆维修和琐事。
大多数患有广泛性焦虑障碍的患者也患有其他精神健康障碍，例如抑郁症或其他焦虑障碍。
广泛性焦虑障碍的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
诊断广泛性焦虑障碍时，患者的担忧或焦虑需满足以下情况
过度
过度
涉及很多活动和事件
涉及很多活动和事件
在 6 个月或更长时间内的大多数日子里存在
在 6 个月或更长时间内的大多数日子里存在

此外，患者必须具备下列症状中的 3 个或更多：
烦躁不安或紧张或快到极限的感觉
烦躁不安或紧张或快到极限的感觉
容易疲劳
容易疲劳
难以集中精力
难以集中精力
应激
应激
肌肉紧张
肌肉紧张
睡眠不安
睡眠不安
在诊断广泛性焦虑障碍之前，医生还会进行体格检查。他们可能会做血液或其他测试，以确保症状不是由躯体疾病或使用药物造成的。
广泛性焦虑障碍的治疗
药物和心理治疗相结合
药物和心理治疗相结合
该病通常联合使用某种心理治疗和药物治疗。心理治疗可处理焦虑的成因并提供应对方式。
抗抑郁药 ，特别是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（例如艾司西酞普兰）和 5-羟色胺- 去甲肾上腺素再摄取抑制剂（例如文拉法辛），对广泛性焦虑障碍有效。这些抗抑郁药通常使用几周以缓解焦虑，因此有些患者首先被给予苯二氮䓬类药物和抗抑郁药联合应用。苯二氮卓类药物是能够迅速缓解焦虑的抗焦虑药物，通常几乎会马上起效。然而，由于长期使用苯二氮卓类药物会导致药物依赖和成瘾（参见 抗焦虑药物和镇静剂的滥用 ），这些药物通常只短期服用。当抗抑郁药和心理治疗开始起效后，应缓慢减少苯二氮卓类药物的剂量，直至停用。苯二氮卓类药物不应突然停用。
丁螺环酮是另一种抗焦虑药物，对某些广泛性焦虑障碍患者也有效。丁螺环酮可能需要 2 周或更长时间才能起效，并且可能需要逐渐增加剂量才能有效。
卡法胡椒 等草药可能有抗焦虑作用，尽管其治疗焦虑障碍如广泛性焦虑障碍的有效性和安全性还需要进一步研究。
认知行为疗法 已被证明是治疗广泛性焦虑障碍最有益的方法。通过这种疗法，人们学会做以下事情：
辨别他们的思维哪里被扭曲
辨别他们的思维哪里被扭曲
控制他们扭曲的思维
控制他们扭曲的思维
相应地修改其行为
相应地修改其行为
放松 、瑜伽、 冥想 、 运动 和 生物反馈 等技巧也可能有所帮助。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。
美国国家精神卫生研究所，广泛性焦虑障碍
美国国家精神卫生研究所，广泛性焦虑障碍