影响药物反应的因素（年龄/特殊人群）

知识类别：用药安全与特殊人群
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/drugs/factors-affecting-response-to-medications/overview-of-response-to-medications
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

药物反应概述
多媒体 |
每个人对药物的反应不同。一个人对药物的反应方式受许多因素影响，包括：
遗传组成
遗传组成
年龄
年龄
体型
体型
使用其他药物和膳食补充剂（如 草药 ）
使用其他药物和膳食补充剂（如 草药 ）
进食（包括饮料）
进食（包括饮料）
基础疾病（如肾脏或肝脏疾病）
基础疾病（如肾脏或肝脏疾病）
药物的储存（药物是否储存时间过长、是否储存在错误环境下）
药物的储存（药物是否储存时间过长、是否储存在错误环境下）
产生 耐受性和抗药性
产生 耐受性和抗药性
患者是否遵医嘱用药（ 依从性 ）也影响他们对药物的反应。这些因素可以影响 身体怎样吸收药物 、身体怎样分解（ 代谢 ）和 消除药物 或药物对身体产生什么作用。
由于影响药物作用的因素很多，医生必须为每一个人选择合适的药物并仔细调整剂量。若患者同时服用其他药物或者患有其他疾病，则可能存在药物间、药物与疾病间的相互作用，这也会使药物及其剂量的选择更加复杂。
每种新药都会确定标准或平均剂量。但是，平均剂量的概念就像衣服的“一刀切”，它可能很适合不同的人，但也可能几乎不适合任何人。然而，有些药物的剂量不需要调整，因为相同剂量在几乎每个人中都效果良好。
年龄对药物反应的影响
婴儿和老人尤其会存在药物反应问题。他们的肝肾功能较弱，故经肝代谢或经肾排泄的药物会在体内蓄积，可能引起用药问题。
相比于儿童和年轻人，老年人患有更多疾病，因而服用更多种类的药物（请参见 衰老和药物 ）。服用的药物种数越多，越有可能出现药物间、药物与疾病间的相互作用。随着年龄老去，患者用药的依从性也会有所下降，例如不能在特定时间服药和避免同服某些食物。
影响药物作用的因素很多

影响药物作用的因素很多