肝炎概述

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/liver-and-gallbladder-disorders/hepatitis/overview-of-hepatitis
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

肝炎概述
肝炎是肝脏的炎症。
病因 |
多媒体 |
肝炎通常可以在世界范围内流行。
肝炎可以为
急性（短期）
急性（短期）
慢性（持续至少 6 个月）
慢性（持续至少 6 个月）
大多数病毒引起的急性肝炎（ 急性病毒性肝炎 ）可自行消退，但有一些可进展为 慢性肝炎 。（也请参见 急性病毒性肝炎概述 和 慢性肝炎概述 。）
您知道吗……
您知道吗……
疫苗接种可以预防大多数病毒性肝炎或者降低其严重性。 几个简单的，常识性的预防措施，也可帮助预防肝炎。
疫苗接种可以预防大多数病毒性肝炎或者降低其严重性。
疫苗接种可以预防大多数病毒性肝炎或者降低其严重性。
几个简单的，常识性的预防措施，也可帮助预防肝炎。
几个简单的，常识性的预防措施，也可帮助预防肝炎。
肝炎的病因
肝炎通常由以下原因引起
病毒，特别是 5 种主要肝炎病毒之一的甲、乙、丙、丁或戊型肝炎病毒
病毒，特别是 5 种主要肝炎病毒之一的甲、乙、丙、丁或戊型肝炎病毒
过量饮酒
过量饮酒
异常代谢引起的 脂肪肝
异常代谢引起的 脂肪肝
使用某些药物，如异烟肼（用于治疗肺结核）
使用某些药物，如异烟肼（用于治疗肺结核）
代谢是将食物转化为能量的过程；利用食物产生维持机体的分子，如蛋白质、碳水化合物和脂肪；并清除体内的废物。肝细胞代谢异常会导致脂肪积聚和炎症。这被称为代谢功能障碍相关性脂肪变性肝病 (MASLD)，可导致代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH)。(MASLD 以前称为非酒精性脂肪肝 [NAFLD]，而 MASH 以前称为非酒精性脂肪性肝炎 [NASH]。）

较少见的原因是引起肝脏炎症的免疫系统反应（自身免疫性肝炎）、遗传性肝脏疾病和其他病毒感染（如 传染性单核细胞增多症 、 单纯疱疹 或 巨细胞病毒感染 ）。SARS-CoV-2 感染（COVID-19）通常可引起轻微的肝炎。肝脏炎症的严重程度往往与 COVID-19 的严重程度相关，但即使患者没有 COVID-19 的症状，也可能出现轻度肝脏炎症。
肝炎病毒
肝炎病毒
传播方式
传播方式
症状与预后
症状与预后
预防
预防
甲型肝炎
甲型肝炎
摄入被感染者粪便污染的东西，通常是因为卫生条件差或卫生条件不足（称为 粪口途径 ）。
摄入被感染者粪便污染的东西，通常是因为卫生条件差或卫生条件不足（称为 粪口途径 ）。
低龄儿童通常无症状 通常在年龄较大的儿童和成人中，会出现典型的急性肝炎症状（食欲不振、恶心、呕吐和常见的黄疸） 通常会完全恢复 不会变为慢性
低龄儿童通常无症状
通常在年龄较大的儿童和成人中，会出现典型的急性肝炎症状（食欲不振、恶心、呕吐和常见的黄疸）
通常会完全恢复
不会变为慢性
在加工食物时保持良好的卫生习惯，避免水源受到污染 为所有儿童和可能感染的成人接种 甲型肝炎疫苗 如果人们有甲型肝炎病毒暴露史，可以使用甲型肝炎疫苗或标准免疫球蛋白*
在加工食物时保持良好的卫生习惯，避免水源受到污染
为所有儿童和可能感染的成人接种 甲型肝炎疫苗
如果人们有甲型肝炎病毒暴露史，可以使用甲型肝炎疫苗或标准免疫球蛋白*
乙型肝炎
乙型肝炎
比甲型肝炎更容易传播 接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：共用未灭菌针头注射违禁药物 重复使用未经灭菌的针刺纹身 性行为 分娩
比甲型肝炎更容易传播
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：
共用未灭菌针头注射违禁药物
共用未灭菌针头注射违禁药物
重复使用未经灭菌的针刺纹身
重复使用未经灭菌的针刺纹身
性行为
性行为
分娩
分娩
通常而言，比甲肝更严重，且偶可致命 乙型肝炎患者同时也患有丁型肝炎时会出现更严重的症状 除了典型的急性肝炎症状外，还会出现关节痛和皮肤瘙痒性荨麻疹（风团） 可能变为慢性，增加罹患

肝癌 的风险
通常而言，比甲肝更严重，且偶可致命
乙型肝炎患者同时也患有丁型肝炎时会出现更严重的症状
除了典型的急性肝炎症状外，还会出现关节痛和皮肤瘙痒性荨麻疹（风团）
可能变为慢性，增加罹患 肝癌 的风险
应避免高危行为，如共用针头注射药物和性滥交 为所有儿童和可能感染的人接种 乙型肝炎疫苗 （从出生开始） 有乙型肝炎病毒暴露史的人（包括感染乙型肝炎的母亲所生的婴儿），需要接受乙型肝炎免疫球蛋白*及乙型肝炎疫苗接种
应避免高危行为，如共用针头注射药物和性滥交
为所有儿童和可能感染的人接种 乙型肝炎疫苗 （从出生开始）
有乙型肝炎病毒暴露史的人（包括感染乙型肝炎的母亲所生的婴儿），需要接受乙型肝炎免疫球蛋白*及乙型肝炎疫苗接种
丙型肝炎
丙型肝炎
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间： 共用未灭菌针头注射违禁药物 重复使用未经灭菌的针刺纹身 性行为（不常见） 分娩（不常见）
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：
共用未灭菌针头注射违禁药物
共用未灭菌针头注射违禁药物
重复使用未经灭菌的针刺纹身
重复使用未经灭菌的针刺纹身
性行为（不常见）
性行为（不常见）
分娩（不常见）
分娩（不常见）
起初，通常症状轻微或没有症状，但有时在轻度和更严重症状之间交替 约 75% 的患者会变为慢性，肝脏严重瘢痕形成（ 肝硬化 ）， 肝癌 的风险增加，但通常仅在肝硬化后才出现
起初，通常症状轻微或没有症状，但有时在轻度和更严重症状之间交替
约 75% 的患者会变为慢性，肝脏严重瘢痕形成（ 肝硬化 ）， 肝癌 的风险增加，但通常仅在肝硬化后才出现
应避免高危行为，例如共用针头注射药物、纹身和在身体上打孔 目前，没有疫苗可预防感染
应避免高危行为，例如共用针头注射药物、纹身和在身体上打孔
目前，没有疫苗可预防感染
丁型肝炎
丁型肝炎
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间： 共用未灭菌针头注射违禁药物 重复使用未经灭菌的针刺纹身 性行为
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：
共用未灭菌针头注射违禁药物
共用未灭菌针头注射违禁药物
重复使用未经灭菌的针刺纹身
重复使用未经灭菌的针刺纹身
性行为
性行为

仅发生在合并乙型肝炎感染时，常使乙型肝炎感染更为严重
仅发生在合并乙型肝炎感染时，常使乙型肝炎感染更为严重
与乙肝相同： 避免高风险行为 接种乙型肝炎疫苗 如果有乙型肝炎病毒暴露史，可以接受疫苗接种同时注射乙型肝炎免疫球蛋白*
与乙肝相同：
避免高风险行为
避免高风险行为
接种乙型肝炎疫苗
接种乙型肝炎疫苗
如果有乙型肝炎病毒暴露史，可以接受疫苗接种同时注射乙型肝炎免疫球蛋白*
如果有乙型肝炎病毒暴露史，可以接受疫苗接种同时注射乙型肝炎免疫球蛋白*
戊型肝炎
戊型肝炎
摄入被感染者粪便污染的东西（称为粪口途径），通常是因为卫生条件差或卫生条件不足 偶尔因摄入被感染动物的肉
摄入被感染者粪便污染的东西（称为粪口途径），通常是因为卫生条件差或卫生条件不足
偶尔因摄入被感染动物的肉
可引起严重的症状，尤其对于孕妇 通常不会变成慢性
可引起严重的症状，尤其对于孕妇
通常不会变成慢性
接种戊型肝炎疫苗（目前只在中国提供疫苗接种）
接种戊型肝炎疫苗（目前只在中国提供疫苗接种）
* 标准的免疫球蛋白是一种含有抗体的制剂，从具有正常免疫系统的人的血液（血浆）中获得。用于治疗各种疾病。乙型肝炎免疫球蛋白包含从具有高水平乙型肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。它通过注入肌肉或静脉给药。
* 标准的免疫球蛋白是一种含有抗体的制剂，从具有正常免疫系统的人的血液（血浆）中获得。用于治疗各种疾病。乙型肝炎免疫球蛋白包含从具有高水平乙型肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。它通过注入肌肉或静脉给药。
乙型肝炎或丙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子。
乙型肝炎或丙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子。
* 标准的免疫球蛋白是一种含有抗体的制剂，从具有正常免疫系统的人的血液（血浆）中获得。用于治疗各种疾病。乙型肝炎免疫球蛋白包含从具有高水平乙型肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。它通过注入肌肉或静脉给药。
* 标准的免疫球蛋白是一种含有抗体的制剂，从具有正常免疫系统的人的血液（血浆）中获得。用于治疗各种疾病。乙型肝炎免疫球蛋白包含从具有高水平乙型肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。它通过注入肌肉或静脉给药。
乙型肝炎或丙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子。
乙型肝炎或丙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子。