

BREAST OF DISEASES

امراضِ پستان

باتصویر

بریسٹ ٹریٹمنٹ

● چھوٹے پستان کا علاج

● بڑے پستانوں کا علاج

● کچھ عورتوں کے پستان نہیں ہوتے اُن کا علاج

● امراضِ پستان کا ڈاکٹری اور ہرٹل علاج

● کینسر پستان رسولی کا علاج



Tibbi Books for
Atiba Karam

www.facebook.com/tibbi.books

عثمان بیل، کشین

پستان کے امراض پر لا جواب تحقیقی کتاب
ہومیو پیتھی اور طب یونانی علاج

(بریسٹ ٹریٹمنٹ)

امراضِ پستان



اور

Tibbi Books for
Atiba Karam

ان کا علاج

معاونت

حکیم عبدالرحمن تھانوی

﴿فہرست مضامین﴾

9	پیش لفظ
10	پستانوں میں دودھ جم جانا
10	Freezing of Milk (فریزنگ آف ملک)
10	غلطی النساء
10	(عورتوں میں شہوت کا بڑھ جانا)
11	رحم کے سکڑنے کا علاج
11	پستانوں کا ورم
11	(انفلامیشن آف میما)
12	پستانوں کا بڑا ہو جانا..... ہائی بر پٹورمی آف دی میمرین
13	پستانوں کا ڈھیلا ہو جانا
13	Relaction of Mima (ریلیکشن آف میما)
13	پستانوں کا چھوٹا ہو جانا۔ اثر وئی آف دی میمرین گلینڈز
14	فصل پستان کا سخت ہو جانا اور ان میں غدد کا ہونا
14	پستان پر کوفت پہنچنے کے بیان میں
15	فصل دبیلہ کے بیان میں
15	امراض مڈی (چھاتی کی بیماریاں)
16	قلت لبن (دودھ کی کمی)
17	کثرت لبن (دودھ کی زیادتی)
18	خروج خون

4	امراض پستان اور ان کا علاج
19	تھین لین (پستانوں میں دودھ کا جم جانا)
20	اورام شدی (پستانوں کے ورم)
22	دبیلہ و قرحہ وغیرہ (پستانوں کے پھوڑے)
22	عظم و سقوط شد بین (پستان کا بڑا اور ڈھیلا ہو جانا)
23	صفر شد بین (پستان کا چھوٹا ہونا)
23	پستانوں کے زخموں کا علاج
25	امراض پستان
25	پستانوں کی ذمہ داریاں
25	عرضی ہے
27	چھاتی کو خون کی سپلائی (Blood Supply of Breast)
27	پستانوں کی ورزشیں
27	امراض پستان اور ان کے امراض
27	دودھ کا کم پیدا ہونا
28	طریقہ علاج
28	پستانوں کا ڈھیلا ہونا
29	پستانوں کی خارش
29	پستانوں کا پھٹ جانا
30	پستانوں کا درد (وجع المین)
31	چھاتی یعنی پستانوں کا ٹکنا
33	چھاتیوں کا ورم (Mastitis)

- 34 ----- پستان کی مزید بیماریاں
- 35 ----- پستانوں کا بڑھ جانا
- 37 ----- پستانوں کا چھوٹا ہونا (صفرائی)
- 38 ----- چھاتی کا کینسر درد دورم
- 39 ----- پستانوں کا شدید درد
- 39 ----- پستانوں کا تناؤ
- 40 ----- پستانوں کا درد (اعصابی) مرض
- 41 ----- پستانوں کی گرہ پڑنا
- 42 ----- پستانوں کی رسولیاں
- 43 ----- دودھ کی زیادتی
- 44 ----- دودھ کی کمی (قلت لبن)
- 45 ----- دودھ کی خرابی (فساد لبن)
- 46 ----- غدی درد پستان
- 48 ----- اعصابی عضلاتی شدید
- 49 ----- روغن
- 49 ----- درد سوداوی اور پستان
- 51 ----- پستان میں رسولی گلٹی
- 52 ----- پستان کے خطرناک امراض
- 52 ----- اعصابی امراض پستان
- 54 ----- پستان کے غدی امراض

55	پستان کے عضلاتی خشکی کے امراض
58	زنانہ تولیدی اعضاء پستان
58	بریسٹ، پستانوں کا بڑھ جانا
59	پستان اور بریسٹ
59	دودھ کا اترنا پستان میں
60	بریسٹ، پستانوں میں دودھ رک جانا
60	رسولیاں گلٹیاں اور بریسٹ کینسر
62	بریسٹ کینسر کی عام علامات
64	دودھ کا زیادہ پیدا ہونا
65	پستان کا کینسر کیسے ہوتا ہے؟
66	پستانوں کی تبدیلیاں (Changes in Breasts)
68	پستان کی بناوٹ (Anatomy of the Breast)
69	پستانوں کی سوزش (Mastitis)
70	پستان کا کینسر (Breast Cancer)
71	بھٹیوں کا پک جانا (Sore Nipple)
73	دودھ پلانے والی عورت کی خوراک
76	وضع حمل کے بعد پستان کی بیماری
76	(Diseases of the Breast following Delivery)
77	دودھ کا بخار (Milk Fever)
77	بھٹی میں زخم (Sore nipples)

79 ----- Suppressed Milk دودھ نہ کی

81 ----- (Breast Feeding) (پھاتی کا دودھ پلانا) بریسٹ فیڈنگ

82 ----- پہلے دودھ (کلوسٹرم) کے فوائد ماں کی پھاتی کے

83 ----- (پہلا دودھ بوطی) نہ دینے کے نقصانات کلوسٹرم

87 ----- دودھ پیدا ہونے کے اسباب

87 ----- Advantages Breast Feeding ماں کے دودھ کے فوائد

89 ----- مصنوعی دودھ (فارمولا ملک) بوتل کے دودھ کے نقصانات

91 ----- دودھ پلانے کی مقدار اور وقت

91 ----- بے بی کا پھاتی کا دودھ پینا

92 ----- بریسٹ فیڈنگ کی ممنوعات

95 ----- ماں کی طرف سے دودھ پلانے میں مشکلات

95 ----- Maternal Breast Feeding Problems

96 ----- چوسنی کے مضر اثرات

97 ----- زخمی یا پھٹا ہوا نپل

97 ----- Sore of Carcked Nipple

98 ----- Engorgment of Breast پھاتیوں کا بھر

100 ----- Mastitis پھاتی کی سوزش

102 ----- Breast Cancer پھاتی کا کینسر

104 ----- Daily Food Guide روزانہ کی خوراک کیلئے شیڈول

105 ----- Lassi لسی

- 108 ----- پستانوں کی بیماریاں اور علاج
- 112 ----- سادہ رسولی (Benign Cyst)
- 112 ----- خبیث رسولی
- 112 ----- پستان کا کینسر
- 114 ----- پستانوں کی تکلیفیں
- 114 ----- Abscess ذہن
- 114 ----- دودھ پلانے کے زمانے کی خرابیاں
- 114 ----- (Disorders of Lactation)
- 115 ----- سرپستانوں (گھنڈیوں) کا پک جانا یا ان میں درد (Sore Nipples)
- 117 ----- دودھ کی غیر معمولی تراوش
- 124 ----- پستانوں کا سوجنا، پستانوں میں ورم (Mastitis)
- 127 ----- دودھ چھڑانے کے متعلق چند ہدایات
- 127 ----- خون بہنا۔ (Bleeding)
- 128 ----- پستانوں کا حجم بڑھ جانا۔ (Hypertrophy)
- 128 ----- (دیکھئے رسولیاں)
- 128 ----- سوزش (Inflammation)
- 128 ----- دودھ (Milk)
- 128 ----- لڑکیوں کی چھاتیوں میں دودھ
- 129 ----- سرپستان۔ بطنی۔ نمل (Nipples)
- 130 -----



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

www.facebook.com/tibbi.book

پرستانوں میں دودھ جم جانا

(Freezing of Milk) فیریزنگ آف ملک

تعریف: اس مرض میں پرستانوں میں دودھ جم جاتا ہے۔

وجوہات: دودھ کی تالیوں میں بلغم جمع ہوتا اور سدہ جم جانا، پرستانوں کے گوشت کا رگوں پر باؤ اور دودھ کی رکاوٹ کا باعث بننا، دودھ کا زیادہ دیر تک پرستانوں میں رہنا۔

تشخیص

پرستانوں کے اندر دودھ جم جانے سے تناؤ ہوتا۔ جس سے شدت کا درد ہوتا ہے اور زہریلی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو ورم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور مریض کو ہلکا ہلکا بخار آتا ہے۔

علاج

شروع میں مریض کے پرستانوں سے دودھ نکالنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ درد اور تناؤ دور ہو جائے۔ اس مطلب کے لئے بریسٹ پمپ استعمال کریں۔ خراطین صاف کئے ہوئے باریک سنوف کردہ قدرے پانی ملا کر روغن زگس ملا کر طلا کریں یہ طلا دودھ کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور اندر کی رسولیوں کو مندل کرتا ہے۔

غلبۃ النساء

(عورتوں میں شہوت کا بڑھ جانا)

فائدہ: بعض عورتوں کو جماع سے نفرت ہو جاتی ہے اس کا علاج بھی اس کے نیچے کرنا چاہئے یعنی جن اسباب سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ ان کے عمل سے نفرت ہو جاتی ہے۔

اسباب: طنون اوہام عادت کتب عشق، عشقیہ مجالس جن میں شہوت اور محبت بڑھے اور عطر، خوشبو، منہیات کا استعمال اور یہ معوی باہر ایسی باتیں کرنا جن سے شہوت بڑھے پھر سق کرنا حکمہ قویا کدہ پیمانہ اسباب اسیر امعاء کا مقرر ریچ کا استعمال۔

علاج:

گردن اور کان کے نیچے جو تک لگوانا، گرم پانی سے غسل کرنا مگر سر پر سرد پانی ڈالنا۔ ہمارا تجربہ شدہ شیر مغز کدو، مغز تربوز، مغز خیارین، مغز بادام پلانا، سبجین لیموں، آب خطمی، ماء الشیر، نقوع، بنفشہ، نیلوفر پلانا اسی ریشہ خطمی آب عنب الثعلب آب پوست خشکاش غذا نابتاتی خرفہ کدو بخنی مرغ بلے پھڑے کی، ترک منہیات یعنی کافی، شراب، چائے اور گرم مصالحہ۔

ایک عورت کو اس مرض کی شدت ہو گئی تھی میں نے اس کو نارٹار مائٹیک بقدر چاول دن میں تین دفعہ دیا تھا۔ اسی لئے آرام ہو گیا۔ آیوڈائیڈ آف پوٹاشیم 2 رتی، برومائیڈ آف پوٹاشیم 5 رتی کا پلانا بھی مفید ہے۔

رحم کے سکڑنے کا علاج

- 1- ارگومیرین گولیاں (ارگونوین، ارگوٹریٹ) Ergometrine Tablets
ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام یا Ergonovine, Ergotrate Tablets
- 2- می تھائل ارگو میٹرین گولیاں (Methbergint Tablets)
Methylergometrine Tablets ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام یا
- 3- ارگٹ مکسچر پلائیں۔ نسخہ ایکسٹریٹ ایکٹ لیکوئیڈ 10 منم سپرٹ ایسٹرونیا ایرومیٹک 20 قطرے ایکوا کلور و فارم ایک اونس تک ایک خوراک صبح ایک دوپہر ایک شام

پستانوں کا ورم (انفلامیشن آف میما)

Inflammation of Mima

تعریف: اس مرض میں مریضہ کے پستانوں میں ورم ہو جاتا ہے۔

وجوہات: مریضہ کو شروع میں خارش ہوتی ہے اگر یہ مرض دیر تک قائم رہے تو ورم کی صورت اختیار کر جاتا ہے کبھی ابتدا سن بلوغ میں حدت خون کے سبب یہ مرض ہو جاتا ہے کبھی خرابی جگر پستانوں پر چوٹ لگنا بھی اس مرض کا باعث بنتا ہے۔



تشخیص

مریضہ کو میٹھی میٹھی خارش رہتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی پھر ہونے لگتی ہے اور سوزش ہو جاتی ہے۔ درد اور تیز بخار ہوتا ہے درد کی شدت کے باعث مریضہ بے چین ہوتی ہے۔

علاج

ابتداء میں بریسٹ پمپ سے دودھ نکال لینا چاہئے۔ متورم شدہ پستان سے دودھ بچوں کو نہیں پلانا چاہئے۔ پستان پر بیلاڈونا گلیسرین لگائیں اور پٹی باندھ دیں یا السی کی پلٹس لگائیں۔ مریضہ کو قبض رفع کرنے کے لئے میکینیشا نصف اونس پانی میں حل کر کے پلائیں اگر ورم میں پیپ پڑ جائے تو شگاف دے کر پیپ کو خارج کر دینا چاہئے۔ نسخہ: برگ سنبھالو، برگ نیم اکاس نیل ہموزن لے کر پانی میں گرم کر کے پستانوں پر باندھیں۔ یا ان کے پانی کو نیم گرم کر کے پستانوں پر ڈالیں تاکہ پستانوں کی تناوٹ دور ہو جائے۔ علاج بھٹنی کا درد، گزشتہ صفحات پر درج ہے۔

پستانوں کا بڑا ہو جانا..... ہائی برپٹوری آف دی ممیرین

(High Tertromy of the Memaryan)

تعریف: بعض عورتوں کے پستان اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جسم کی خوبصورتی ضائع ہو جاتی ہے اور دودھ کی پیدائش بھی بہت تھوڑی ہو جاتی ہے۔

وجوہات: چربی دار مادہ زیادہ ہو کر ایسا مرض پیدا کر دیتا ہے۔ بدن کا فربہ ہو جانا۔ پستانوں کا زیادہ مسلنا یا پستان بھاری ہونے کے سبب لٹکے رہنا یا کسی روغن کی مالش اور بعض میں موروثی ہوتا ہے۔

تشخیص

اس مرض میں دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ دودھ کی نالیوں پر بوجھ پڑنے سے دودھ کا نکلنا بہت کم ہو جاتا ہے اگر خرابی خون سے ہو تو پستانوں پر سرخی پائی جاتی ہے اگر مادہ بلغم سے ہو اور جسم کا موٹاپا سبب ہو تو بلغم کی کثرت پائی جائے گی۔

علاج: مریضہ کو پستانوں پر ایسا لباس پہننا چاہئے جس سے پستان لٹکے نہ رہیں۔



پستانوں کا چھوٹا ہونا

بعض عورتوں کے پستان بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں حدود و حد کی کمی ہونے کے سبب
اولاد کی پرورش پوری طرح نہیں کر سکتے۔

پستانوں کا ڈھیلا ہو جانا

Relaction of Mima (ریلیکشن آف میما)

تعریف: اس مرض میں عورت کی پستان ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔
 وجوہات: کمی خون بچہ کو عرصہ تک دودھ پلانا حمام کا استعمال کرنا پستانوں کی رگوں کا خون سے خالی ہونا۔
 تشخیص: ایسی عورتیں ست مزاج ہوتی ہیں ان کا بدن موٹا اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔

علاج

جب یہ مرض کسی عورت کو ہو جائے تو فوراً بچہ کا دودھ چھڑا دینا چاہئے اور پستانوں پر ایسا کپڑا چڑھانا چاہئے جس سے پستان نیچے نہ لٹکتے رہیں اور مندرجہ ذیل نسخہ استعمال میں لائیں۔
 نسخہ: انار کا چھلکا ایک تولہ مازد ایک تولہ اقا قیا 6 ماشہ مائیں ایک تولہ سب ادویہ کو ملا کر خوب باریک کریں اور بوقت ضرورت سرکہ ملا کر پستانوں پر لپ کریں۔
 فائدہ: اس سے پستانوں میں سختی آ کر نیچے لٹکنا اور ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔
 نسخہ: گلنار ایک تولہ چھلکا انار ایک تولہ چھلکا کیکر ایک تولہ چھلکا جامن ایک تولہ تمام ادویہ کو رات بھر پانی میں بھگو رکھیں۔ صبح کو روغن زرد میں ملا کر محفوظ رکھیں۔ بوقت ضرورت پستانوں پر ملیں۔
 اس سے پستان سخت ہو کر اصلی حالت پر آ جائیں گے۔

پستانوں کا چھوٹا ہو جانا۔ اٹروفی آف دی میمرین گلینڈز

(Atrophy of the Mamregalands)

تعریف: بعض عورتوں کے پستان بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں جو دودھ کی کمی ہونے کے سبب اولاد کی پرورش پوری طرح نہیں کر سکتے۔
 وجوہات تشخیص: پستانوں کی رگوں میں سدے پڑ جانا جن سے پستانوں کی پرورش کرنے کے لئے خون آتا ہے پستانوں کی قوت جاذبہ کمزور ہو کر قابل نہ رہنا کہ کافی مقدار میں جذب ہو کر

پرورش کر سکتے۔ جسمانی کمزوری اعضائے تولید میں نقص واقع ہو جانا جس سے پستان چھوٹے رہ جاتے ہیں اور کافی دودھ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔

علاج

اگر قوت جاذبہ کی کمی ہو تو کچھوے خشک ایک تولہ جو تک تولہ روغن کنجد سیاہ 4 تولہ کچھوے اور جو تک کو بار یک پیس کر تیل میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب تمام حل ہو جائیں تو تیل ٹھنڈا کر کے پستانوں پر ملیں۔ فائدہ اس تیل سے پستانوں میں قوت جاذبہ پیدا ہو کر خوب صورت اور دودھ آور بنادے گی۔ اور پستانوں کا چھوٹا پن دور ہو جائے گا۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو دودھ گھی اور قوت وہ غذا استعمال کریں اگر پیدائشی اعضائے تولید میں نقص ہو تو یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا ہے نیز تپ دق و سل اور ذیابیطس کے ہو جانے سے بھی عورتوں کے پستان چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ان امراض کے رفع ہونے کے ساتھ ہی اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔

فصل پستان کا سخت ہو جانا اور ان میں غدد کا ہونا

اور روغن بنفشہ اور بیضہ مرغ کی زردی طلا کریں اور روغن زیت میں موم پگھلا کر نیل کا پتہ ملا کر طلا کریں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں قطران ملانے کی حاجت پڑے اور سر کے کا تلچھٹ ٹگنا مفید ہے اور برگ مازو کوٹ کر لگانا نافع اور گرہ نرم کرنے کے لئے مرطب چیزوں کا اور جہ بیوں کا استعمال کرنا مفید ہے اور یہ گرہ بالغ ہونے کے وقت اکثر ہو جاتی ہے۔

پستان پر کوفت پہنچنے کے بیان میں

جان لیں کہ کبھی پستان کا گوشت کٹ جاتا ہے سو اگر امر خفیف ہو دانہ مویز اور مونگ کوٹ کر سرو کے پتے کے پانی میں یا آس کے پانی میں گوندھ لیں اور ضامد کریں اور اگر کوفت کے سبب سے آماں ہو جائے تو جو کچھ آماں کے لئے کہہ دیا ہے احتیاج کے موافق کام میں لائیں اور مونگ اور مویز کے دانہ کا ضامد ابتدا میں مناسب ہے تاکہ عضو کو قوت دے اور مادے کو آنے سے روک دے اور جب ابتدا سے گزر جائے جیسا وقت کے مناسب ہو عمل میں لائیں۔

فصل دہیلہ کے بیان میں

کہ پستان میں پیدا ہو: تخم السی، کنجد، بنج سوسن، میہ تر، پنجال کبوتر، نظرون، راجتانج برابر لے کر پیس لیں اور روغن کنجد اور مغز ساق گاؤ مپختہ میں ملا کر ضا د کریں اور باقی تدبیر دہیلہ کی بحث سے دریافت کریں اور اگر شگاف کی حاجت پڑے لوہے کے آلات سے چیر ڈالیں اور زخم کہ اس جگہ پیدا ہو اس کا ویسا ہی علاج کریں جیسا منہ اور زبان کے زخم میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ نازک نازک اعضا کے زخم کا علاج یکساں ہے۔

اور جس قدر مناسب ہے اس سے زیادہ نہ ہوں: سفید طین، فیمو نیا ہر ایک دو درم لے کر دونوں کو برگ بنک کے پانی میں یا اس کے تخم کے جو شاندرے میں ملا کر تھوڑا سا روغن مصطلی اس میں ڈال کر ہر مہینے تین دن طلا کریں اور طلا کے وقت کتان کا کٹڑا مازو کے پانی میں بھگو کر سرد کریں اور پستان پر رکھیں اور تمام کا جانا کم کریں۔

دوسرا طلا: پاکیزہ مٹی جس کو عربی میں طین حر کہتے ہیں بیس درم۔ شوکران دو درم لے کر سرکہ میں ملائیں اور تین دن تک طلا کریں۔

دوسرا نسخہ: طین شاموس، اقا قیا سفیدہ سب برابر لے کر کوٹ لیں اور بنگ کا پانی نچوڑ کر اس میں ملا کر طلا کریں۔

دوسرا نسخہ: پھٹکری پیس کر روغن زیت کے ساتھ سیسے کی کھرل میں پیس لیں جب تھوڑا سا سیسہ اس میں گھس جائے ہمیشہ طلا کریں۔

تنبیہ: بنگ کا جو یہاں ذکر آیا ہے اس سے بنج مراد ہے جس کو ہندی میں اجوائن خراسانی کہتے ہیں اور رنگ خواروں کی بنگ نہیں جس کو قنب بولتے ہیں۔

امراض شدی (چھاتی کی بیماریاں)

ہدی یعنی پستان میں حسب ذیل امراض عارض ہوتے ہیں۔

(1) قلت (2) کثرت لبن (3) خروج خون (4) تھکس لبن

(5) جمود خون (6) تہ اشدی (7) ورم (8) درد

(9) صلابت (10) سلع (11) غدود اور ان کا سخت ہونا

(12) دہیلہ (13) خارش (14) شقاق

(15) پستانوں کا بڑا ہونا (16) ان کا چھوٹا ہونا۔

قلت لبن (دودھ کی کمی)

دودھ میں زیادتی خون کی مناسب مقدار اور اس کے جید ہونے سے ہوتی ہے۔ علاوہ بریں اس کے لئے پستانوں کے مزاج کا معتدل ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ دودھ کی کمی کا سبب یا خون کی خرابی ہوتی ہے یا اس کی اتنی زیادتی کہ افراط کے باعث اس میں قوت مناسب تصرف نہ کر سکے۔

دودھ کی کمی کے اسباب کی تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبض وقارورہ وغیرہ سے کیفیت چہارگانہ میں سے کسی کیفیت کے غلبہ کی حالت معلوم کریں چنانچہ جس کیفیت کا غلبہ ہو اسی کو دودھ کی کمی کا سبب قرار دیں اور اگر کسی کیفیت یا کسی خلط کی زیادتی محسوس نہ ہو تو غذا کی مقدار اور اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کریں چنانچہ اگر غذا کی مقدار کم ہو یا بار دیا یا بس غذا کی عادت ہو تو اس کا سبب یہی ہوگا اور اگر غذا معتدل ہو تو جسم سے بکثرت خون خارج ہونے کی بابت دریافت کریں اگر اس کا اتفاق ہوا ہو تو قلت لبن کا باعث یہی ہوگا یا اس کا سبب اعراض نفسانی ہوں گے یا اس کا باعث بچہ پر شفقت کی کمی ہوگی۔

دودھ کی کمی کا علاج یہ ہے کہ اگر اس کا سبب غذا کی کمی ہو تو غذا بڑھائیں بالخصوص چار رطب غذائیں دیں۔ مثلاً دودھ چاول، چوزہ مرغ و حلوان کا گوشت، بیضہ مرغ شکر یا شہد کے ساتھ دودھ، جانوروں کی مغز، تازہ مچھلی، شیر برنج، فالودہ، دودھ اور بادام کی فیرنی، حلوار بنجود، شلجم، بادنجان، گاجریں، حلوہ گزر و حلوار بیضہ مرغ استعمال کرائیں۔ چار ماشہ تو دری سرخ گائے کے پاؤ سیر دودھ کے ساتھ کھانا اس باب میں مجرب و معمول ہے۔ علاوہ بریں تمام چیزیں دودھ کو بڑھاتی ہیں جو مٹی کو زیادہ کرتی ہیں، تو درمیان تخم خشخاش سفید، پستان، بزولیش کھانا اور پستان کو ملنا دودھ زیادہ کرنے کے لئے نہایت موثر ہے اور یہ حریرہ بھی افزائش شیر کیلئے بغایت سودمند ہے۔ دو تولہ نشاستہ آدھ سیر دودھ میں حل کر کے شیرہ برنج، شیرہ مغز بادام، شیرہ مغز پنبدانہ، شیرہ مغز حسکد انہ سیرہ مغز چلغوزہ ہر ایک ایک تولہ، شیرہ بادیان، شیرہ دانہ ہیل ہر ایک سات ماشہ، شیرہ تخم شبث چھ ماشہ، شیرہ تو دری سرخ ایک تولہ، قند سفید ترنجبین بقدر ضرورت سب کو نرم آگ پر جوش دیکر سرد کر کے پلائیں۔ اسی طرح حسب میل سفوف بھی اس مقصد کیلئے مفید ہے۔ تخم ریحان، تخم مرد، تخم بادروج، تو دری گللوں، شقائق، تخم گزر، تخم انجرہ، مغز تخم مرد، تخم بادروج، تو دری



گلوں شعل، تخم گزر، تخم انجرو، مغز تخم کدو شیریں، مغز تخم بندوانہ، مغز تخم خربزہ ہر ایک ایک تھوڑے سب کو سفوف کر کے اس میں سے روزانہ سوا تولہا کر اوپر سے دودھ پیائیں یا تخم ہلیون جوش دے کر صاف کر کے قند داخل کر کے پیئیں یا اس کا سفوف بنا کر ہموزن قند ملا کر سات ماشہ استعمال کریں۔ قلت شیر کے علاج میں دواؤں کی بہ نسبت غذا کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور مسکن، رطب غذا میں دودھ بڑھانے میں خاص اثر رکھتی ہیں۔

اگر اس کا سبب غذا کی خرابی اور غیر موافق اشیاء استعمال کرنا ہو تو اس کی اصلاح کریں اور جید الکھوس غذا میں دیں۔ اگر اس کا سبب خروج خون ہو تو اسے بند کریں۔ اگر اس کا سبب سوء مزاج سادہ ہو تو غذا وغیرہ سے اس کی تعدیل کریں اور پستان کے سوء مزاج کے لئے مقامی دوا میں برقی مثلاً اس میں حرارت کا غلبہ ہو تو تہید دیں اور میردات ضداد کریں اور برودت غالب ہو تو مسخن تدابیر اختیار کریں۔

اگر اس کا سبب کسی خلط کا غلبہ ہو تو اس کا تنقیہ اور مزاج کی تعدیل کریں مثلاً غلبہ صفرا کی صورت میں شیر، مغز تخم کدو، شیر، تخم خرف، آب انار، گنجین سادہ اور دوسری ترش دوائیں اور غذا میں دیں۔ شکر یا شربت نیلوفر کے ساتھ ماء الشعیر پلائیں۔ بلغمی مزاج میں اسکی گرم دوائیں جن میں تحفیف کم ہو مثلاً گزر، جرجیر، بادیان، ہنز، شبث و کرفس تازہ استعمال کرائیں، اگر گندم کا حریرہ قدرے حلہ، ازیا نہ اور شہد کے ساتھ دیں اور بلغم خارج کرنے والی گولیوں سے اسپال لائیں۔ سودا کے غلبہ کی حالت میں حقن و مرطب دوائیں دیں۔ گندم، نخود، جو اور انجیر کا حریرہ روغن بادام کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اگر دودھ کی کمی کا سبب خون کی زیادتی ہو تو مقلقل خون، مولہ شیر اور مقوی طبع دوائیں دیں اور اس کا سبب نفسانی عوارض ہوں تو ان کا تدارک کریں۔

ستاد کوٹ چھان کر ہموزن شکر ملا کر اس میں سے ایک تولہ روزانہ شیر بادیان یا شیر اودہ گاؤ کے ساتھ کھانا دودھ کو زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح زیرہ سفید، سونف، ستاد سب کو کوٹ چھان اس میں سے سات ماشہ شیر شکر کے ساتھ کھانا مفید ہے اور زیرہ سفید لودھ، رنج سرخ ہر ایک سوا تولہ کوٹ چھان کر شیر گاؤی حریرہ پکا کر پینا بھی مفید ہے۔

کثرت لبن (دودھ کی زیادتی)

دودھ کی زیادتی بسا اوقات پستان میں میں تکلیف اور درم پیدا کر دیتی ہے۔ علاوہ ازیں

اس سے خود دودھ ناسد ہو جاتا ہے اور بخار اور جنون وغیرہ امراض لاحق ہوتے ہیں۔ گاہے نسل اور ولادت کے بغیر پستان میں دودھ آ جاتا ہے اور نچکنے لگتا ہے اور گاہے بلوغ کے وقت مردوں کے پستان میں بھی دودھ آ جاتا ہے اور درد عارض ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب خون کی زیادتی ہوتی ہے یا قوت ماسکہ کی کمزوری اور دودھ میں حدت و رقت پیدا ہو جاتا۔

اگر اس کا سبب غذا اور خون کی زیادتی ہو اور دودھ کی کثرت کے باوجود کمزوری یا کوئی اور تکلیف نہ ہو تو اس کو کم کرنے والی چیزیں نہ استعمال نہ کریں، البتہ اگر کسی خرابی کا خوف ہو تو پہلے صرف غذا میں تقلیل کریں اور نجف و منشف دوائیں استعمال نہ کریں مگر کسی مرض کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو مزاج کے مطابق ایسی بخفف اشیاء استعمال کرائیں جو رطوبت کو جذب کرتی ہوں یا سختیں کے ذریعہ تحلیل کرتی ہوں، علاوہ ازیں مہر دات اور وہ تمام دوائیں دودھ کو کم کرتی ہیں جو مقلل منی ہیں مثلاً چار دوائیں دینا چاہیں تو برگ سداب شرما و ضداد استعمال کریں، تخم سداب، فنجکشت، تخم فنجکشت اور بادروج دیں اور بیخ کربن ضداد کریں یا اشق شراب کے ساتھ لگائیں یا عصا رہ حلب یا لک، مرداسنگ و روغن گل ملا کریں اور بار دواؤں کی ضرورت ہو تو تخم کا ہو اور عدس سرکہ، کزکیر، اعلیٰ اسپغول پلائیں اور آرد باقلا روغن گل و سرکہ کے ساتھ کھلائیں۔ لعاب اسپغول پلائیں اور آرد باقلا روغن گل و سرکہ کے ساتھ ضمّد کریں۔ کہتے ہیں کہ گل بابونہ ضداد کرنا اس باب میں مجرب ہے اور یہ معجون ہندی بھی دودھ کو کم کرنے کے لئے مفید ہے۔ شہدانہ تین حصہ، تاملکھانا، تخم تمر ہندی، سمندر پھل ہر ایک دو حصہ سب کو کوٹ چھان کر شہد میں بدستور معجون بنا کر کھلائیں اور غذا میں جو کی روٹی اور مسور کی دال دیں۔ اگر اس کا سبب احتباس طمث ہو تو مدرات حیض استعمال کرائیں۔

خروج خون

پستان سے دودھ کے بجائے خون خارج ہونے کا سبب خون کی زیادتی ہے یا اس کی خرابی اور اس کا علاج یہ ہے کہ مناسب معلوم ہو تو پہلے صافن کی فصد کھولیں اور اس کے تین چار روز کے بعد باسلیق کی فصد لیں اور مصفیات خون استعمال کریں۔ خیارین ہر ایک نو ماشہ، تخم کاہو سات ماشہ، شربت نیلوفر، کنجین سادہ ہر ایک دو تولہ پلائیں، غذا میں روٹی کے ساتھ خرفہ کا ساگ دیں۔ برگ کاہن کشیز و برگ کاہی ہر ایک ایک تولہ، گیر و ہر ایک نو ماشہ، سب کو گلاب میں چھین کر مات دین میں آٹھ بار ضداد کریں۔

تحکین لبن (پستانوں میں دودھ کا جم جانا)

تحکین یعنی پستان میں دودھ جم جانے کا سبب یا حرارت کی زیادتی ہوتی ہے یا برودت کی یا اس کا سبب بچہ کا پستان نو بخوبی نہ چوسنا ہوتا ہے۔ تحکین اگر حرارت سے عارض ہو تو اکثر درم عارض ہو جاتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ اگر اس کا سبب بچہ کا زور سے نہ چوسنا ہو تو دودھ خارج کریں یا دوسرے بچہ سے چوسنے کو کہیں اور سینہ و پستان پر آب گرم سے نطول کریں۔ اگر دودھ جم جانے کے سبب سے بغیر درم کے تھد پیدا ہو جائے تو بابونہ، بنفشہ، گل خطمی، حلبہ سب کو روغن زرد اور پانی میں جوش دے کر اس سے نطول کریں۔ حرام مغز شراب میں پکا کر ضاد کرنا منجھد دودھ کو تحلیل کرتا ہے۔ مونگ اور برنج ساٹھی قدرے پانی میں پیس کر گرم کر کے ضاد کرنا ایسے انجماد کے لئے مفید ہے۔ جس کا سبب حرارت و بیوست ہو۔ انجماد حار میں ہر وقت پستانوں کو روغن بنفشہ سے تر رکھیں۔ آب نیم گرم سے نطول کریں اور موم و روغن بنفشہ کی قیروٹی ملتے رہیں یا گل بنفشہ کشیز، آرد جوہر ایک تین ماش، سب کو آب برگ مکہ سبز کے ساتھ ضاد کریں۔ سرطان نہری کوٹ کر ضاد کرنا منجھد دودھ کو پگھلانے اور درم کو تحلیل کرنے کے لئے بے بارہا کا آزمودہ ہے۔ اسی طرح چقدر معدہ برگ کو روغن گل و روغن بنفشہ و گلاب میں پکا کر ضاد کرنا بخایت سودمند ہے۔

اگر اس کا سبب برودت ہو تو موم زرد اور روغن خیری، روغن سوسن و روغن قسط کی قیروٹی استعمال کریں اور تین روز کے بعد حلبہ، بزرکستاں بابونہ، خطمی، خبازی ہر ایک چار ماش، آرد حنظل کرنب پانچ ماش سب کو روغن زنبق میں ملا کر لگائیں اور اکلیل، بابونہ، کتاں، مکو حلبہ، برگ کرنب و شلجم کے مطبوخ سے بھپارہ لیں اور روغن بابونہ و روغن زنبق باہم ملا کر لگائیں۔

پستان میں جے ہوئے دودھ میں غنوت پیدا ہو جانے کا اندازہ اس کے رنگ اور مزے سے ہو سکتا ہے، چنانچہ اس صورت میں چقدر کو خوب پکا کر مغز نان و آرد باقلا کے ساتھ خوب کھل کر کے روغن کنجد ملا کر ضاد کریں یا کنجد کو نہ شہد میں ملا کر لگائیں اور اسی میں آرد باقلا یا مغز نان بھی ملا دیں تو زیادہ مفید ہوگا علاوہ بریں آب گرم سے تلمیہ کریں۔

اگر پستانوں میں خون جم جائے تو آرد باقلا میں پانی اور شہد ملا کر ضاد کریں اور آب گرم و روغن زیتون سے یا حلبہ، زرتکان و حاشا کے جوشاندے سے تلمیہ کریں اور شیرہ کاسنی، شیرہ خیار، شیرہ ایکلا (نو) ماش، شیرہ حنظل، کاسوسات ماش، شربت نیلوفر و تحکین داخل کر کے ملائیں۔

اور ام شدی (پستانوں کے ورم)

پستانوں کا ورم دوسرے اعضا کے ورموں کی طرح چاروں اخلاط اور ریاح و مائیت سے عارض ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ورم دموی یا خون اور بلغم سے مرکب ہوتا ہے۔ پستانوں کے ورم کا علاج بھی وہی ہے جو دوسرے اعضاء کے ورم کا۔

ورم حار: تمہید کے لئے لعاب بہدانہ، شیرہ عناب، شیرہ مغز تخم تربوز، عرق شاہترہ و عرق عنب الثعلب میں نکال کر شربت نیلوفر و خاکی داخل کر کے پلائیں اور گیر و رسوت، عنب الثعلب، حفصہ کی ہر ایک چار ماشہ آب عنب الثعلب کے ساتھ ضماد کریں، جو نکلیں لگانا بھی اس کے لئے سود مند ہے۔ یا ابتداء میں آرد باقلا سلخجین و روغن گاؤ باہم ملا کر ضماد کریں یا اسپغول سرکہ اور برگ عنب الثعلب میں جوش دے کر لگائیں۔ اگر ورم میں التهاب ہو تو مغز نان جواری، آب عنب الثعلب و روغن گل ملا کر ضماد کریں یا موم سفید لعاب ^{خط} ن، لعاب بہدانہ، لعاب اسپغول و روغن گل یا روغن بنفشہ کی قیروطی مرکب کر کے لگائیں، سرکہ انگوری، روغن گل و آب عنب الثعلب یا ہم مخلوط کر کے طلا کرنا بھی مفید ہے۔ مادہ کولوثانے کے لئے عدس و برگ عنب الثعلب کوٹ کر روغن گل ملا کر ضماد کرنا سود مند ہے اور تلخین کی خاطر تا کہ رطوبتیں پستان میں منجمد نہ ہونے پائیں۔ گل نیلوفر، گل بنفشہ، گل خطمی، عنب الثعلب، برگ خبازی و برگ خطمی پانی میں جوش دے کر صاف کر کے نطول کریں یا چاول اور مونگ کی دال پانی میں پکا کر اس سے نطول کریں۔

تزیید کے زمانہ میں ضماد نطول میں مذکورہ بالا روادع کے ساتھ حلبہ، اکلیل و بابونہ کے ملیات داخل کریں یا آرد جو، گل خطمی، گل نیلوفر، اسپغول سب کو کوٹ چھان کر و مغز نان، آب عنب الثعلب تازہ و روغن گل میں پکا کر اس میں مخلوط کر کے ضماد کریں یا نخص، جدوار و زعفران پس کر ضماد کریں یا پوست ہلیلہ زرد، صبر، رسوت و زنجبیل یا پوست ہلیلہ، آرد جو، آرد مونگ، و آرد باقلا آب عنب الثعلب تازہ کے ساتھ ضماد کریں۔

زمانہ انتہا حلبہ، اکلیل، بابونہ اور دوسرے محلات استعمال کریں یا گل خطمی، بزرکٹاں و عنب الثعلب کوٹ چھان کر روغن گل ملا کر ضماد کریں یا تخم کتاں، بابونہ، اکلیل، الملک، کنجد باریک کر کے موم و روغن گل کی قیروطی میں ملا کر طلا کریں۔

گاہے پستان میں دودھ جم جانے کی وجہ سے گرم ورم پیدا ہوتا ہے۔ اس صورت میں گلاب دسر کہ میں کپڑا تر کر کے رکھیں اور اس کے گرم ہونے پر بدلتے رہیں اور آرد جو، آرد باقلا، مغاٹ سب کو آب کشینز سبز، آب خرفہ و سبز و زردی بیضہ مرغ کے ساتھ ضماد کریں۔ خراطین یا سرطان زندہ کوٹ کر پستان پر باندھنا ورم حار کو تحلیل کرنے اور منجمد دودھ کو پکھلانے کے لئے عجیب الاثر ہے۔ اگر مادہ تحلیل نہ ہو اور ریم پڑ جائے تو دبیلہ پستان کا علاج کریں۔ پستانوں کے دودھ کی صورت میں مدرات حیض پلانا اور حلبہ، بزرکٹاں و روغن گل ضماد کرنا سودمند ہے۔

ورم بارد بلغھی: اگر ورم بارد بلغھی ہو تو گل بابونہ، اشنہ، اکلیل مکو، سنبل الطیب، برگ کرنب، برگ انار، برگ مکو ہر ایک تین تولہ سب کو پانی میں جوش دے کر نطول کریں اور تخم کرفس، بابونہ، اکلیل، مکو ہر ایک سات ماشہ ضماد کریں اور بار بار بلغم کا مسہل دیں۔ میدہ لکڑی، پوست کچنال، تخم حبابہ، پوست بنج بید انجیر، گبرو ہر ایک بوزن مساوی ورم بارد کے لئے مفید ہے۔ علاوہ بریں مذکورہ بالا گرم ضماد لگائیں اور تحلیل نطول استعمال کریں۔

ورم صلب وغیرہ: اگر پستان کے ورم میں صلابت ہو تو سودا کا مسہل دیں اور موم زرد ڈیڑھ تولہ، زردی بیضہ بڑ دو عدد، روغن بنفشہ، روغن بادام، روغن گل ہر ایک ڈیڑھ تولہ سب کی قیر و طی مرتب کر کے استعمال کریں یا آرد باقلا و اکلیل روغن کنجد کے ساتھ ضماد کریں، گرم و خوشبودار اشیاء سے نطول کریں اور مولدات سودا سے پرہیز رکھیں۔ علاوہ بریں عنب اشعلب چار ماشہ، شاہترہ چھ ماشہ، اصل السوس چار ماشہ سب کو جوش دے کر ڈیڑھ تولہ قند سفید داخل کر کے پلائیں۔ ورم صلب بعض اوقات سرطان پر منتج ہوتا ہے اور یہ اکثر کسی علاج سے نہیں جاتا لیکن بہر حال ماء الجبین پلائیں اور وہ ضماد برقیں جو سرطان کی بحث میں لکھے جائیں گے۔

شیخ نے لکھا ہے کہ ورم پستان میں صلابت آنے لگے تو ابتداء میں بہرورہ شراب میں بھگو کر ضماد کریں یا روغن بنفشہ زردی بیضہ مرغ کی قیر و طی لگائیں اور اگر ورم صلب ہو جائے تو موم، روغن گل قطران و ماء الکافور کی قیر و طی طلا کریں۔ سلع اور غدود کی بہترین دوا یہ ہے کہ برگ شفتالو تر و برگ سداب سبز نہیں کر ضماد کریں اور اگر صلابت اس کی گرہ کے باقی رہ جانے کا نتیجہ ہو جو بلوغ کے وقت بندھتی ہے تو یہ دواؤں سے تحلیل نہیں ہو سکتی اور اس کا علاج یہی ہے کہ شکاف دے کر اسے خارج کر دیں۔

دبیلہ و قرحہ وغیرہ (پستانوں کے پھوڑے)

اگر ورم کا مادہ پستان میں جمع ہونے لگے تو منضجات استعمال کریں مثلاً تخم ریحاں شیر گاؤ میں پکا کر باندھیں یا تخم کتاں، بابونہ اکلیل الملک پانی میں جوش دے کر صاف کر کے مہم و روغن گل کے ساتھ قیروطی بنا کر ضاد کریں یا حلبہ۔ عظمیٰ اور تخم کتاں کا لعاب یا انجیر کوٹ کر ضاد کریں یا گندم، بادیان، حلبہ، تخم کتاں و راتیخ، مطبوخ انجیر میں ملا کر لگائیں۔ نضج کے بعد مفر (پھارنے والی اشیاء ضاد کریں یا شکاف دے کر مواد خارج کریں بعد ازاں مرہم سفید اب کے مانند مدلل مرہم لگائیں باقی تدابیر حسب حاجت مطلق دبیلہ کی بحث سے اخذ کریں۔

پستان کے قرحوں کا علاج منہ اور زبان کے قرحوں کے مانند کریں۔ رصاص محرق ان قرحوں کے لئے نہایت مفید ہے۔ اسی طرح صاصی کھل میں اس کے دستہ سے روغن زیتون حل کر کے طلا کرنا بھی مفید ہے۔ حسب ذیل روغن شیخ کے قول کے مطابق پستان اور دوسرے ڈھیلے اعضاء مثلاً دہن و زبان کے ہر قسم کے قرحوں کے لئے نہایت مفید ہے اور ان کو تا کل سے بچاتا ہے۔ نبیذ قابض میں حصہ میں سماق ایک حصہ ماز و خام نصف حصہ، سلیخہ، نصف حصہ و جوز سرؤ ایک حصہ تر کریں اور سب کو بیس روز بھگونے کے بعد جوش دے کر نف رہ جائے تو مل چھان کر دوبارہ آگ پر چڑھائیں اور گاڑھا ہو جانے کے بعد اسے شیشی میں محفوظ رکھیں اور بوقت ضرورت مرغ کے پر سے طلا کریں۔

اگر پستان میں خارش پیدا ہو جائے تو انجیر سرکہ خمیر میں پیس کر طلا کریں اور باقی تدابیر حسب حاجت مطلق حاد خارش کی بحث سے اخذ کریں۔

اگر پستان، شکم اور راتوں میں شقاق پیدا ہو جائے جیسا کہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے تو گل قہو لیا و کندر بوزن مساوی کوٹ چھان کر روغن گل میں ملا کر ضاد کریں یا کچھوے کو جلا کر اس کی راکھ سفیدی بیضہ مرغ میں ملا کر لگائیں اور ان تدابیر پر عمل کریں جو عام شقاق کی بحث میں لکھی جائیں گی۔

عظم و سقوط شد بین (پستان کا بڑا اور ڈھیلا ہو جانا)

گا ہے پستان بڑے ہو جاتے ہیں اور نیچے لٹک جاتے ہیں جو عیب کی بات ہے۔ ان ک

اعلاج مہر و محف، مخدر اور ایسی مقہض اشیاء سے کریں جو عروق کو تنگ کرتی ہوں مثلاً یہ ضمہ لگائیں جو ان صفات کا جامع ہے اور پستانوں کو بڑے ہونے سے بچانے کے لئے عجیب الایڈ ہے۔ گل قہولیا، مازد، سفیدہ و بزانج سب کو باریک کر کے سرکہ میں ملا کر باریک کپڑے پر لگا کر تین چار روز ضماد کریں، افیون و تان سرکہ کے ساتھ ضماد کرنا بھی اس باب میں مفید ہے۔ برگ انار بارانار، گل انار، پوست انار ہر چار، اجزاء باریک کر کے ایک شبانہ روز پانی میں تر رکھیں اور دوسرے روز جوڑ دے کر صاف کر کے چہارم حصہ روغن تلخ ملا کر جوش دیں اور پانی جل جائے تو آگ سے اتار کر روغن کو محفوظ رکھیں اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا پستانوں پر ملتے رہیں۔

زیرہ سیاہ کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر ضماد کرنا اور اس کے اوپر سرکہ میں کپڑا اتار کر رکھنا اور سینہ بند مستحکم باندھ کر اسے تین روزانہ کھولنا پستان کی حفاظت کے لئے نہایت مؤثر تدابیر ہے۔


اطباء ہند کا قول ہے بنج کٹائی بزرگ، پوست انار، بنج کندور، مولسری خام ہر ایک بہ وزن مساوی باریک کر کے ضماد کرنا گری ہوئی چھاتیوں کو سخت کرنے کے لئے مفید ہے۔ اسی طرح بڑے نرم و نازک ریشے خشک کر کے پانی میں پیس کر لگانا بھی مفید ہے اور آموں کی کیری جو نخود سے بڑی نہ ہو، مچھلی خرد ببول، مغز تخم تمر ہندی، پوست انار سب کو سارے میں خشک کر کے کوٹ چھان کر رکھ لیں اس میں سے روزانہ اڑھائی تولہ لے کر آٹھ پاؤ روغن گاؤ اور آدھ پاؤ شکر میں صوابنا کر کھانا اور چالیس روز اس کی مداومت کرنا چھاتیوں کی اصلاح کیلئے نہایت مفید و مجرب ہے۔

صغیر شد بین (پستان کا چھوٹا ہونا)

اگر پستان بہت چھوٹے ہوں جس میں ان کی تخلیق کا مقصد حاصل نہ ہو تو پیہ گاؤ میٹھ، پیہ لیل بوزن مساوی پگھلا کر رکھیں اور اس میں روزانہ شیر گرم مالش کریں۔ اسی طرح خراطین یا زلور روغن کنجد میں حل کر کے طلا کرنا بھی پستان کو بڑا ہونے کے لئے مفید ہے۔

پستانوں کے زخموں کا علاج

ایکسریض نے بیان کیا کہ ایک شاہ صاحب کے پاس پستانوں کے زخموں کا جواب



علاج ہے۔ شاہ صاحب عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں خود بھی کئی عورتوں کو یہ گولیاں لا کر دے چکا ہوں۔ تمام کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ بعض عورتوں کی چھاتیوں کا تو تین دفعہ پریشن ہو چکا تھا۔

شاہ صاحب سے تعلق پیدا کیا اور نسخہ طلب کیا مگر شاہ صاحب نے نسخہ بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ خیر کئی بار کی منت سماجت اور ملاقات کے بعد ان کا دل پسیج گیا اور نسخہ مل گیا۔ میں نے تیار کر کے مریضوں کو دیا۔ خدا شاہد ہے جن عورتوں کی چھاتیاں دوران حمل متورم ہو جاتی تھیں ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ بعض عورتوں کا علاج کئے چالیس سال گزر چکے ہیں دوبارہ انہویں یہ تکلیف نہیں ہوئی اور علاج کے بعد ان کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے۔

ہوالشانی: کچور، بھر داد نہ گڑ پرانا، برگ مہندی، برگ نیم، سفید سرسوں، گیری تمام اجزاء ایک ایک تولہ۔

ہوالشانی: تمر مہو کھڑی ایک پاؤ تازہ لے کر اس کا چھلکا دور کر کے گودا بمعہ بیج رگڑ کر گولیاں بقدر جنگلی بیر بنالیں۔ یہ گولیاں سرخ رنگ کی ہوں گی۔

ہوالشانی: رسونت صاف، آرد چاکسو 5-5 تولہ۔ آب برگ بھنگ یا جو شانہ سے نخودی گولیاں بنالیں۔ ان گولیوں کا رنگ سیاہ ہوگا۔

طریقہ استعمال: ایک دن سرخ گولی صبح شام ایک ایک۔ دوسرے دن سیاہ گولی صبح شام ایک ایک گولی دیں۔

ایک دن سادہ پانی سے سیاہ گولیاں دیں۔

دوسرے دن آب برگ نیم کے ساتھ دیں۔

تیسرے دن مہندی کے پتوں کے نقوع کے ساتھ دیں۔

چوتھے دن کچور کے نقوع سے دیں۔

پانچویں دن سادہ پانی کے ہمراہ دیں۔

کبھی کبھی ناغہ بھی کر دینا مفید ہے۔

کبھی کبھی ناغہ بھی کر دینا مفید ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا یہ ہمارا خاندانی مجرب نسخہ ہے۔ آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ حالانکہ کئی لوگوں نے آپ سے پہلے بھی طلب کیا۔ فقط آپ کی محبت نے یہ نسخہ حاصل کر لیا ہے۔ خود میں نے حکمت کی ہزاروں کتب کا مطالعہ کیا ہے لیکن یہ نسخہ کسی کتاب میں نظر نہیں آیا۔ لہذا مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ نسخہ اس کتاب کے تمام نسخوں پر بھاری ہے اب عورتوں کے علاج میں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔

امراض پستان

عورت کے پستان بھی غدی اعضاء ہیں یہ تعداد میں دو ہیں یہ بھی نشوونما کے اعضاء میں شامل ہیں۔ یہ بچہ کے لئے دو سال تک دودھ تیار کرتے ہیں۔ پستان گردوں اور خسیوں کی طرح نالی دار غدود ہیں۔

پستانوں کی ذمہ داریاں

جس طرح جب گردوں کے پاس خون آتا ہے تو وہ اس میں سے پیشاب علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جب خسیوں کے پاس خون آتا ہے تو وہ اس سے منی کے اجزاء نکال کر منی بنا لیتے ہیں بالکل اسی طرح جب پستان کے پاس خون آتا ہے تو اس میں سے ایسے اجزاء نکال لیتے ہیں جن سے دودھ بن کر باہر خارج ہوتا ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدن کے تمام غدود پیدا ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔

عرضی ہے

بدن کے تمام غدود پیدا ہوتے ہی اپنا کام شروع نہیں کرتے بلکہ وہ غدود جن کے ذمہ بدن کے لئے غذا امہیا کرنا اس کا خلاصہ نکال کر خون میں شامل کرنا اور بدن میں رکے ہوئے فضلات کو دوبارہ خون میں داخل کرنے اور خون سے فاضل مواد کو باہر نکالنے کی ذمہ داریاں ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ذمہ داریاں شروع کر دیتے ہیں۔

جیسے جیسے بدن کے دوسرے اعضاء بڑھتے ہیں اور نشوونما پاتے ہیں اسی نسبت سے یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور بدستور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے رہتے ہیں۔

لیکن جو اعضاء انسان کی مثل پیدا کرتے ہیں اور اس کی نشوونما کے لئے ہی اس کی غذا تیار کرتے ہیں ان میں بھی خزانہ کی نصیبۃ الرحم کا ذمہ داریاں رحم اور پستان وغیرہ شامل ہیں۔

منصوبہ بالا اعضاء اس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کرتے جب تک یہ اعضاء اپنی نشوونما مکمل نہیں کر لیتے ان اعضاء کی نشوونما اس وقت مکمل ہوتی ہے جب مرد عورت جوان ہوتے ہیں



اور کم از کم چودہ پندرہ سال کے ہو جاتے ہیں۔ ان اعضاء کے مکمل نشوونما پانے کی نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں مثلاً مرد کے خبیے منی بنانے لگتے ہیں جس کا اظہار اختلام کی صورت میں ہوتا ہے اور عورت کے جوان ہوتے ہی ماہواری آنے لگتی ہے۔

مردوں کی سوچیں دائرہی نکل آتی ہیں اور عورت کے پستان بڑھ جاتے ہیں ان ظاہر علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت جوان ہو گئے ہیں اب کی تمنا ایک دوسرے سے ملنے کیلئے بے چین ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مثل پیدا کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ان کے ملاپ سے مرد کے جراثیم منویہ اور عورت کے بیضہ انشی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تاکہ ان کی نسل یا مثل ساتھ ساتھ بنتی اور نشوونما پاتی رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب ایک عضو کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو دوسرا اپنا کام شروع کر دیتا ہے جب دوسرا اپنا کام مکمل کرتا ہے تو تیسرا اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیتا ہے یعنی ہر ایک انسانی تخم سے لیکر جنین اور بچہ بننے تک اپنی ذمہ داریاں باری باری نبھاتے ہیں۔

مثلاً قاذف نالی میں جو بیضہ ہوتا ہے اس میں انسانی تخم کی نشوونما کے لئے کچھ دن کی غذا موجود ہوتی ہے۔ جنسی ملاپ کے نتیجہ میں جب یہ تخم بیضہ انشی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں موجود مادہ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب بیضہ انشی غذا سے خالی ہو جاتا ہے تو قاذف نالیوں کا کام مکمل ہو جاتا ہے اب تخم انسان کسی قدر بڑا ہو جاتا ہے اب اسے غذا کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لہذا وہ قاذف نالی سے نکل کر رحم میں آ جاتا ہے یہاں رحم کے جسم میں اس کے لئے وافر مقدار میں غذا موجود ہوتی ہے لہذا وہ رحم میں جو تک کی طرح چمٹ جاتا ہے اور وہاں سے اپنی غذا کھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی نشوونما مکمل کرنے لگتا ہے۔

یہاں رحم میں اسے تقریباً نو ماہ تک غذا ملتی ہے اس کے بعد رحم میں بھی اس کی غذا ختم ہو جاتی ہے چنانچہ قدرت نے اس کی پیدائش سے قبل ہی عورت کی چھاتیوں میں چشموں کی صورت میں دودھ جاری کر دیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب جنین بچہ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو اسے بھوک لگی ہوتی ہے لہذا پیدا ہوتے ہی رونے کی صورت میں غذا مانگنے لگتا ہے۔

لہذا چونکہ ماں کی چھاتیوں میں غذا وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ اس لئے بچہ کے روتے ہی ماں اس کا منہ اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہے بچہ فوراً دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے اس طرح دو سال تک دودھ پستانوں میں بنتا رہتا ہے جسے پی کر بچہ اپنی نشوونما مکمل کرتا رہتا ہے۔

ہر ایک دودھ پستانوں میں بننا بند ہو جاتا ہے اس دوران بچہ باہر سے غذا میں کھانے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ ہذا دو سال کے بعد سے تمام زندگی تک باہر سے غذا کو کھاتا رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔

چھاتی کو خون کی سپلائی

(Blood Supply of Breast)

چھاتی میں خون کی نالیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کو سپلائی کرنے والی شریانیں یہ ہیں۔

(i) انٹرنل تھوریک آرٹری (Internal Thoracic Artery)

(ii) ایکزٹرنل آرٹری کی شاخیں (Branches of Axillary Artery)

(iii) پوسٹیریئر انٹرنل آرٹری کی شاخیں

(Branches of Posterior Intercostal Arteries)

پستانوں کی ورزشیں


ایسی لڑکیاں یا شادی شدہ عورتیں جن کے پستان نہ ہونے کے برابر ہوں یعنی ان کی قدرتی نشوونما مکمل ہو۔ ان کا سینہ مردوں کی طرح نظر آتا ہو ایسی صورت میں سیمیل سرویٹ کی تین چار خوراک روزانہ کھلا دیں اور اسی دوا کی پستانوں پر مالش ویزلین میں حل کر کے کریں۔ چند روز میں پستان نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔

امراض پستان اور ان کے امراض

پستانوں میں دودھ کم پیدا ہونا یا دودھ کا زیادہ پیدا ہونا پستانوں میں درد اور پستانوں میں کینسر ہونے کی تکالیف ہو جایا کرتی ہیں۔

دودھ کا کم پیدا ہونا

جس عورت کے پستانوں میں بچہ کی ضرورت کے لئے بھی دودھ پیدا نہ ہو تو ماں بچہ کو



پستانوں کا ڈھیلا ہونا

پستان طبعی حالت کی نسبت ڈھیلے ہو کر انک جاتے ہیں، جیسے جرابوں میں ریت بھری ہو، عورت کی خوب صورتی گہنا جاتی ہے، عمر سے بیس سال زیادہ کی بوڑھی لگنے لگتی ہے

اگر جانوروں کا دودھ پلانے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ اوپر دودھ بعض دفعہ موافق نہیں آتا جس سے اسے بد بھٹی ہو جاتی ہے کبھی ابکیاں اور دست شروع ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں ماں اور بچہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔

طریقہ علاج

جس عورت کے دودھ کم پیدا ہوتا ہو وہ غدی عضلاتی تحریک کی ہوتی ہے اگر اسے غدی اعصابی غذا دوا دینی شروع کر دی جائے تو دودھ ضرورت کے مطابق بننے لگتا ہے۔
 حوالہ شافی: زیرہ سفید 3 تولہ کشیز خشک 3 تولہ سبز الائچی 3 تولہ چینی حسب ضرورت تمام ادویہ کو باریک کر کے محفوظ کر لیں ضرورت کے وقت تین سے پانچ ماشہ تک دن میں تین بار ہمراہ دودھ بکری کھلائیں فوراً دودھ بڑھ جائے گا۔

پستانوں کا ڈھیلا ہونا

برہنہ: پستان طبعی حالت کی نسبت ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں، جیسے جرابوں میں ریت بھر دی گئی ہو، عورت کی خوب صورتی گہنا جاتی ہے، عمر سے بیس سال زیادہ کی بوڑھی لگنے لگتی ہے، اس مرض کے اسباب میں کمزوری، کمکی خون، بچے کو زیادہ عرصہ تک دودھ پلانا، بہت گرم پانی سے نہانا شامل ہیں لیکن ایک سبب ان سبب سے بھاری ہے۔ مرض میاں صاحب کا پیدا کردہ ہے خواہ مخواہ کی نوج کھسوٹ سے پستان ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

علاج: سب سے پہلے سبب کو دور کریں، اگر کسی خون سبب ہو تو اطریغلات اور فولاد کے مرکبات استعمال کرائیں، اگر سبب نوجنا کھوٹا ہو تو اسے دور کریں، ترمحلہ چھ ماشہ رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح مل چھان کر خالی معدے پلائیں اگر قبض کرے تو اگلے روز اس میں ایک ماشہ نمک ملا لیں، اگر دست لائے تو چھ ماشے چینی ملا کر میٹھا کر لیں، ۸۱ ملین بھی دے سکتے ہیں، دودھ کولہاں عین مرجدن میں کھانے کے بعد انجبار کے قہوے سے دیں۔
 حوا: حنہ لین (حنہ سرخ، حنہ سفید) مازو سبز، گل قہولیا، کشیز ہر ایک نو ماشہ، اجوائن

عربانی، پوست بخ انداز چھ ماشہ، کافور من، ماشہ سب ادویہ کو عرق گلاب میں کھوئیں، اور صبح کھائیں۔

نقد اٹھیں۔ مریہ آملہ، مریہ بکلی، پرت، موگ، کچلی، چھوڑا، جتنے ہوئے ان کے کی زبردی، ہذا
گیشت، مالک، شام کی چٹائی، اس کاں مقالہ و قیرہ۔

ایستاتوں کی خارش (جلد ۲۰)

پستانوں یا ان کی بھٹیوں پر بیٹھی بیٹھی عارض ہوتی رہتی ہے جس میں مزہ بھی آتا ہے اور عارض کو بچنے کے بعد جلن بھی ہوتی ہے عارض کرنے سے ان پر خراشیں آ جاتی ہیں اور پستان درد کرنے لگتے ہیں۔ مسلسل عارض سے ان پر بھٹیوں کے قرب و جوار پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہوئیں۔ کبھی پستانوں کے چلی طرف درم بن جاتا ہے۔ درم نہایت سرخ ہوتا ہے، جب ایک وقت اس میں عارض چھڑ جائے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے عارض کرنے سے درم میں سے زردی مائل سفید پانی نکلنے لگتا ہے اور یہ پانی جہاں کہیں لگ جائے وہیں عارض اور بڑھ جاتی ہے، اسے اگلے برے سمجھ کر علاج کریں۔ یہ قشری درم ہے تفصیل کیلئے دیکھو انگریز حصہ دوم امراض جلد علاج: 67 پانچ ماش تین مرتبہ دن میں کھانے کے بعد پانی سے دیں اس کے ساتھ ہی حب ہتلق ایک ایک کھلائیں۔ دو دن کے وقفے سے قشری اعصابی سہل دیں، بیرونی طور پر روغن مرشق میں عارضی ملا کر لگائیں۔

ہومو سیکس۔ سیکسی نہیں جیلاؤں اور سیکس ریاری 200 میں دیں۔

مالو کیلے محکمہ: کلگری یا اس اور تیرم میجر 6x یاری یاری دن ایک مرتبہ دیں۔

تقدائیں۔ پھلوں کے جوس بنریوں کے پھلکے سوپ پلائیں، جن میں مصالحہ نہ ڈالا گیا ہو، کدو،
ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، گھیا توڑی، شلغم سقید، اسروہ، سردہ، خربوزہ پھیکا، مربہ گاجر حلوہ گاجر، انار
شیریں، مالٹا کا جوس، خمیرہ گاؤڑیاں اور گاؤڑیاں، انجیر، قبوہ گل سرخ، مٹھا دلہا، بند، رس، ڈبل
سٹکی، چٹنی، ملکٹ کشرؤ، جلی، گنڈیریاں، گنے کارس تربوز، دودھ سوڈا، کچی لسی، چائی کی لسی،
شریت، برہنہ کی شریت، بخسہ وغیرہ۔

پستانوں کا پھٹ جانا

کسی مصلحت مرض کی وجہ سے یا غلبہ فطرت کی وجہ سے یا سخت سردی لگنے سے پستانوں کے

جائے تو پورے پستان سے پھٹ کر خون بہنے لگتا ہے، نہایت تکلیف ہوتی ہے، معمولی کپڑا چھو جانے سے بھی بہت درد ہوتی ہے، اٹھنا، بیٹھنا، ہلنا، جلنا سب اذیت ناک بن جاتا ہے۔

علاج: مرہم زرد لگائیں، اعصابی قشری ملین دودو گولیاں کھانے کے بعد تین مرتبہ دن میں دودھ گرم سے دیں، قبض نہ ہونے دیں، اگر قبض ہو تو اسی دودھ میں کیسٹر آئل ایک چمچ ملا لیں۔

غذائیں: دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام غذائیں زیادہ دیں، مکھن، اسبغول کی کھیر کھلائیں، کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، گھیا توری، شلغم سفید، دودھ میٹھا، امرود، گرما، سردا، خربوزہ پھیکا، مرہہ گاجر حلوہ گاجر، انار شیریں، انار کاجوس، خیرہ گاؤ زبان، عرق گاؤ زبان، زنجیر، قبوہ گل سرخ، بالائی، حلوہ سوچی، دودھ سویاں، میٹھا دلیا، بند، رس، ڈبل روٹی، دودھ جلیبی سکٹ، کشرڈ، جیلی، کھویا، گنڈیریاں، گنے کارس۔

پستانوں کا درد (وجع الثدي)

ایک یا دونوں طرف کے پستان درد کرنے لگتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، کسی خرابی سے دودھ کا جم جانا، چوٹ لگ جانا، جیسے کہ بچہ سر مار دے، رحم کی سوزش کی وجہ سے، خود پستانوں میں کسی زہر کی سرایت سے درد، مجری، لہیہ کی سوزش وغیرہ سے درد ہوتا ہے، اگر دودھ جمنے کی وجہ سے درد ہو تو پستانوں میں سے دودھ نہایت کم مقدار نکلے گا، اگر چوٹ کی وجہ سے ہو تو ماں کو پتہ ہوتا ہے، اگر رحم کی سوزش کی وجہ سے ہو تو حیض میں تکلیف ہوگی، اگر پستانوں میں کوئی زہر سرایت کر گیا تو پستانوں کی رنگت میں تبدیلی آجائے گی، اگر مجری لہیہ کی سوزش وجہ مرض ہو تو دودھ کی کمی اور پستان ذکی الحس ہوں گے ذرا سا چھونا بھی برداشت نہیں ہوگا۔

علاج: اگر دودھ جمنے سے درد ہو تو قشری اعصابی ملین تین ماشہ کھانے کے بعد پانی سے تین مرتبہ دن میں دیں۔

اگر چوٹ کی وجہ سے درد ہو تو پستان پر ضاد کریں۔

ضاد: ہلدی، گڑ، آ، روغن سرشف تولہ تولہ، نمک خوردنی تین ماشہ، پانی حسب ضرورت سے حسب دستور آگ پر رکھ کر گاڑھی سی لینی بتالیں اور نیم گرم لینی پستان کی بھٹی بچا کر اوپر باندھ دیں، اگر پہلے روغن کبجہ سے چھڑ لیا جائے تو جلد آرام آ جاتا ہے۔

اگر سوزش رحم کی وجہ سے درد ہو اور درد دائیں طرف قاذف میں زیادہ ہو تو یہ قشری تحریک سے سوزش اور درد ہے اس لئے اعصابی قشری ملین دود گولیاں دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد گرم دودھ سے دیں یہ قشری سوزش رحم کی قسمی دوا ہے۔

اگر کسی زہر کے سبب درد ہو تو اس کی علامات پائی جائیں گی، نبض دیکھ کر اس کا علاج کریں، یادار الشفاء + R2 + جب شفاء دے کر غددنا قلعہ کھولیں جو بھی زہر ہوگا خارج ہو کر آرام آ جائے گا، اس کے علاوہ بھی یہ دوا Pain Killer ہے، کیسی بھی درد کیوں نہ ہو فائدہ ہو جاتا ہے، قبض کا خیال رکھیں، غلط کے مطابق مسہل دیں۔
غذائیں: جو بھی دوا دیں اسی گروپ کی غذائیں دیں۔

چھاتی یعنی پستانوں کا لٹمان

شکوفہ مدار 3 عدد، شکوفہ دستورہ 3 عدد، شکوفہ نرم ارتد 3 عدد، باریک سر کے پستان کئے اوپر نیچے لیپ کر دو۔ مگر ڈوڈی پرست لگاؤ، اور انگلیا سخت پہنا دو۔ غاست ایک ہفتہ تک۔

پستانوں میں گلتیاں:

کوئیم 200 طاقت یا 1cm کی ایک خوراک روزانہ دیں اور اس کے علاوہ تین خوراک روزانہ برائی اونیا 30، کلکیر یا فلور 4x دونوں ملا کر دیں۔ یاد رکھیں کوئیم ایسے مریضوں کے لئے از حد مفید ہے جن کو نچلے دھڑ کا فالج ہو گیا ہو یا نیچے سے اوپر کو درد جاتا ہو یا کنارہ پن کی مردانہ ترافض ہوں۔

پستانوں کا زخم

بچے کی پیدائش کے بعد اکثر اوقات میری چھاتیوں میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نہ تو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اور نہ ہی کپڑا اوپر برداشت کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت علاج کروایا لیکن مستقل شفاء نہیں ہوتی برائے مہربانی کوئی اچھا سا علاج تجویز کریں۔

بچے کی پیدائش کے فوراً بعد پستانوں کو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر ان کو مسل مسل کر دھونا چاہئے تاکہ ان کے سوراخ کھل جائیں اگر چھاتی کے مسام بند ہیں تو ان کے اندر دودھ جم جائے

مکمل طور پر متفق ہو کر رقم دیا کرتے تھے اور سچے کامیاب بنانے میں ان کا حقیقی ہونے کی صورت میں دیکھی تھی کہ انہوں نے بلدی کو ملا کر اس کی نگہداشت کی جاتی ہے اور تعلیمی اہلیت کے استعمال کیا جاتا ہے اور تعلیمی مسائل بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سرکاری طور پر رقم دیا جاتا ہے استعمال کر دیا جاتا ہے اور سچے طور پر رقم دیا جاتا ہے ان تمام باتوں کے علاوہ۔

55

میرا پیدا ہونے کا وقت تو اس کو معلوم تھا کہ کتنی مسئلہ تھیں تھا لیکن اب صبر سے بچ کر
پیدا کئے جاتے ہیں اس وقت تک کہ بہت کی ہو گئی ہے اس کا یہ بت نہیں پھر رہا تھا کہ قرآن کریم کی ایجاد
ساتھ ہی جو یہ قرآن میں بتا گیا ہے یہ بت پھر کر کے دینی سکھ

بچہ کی پیداوار کے وقت اور بعد میں آپ نے جو قہر و قہریاں اسیات کا استعمال کیا ہے
اس سے وہ بچہ میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ لہذا آپ اب صبح و شام قہر کا استعمال کریں گے۔
میں نے، شلغم، تھوری، دال، مونگ، دلیا، ان میں دہی، گھی کی مقدار بتلایا ہے۔ مگر ان کی کھیر و دھنیاں
کھجوری استعمال کریں۔

نزیر عقیدہ کشمیر کے چیلل میں کھج کے وقت جیسا کہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ایک
تجربہ کا استعمال کر رہا ہے۔ تم اب یہ وقت کے چیلل میں عقیدہ براہِ حق میں پیدا کر کے ایک
چیلل میں پیدا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ

یہاں تو ان کا وہ ملک جہاں میرے چاہے تھے یہاں وہ سب بچوں نے دعوت چلا ہے اور میرے
یہاں وہ ملک گئے یہاں اس کا کیا ہے یہاں کے سہرا لائی کوئی ایسا سادہ علاج تجویز کر دے گی کہ انک میں
اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔

[illegible]

ہوالشانی: مغزنبہ دانہ 50 گرام، اسگندھ 30 گرام، کوزہ مصری 100 گرام کا سفوف تیار کریں ایک چمچ بڑا صبح نہار منہ اور ایک چمچ بعد از عصر ہمراہ دودھ استعمال کریں اور درج ذیل طلاء بنا کر مساج کریں۔ چھلکا اتار مازو بے سوراخ 50x50 گرام کوروغن کنجد 500 گرام میں جلائیں اور رات کو سونے سے قبل پستانوں پر ہلکا ہلکا مساج کر کے اوپر کپڑا باندھیں اور غذائی چارٹ میں سے عضلاتی غدی، غدی عضلاتی کا استعمال کریں۔

پستانوں کی سوزش

بعض ایسی عورتیں مطلب پر آتی ہوئیں جن کے پستانوں پر سوزش اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ نپل ہی اندر دھنس جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تحریر کریں اور اصول علاج کیا ہوگا؟

بعض اوقات بچے کو دودھ پلانے کے دوران بخار یا بچے کا سر زور سے چھاتی پر لگ جائے تو درد کی شدت سے دودھ نہیں پلایا جاسکتا اور دودھ چھاتی کے اندر رک کر اس سے چھاتی کے اندر تناؤ، سوزش ورم پیدا ہو جاتا ہے یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا عمل ہوتا ہے اور اس سے پیچوٹری گلینڈ کے افعال میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا فوری طور پر علاج یہ ہے کہ بریسٹ پمپ کی مدد سے دودھ کا اخراج کیا جائے اور غدی عضلاتی ملین حب سوزش کھانے کو دی جائے تمام عضلاتی غذائیں بند کر دی جائیں اور اس کے علاوہ تناؤ کو کم کرنے کے لئے پستانوں پر روغن زیتون کی ہلکی سی مالش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ جب تک مکمل صحت اچھی نہیں ہوتی اس چھاتی سے بریسٹ پمپ کے ساتھ ہی دودھ نکالا جائے بچے کو اس طرف سے دودھ پینے سے روکا جائے اس طرح بہتری پیدا ہو جائے گی۔

چھاتیوں کا ورم (Mastitis)

تھنیل (Swelling of Mammia) - سویلنگ آف میمیا

چھاتیوں سے دودھ نہ نکالنے کے سبب وہ تن جاتی ہیں اور تھنیاں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ جس سے بچے کو دودھ پلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تناؤ بڑھ جائے تو پستان میں سوزش ہو جاتی ہیں۔ اور سوزش کے رفع نہ ہونے کی صورت میں پستان میں پیپ پڑ کر وہاں پر پھوڑا بن جاتا ہے۔

Symptoms of Mastitis

The main symptoms of mastitis are: breast pain, swelling, redness, fever, enlargement, changed nipple sensation, discharge, itching, tenderness, and/or a breast lump.



lump

discharge

بریسٹ پمپ سے چھاتیوں سے دودھ نکال دیں اور بیلاڈونا گلیسرین لگائیں۔ چار ڈرام میگ نے شیا سلفاس پانی میں گھول کر مریضہ کو پلائیں تاکہ قبض دور ہو جائے۔ سلفاڈایازین یا سلفا تھیا زول کھلائیں اگر فائدہ نہ ہو تو پکانے کے لئے پلٹس باندھیں جب پک جائے تو شکاف دے کر مرہم پٹی کریں۔ اگر زخم بڑھ جائے تو سلفا ڈرگز کے علاوہ مینی سلین کا استعمال کریں۔

پستان کی مزید بیماریاں

لدی

یہ دو گلیٹیاں ہیں جن میں بچے کیلئے دودھ پیدا ہوتا ہے، یہ عورتوں کی طرح مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کو اگر غیر معمولی اسباب سے بڑھایا نہ جائے تو یہ ایک نشان کی مانند باقی رہ جاتی ہیں، جوان عورتوں میں یہ دو بڑی بلندیاں ہوتی ہیں۔ نصف کرہ کی مانند گول ہیں، یہ سینہ کی اگلی اور پہلوی سطحوں پر تیسری سے چھٹی یا ساتویں پسل اور سینہ کی ہڈی سے بغل تک رہتی ہیں۔ ان کا وزن اور حجم مختلف عورتوں اور مختلف عمروں میں جدا گانہ ہوتا ہے، چنانچہ جوانی سے پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر اعضاء تناسل کی بالیدگی کے ساتھ بتدریج بڑھتی ہیں، اور ایام حمل اور ایام رضاعت میں (دودھ پلانے کا زمانہ) بڑی ہو جاتی ہیں، اور بڑھاپے میں لاغر اور ڈھیلی ہو جاتی ہیں، باقی چھاتی علی العلوم دائیں سے قدرے بڑی ہوتی ہے، ان کا قاعدہ جو سینہ سے لگا رہتا ہے گول ہوتا ہے جو سینہ کے عضلات سے بذریعہ ایک باریک طبقہ کے علیحدہ رہتا ہے۔ ان کی بیرونی سطح محدب ہوتی ہے اس کے وسط سے قدرے نیچے ایک چھوٹی سی مخروطی شکل کی بلندی ہوتی ہے، جس کو سرپستان (بھٹنی) کہتے ہیں، سرپستان کی سطح سیاہی مائل یا سیاہ اور اس کے گرد گلابی رنگ کا ہالہ (گھیرا) ہوتا ہے، باکرہ لڑکیوں میں اس کا رنگ گلابی ہوتا ہے، عورتوں میں حمل کے دوسرے مہینے کے قریب یہ پھیل جاتا ہے اور اس کا رنگ گندمی ہو جاتا ہے۔

پھر جس قدر حمل کے دن زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اسی قدر گندمی رنگ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ بالآخر سیاہ ہو جاتی ہے، پھر رضاعت کے بعد اس کی رنگت زائل ہو جاتی ہے مگر اس کا یہ اثر پستان گندمی سیاہی مائل تازیت قائم رہتا ہے، اس ہالہ کی رنگت کے تغیرات وجود حمل کی معتبر دلیل بنتی ہے، پستان کی ساخت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی گلیٹیاں ہوتی ہیں جو دودھ پیدا کرتی ہیں۔

سرپستان ایک مخروطی بلندی ہے جو عملی تحریک سے کسی قدر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا رنگ گلابی یا گندمی مائل ہوتا ہے، اس کی سطح شکن دار اور اس پر چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں، اس کی نوک پر بہت سے سوراخ ہوتے ہیں، جو دودھ کی نالیوں کے دھانے ہیں، سرپستان کی جڑ کے پاس اور ہالہ کی سطح پر بہت سی شمعیں گھنٹیاں ہوتی ہیں جو ایامِ رضاعت میں بڑی ہو کر جلد کے نیچے میل کی طرح معلوم ہوتی ہوئیں۔ ان گھنٹیوں سے مخصوص روغنی مادہ مترشح ہوتا رہتا ہے، جس کا قاعدہ یہ ہے کہ سرپستان کی جلد رضاعت کے وقت زیادہ محفوظ رہے۔

پستان کی ساخت

پستان کی ساخت میں گلٹی کا گشت (لحم غدودی) اور ان کے جوڑنے والے ریشے داخل ہیں، کچھ چربی ساخت بھی ہوتی ہے، لحم غدودی بہت سے ٹکڑوں سے مرکب ہے، جس میں دودھ کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، یہ نالیاں باہم مل کر بڑی ہو جات ہیں، یہ بڑی نالیاں پندرہ سے بیس تک ہوتی ہیں اور ان کو مجاریِ لبن (دودھ کی نالیاں) کہتے ہیں یہ نالیاں ہالہ کے پاس پھول جاتی ہیں، جن کو اوعیہِ لبن (دودھ کے ظرف) کہتے ہیں، پھر تنگ ہو کر حلقہ میں سوراخوں کے ذریعے کھلتی ہیں۔

لبن: (دودھ) اگرچہ دیکھنے میں بظاہر دودھ کے سارے اجزاء ایک دوسرے سے قشابہ و متجانس (ملتے جلتے اور ہم جنس) معلوم ہوتے ہیں، اور سب چیزیں منحل نظر آتی ہیں، مگر اصل میں دودھ دو قسم کے اجزاء سے مرکب ہے۔

(۱) صاف رقیق و سیال رطوبت جس کو دودھ کا پانی یا ماءِ الحین کہتے ہیں۔

(۲) کچھ منجمد اجزاء جو رطوبت مذکورہ میں تیرتے رہتے ہیں، ان کو (کریاتِ لبن) دودھ کے گول دانے کہتے ہیں، انہی دانوں کی وجہ سے دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے۔

پستانوں کا بڑھ جانا

اس مرض میں ایک یا دونوں پستان بڑھ کر بڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی شکل ایک چھوٹے سے مشکیزے جیسی ہو جاتی ہے، اس مرض سے

پستانوں کا چھوٹا ہونا (صغیرالشدی)

بعض اوقات پستان طبعی سائز سے بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی عورت کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے لڑکا ہو صرف کپڑوں سے یا آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی یا عورت ہو سکتی ہے۔


سب سے پہلے نقص تغذیہ سبب ہے اس پر غور کریں، ہارمون ایسٹروجن کی کمی بھی اس دور کا ایک بڑا سبب ہے، اس کے بعد پستانوں کی رگوں کے سدے، عسر طمث بوجہ سوزش کا ذہن، موروٹی آتشک یا سوزاک، ہمیشہ ہی گرم پانی سے نہانا جس سے جسمانی بافتیں تحلیل ہو جاتی ہیں، زیادہ محنت مشقت کرنا، کثرت سے مسہل و مدرات کا استعمال، فساد خون کے امراض سے خشکی کا غلبہ، نسلی اعضا کا پیدائشی یا عارضی نقص، عمر کی زیادتی سے بھی پستان چھوٹے ہو جاتے ہیں یا مرجھا جاتے ہیں۔

علاج: سب سے پہلے سبب دور کریں، اگر سوزش کا ذہن یا ایسٹروجن کی کمی سبب ہو تو اعصابی قشری ملیں دودو گولیاں کھانے کے بعد تین مرتبہ دن میں دودھ بے دیں، اگر نقص تغذیہ سبب ہو تو غذا بہتر کریں، اگر کوئی اعضاء تولیدی میں خللی نقص ہے تو یہ ناقابل علاج ہے، اگر موروٹی آتشک یا سوزاک کی علامات ملیں تو ان کا علاج کریں، جو اپنے اپنے باب میں لکھا گیا ہے، اگر بھس وغیرہ وجہ ہو تو مولد خون ادویہ (اٹریفلٹات) واغذیہ دیں، اگر سبب خشکی ہو تو اعصابی حریرہ استعمال کرائیں۔

غذائیں: اعصابی قشری، پھلوں کے جوس بنریوں کے پھیکے سوپ پلائیں، جن میں مرچ مصالحہ نہ ڈالا گیا ہو، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام غذائیں زیادہ دیں، بالائی، مکھن، اسبغول کی کھیر کھلائیں، کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، گھیا توری، شلغم سفید دودھ میٹھا، امرود، گرما، سردا، خر بوزہ پھیکا، مربہ گاجر حلوہ گاجر، انار شیریں، انار کا جوس خمیرہ گاؤ زبان، عرق گاؤ زبان، انجیر، قہوہ گل سرخ، بالائی، حلوہ سوچی، دودھ سویاں میٹھا لیا، بند، رس، ڈبل روٹی، دودھ بکثرت پلائیں۔

اعصاب مقوی حریرہ: مغز بادام $1/2$ کلو، کاجو $1/2$ کلو، بادیان، مغز کدو شیریں تربوز، مغز خر بوزہ، مغز کھیرا، موصلی سفید پاکستانی سب $1/4$ ، $1/4$ کو، کشنیز $1/8$ کلو، فلفل سیا $1/16$ کلو، الائچی سفید $1/32$ کلو۔

Types of Breast Cancer



مغزیادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح چھیل کر دھوپ میں خشک کر لیں، باقی مغزیات بھی اچھی طرح دھولیں کیونکہ یہ تیزاب کی مدد سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترشی اچھی طرح دور ہو جائے، موصلی سفید بھی اچھی طرح مسل کر دھولیں یہ بھی تیزاب کی مدد سے سفید کی ہوتی ہے جبکہ اس کا اصل رنگ موتیا ہوتا ہے، ان سب ادویہ کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیں، پھر سونف، کشیز، موصلی، مرچ سیاہ اور الائچی کو اچھی طرح سے باریک پیس لیں، مغزیات کو صرف جو کوب کریں اور شربت بارد چار کلو ملا کر مجون بنالیں باقی کا سفوف سنجال لیں، جب ضرورت پڑی اتنا تیار کر لیا یہ اس وجہ سے بتایا ہے کہ زیادہ دیر رکھا رہنے سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اعصابی مقوی حریرہ تیار ہے ایک کچھ سفوف اعصابی مقوی حریرہ آدھا کلو دودھ میں ڈال کر ایک جوش دیں اور دو تولہ کھن شامل کر لیں نیم گرم صبح شام حلوے کو پلائیں، نہایت اعلیٰ دوا ہے جو استعمال کرے گا وہی اس کے فوائد سے واقف ہوگا۔

روغن مسکن: چربی ساغ، چربی گردہ بڑ، چربی گاؤمیش، روغن بیضہ مرغ ہر ایک تولہ تولہ، روغن قسط، روغن گل دودھ تولہ، روغن بادام تن تولہ۔

سب کو ایک برتن میں ڈال کر نرم سی آگ پر رکھیں سب حل ہو جائیں گے، محفوظ کر لیں روزانہ صبح شام پستانوں پر طلاء کریں، اس طلاء سے بھی خاطر خواہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن سرفہرست غذا کی طرف توجہ دیں، مریضہ کے آرام کا خاص خیال رکھیں۔

پرہیز: تمام قسم کے گوشت، دال مسور، اٹھ، پکڑے۔ میٹھی، تمام قسم کے ساگ، کریلے، پیٹنگن، چائے، کافی، پان، سگریٹ، پالک، مچھلی، چھوہارے، پستہ، اخروٹ، چلتوزے، سرخ مرچ، بازاری چے اور دیگر تیز مرچ مصالحہ جات سے سخت پرہیز کریں۔

چھاتی کا کینسر در و درم

بائیں جانب چھاتی پر درد ہو اور وہاں درم نما پھوڑا بن گیا جو بڑھتا گیا آخر کار اس کا اپریشن کر لیا گیا اپریشن کے چھ ماہ بعد وہی صورت دوبارہ ہو گئی یعنی پھوڑا پہلے سے بھی زیادہ ظاہر ہوا پھر اپریشن کر لیا ایک سال ٹھیک رہا۔ پھر آہستہ آہستہ چھوٹی سی مٹھی بن گئی جو کہ بڑھتی گئی اور مکمل ہو کر پھٹ گئی اور اس میں سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلنے لگے رہے اس حالت کو اب چار ماہ ہو رہے ہیں وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا اس میں بڑی نما گوشت بڑھتا ہے جو کہ سفید رنگ کا ہے اور نیم زرد رنگ میں رطوبت رستی رہتی ہے۔

چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے ناکلیں درست کام نہیں کرتیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز پھرتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی غذا ہضم نہیں ہوتی باقی اعصابی نظام درست ہے اس کے لئے قانون مفرد اعصاب کے مطابق غذائی اور دوائی علاج تجویز فرمائیں۔

مریضہ کی چھاتی میں درد اور ورم ہے اسے غدی عضلاتی تحریک ہے۔ خون میں فاضل مادے اور صفراء کی کثرت ہے علاج کے لئے غدد ناقہ کو تیز کریں تاکہ ان فضلات کا با آسانی اخراج ہو سکے اس کے لئے غدی اعصابی مسہل اعصابی کھار اعصابی عضلاتی ملین اور حب اکسیر جدید ملا کر استعمال کرائیں غذائیں بھی اعصابی استعمال کرائیں اللہ شفا دے گا۔

پستانوں کا شدید درد

دودھ کا جم جانا: درد کی یہ قسم سادہ پستانوں میں دودھ جم جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس سے گرم ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ عرف اسے تفیلہ بھی کہتے ہیں۔

علامات: پستانوں میں دودھ جم جانے سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھرتاؤ اور صلابت پیدا ہو کر ان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ پستانوں کو ہاتھ لگانے سے یا کپڑا وغیرہ لگنے سے بھی سخت درد ہوتا ہے اور کبھی بخار بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔

طریقہ علاج: پستانوں میں سے دودھ خارج کریں۔ سرکہ سے کپڑا بھگو کر پستانوں پر رکھیں۔ شدت حرارت کے وقت سرد ادویہ کا لیپ کریں۔ جب حرارت کو سکون ہو جائے تو محلل ادویہ لگائیں اور کھلائیں۔

ضروری باتیں: جب پستان میں ورم ہو تو بچے کو اس طرف کا دودھ پلانا چھوڑ دیں۔

پستانوں کا تناؤ

اگر خدا نخواستہ بچہ مر جائے یا بچہ دودھ نہ پئے تو دودھ رک جانے کی وجہ سے پستان خوب تن جاتے ہیں، ہاتھ لگانا تک برداشت نہیں ہوتا، یا دودھ جم کر دودھ کی نالیوں میں سدہ پڑ جانے سے بھی پستان تن جاتے ہیں۔

علاج: اول الذکر میں برسٹ پمپ (آلہ مخرج اللبن) سے دودھ نکالیں اور پستانوں کو کپڑے سے اوپر کی طرف اٹھا کر باندھ دیں، دوسری صورت میں دیکھیں کہ مجری لہیہ کی سوزش کی وجہ سے

رستہ مسدود ہو کر دودھ رکنے سے تباہ پیدا ہوتا ہے تو اعصابی قشری ملین دودھ کو لیاں تین مرتبہ دن میں کھانے کے بعد گرم دودھ سے دیں، اگر خون میں سردی آ جانے سے دودھ جم گیا ہے تو قشری اعصابی ملین تین ماشہ تین مرتبہ دیں۔

غذائیں: سبب کے مطابق دیں، اگر وجہ سردی ہے تو ماء العسل سے بہتر کچھ نہیں ہے۔

پستانوں کا درد (اعصابی) مرض

ماہیت مرض: یہ علامت خالص خلط بلغمی فاضلہ کے بدن میں ضرورت بدن سے زائد جمع ہونے سے ہوتی ہے اور اس کا اخراج بند ہوتا ہے۔

اسباب: ترگرم و تر سرد اغذیہ اور اشیاء وغیرہ کا بکثرت استعمال ٹھنڈے ماکول و مشروبات کا استعمال۔

علامات مرض: رطوبت بلغمی کی کثرت کی وجہ سے یا عورت کے مقامی غدد (پستان) زیادہ نشوونما پاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اپنے حجم میں بڑھ جاتے ہیں گا ہے بچہ والی عورت میں اعصابی تحریک بڑھ کر پستانوں کی قوت جاذبہ بڑھ جاتی ہے جس سے پستانوں میں دودھ بکثرت اکٹھا ہونے لگتا ہے جو کہ بچے سے بچ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پستانوں کے اندر سخت تباہ اور درد ہوتا ہے۔ جو کبھی درم کی شکل میں بھی اختیار کر لیتا ہے۔

علاج بالغذا: مریض کو تر سرد اور ترگرم اغذیہ و دودھ مغزیات مشروبات سے پرہیز کرائیں۔ غذا خشک سرد یا خشک گرم ملا کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی اغذیہ دیں۔

علاج بالادوا: مریضہ کا بغور معائنہ کریں درست علاج مزاج کی تبدیلی ہے۔

علاج کلی: مریضہ کے معائنہ کے بعد صحیح تشخیص کر کے علاج ادویہ اور اغذیہ تجویز چونکہ اعصابی تحریک میں قوت جاذبہ بڑھنے سے پستانوں میں دودھ بکثرت اکٹھا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بچہ کی ضرورت سے بچ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پستانوں کی اندر سخت درد اور تباہ ہوتا ہے اور دودھ بھی خوب ہوتا ہے۔

علاج

عورت کو چاہئے کہ اگر درد دودھ کی وجہ سے ہو رہا ہو تو بذریعہ مسٹ پمپ دودھ نکال دے۔ غلا میں دودھ اور گوشت یعنی اعصابی اغذیہ اور غدی اعصابی اغذیہ نہ دیں۔ اگر درد جوش

خون کی وجہ سے ہو تو یہ غدی اعصابی تحریک ہے۔ اس کا علاج اعصابی عضلاتی ادویہ و اغذیہ سے کریں اور انہی ادویہ کا پستانوں پر لیپ کریں۔

اگر درد پستان دودھ کی زیادتی سے ہے تو دودھ کم کرنے والی عضلاتی اعصابی ادویہ دیں اور اغذیہ بھی بھی دیں اور پستانوں پر بھی انہی ادویہ کا لیپ کریں۔

اجزائے نسخہ: جخم میتھی 7 تولہ، رائی 5 تولہ، کلونجی 2 تولہ۔

دوائی بنانے کا طریقہ: سب ادویہ کا سفوف بنالیں۔

مقدار خوراک: 2-3 ماشہ دن میں 3 بار کھلائیں اور اسی دوا کا لیپ کریں۔

فائدے: دودھ کم ہو جائے گا۔

انتفہی کا استعمال کریں۔

مازو، مائیں، کتھا سفید، پوست اتار، کڑا چھال، پتے کیکر، پھلکوی سفید، موزن لیکر اس

کا سفوف بنائیں۔ اور سرکہ میں گھوٹ لیں اور پستانوں پر لیپ کریں۔

نسخہ بنانے کا طریقہ: لونگ دار چینی 1 تولہ، جلو تری، 1 تولہ مصر 3 تولہ۔

ترکیب تیاری: سب ادویہ کو باریک کر کے نخودی گولیاں بنائیں۔

خوراک کی مقدار: 1-2 گولی دن میں 4 بار ہمراہ پانی یا قہوہ

فوائد: درد پستان میں استعمال کرے پے خطا ہے۔

پستانوں کی گرہ پڑنا

پستان کے مرض میں مجری، لہیہ میں سدہ پڑ جانے سے گرہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے

دودھ بند ہو جاتا ہے یا کم مقدار میں نکلتا ہے، پستانوں کو ٹٹولنے سے گانٹھیں سی محسوس ہوتی ہیں اور

ان میں درد ہوتا ہے، اس کی عام طور پر دو وجوہات عام پائی جاتی ہیں ایک تو دودھ گاڑھا ہو کر

تالیوں میں جم جائے دوسرا دودھ کی تالیوں کی سوزش و ورم ہے، اگر دودھ جم جانے سے ہوں تو

پستانوں میں تپناؤ ہوگا، اگر سوزش کی وجہ سے ہو تو پستانوں میں تپناؤ کے ساتھ ساتھ درد بھی ہوگا۔

علاج

اگر دودھ جمنے کی وجہ سے سدہ پیدا ہو گیا ہو تو قشری اعصابی المین ماء العسل سے تین

مرتبہ دن میں کھانے کے بعد چار ماشہ دیں اور بھی دوا شہد اور پانی کی مدد سے ضاداً بھی استعمال

کریں، اگر دودھ کی نالیوں کی سوزش و ورم کی وجہ سے سدہ رک کر گانٹھیں پڑی ہیں تو سوزش اتارنے کیلئے اعصابی ادویہ دیں، مجری لہیہ کا زیادہ حصہ چونکہ قشری اور عضلاتی بافتوں سے مرکب ہیں اس لئے اعصابی قشری ملین دودھ گولیاں تین مرتبہ دن میں کھانے کے بعد گرم دودھ سے دینا بہت فائدہ مند ہے، گانٹھیں فورات تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

غذائیں: اگر دودھ جننے سے سدہ رکا ہو تو قشری اعصابی غذائیں دیں، اگر دودھ کی نالیوں کی سوزش کی وجہ سے مرض واقع ہوا ہو تو اعصابی قشری غذائیں دیں۔ تمام غذائیں کتاب کے آخر میں لکھ دی گئی ہیں وہاں سے دیکھ لیجئے۔

پستانوں کی رسولیاں

کبھی ایک پستان میں اور کبھی دونوں پستانوں میں پہلے گلٹیاں (رسولیاں) محسوس ہوتی ہیں جن میں درد ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا پتہ ہی درد سے لگتا ہے، بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتوں تک یہ مرض ہو جاتا ہے، بچپن سال تک کی عورتوں میں تو میں نے یہ مرض دیکھا ہے، نبض قشری اعصابی ہوتی ہے، جسم بھرا ہوا بلکہ بعض اوقات فرہہ، اچانک ہی کوئی چیز لگنے سے یا معمولی دباؤ آنے سے پستان میں درد محسوس ہوتا ہے اگر ٹٹول کر دیکھا جائے تو ایک گلٹی سی ہوتی ہے جس میں دبانے سے درد بڑھ جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے پستان کے حجم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس حد تک کہ دونوں پستان بے ڈول ہو جاتے ہیں، کبھی ایک میں ہی مرض ہوتا ہے، کبھی دونوں میں یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، یہ رسولیاں دو قسم کی ہیں ایک میں شدید درد ہوتا ہے اور ایک قسم میں معمولی درد، دبانے سے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کا آپریشن کر دیتے ہیں، ان دونوں اقسام کا الگ الگ علاج ہے، ان کی تشریح سادہ رسولی اور خبیث رسولی کے بیان میں تفصیل سے پڑھیں۔ اس مرض کے کئی مریض آئے ان میں سے کچھ ایسی عورتیں بھی آئیں جنہوں نے آپریشن کر لیا تھا، وہ سال کو سال بعد مر جاتی ہیں ہوتا ایسا ہے کہ کچھ جلد باز عورتیں جب ایک پستان میں رسولی بنتی ہے تو اس کی تکلیف سے عاجز آکر اسے آپریٹ کر دیتی ہیں، جب ایک پستان سے آپریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا مادہ دوسرے پستان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر اسے بھی آپریٹ کرانا پڑتا ہے، جن عورتوں نے آپریشن کر دیا ہو ان کا علاج نہیں کرنا چاہئے، کسی کی مصیبت اپنے گلے کیوں ڈالیں، کیونکہ آپریشن کرنے سے رسولیوں کے خلیات منتشر ہو کر جسم میں کئی اور جگہ پر مرض پیدا کر

دیتے ہیں، جو بظاہر نہیں نہیں آتا لیکن درپردہ پھلتا پھولتا رہتا ہے اور آخر کار ایک دن لے ڈالتا ہے۔

علاج

اگر رسولی درد ناک ہو تو اچھ 67 پانچ ماشہ دن میں تین بار تازہ پانی یا شربت بزوری بارو سے دیں، قشری اعصابی مسہل دیں، مسہل ہفتے میں ایک سے دو بار دینا چاہئے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر غالب خلط کا بہت غلبہ ہو اور ملیحیات سے مادہ خارج نہ ہوتا ہو، اگر رسولی کی بغیر درد والی قسم ہو تو قشری اعصابی ملین تین ماشہ دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد پانی سے یا شہد والے پانی سے دیں۔

غذائیں

درد والی قسم میں پھلوں کے جوس اور بنریوں کے پھکے سوپ پلائیں، جن میں مرچ مصالحہ نہ ڈالا گیا ہو، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام غذائیں زیادہ دیں اسبغول کی کھیر کھلائیں، کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، گھیا توری، شلغم سفید، دودھ میٹھا، امروہ، گرما، سردا، خربوزہ پھیکا، مرتبہ گاجر حلوہ گاجر، انار شیریں، انار کا جوس، خمیرہ گاؤ زبان، عرق گاؤ زبان، انجیر، قہوہ، گل سرخ، بالائی، حلوہ سوچی، دودھ سویاں، میٹھا دلایا، بند، رس، ڈبل روٹی، دودھ جلیبی بسکٹ، گندیریاں، گنے کارس، کشرڈ، جلی کھویا، رس، تربوز، شربت بزوری، شربت بنفشہ وغیرہ۔ بغیر درد والی قسم میں قشری اعصابی غذائیں دیں۔

دودھ کی زیادتی

کثرت رطوبات کے باعث یا جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے تو دودھ کی زیادتی ہو جاتی ہے، مقوی و مرغن غذاؤں کے استعمال سے، اور مغزیات کے استعمال سے بھی دودھ بکثرت پیدا ہونے لگتا ہے، پستانوں میں تناؤ پیدا ہو کر پستان درد کرنے لگتے ہیں اگر بچے کا دودھ چھڑانے کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا ہو تو شروع میں دودھ خود بخود بہتا رہتا ہے بعد میں مناسب علاج کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تو درم پیدا ہو کر بخار آنے لگتا ہے۔

علاج: اگر بچے کا دودھ چھڑانے سے ہو تو برست پپ سے دودھ نکال دیا کریں چند روز بعد خود

بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کثرتِ مقوی و مرغین اغذیہ سبب ہو تو اسے دور کریں اور عضلاتی مخاطی دور دیں اور اسی قبیل کی ادویہ پستانوں پر ضما د کریں۔

ضما د: حتم کتان اور حتم حلبہ ہموزن کسی تابہ آہنی میں جلا لیں اور تیز سرکہ میں کھل کر کے پستانوں پر ضما د کریں، چند بار کے استعمال سے دودھ میں کمی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ بند ہو جائے گا۔

غذا لیں: سادہ اور بھوک رکھ کر عضلاتی مخاطی ہی کھلائیں، مربی آملہ، مربی سیب، مربی بھی، مربی ہریڑ، بادیان خطائی اور الا پچی سفید کا قہوہ، انجبار اور بوڑھ کی داڑھی کا قہوہ، مٹر لو بیا، ہرا چھولیا، چنے بھنے ہوئے، چنے شور بہ دار پکائے ہوئے۔ آلو گوبھی، کچھار، سیم پھلی، مکئی اور باجرے کی روٹی، مین کی روٹی میٹھی ڈال کر، اوپر لکھے گئے قہوے استعمال کریں، ناریل، آڑو، چھوہارے، پستہ، بڑا گوشت اور اس کے کباب، کڑا ہی پکڑے، کوفتے، انڈے کی زردیاں، لیموں کا استعمال بکثرت کریں، قالہ، کینو، جامن، مالٹے، چکوترا، ترش انار وغیرہ دیں، منقہ مویر، خوبانی وغیرہ دیں۔

دودھ کی کمی (قلت لبن)

دودھ کی کمی کوئی تکلیف دہ مرض تو نہیں ہے لیکن ماں کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا دکھ ہوگا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا بھوک سے ہلکتا رہے اور وہ ماما کی ماری بار بار اس کے منہ میں پستان دے، لیکن چند لٹے سیدھے منہ مار کر پھر رونے لگے کیونکہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق دودھ نہیں ملتا، بچہ دن بدن غذا کی کمی کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ماں کی غذا متوازن نہ ہونا ہے اور ماں کا ضعف اشتہا بھی سبب ہے جب ماں ہی کچھ نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے بنے گا، بھس کی وجہ سے بھی دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ دھوپ میں کام کاج کرنا، حالاتِ نفسانیہ بھی سبب ہیں، کوئی رحم کا مرض، جیسے کثرتِ طمث کی وجہ سے کثرتِ زبان خون، بچے سے عدم محبت بھی ایک بڑا سبب ہے۔

علاج:

سب سے پہلے سبب دور کریں اگر پھر بھی مطلوبہ مقدار میں دودھ نہ پیدا ہو تو ہمارے تجربے میں دو تین ادویہ ہیں جن سے مقصد براری ہو جاتی ہے، زیرہ سفید چھ ماشہ آدھا کلو دودھ میں نرم آگ پر اچھی طرح پکائیں جب نصف رہ جائے تو صبح تمام نوش کرنے سے چھوٹی موٹی کمی

پوری ہو جاتی ہے، سونف کو دودھ میں جوش دیکر پینے کے بھی یہی فوائد ہیں، اس سے بڑھ کر تودری سفید ایک تولہ آدھا کلو دودھ میں نرم آگ پر رکھیں جب دودھ ڈیڑھ پاؤرہ جائے تو صبح شام پینے سے بہت زیادہ مقدار میں دودھ آنے لگتا ہے، یہ تو مفرد ادویہ کا کمال ہے ویسے بہتر یہی ہوتا ہے کہ مفرد ادویہ استعمال میں لائی جائیں لیکن درج ذیل حریرہ بھی کمال کا مولد شیر ہے۔
مولد شیر حریرہ: تودری سفید اصلی، موصلی سفید انڈین، مغز تربوز، مغز خر بوزہ، کشمش، ہر ایک تولہ، الائچی سفید چھ ماشہ۔

سب ادویہ کو اچھی طرح ہاون دستہ سے کوٹ لیں، مشین سے نہیں پیسنی یہی ایک راز ہے، ایک تولہ دوا آدھا کلو دودھ میں نرم آنچ پر رکھیں اور اس میں تین تولہ کھویا شامل کر دیں، حسب ذائقہ چینی ملا کر صبح شام خلونے معذہ استعمال کریں۔
ایک راز: جتنی بھی مولد منی دوائیں ہیں سب ہی مولد شیر بھی ہوتی ہیں، اس لئے اس طرف بھی دھیان رکھیں۔

غذائیں: مغزیات کے حریرے دودھ میں پکا کر دیں، دودھ مکھن، بالائی، کھویا، کھیر، دودھ سویاں، سوچی کا حلوہ دودھ والا، دودھ جلیبی کو بھی اس کام میں کمال حاصل ہے، پھل زیادہ سے زیادہ کھلائیں، اگر قبض ہو تو سبزیوں کا بکثرت استعمال کریں، اگر غذا کی کمی ہو تو اسے پورا کریں، اگر خون کی کمی کی وجہ سے ہو تو غذاؤں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ کشتہ فولاد دورتی صبح شام مرہہ گاجر سے دیں۔

دودھ کی خرابی (فساد البین)

کبھی دودھ میں خرابی آ جاتی ہے جس وجہ سے بچہ یا تو اسے پیتا ہی نہیں اگر پی لے تو مختلف امراض میں گھر جاتا ہے جیسے، بد ہضمی، اچھارہ، اسہال، قے، لاغری جیسی امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے، اخلاط اربعہ کی کمی بیشی سے غالب خلط متعفن ہو کر دودھ کو خراب کر دیتی ہے اور دودھ کا رنگ توام، ذائقہ، بو اور مقدار متاثر ہو کر بچے کو بیمار کر دیتی ہے، ماں کی صحت بھی دن بدن خراب ہونے لگتی ہے۔

دودھ کے رنگ، ذائقہ اور قوام سے بمطابق خط تشخیص کر کے علاج کریں یا نبض آپ کی مدد کر سکتی ہے، لیکن عورتوں کی نبض ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ماشاء اللہ صحت مند ہوتی ہے، نبض ڈھونڈنے سے بھی بمشکل ہی ملتی ہے، صحت مند کیوں ہوتی ہیں اور نبض کیوں نہیں ملتی کسی اور مناسب جگہ ذکر کرونگا۔

علاج: غالب خط کا اخراج کریں اور علاج بالآمالہ کریں، کیونکہ علاج بالآمالہ کا غالب خط بھی تحلیل ہوتی رہتی ہے، اگر علاج بالجبذب کیا جائے تو متعفن مادہ جذب ہو کر زہر کی شکل اختیار کر کے کئی نئے فساد کھڑے کر دے گا، علاج بالغذہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے مرضی مادے میں سکون واقع ہو کر اس کا تعفن در تعفن زہر کی صورت اختیار کر جائے گا۔
غذائیں: جو بھی دوا دیں گے اسی گروپ کی غذائیں دی جائیں گی۔

غدی دردِ پستان

ماہیت مرض: یہ علامت خط صفراوی قاضلہ کے سبب نمودار ہوتا ہے۔

اسباب مرض: کثرتِ رطوبات صفراوی قاضلہ کا خارج نہ ہونا۔ اچانک گرمی لگ جانا ماکول و مشروب کڑا ہی گوشت اور مصالحہ کا بکثرت استعمال حدتِ خون، خون میں سوزا کی زہر ہونا اور اس کا اخراج نہ ہونا۔

مرض کی علامت: بانیں پستان میں ورم درد پھوڑا وغیرہ سے پستان دردناک ہو جاتا ہے۔ جب جگر کی کیمیائی تحریک غدی عضلاتی ہوتی ہے تو غدہ صفراء زیادہ بناتے ہیں مگر اس کا اخراج بند ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریضہ کے جسم میں گرمی خشکی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔

جب پستانوں کی عشاءِ کاظمی میں صفراء رکھتا ہے تو وہاں پر پہلے جلن وار خارش ہوتی ہے اس کے اگلے درجہ میں شدت صفراء سے سوزش نمودار ہوتی ہے اور ساتھ ہی درد بھی ہونے لگتا ہے۔

علاج بالغذا: تمام گرم خشک اور خشک گرم ادویہ اور انڈیہ سے پرہیز کرائیں اور تر گرم و تر سرد مادہ ا۔ مکر رکھیں۔ جب تک شدید بھوک نہ لگے ٹھوس غذا نہ دیں۔

ستہ: صفراء 25 گرام، دیکسی گھی 250 گرام، شہد خالص آدھا کلو۔

ترکیب تیاری: مغز بادام اہال کران کو چھیل کر اتار لیں بعد میں گھی میں براؤن کریں نرم آگ پر پکائیں خیال رہے کہ گریاں جل نہ جائیں جب مغز بادام سرخ ہو جائیں تو نیچے اتار کر شہد ملا لیں پس تیار ہے۔ حسب ضرورت کھلا کر قہوہ اجوائن پودینہ کا پلائیں۔

نکھن، ڈبل روٹی، دودھ چاہل یا کھیر دیں، گاجر کا مربہ کھلائیں۔ سبزیوں میں مولی، گاجر، شلغم، مونگرے، گھیا کدو، دیسی ٹینڈے، توری، دال ماش، کھجڑی، مونگی کی دال، بھنڈی مرچ، سیاہ ڈال کر پکائیں اور نمک بھی بند کریں بلکہ نمک کی جگہ جو کھار ڈال سکتے ہیں۔
علاج بالذوا: اصول، ماحول کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، غذا کی تبدیلی، میرض کو سرد اور مرطوب موسم میں رکھیں گرمیاں ہوں تو صحت افزا مقام پر لے جائیں۔

2- ماحول کی تبدیلی کیلئے غصہ دلانے والے عوامل اور ماحول وافر اشیاء سے پرہیز رکھیں۔
3- غذا کا خاص خیال رکھیں جب تک شدید بھوک نہ ہو ٹھوس غذا ہرگز نہ دیں بدن میں رطوبت پیدا کریں خواہ دوا سے یا غذا سے تاکہ تحریک اگر نامکمل ہے تو مکمل ہواں کے لئے غدی اعصابی مسہل دیں اگر پستان کا درد دورینہ ہو تو اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی مسہل دے کر صفراء کو خارج کریں اس کے بعد تعدیل کے لئے اعصابی غدی ملین اکسیر بھی دے سکتے ہیں۔
اصل علاج خلط صفراء کو خلط باغم میں تبدیل کرنا ہے۔

علاج کلی

مریض کا معائنہ بغور کریں اصل سبب تلاش کریں جسمانی حالت دیکھیں بدن کی رنگت لہس قارورہ کی مقدار اور رنگ دیکھیں قبض یا اجابت یا فراغت ہے پستانوں کا معائنہ کرائیں سب امور کو مد نظر رکھ کر دوا کی تجویز کی طرف متوجہ ہوں۔

اگر پستان میں سوزش اور درد ہو رہا ہو تو اور بھی زخم نہ بنا ہو تو اعصابی ادویہ کالیب کریں۔
مثلاً برگ کاسنی، برگ مکو ہر ایک 50 گرام، سہاگہ بریاں 20 گرام، سفیدی انڈا ایک

عدد۔

تیاری کا طریقہ: برگ مکو اور برگ کاسنی کو گھونٹیں اور پھر سہاگہ ملا دیں آخر میں سفیدی انڈا شامل کر کے مقام ماؤف پر لپ کر دیں۔ انشاء اللہ جلن درد اور ساڑ ختم ہو جائے گا۔
اگر جلن کا مریض زیادہ احساس کرے تو مذکورہ لیپ میں تھوڑا سا یعنی 5 گرام کا فور

اگر درد زخم کی وجہ سے یا ناسور بن گیا ہو تو پہلے اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ادویہ کھلا کر اور اوپر مرہم بنا کر لگا کر صفراء کی غلیظ رطوبات خارج کریں۔

اصول: چپ جب تک زخم سے آتی رہے۔ اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی ادویہ لگائیں اور کھلائیں۔ جب چپ آتی بند ہو جائے صرف پانی خارج ہو تو عضلاتی اعصابی ادویہ اور اغذیہ سے علاج کریں اور مقام ماؤف پر مرہم بھی عضلاتی اعصابی لگائیں۔

اعصابی غدی ملیں: سہاگہ 7 تولہ، ملٹھی 7 تولہ، شیرمدار 1 تولہ، ریوند چینی 4 تولہ خوراک دینے کا طریقہ: 1-2 ماش۔

فوائد: درد اور سوزش پستان کو ختم کرتی ہے۔

نسخہ: سہاگہ 7 تولہ، ملٹھی 7 تولہ، شیرمدار 1 تولہ، ریوند چینی 4 تولہ، سقمونیا اصلی 2 تولہ مقدار خوراک: 2 ماش۔

اعصابی غدی روغن: روغن کدو 9 تولہ، پودینہ 1 تولہ، ست کا نور 1 تولہ ترکیب تیاری: حسب دستور تیار کر لیں۔

فائدہ: درد و سوزش پستان کے لئے۔

اجزاء نسخہ: ست پودینہ 50 گرام، مشکور 50 گرام، روغن زیتون 125 ملی گرام۔

ترکیب تیاری: حسب دستور تیار کریں۔

فوائد: سوزش پستان کے لئے۔

اعصابی عضلاتی شدید

اجزاء نسخہ: قلمی شورہ 3 تولہ، جوکھار 5 تولہ، جٹم کاسنی 5 تولہ، گل گلاب 8 تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویہ کوٹ پیس کر سفوف بنالیں۔

مقدار خوراک: 1 ماشدن میں 3 بار۔

فوائد: درد و سوزش پستان کے لئے

اعصابی عضلاتی مسہل: قلمی شورہ 3 تولہ، جوکھار 5 تولہ، جٹم کاسنی 5 تولہ، گل سرخ 8 تولہ دانہ 20 تولہ

ترکیب تیاری: حسب بقدر بخود بنائیں۔

فوائد: مادہ کے اخراج اور پستان و سوزش میں دیر۔

روغن

نسخہ بنانے کا طریقہ: روغن بادام 9 تولہ، کافور 1 تولہ۔

ترکیب تیاری: حسب دستور بنا کر استعمال کریں۔

ٹکڑ: برگ سنبھالو، برگ نیم، اکاس نیل برابر وزن۔

ترکیب تیاری: پانی میں گرم کر کے ٹکڑ کریں پھر یہی اوپر باندھ دیں (بھرتہ بنا کر قدرت تیل ملا

کر)

فوائد: پستانوں کے تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

درد سوداوی اور پستان

ماہیت: خالص سوداوی (خشکی) فاضلہ کی کثرت اور شدت کا نتیجہ درد ہے۔

مرض کے اسباب

کثرت رطوبت سوداوی کا پیدا ہونا اور خارج نہ ہونا (عضلاتی اعصابی تحریک) ترش اشیاء کا بکثرت استعمال، کڑا ہی گوشت یا بڑا گوشت، سرخ مرچ، انڈے اور تیز گرم مصالحہ جات کا استعمال بکثرت استعمال کرنا، نشہ آور ادویات یا شراب نوشی، امیر گھرانے کی عورتیں جو کہ نشہ آور ادویہ اور شراب نوشی کا بکثرت استعمال کرتی ہیں، وہ عورتیں جن کو شہوت کا غلہ ہو اور کثرت مباشرت میں مبتلا رہتی ہیں۔

غریب گھرانے کی عورتیں جن کی غذائی قلت کے باعث رطوبات بدنی خشک ہو جاتی ہیں۔ اور خون گاڑھا ہوا جاتا ہے تو پستانوں میں دودھ جمنے یا رسولی پیدا ہونے سے پستانوں میں درد ہوتا ہے۔

علامات مرض

جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے خون میں بو اسیر زہر ہوتا ہے اور کثرت غلط سوداوی یعنی شدت عضلاتی اعصابی تحریک سے رطوبات بدنی خشک ہونے لگتی ہیں اور دودھ کی پیدائش کم ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ دودھ کی پیدائش بند ہو جاتی ہے کبھی ان میں خشک خارش اور کبھی

تیزابیت کی وجہ سے پستانوں میں زہر مواد یا بواسیری زہر کی وجہ سے کھن بن جاتی ہے یا پھوڑا بن جاتا ہے اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو درم بن کر یہ درد ہوتا ہے اور پھر پھوڑا پھٹ جاتا ہے۔ اور خون بہتا ہے درم ہو اس زخم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

اگر مرض مزمن شکل اختیار کر جائے۔ عضلاتی اعصابی تحریک شدت اختیار کر جائے مثلاً کارورہ سیاہ آنے لگے یا پاخانہ سیاہ رنگ کا آنے لگے شدید قبض ہو اور ریاح ہو اسکی صورت میں ہر حال میں غدی عضلاتی مسہل سے علاج شروع کریں۔ اور باقی ادویہ حسب شدت مرض کام میں لائیں۔

علاج بالغذا: خشکی گرمی یا خشکی سردی نبض والے مریض کو غذا ہمیشہ گرم تر یا تر گرم دیں۔

صبح کا ناشتہ: مغز بادام رات کو بھگو کر صبح چھیل کر گھوٹ کر مکھن ملا کر کھلائیں۔ اٹھوے کا حلہ یا آلیٹ۔

میوہ جات: چلغوزے، پستہ، اخروٹ، کشمش ملا کر کھلائیں۔

قہوہ: ادراک کا قہوہ بنا کر نمک سیاہ مرچ ملا کر پلائیں۔

1۔ دیسی گھی، غذا کی زردی ایک عدد، شہد ملا کر پھینٹ کر پلائیں۔

دو پہر: غدی عضلاتی اور غدی اعصابی، اعصابی غدی غذائیں کھلائیں مثلاً گوشت، دیسی مرغ، تتر، شیر، بکرا کا گوشت، کدو، گھیا توری، دال مونگ چھلے والی، دال ماش، پالک، میتھی کا ساگ، مولی، گاجر، مونگرے، شلغم، شینڈے، گھیا توری، پیٹھا، دل توری، مرچ سیاہ، دیسی گھی ڈال کر پکائیں۔

رات: رات کو دو پہر والا سالن، روٹی گندم یا مکئی کی روٹی، دودھ گائے، بکری اونٹنی کا شہد ملا کر پلائیں۔

پھل: انگور شیریں، امرود، گرما، پپٹا، خربانی۔

یہ سیرپ پلائیں۔ شہد کا شربت، مالٹا، شربت بزوری، سیون اپ۔

علاج بالدا

اصول علاج مریض کو گرم تر گرم ماحول میں رکھیں موسم گرما ہو تو مریض کو صحت افزا مقام پر لے جائیں۔ بغیر شدید بھوک غذا نہ دیں۔ ٹھوس غذا نہ دیں گرم تر یا نرم گرم غذا جس میں

دیکھی گئی تریہ تر ہو دیں۔ مثلاً دلیا، جو، گندم یا کسڑ کی کھیر شہد و کھن ملا کر دودھ گھی بکثرت دیں
خراج کی تبدیلی کریں۔ یعنی سودا کو صفراء میں تبدیل کرنے کیلئے غذا دوا کا استعمال کریں۔

ابتدا میں غدی اعصابی مسہل دیکر محدہ آستوں اور گردوں سے سودا کا اخراج کریں
شدت مرض میں مسہل دوا اتنی تیز ہو کر ایک دو دست آنے چاہئیں۔

مرض میں مسہل دوا اتنی تیز ہو کر ایک دو دست آنے چاہئیں مریض کثرتول ہونے پر دوا کم
کردیں کہ ایک پاخانہ ضرور آجایا کرے اور مریض کمزور بھی نہ ہو۔

اجزاء نسخہ: زنجبیل 5 تولہ، بنوشادر ٹھیکری 2 تولہ، مرج سیاہ 1 تولہ، سناسکی 8 تولہ۔

ترکیب تیاری: کوٹ پیس کر خوب باریک کر لیں۔

مقدار خوراک: 4 رتی تا 1 ماشہ تک دن میں 4 بار کھلائیں۔

صفراء: سودا کا بے ضرر مسہل ہے سودا کو ختم کرتا ہے۔

علاج کلی کا طریقہ: مریض کے معائنہ کے بعد صحیح تشخیص کر کے علاج اعتدیل دوا دیہ تجویز کریں۔

اگر بدن میں غلط سودا زیادہ ہو تو چہرے پر سرخی نمایاں ہو منہ کا ذائقہ کڑوا، قارورہ اور
پاخانہ سرخ زردی مائل ہو تو عضلاتی غدی تحریک خیال کریں۔

نبض اگر تین انگلیوں یا تین انگلیوں سے بھی کراس کرے اور دباؤ دینے سے سخت تنی ہوئی
محسوس اور حرکت دینے سے ادھر ادھر حرکت نہ کر سکے تو یہ نبض عضلاتی غدی ہوگی۔ یہ درد جو ہے وہ
گرمی و خشکی کی وجہ سے ہوگی۔

علاج تجویز: اگر تشخیص کے مطابق تحریک عضلاتی اعصابی ہو تو پہلے غدی اعصابی مسہل دیں تا
کہ محدہ جگر گردوں کی صفائی ہو اس کے بعد طین غدی اعصابی 2 ماشہ کی مقدار میں دیں ساتھ قہوہ
اجوائن پودینہ کا دیں۔

درد شدت میں دوا پندرہ پندرہ منٹ بعد دے سکتے ہیں۔ جب درد کثرتول ہو جائے تو دوا
کا وقفہ بڑھادیں اور تریاق بھی دے سکتے ہیں۔ بے چینی ہو رات کو خیندہ آئے تو مفرح دوا دیں۔

پستان میں رسولی گلتی

میرا ایک کلاس فیلو ہے اس کی والدہ کے پستان میں رسولی ہوئی جو چھوٹی سے بڑی ہوتی
گئی درد بھی ہونے لگا ڈاکٹروں نے اپریشن کا مشورہ دیا میرے نہ ہونے کی وجہ سے اپریشن نہ کرا سکے

تعوید گنڈے بھی کرائے لیکن افادہ نہ ہوا ایک دن رسولی پھٹ گئی اور اس سے پیپ نکلتی شروع ہو گئی پیپ کئی دن متواتر نکلتی رہی پھر کیڑے بن گئے آہستہ آہستہ پیپ ختم ہو گئی کیڑے بھی ختم ہو گئے اور بدبو بھی ختم ہو گئی۔

اب پستان میں پیپ نہیں ہے مگر ازخم ہے زخم بھی ایسا ہے کہ اندر کالال گوشت بھی اوپر کناروں پر ابھر آیا ہے زخم سے کبھی کبھی خون بھی آتا ہے پاؤں پر ورم ہے پانی نہیں پی سکتی ایسا لگتا ہے کہ پانی غذا والی مٹی میں لگتا ہے بھوک بند ہے اس کا کوئی آسان علاج بتائیں اور زخم پر لگانے کے لئے بھی کوئی مرہم کا نسخہ بتائیں۔

سولی میں پیپ کا بننا اور خارج ہونا غدی عضلاتی تحریک کی انتہا اور غدی اعصابی تحریک ابتدا سمجھیں آپ اس کی تحریک کو مزید آ کر بڑھا دیں یعنی اسے غدی اعصابی اکسیر اعصابی غدی تریاق اور اعصابی کھار استعمال کرائیں زخم پر گل کیسوافتیون 30,30 گرام لے کر دو کلو پانی میں رات کو بھگو دیں صبح نیم گرم ٹکور کریں بلکہ ٹکور کے بعد گل کیسوافتیون دھوپ میں خشک کر کے ویزلین ملا کر زخم پر لگائیں غذا اعصابی استعمال کرائیں قبض نہ ہونے دیں اس کے لئے حسیانہ سٹاکلی پلائیں پیشاب پاخانہ کھل کر آنا چاہئے۔

نوٹ: ایک یا دو بیٹھے کا چھلکا ایک پاؤ پانی میں جوش دے کر نیم گرم غرارے کرائیں پھر گرم دودھ میں کمی ڈال کر پلائیں اللہ شفاء دے گا۔

پستان کے خطرناک امراض

اعصابی امراض پستان

پستان کا بڑھ جانا یا لنگ جانا۔ کثرت دودھ وغیرہ۔

ماہیت مرض: مندرجہ بالا جملہ علامات خلط خالص بلغمی فاضلہ کا بدن میں ضرورت بدن سے زائد ہونا۔ اور ان کا خارج نہ ہونا۔

اسباب مرض: تر گرم و تر سرداغل یہ اشیاء کا بکثرت استعمال۔ ٹھنڈے ماکولات و مشروبات کا استعمال۔ نازک حرارتی۔ بچے سے محبت کا جذبہ زیادہ ہونا۔

علامات مرض: رطوبات بلغمی کی کثرت کی وجہ سے عورت کے مقامی غدود (پستان) زیادہ نشوونما

پاتے ہیں۔ جس وجہ سے اپنے جسم میں بڑھ جاتے ہیں۔ گاو کثرت رطوبت دودھ سے لٹک بھی جاتے ہیں۔

علاج بالغذا: مریض کو تر سرد اور تر گرم اغذیہ: دودھ، مغزیات، مشروبات سے پرہیز کرائیں۔
غذا خشک سرد و خشک گرم دیں۔ مقصد مریض کو عضلاتی اعصابی و عضلاتی غدی اغذیہ دیں۔
علاج بالدوا: مریض کا بغور معائنہ کریں۔ درست علاج کے لئے اعصابی تحریک کو عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی میں تبدیل کریں۔ اگر تھن (پستان) چھونے کرنے ہو یعنی سڈول بنانا ہو تو عضلاتی اعصابی ادویہ کی پستان پر لپ بھی ضرور کریں۔

علاج کلی

مریض کا بغور معائنہ کریں اور صحیح تشخیص کر کے علاج ادویہ اور اغذیہ تجویز کریں۔ چونکہ اعصابی تحریک میں پستانوں کی قوت جاذبہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس سے پستانوں میں دودھ بکثرت اکٹھا ہونے لگتا ہے جو کہ بعض دفعہ بچہ کے پینے سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پستانوں کے اندر سخت تناؤ اور درد ہونے لگتا ہے جو کبھی ورم کی صورت میں بھی اختیار کر جاتا ہے۔ کبھی بوجہ کثرت دودھ خود بخود پستانوں سے دودھ بہنے لگتا ہے۔

علاج:

اگر دودھ بکثرت خود بخود بہتا ہو تو عورت کو چاہئے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے دبا کر نکال دے اور اگر درد ہوتا ہو تو بذریعہ پمپ نکال دے۔ غذا میں دودھ و گوشت مقصد اعصابی اغذیہ اور غدی اعصابی اغذیہ نہ دیں۔ اگر مریض میں جوش خون ہو یعنی غدی اعصابی تحریک ہو تو اعصابی عضلاتی ادویہ و اغذیہ دیں اور انہیں ادویہ کا پستانوں پر لپ بھی کریں۔ اگر دودھ کم کرنا مقصود ہو تو عضلاتی اعصابی خشک سرد ادویہ اور اغذیہ دیں اور پستانوں پر ان ادویہ کی لپ کریں۔ تخم میتھی 7 حصے۔ رائی 5 حصے سفوف بنادیں۔ کھانے کے لئے خوراک 4 ماشہ تا 6 ماشہ دن میں 3 مرتبہ اور اسی دوا کا لپ بھی کریں۔ پستان سڈول ہو جائیں گے اور دودھ کم ہو جائے گا۔ نسخہ، مازو، مائیں، کتھ سفید، سفید بھٹکوی، اقا قیا، پوست انار برابر وزن ان کا سفوف تیار کریں۔ بعد ازاں سرکہ میں گھوٹ کر پستان پر لپ کریں۔ پستان اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر کتھی کا استعمال کیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔

پستان کے غدی امراض

بائیں پستان کا ورم یا پھوڑا۔ پستان کا ناسور۔ سوزش پستان۔ پستان میں جلن و سوز ہونا

وغیرہ۔

ماہیت مرض: مذکورہ بالا جملہ علامات خلط خالص صفراوی فاضلہ کے سبب نمودار ہوتی ہیں۔ اسباب مرض: کثرت رطوبات صفراوی فاضلہ کا خارج نہ ہونا۔ گرمی کا لگ جانا اچانک گرمی لگ جانا۔ موسمی تغیرات۔ گرم خشک موسم یا گرم خشک ہواؤں سے متاثر ہونا۔ گرم ماکولات و مشروبات، کڑا ہی گوشت اور گرم مصالحہ کا بکثرت استعمال۔ شراب نوشی، سخت غصہ آنا، الرجی، سوزش جگر و گردہ، حدت خون، یرقان، امراض رحم، سوزش خصیۃ الرحم، عسر طمث، اسقاط حمل، انحراف اور خون میں سوزا کی زہر کا ہو جانا اور اس کا خارج نہ ہونا۔

علامات مرض:

جگر کے غیر طبعی فعل (غدی عضلاتی) تحریک کی وجہ سے صفرا خون میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا اخراج بند ہوتا ہے۔ جس وجہ سے مریضہ کے بدن میں گرمی خشکی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ پستان خود بھی غدہ ہیں۔ جب ان کے غشائے میں صفرا رک جاتا ہے تو وہاں پر پہلے جلن دار خارش ہوتی ہے۔ جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تو سوزش نمودار ہونے لگتی ہے ساتھ ہی درد بھی ہونے لگتا ہے جو بالآخر وہاں پر ورم بن جاتا ہے۔ اگر ورم کا درست علاج نہ کیا جائے تو ورم ناسور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جس سے پانی رستار ہوتا ہے۔ گاہ پیپ بھی نکلتی ہے۔

علاج بالغذا: مریضہ کو تر گرم و تر سرد اغذیہ دیں اور تمام عضلاتی اور غدی اغذیہ سے پرہیز کرائیں۔ یعنی خشک گرم یا گرم خشک ہرگز نہ دیں۔ اغذیہ میں مکھن و شہد، مکھن ڈبل روٹی سے دودھ چاول یا چاول کی کھیر دیں۔ مربہ گاجر، بنریات مولی، گاجر، شلغم، مونگرے، کدو دیسی، گھیا، توری، ٹنڈے، پیٹھا، مریچ سیاہ ڈالیں۔ کافی نمک بھی بند کر دیں۔ بلکہ نمک کی جگہ جو کھارا استعمال کریں۔

علاج بالادوا: مریضہ کو سرد اور مرطوب ماحول میں رکھیں جب تک شدید بھوک کا احساس نہ ہو۔ ٹھوس غذا ہرگز نہ دیں۔ بدن میں رطوبات پیدا کرنے والی ادویہ دیں۔ شروع علاج میں تحریک کو مکمل کرنے کے لئے غدی اعصاب مسہل دیں۔ اگر مرض یا علامت دیرینہ ہو تو ایسی صورت

میں ہر حالت پہلے اعصاب غدی یا اعصابی عضلاتی مسہل دیکر صفرا کا اخراج کریں۔ اس کے بعد اعصابی غدی ملین، اکسیر و تریاق نمبر 6 کو استعمال میں لادیں۔ ان کے ساتھ اگر شربت صندل یا شربت بزوری معتدل استعمال کیا جائے تو فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا خلط صفرا کو خلط ملغم میں تبدیل کر دینا درست علاج ہے۔

علاج کلی: مرض کا اصل سبب تلاش کر کے صحیح تشخیص کے بعد علاج کریں۔ مریضہ کا بغور جسمانی معائنہ کریں یا کسی دانیہ سے معائنہ کرا کر رپورٹ حاصل کریں۔ جسمانی حالت کو دیکھیں۔ جس میں بدن کی لمس درنگت، قارورہ کارنگ اور مقدار دیکھیں اجابت با فراغت یا قبض۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا تجویز کریں اگر مرض کا اصل سبب جگر کی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کریں۔ مقصد صفرا کا اخراج کریں۔ اگر پستان پر سوزش اور درد ہو رہا ہو اور زخم نہ بنا ہو تو پھر اعصابی ادویہ کی لیپ کریں۔ مثلاً برگ کاسنی، برگ مکو، ہر ایک 50 گرام، سہاگہ بریاں 20 گرام، سفیدی انڈہ ایک عدد۔ ترکیب پہلے برگ کاسنی و برگ مکو کو گھوٹیں۔ اس کے بعد اس میں سہاگہ ملا دیں۔ آخر پر سفیدی انڈہ شامل کر کے مقام ماؤف پر لیپ کریں۔ انشاء اللہ جلن و ساڑ اور درد میں فوری تخفیف ہوگی۔ اگر مریضہ جلن کا زیادہ احساس کرتی ہو تو مذکورہ لیپ میں کافور 5 گرام بھی شامل کر دیں اگر پستان میں زخم ہو گیا ہو یا ناسور بن گیا ہو تو ایسی صورت میں پہلے اعصابی غدی و اعصابی عضلاتی ادویہ کھلا کر اور اوپر باندھ کر غلیظ صفراوی رطوبات کو خارج کریں جب زخم سے پیپ آنا بند ہو جائے اور صرف پانی خارج ہونے لگے تو پھر عضلاتی اعصابی ادویہ و اغذیہ دیں اور مقام ماؤف پر مرہم بھی عضلاتی اعصابی لگا دیں۔ نسخہ جات دیئے گئے فارما کوپیا میں ملاحظہ فرمادیں۔

پستان کی سوزش دور کرنے کے لئے برگ سنبھالو۔ برگ نیم اور آکاس بیل برابر وزن لیکر پانی میں گرم کر کے ٹکور کریں۔ پھر یہی بھرتہ بنا کر قدر تیل ملا کر اوپر باندھیں۔ اس سے پستانوں کی تناؤ دور ہوگی۔

پستان کے عضلاتی خشکی کے امراض

قلت دودھ۔ پستان کا سکڑ جانا۔ خشک خارش ہونا۔ دائیں پستان کا ورم۔ پستان سے خون آنا۔ سرطان پستان ہونا۔

ماہیت مرض: مذکورہ بالا جملہ علامات خلط خالص سوداوی (خشکی) فاضلہ کی کثرت اور شدت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔

اسباب مرض

کثرت رطوبت سوداوی فاضلہ اور اس کا خارج نہ ہونا۔ علاوہ ازیں یہ علامات ایسی مستورات میں پائی جاتی ہیں۔ جو اکثر کڑا ہی گوشت یا بڑا گوشت۔ سرخ مرچ، انڈے گرم، مصالحہ جات اور ترش اشیاء و اغذیہ کا بکثرت استعمال کرتی ہیں یا امیر گھرانوں کی مستورات جو کہ نشہ آور ادویہ اور شراب نوشی کا بکثرت استعمال کرتی ہیں۔ یا جن کو شہوت کا غلبہ ہو اور کثرت مباشرت میں مبتلا رہتی ہوں لیکن بعض اوقات غریب گھرانوں میں غذائی قلت کے باعث رطوبات بدنی خشک ہو جاتی ہیں اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ دراصل مقامی طور پر خشکی کی وجہ سے علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

علامات مرض

مریضہ کو اکثر قبض اور نفخ معدہ کی شکایت رہتی ہے۔ سینہ و خوراک نالی اور معدہ میں شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔ ترش ڈکار آتے ہیں۔ بدن کی رنگت سیاہ، بدن کھردرہ، چہرہ اور رخساروں پر سیاہ دھبے ہوتا۔ ہونٹ خشک، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوتا۔ دل سے دھواں اٹھنا۔ سر خالی محسوس ہونا۔ خوفناک خواب آنا۔ اور سیاہ رنگ کی چیزیں دیکھنا۔ قلت نیند۔ دبلا پن۔ بندش حیض یا کثرت حیض کا عارضہ ہونا۔ خون میں بو اسیری زہر کا ہونا۔ کثرت خلط سوداوی (شدت عضلاتی اعصابی تحریک) رطوبت بدنی خشک ہونے کی وجہ سے دودھ کی پیدائش کم ہونے لگتی ہے۔ جو بالآخر دودھ کی پیدائش قطعی ختم ہو جاتی ہے۔ پستان سکڑ جاتے ہیں۔ گاہ ان میں خشک خارش ہونے لگتی ہے۔ کبھی تیزابیت کی وجہ سے پستان میں زہریلا مواد (بو اسیری) زہر کی وجہ سے گلٹی بننے لگتی ہے۔ یا پھوڑا بننے لگتا ہے اگر بروقت اس کا تدارک نہ کیا جائے تو وہاں پر شدید درد ہونے لگتا ہے گا ہے پھوڑا پھٹ جاتا ہے۔ خون بننے لگتا ہے اور ورم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اس کا بھی درست علاج نہ ہو سکے تو پھر یہی ورم و زخم سرطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ مریضہ کے لئے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

علاج بالغذا:

اصول علاج: جب تک مریضہ کو شدید بھوک کا احساس نہ ہو۔ ٹھوس غذا نہ دیں۔ ابتدا میں مریضہ کو غدی اعصابی (گرم تر) اغذیہ دیں مگر شدت صورت میں اعصابی غدی (ترگرم) اور غدی اعصابی (گرم تر) دونوں ملا کر دیں۔ تاکہ خشکی کا عارضہ جلد دور ہو جائے۔ صبح کا ناشتہ، مغز بادام 10 عدد، مغز پستہ 10 عدد، مغز اخروٹ 10 گرام۔ ادراک تازہ 5 گرام۔ مرچ سیاہ 7 عدد، زردی انڈہ 1 عدد۔ دیسی گھی 50 گرام شہد خالص 50 گرام: ترکیب تیاری، جملہ مغزیات بمعہ ادراک۔ دیسی گھی میں بریاں کریں۔ آخر پر زردی ملا کر نیچے اتار کر شہید ملا لیں۔ یہ ناشتہ کھا کر قبوہ۔ اجوائن دیسی و پودینہ والا پلا دیں۔ اگر اس ناشتہ سے مریضہ گھبراہٹ محسوس کرے تو پھر مغز بادام الاچھی سبز، مربہ گاجر اور مکھن ملا کر دیں اور قبوہ گل سرخ، سونف ہر ایک 10 گرام سفید زیرہ 5 گرام دودھ 1-1/2 پاؤں صبح و شام پلائیں۔

دوپہر گوشت بکرا دیسی۔ دیسی مرغ کا گوشت، تیتڑ، شیر کا گوشت ساتھ کوئی سبزی ملا کر کھلا دیں۔ مزید سبزیات میتھی پالک کا ساگ۔ کریلے۔ مولی۔ گاجر۔ شلغم۔ گھیا توری۔ دال مونگ و ماش مرچ سیاہ ڈالیں۔ (رات) دوپہر والا سالن کھا کر قبوہ پی لیں۔
علاج بالادوا: اصول علاج۔ مریضہ کو گرم تر و ترگرم ماحول میں رکھیں۔ اگر موسم گرما ہو تو مریضہ کو صحت افزا مقام پر رکھیں یا ایئر کنڈیشنز کمرہ میں رکھیں۔ صحیح علاج کرنے کے لئے خلط سودا کو خلط صفرا میں تبدیل کریں۔ مقصد، غدی اعصابی تحریک پیدا کریں۔ اس لئے شروع علاج میں غدی اعصابی مسہل دیکر جگر۔ معدہ۔ گردے صاف کریں۔

علاج کلی

مرض کا اصل سبب تلاش کر کے صحیح تشخیص کے بعد غذا اور دوا تجویز کریں۔ مریضہ کا اچھی طرح بغور معائنہ کریں اور جسمانی حالت پر غور کریں۔ بدن کی جو علامت آپ کی رہنمائی کرتی ہو اسے نبض و قارورہ سے تطبیق دیں۔ اگر واقعی علامت درست نشاندہی کر رہی ہے۔ تو پھر اس کے مطابق تسکین والے مقام پر تحریک پیدا کریں۔ سب سے پہلا مقدم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے غدی اعصابی مسہل دیکر معدہ جگہ اور گردوں کی صفائی کریں۔ تاکہ تیزابیت خون سے خارج ہو جائے۔ اس کے بعد جب موقع و ضرورت آکیر۔ تریاق اور ملینیات کام میں

لاویں۔ غذا کا خاص خیال رکھیں۔ جس میں کھی دودھ بکثرت پلاویں۔ گندم کا دلیا جس میں تربہڑ دیسی گھی ڈالا گیا ہو۔ اسی طرح جو کا دلیا، چاول کی کھیر، یا شہد و مکھن ملا کر دیں۔ مقصد ہر حالت غدی اعصابی تحریک پیدا کریں اگر خدا نخواستہ پستان پر کیفسر (سرطان) کا عارضہ ہو گیا ہو تو پھر بھی علاج یہی جاری رکھیں۔ البتہ ساتھ تریاق کیفسر مقدار خوراک $1\frac{1}{2}$ تا 1 ماشہ دن میں 3 مرتبہ دیں اور ساتھ قہوہ اجوائن و پودینہ ضرور دیں۔ حسب ضرورت مقام ماؤف پر مرہم جات کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ علاج کیلئے باب مرہم جات فارما کو پیامیں ملاحظہ فرمادیں۔

زنانہ تولیدی اعضا

پستان

یہ دو بڑے نالی دار غدود ہیں جو مختلف نشور سے بنے ہوتے ہیں۔ مردوں میں بہت ہی چھوٹے اور مکمل بے کار ہوتے ہیں جبکہ خواتین میں مناسب ابھار کے ساتھ انتہائی کارآمد نوزائیدہ کی مکمل خوراک کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ سینے کی بطنی سطح پر دھوسری سے چھٹی پسلی تک عظیم قص سے بغل تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر پستان تقریباً بیس فعلیاتی قطعات پر مشتمل ہوتا ہے۔

بریسٹ، پستانوں کا بڑھ جانا

خواتین کے پستان بہت بڑے ہو کر لٹک جاتے ہیں اور چلنے پھرنے سے ادھر ادھر ڈھلکتے ہیں۔ اسباب: پستانوں کو زیادہ گدگدانا اور کھینچنا، بلغنی اشیاء کا کثرت استعمال۔ علاج: یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا مرض ہے اس کا علاج عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تحریک سے کریں اور یہ نسخہ مفید ہے:

2 ملین 3+500mg شدید 500mg صبح دوپہر شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

اور بطور ضماویہ نسخہ استعمال کرائیں:-

مازو، کھریا مٹی، پھلکری بریاں، سفیدہ راگ، اجوائن خراسانی، آرد جو، مولسری، مائیں ہر ایک 10 گرام ہیں کر سرکہ میں ملا کر لیپ کریں۔

نوٹ: جب تحریک عضلاتی اعصابی ہو جائے تو اسے عضلاتی غدی کریں اور سب یہ بحال ہو جائے تب غدی عضلاتی بحال کریں۔ اس مقام پر صحت ہوگی ان شاء اللہ!

پستان اور بریسٹ

بریسٹ: پستانوں میں دودھ بہت زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ بچہ بھی خوب سیر ہو کر پیتا ہے پھر بھی پستانوں سے دودھ نکلتا رہتا ہے۔ اس صورت میں ان میں تناؤ اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرف دوران خون تیز ہو کر سوزش اور ورم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسباب: بچے کو دودھ چھڑا دینا، بلغمی رطوبات کا زیادہ ہونا، مولد لبن غذا کا استعمال مثلاً دودھ، گھی، دال ماش وغیرہ۔

علاج: یہ اعصابی غدی تحریک کا مرض ہے اس کا علاج اعصابی عضلاتی تحریک سے کریں۔
1 ملین 500mg صبح دوپہر شام دیں تین یا پانچ دن کے بعد عضلاتی اعصابی ملین 3+500mg شدید 500mg دیں۔ پھر عضلاتی غدی کرنے کے لئے 3 ملین 4+500mg شدید 500mg دیں۔ اور اس کے بعد یہ نسخہ دیں، مفید ہے:
تخم میتھی 70 گرام، رائی 10 گرام سفوف بنا کر 1 گرام تا 4 گرام دن میں تین چار مرتبہ ہمراہ آب تازہ دیں۔ اچار اور چٹنیاں خوب کھلائیں۔ اگر پھر بھی مرض زیادہ ہو تو اسی دواء کا پتلا سالیپ لگوائیں۔
نوٹ: اگر دودھ رک کر درد کا باعث بن رہا ہو تو اسے بریسٹ پمپ سے نکال دیں۔

دودھ کا اترنا پستان میں

پستانوں میں دودھ اس قدر کم ہو جاتا ہے جو بچے کی غذا کے لئے ناکافی ہوتا ہے۔ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر روتا رہتا ہے اور روز بروز کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسباب: غم و غصہ، خشک اشیاء کا کثرت استعمال، غذا کی کمی، خون کی کمی، گرمی میں کام کاج۔ علاج: یہ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہے اس کا علاج غدی اعصابی تحریک سے کریں۔

5 ملین 5+500mg مقوی 10 گرام صبح دوپہر شام دیں اور ناشتہ میں یہ دیں:

ناریل، مغز چلغوزہ، مغز بادام، مغز اخروٹ، مغز چار ہر ایک 10 گرام آدھا کلو دودھ میں کھیر بنا کر کھلائیں۔

اور یہ نسخہ مفید ہے:

تخم ترب 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام، بادیان 150 گرام

سفوف بنا کر 1 تا 3 گرام ہمراہ دودھ دن میں تین مرتبہ۔

نوٹ: مغز بادام اور تووری سفید، هموزن دودھ میں کھیر بنا کر نہار منہ استعمال کرائیں

بریسٹ، پستانوں میں دودھ رک جانا

عورت کو بخار یا کوئی عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے اسے دودھ پلانے سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ زہریلی کیفیت پیدا کر کے تناؤ، درد، سوزش، ورم اور بخار کا باعث بنتا ہے۔

اسباب: بخار، دودھ کی نالیوں میں سدہ یا سلعہ پیدا ہونا۔

علاج: یہ عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تحریک کا مرض ہے اس کا علاج غدی عضلاتی اور غدی اعصابی تحریک سے کریں اور یہ نسخہ مفید ہے:

4 ملین 500mg + 5 ملین 500mg

صبح دو پہر شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں یا شربت نمبر 5 سے دیں۔

رسولیاں گلٹیاں اور بریسٹ کینسر

بریسٹ میں ہونے والی گلٹیاں اس طرح کی ہوتی ہیں:

سلعات بسیط (Simple Tumors): ان کی یہ اقسام ہیں:

صلب ليفی سلعہ (Hard Fibroadenoma)

غددی کیسہ سلعہ (Cystic Adenoma)

صلب ليفی سلعہ (Hard Fibroadenoma): صلبی غددی سلعہ ایک مخاط

(Circumscribed) اور قدرے لچکدار (Elastic) جھوم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس کا قطر سات سینٹی میٹر تک ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کی جسامت زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ یہ

نمایاں طور پر ملفوف (Encapsulated) ہوتا ہے اور اس کو آسانی سے نکالا جاسکتا ہے۔ یہ

یہ

سلحہ غدوی فص (Mammary Lobule) کی تمام شیرجی اکائی (Anatomical Unit) سے وجود میں آتا ہے۔ پیدائش سے سلحہ کے طریق کار کی مناسبت سے اس کی دو اقسام ہیں:

- الف: پہلی قسم Pericanalicular بیرونی قتالی سلحہ
ب: دوسری قسم Intracanalicular اندرونی قتالی سلحہ

Pericanalicular:

ایک سلحہ کے اندر پیدائش کی دونوں اقسام موجود ہوتی ہیں۔ اول الذکر حالت میں ترتیب بشرہ مخاطیہ (Epithelial Arrangement) حسب معمول چھاتیوں کے بشرہ مخاطیہ کی ترتیب سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس حالت میں بشرہ مخاطیہ اور اتصالی بافت دونوں کی پیدائش دیکھنے میں آتی ہے مگر ان کا تناسب ایک جیسا نہیں ہوتا کبھی کبھی عنیبات (Acini) کے ارد گرد سچ اساسی سٹروما کی ساخت بہت زیادہ ڈھیلی ہوتی ہے۔ اس سلحہ کے اندر کی پیدائش نوعیت پستان کی حسب معمول نشوونما کی مانند ہوتی ہے۔ یہ سلحہ بالعموم جوانی کے پہلے سالوں میں رونما ہوتا ہے۔ اگر سچ اساسی سٹروما قلیل مقدار میں ہو تو ایسی حالتوں کے لئے عام مشاہدے میں آنے والے لفی غدوی سلحہ کی بجائے بعض اوقات سازج غدوی سلحہ (Adenoma Simplex) کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔

Intracanalicular:

اس میں کئی ایک خمیدہ اور شاخوں والی درزیں (Clefts) ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اطراف پر بشرہ مخاطیہ کا پیرین موجود ہوتا ہے۔ دراصل یہ ساخت عنیبات (Acini) اور بطانہ قنات میں لفی وغلیاتی بافت (Fibro Cellular Tissue) کے کند اور گول زائندوں کی پیدائش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سچ اساسی کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ستر کرنے والا بشرہ مخاطیہ بھی اسی مناسبت سے پیدا ہوتا رہتا ہے یعنی ان دونوں کی پیدائش میں یکسانیت و توازن برقرار رہتا ہے جس کی وجہ سے نمونے کی ساخت وجود میں آتی ہے۔

(Cystic Adenoma)

اس حالت میں غلیات بشرہ مخاطیہ بڑے اور غدوی ہوتے ہیں۔ ان کے Cysts کے

اندر طسی Papilliform پیدا آئیں بھی وجود میں آتی ہیں۔ اس میں ایک قسم انکی آتی ہے جس میں کیس اندرونی طسی پیدا آئیں (Papilliform Ingrowths) سے بھر جاتا ہے۔ اسے نکاثری قسم (Proliferous Types) کہتے ہیں۔ اس کیس کی جسامت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر تقرح (Ulceration) کے بعد یہ شق بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ایک طسی جو دم جلد سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ اس قسم کی پیدائشیں خصوصیات کے لحاظ سے عام طور پر ساذج (Simple) ہوتی ہیں مگر کبھی کبھی ان میں سرطانی تبدیلی ہو جاتی ہے۔

کینسر سلعات (Malignant Tumors):

یہ عام طور پر 30 سال سے زائد عمر کی خواتین میں پایا جاتا ہے۔ سرطان مٹوئی کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں غور کرنے سے سبب کی خصوصیات یکساں نوعیت کی ہیں۔ سرطان مٹوئی کی Cirrhous Form کثیر الوقوع ہے۔ اس میں اضافے کی بجائے منقلص (Contraction) اور کچھ حصوں کا اندرونی جانب سکڑنے کا رجحان ہو جاتا ہے چنانچہ ایسی حالتوں میں مریضہ کے سیدھا ہونے کی صورت میں متاثرہ طرف بھٹنی اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ سرطان کی یہ قسم چھاتی کے کسی حصہ میں بھی ہو سکتی ہے لیکن بالائی اور بیرونی حصہ اس کا خاص مقام ہے۔ اس کی وجہ سے ایک غیر معین حاشیوں والا صلب حصہ وجود میں آ جاتا ہے۔ بھٹنی میں اکثر کھچاؤ پیدا ہو جاتی ہے۔ درمیانی حصوں کی اس خبیث پیدائش کی زد میں آنے کی صورت میں بھٹنی کی کھچاؤ بھی نمایاں درجے کی ہوتی ہے۔

بیماری کی زد میں آنے کے تھوڑے عرصہ بعد ابلی غدد جاذبہ (Axillary Lymph Node) بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سوج کر سخت گلیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جلد کی عروق جاذبہ وغدد جاذبہ تک بیماری سرایت کر جاتی ہے۔ چھاتی کی متاثرہ جلد بہت سخت اور دبیز ہو جاتی ہے۔

بریسٹ کینسر کی عام علامات:

آج کل بریسٹ کینسر کی وباء عام ہے۔ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر 30 سال سے زائد عمر کی خواتین میں ہوتا ہے۔ چھاتی میں کینسر کی ابتداء ایک خاص قسم کے ابھار یا سخت گلی کی صورت میں ہوتی ہے۔ پہلے پہلے جلد کے اندر محسوس ہوتی ہے، پھر ظاہر جلد تک واضح ہو جاتی

ہے۔ مرض کا احساس ابتداء میں نہیں ہوتا کیونکہ گلٹی میں درد نہیں ہوتا۔ محض ایک ابھار سا معلوم ہوتا ہے۔ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ سوزش کے بعد وہاں ورم ہو جاتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے حتیٰ کہ ورم پختہ ہو کر پھٹ جاتا ہے جس سے سرخی مائل مواد بہتا ہے۔ بریسٹ کینسر میں رسولیوں کی وسعت بغل کے نیچے پیٹ کے نیچے نسوانی اعضاء تک جا پہنچتی ہے لیکن ٹیومرز کے اس پھیلاؤ میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔

بریسٹ میں موجود ابھار یا گلٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر کی ہو بلکہ عام طور پر سادہ گلٹی ہوتی ہے جو عام غدی اعصابی محلل ادویہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جب وہ خبیث ہو تو اس میں مواد متعفن ہو کر کینسر کی صورت اختیار کر لیتا ہے لہذا اس کا بروقت صحیح علاج کرانا ضروری ہے۔ چھاتی میں مستقل درد واقعاً کسی اہم مرض کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً چھاتی میں ایک گلٹی یا کئی گلٹیاں، چھاتی میں انفیکشن، چھاتی کی ٹی بی، چھاتی پر خارش، چھاتی کا کینسر وغیرہ ان امراض میں درد کی نوعیت مرض کے اعتبار سے ہوتی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتی ہے۔ تشخیص کے بعد اگر گلٹی سادہ ہے تو اس کا جلد علاج کریں اور اگر خبیث یعنی کینسر کی ہے تو فوری طور پر تمام مناسب تدابیر بروئے کار لا کر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مرض کے مکمل خاتمے تک پوری جدوجہد کریں۔ اگر معالج کو شک ہو تو چھاتی کا خاص ایکسرے جسے میموگرافی (Mamography) کہتے ہیں، کروائے۔ اس سے بیماری کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے البتہ کینسر کا حکم لگانے سے پہلے بائیوپسی (Biopsy) ضرور کرائے۔

حتمی تشخیص کے بعد طب جدید (ایلوپیتھی) میں چھاتی کٹوانے کے لئے بڑا آپریشن (Mastectomy) کراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح اس کے جراثیم دوسرے حصوں تک سرایت نہیں کرتے۔ اس کا زخم بچنے کے بعد وہ برقی شعاعیں (Radiation) کے ذریعے مرض کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن افسوس ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ جس عضو کے بگاڑ سے یہ مرض واقع ہوا تھا اس کی اصلاح کرنا ان کے علاج میں شامل ہی نہیں۔ اس لئے وہ عضو اسی طرح کے مواد مسلسل بناتا رہتا ہے اور ایک وقت پھر اکٹھا ہو جاتا ہے جس سے مرض پھر اسی طرح لوٹ آتا ہے جبکہ طب قدیم نہ صرف ظاہری طور پر اس مرض کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ خون سے اخلاط (کیمسٹری) مکمل تبدیل کر دیتی ہے جس سے دوبارہ مرض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسباب: بچوں کو دودھ نہ پلانا، ہارمونز بڑھانے والی ادویہ اور غذائیں، طبیریائی زہر کے اثرات، ٹی بی کا بگڑنا۔

علاج: یہ عموماً دائیں طرف عضلاتی اعصابی اور بائیں طرف غدی عضلاتی تحریک میں متاثر ہونے ہیں اس لحاظ سے ان کے نسخہ جات یہ ہیں:

دائیں طرف عضلاتی اعصابی کے لئے:

3 ملین 4+250mg شدید 4+500mg 14 کسیر 250mg

بائیں طرف غدی عضلاتی کے لئے:

5 شدید 1+500mg 1 سارون 5+500mg 5 تریاق 250mg

صبح دو پہر شام دیں۔

دودھ کا زیادہ پیدا ہونا

عورت کو دودھ اتنا زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ بچہ اتنا دودھ چوس نہیں سکتا فاضل دودھ عورت کے پستانوں میں رہ جاتا ہے جو ماں کو اذیت دیتا ہے بعض دفعہ بخار جنم جاتا ہے بعض سمجھدار عورتیں بریسٹ پمپ سے دودھ نکال دیتی ہیں اور تکالیف سے محفوظ رہتی ہیں۔ روزانہ دودھ نکالتے رہنے کی بجائے دودھ کی پیدائش ہی کم کر دینی چاہئے یاد رکھیں کہ دودھ کی کثرت غدی اعصابی تحریک کا مظہر ہے۔


طریقہ علاج: دودھ کی کثرت غدی اعصابی تحریک سے ہوتی ہے لہذا ایسی عورت کو اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی غذا دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی کیمیائی تحریک غدی عضلاتی بڑھا دیں فوراً دودھ کی پیدائش نارمل ہو جائے گی۔

اس مقصد کے لئے قانون مفرد اعضاء کے غدی عضلاتی سے عضلاتی غدی نسخہ جات فوری فائدہ مند ہیں۔

یاد رکھنے کی باتیں

آپ سوچ رہے ہونگے کہ جب دودھ کی کثرت کی صورت میں عورت کی تحریک غدی اعصابی ہوتی ہے تو اس کا علاج اعصابی غدی تحریک سے کیوں نہیں کیا گیا؟

Stage IIIB Breast Cancer



ذہن نشین کر لیں کہ قانون مفرد اعضاء کی تحقیق کے مطابق ہر عضو کی دو تحریکیں ہوتی ہیں ایک کیمیائی اور دوسری مشینی۔

کیمیائی تحریک میں مفرد عضو اپنی رطوبات پیدا کرنے کے ساتھ روکتا بھی ہے اور مشینی تحریک میں خارج کرتا ہے۔ لہذا: دودھ کی زیادتی کو روکنے کے لئے جگر کی کیمیائی تحریک غدی عضلاتی پیدا کرنا زیادہ بہتر ہے جس سے دوفوائد حاصل ہونگے ایک طرف عورت کمزور نہیں ہوگی دوسری طرف بچہ کو حرارت غریزی سے بھرپور دودھ ملے گا جس سے اس کی نشوونما قابل رشک ہوگی۔

ایک اور بات: دودھ کی کثرت غدنا قلعہ میں تسکین پیدا کر کے بھی کی جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے لئے عضلاتی اعصابی اغذیہ مفید ہونگی جو جگر خصوصاً غدنا قلعہ میں تسکین کرتی ہیں لہذا ان کے استعمال سے جو غدی غدنا قلعہ میں تسکین ہوگی دودھ کم پیدا ہونے لگے گا۔

ہمارا نظریہ: ان ادویہ اغذیہ سے حرارت غریزی کی پیدائش بھی کم ہو جائے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف عورت اپنے طبعی مزاج میں نہ رہنے سے کمزور ہو جائے گی دوسری طرف بچہ حرارت غریزی کی کمی سے جلد نشوونما نہ پاسکے گا اور ممکن ہے کہ بچہ دق الاطفال میں مبتلا ہو جائے۔

پستان کا کینسر کیسے ہوتا ہے؟

آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ پستان نالی دار غدود ہیں جن کا کام حیض وغیرہ کے فلات کو خون سے لے کر دودھ میں تبدیل کر کے خارج کرنا ہے۔ بعض دفعہ دودھ پلاتے وقت یا بچہ کے ضد کرتے وقت بچہ کا سر پستان سے ٹکرا جاتا ہے جس سے پستان کی نالیوں میں ورم ہو جاتا ہے اسی طرح کسی وجہ سے پستان پر چوٹ لگ جاتی ہے یا پستان پر کسی قسم کا بوجھ یا وزن لگنے سے ورم آ جاتا ہے جس سے پستان کی نالیاں پچک جاتی ہیں اور ان کے اندر بننے والا دودھ پوری طرح خارج نہیں ہو سکتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پستان کے ماؤف حصہ میں سوزش ورم قائم ہو جاتا ہے دودھ پلانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا عورت بچہ کو دودھ پلانے سے کترانے لگتی ہیں اور جو اور بھی باعث نقصان ہوتا ہے۔

یار کھنے کی باتیں: حالت زچگی یا دودھ پلانے کے زمانے میں بچہ کی وجہ سے یا چوٹ لگنے سے پیدا ہوتی ہے۔

جوان عورت کے پستان پر بھی چوٹ آسکتی ہے یا کسی قسم کی رگزیادہ باؤ سے پستان میں ورم آسکتا ہے جو جلد رفع نہ ہونے کی صورت میں کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

پستان میں کینسر یا چوٹ لگنے کے علاوہ پستان پر کسی غدی سوزش پیدا کرنے والی شے کے لگنے یا اس کے مسلسل استعمال سے جن میں گرم خشک اغزیہ اور یہ شامل ہیں ہو سکتی ہیں۔

اسی طرح بعض عورتیں پستانوں کو خوبصورت رکھنے کے لئے مختلف کریمیں لگاتی ہیں جو اپنے مزاج میں گرم خشک ہوتی ہیں جس کے استعمال سے پستانوں میں غدی عضلاتی تحریک پیدا ہو جاتی ہے جس سے پستانوں سے فضلات اخراج نہیں پاسکتے یہی فضلات پستانوں میں جمع ہو کر گٹھی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو بوجھ اور دردوں کا باعث بنتے ہیں اس حالت کو اطباء پستان کا سرطان کا کینسر کہتے ہیں۔

طریقہ علاج: چونکہ پستان کا کینسر غدی عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے اس لئے غدودنا قلعہ کا فعل تیز کر دینا چاہئے تاکہ پستان میں رکے ہوئے فضلات خارج ہو جائیں فوراً کینسر ختم ہو جائے گا۔
اس مقصد کے لئے قانون مفرد اعضاء کے فارما کو پیا کے غدی اعصابی سے اعصابی غدی نسخہ جات بے حد مفید ہیں اللہ شفاء دے گا۔

پستانوں کی تبدیلیاں

(Changes in Breasts)

- ☆ حمل کے دوران پستانوں میں درج ذیل تبدیلیاں آتی ہیں۔
- ☆ حمل کے آٹھویں ہفتے میں پستانوں کا سائز بڑھنے لگتا ہے۔
- ☆ پستانوں کی بھٹیاں بڑھ کر بڑی ہو جاتی ہیں۔
- ☆ بھٹیوں کے حلقے گہرے ہو جاتے ہیں بھورے یا سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔
- ☆ پستانوں کے اندر خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے۔
- ☆ پستان پر موجود رگیں پھول جاتی ہیں۔
- ☆ ایک خاص وقت پر حمل کے آخری مرحلہ پر دودھ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
- ☆ پستانوں کے Glandular Tissue میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ☆ پستانوں کے اندر ایک تناؤ کی حالت آ جاتی ہے۔

- ☆ تیسرے مہینے میں پستان کی بھٹنی دبانے سے رطوبت خارج ہوتی ہے جو کلاstrum کہلاتی ہے۔
- ☆ حمل کے آخر میں پستان بچے کو دودھ پلانے کیلئے تیار ہوتے ہیں۔

لمفٹک ڈرنیج (Lymphatic Drainage)

چھاتیوں سے لمف (Lymph) درج ذیل غدودوں کی مدد سے خارج ہوتی ہے۔ چھاتی سے 75 فیصد لمف اگزیلری لمف نوڈز (Axillary Lymph Nodes) میں جاتا ہے۔ 20 فیصد انٹرنل میمری لمف نوڈز (Internal Mammary Nodes) اور 5 فیصد پوسٹیریئر انٹرکوسٹل نوڈز (Posterior Intercostal Nodes) میں خالی ہوتا ہے۔

چھاتی پر ہارمونز کے اثرات

(Effects of Hormones of Breast)

- 1- دوران حمل ایسٹروجن ہارمون ایلیولائی (Alveoli) اور ڈکٹس (Ducts) کی نشوونما میں اضافہ کرتا ہے۔
- 2- دوران حمل ایسٹروجن اور پروجیسٹران کی مدد سے کلاstrum (Clostrum) بننے کے عمل کو تحریک (Stimulation) ملتی ہے۔
- 3- جب تک زچگی نہیں ہوتی اس وقت تک دودھ کا اخراج بند رہتا ہے۔
- 4- جب ایسٹروجن اپنی مجوزہ مقدار سے کم ہو جاتی ہے تو پرولیکٹن (Prolactin) کا اخراج جاری ہو جاتا ہے۔
- 5- دودھ کا اخراج پچوٹری غدود کے ہارمونز کے زیر اثر رہتا ہے۔
- 6- آکسی ٹوسن (Oxytocin) کی وجہ سے چھاتی کے اندر مایو اپی تھیلیل خلیات (Myoepithelial Cells) کی کنٹریکشن (Contraction) میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دودھ کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اپی تھیلیل خلیات کی اس کنٹریکشن کو ملک ایجکشن (Milk Ejection) یا لیٹ ڈاؤن ریفلکس (Let Down Reflex) کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کو دودھ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔



چھاتی کے افعال (Functions of Breasts/ Mammary Glands): چھاتی کا کام نوزائیدہ بچوں کو غذا اور دودھ مہیا کرنا ہے۔ بریس فیڈنگ (Breast Feeding) پر ایک مفصل باب آگے موجود ہے۔ (دیکھئے بریسٹ فیڈنگ)

پستان کی بناوٹ

(Anatomy of the Breast)

پستان جسم کا وہ حصہ ہے جس میں بچے کے لئے دودھ غذا کی شکل میں جمع رہتا ہے۔ یہ دودھ نوزائیدہ کی غذا بنتا ہے اور بچہ اس پستان کو چوس کر اس دودھ کو پیتا ہے۔ قدرت نے اس کی ساخت اس طرح بنائی ہے کہ اس میں دودھ کی کافی مقدار جمع رہتی ہے۔

پستان کی ساخت کو سمجھنے کے لئے اس کی Anatomy کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پستان Secretory Gland کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر دودھ موجود ہوتا ہے۔ آئیں پستان کی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس میں دودھ کے نظام کو سمجھ سکیں۔

Nipple: نپل یا بھٹنی پستان کا اگلا حصہ ہوتا ہے یہ وہ حصہ ہے جس کو چوس کر بچہ دودھ حاصل کرتا ہے۔ پستان کی ساخت Erecting Tissue پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ساخت Epithelium سے ڈھلی ہوتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے Muscle Fiber موجود ہوتے ہیں اس سے نپل کے اندر ایک Sphincter بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے دودھ بہنے لگتا ہے۔

Areola: یہ پستان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو نپل کے گرد ایک حلقے کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ حلقہ سفید رنگ والی عورتوں میں گلابی رنگ کا اور سانولی رنگت والی عورتوں میں بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور ولادت کے بعد اس حلقے کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اس حلقے کے اندر خاص قسم کے غدود ہوتے ہیں۔

Montgomery Glands: یہ خاص طرح کے غدود پستان کے حلقے Areola میں موجود ہوتے ہیں یہ غدود ایک خاص قسم کے انزائم پیدا کرتے ہیں ان کا کام لبریکنٹ کا ہوتا ہے۔

Lobes: پستان کی ساخت میں مختلف لوبز ہوتے ہیں یہ لوبز Gladular Tissue پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان لوبز کی تعداد 20 ہوتی ہے

Lobule: اگر ایک لوب کی ساخت کو دیکھیں تو حرید لوبیڈ نظر آتے ہیں۔ ان کی ساخت کے اندر **Ducts** اور **Alveoli** ہوتی ہیں۔

Acini Cell: یہ خاص قسم کے خلیات ہوتے ہیں جو دودھ پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں ان خلیات کے گرد **Myoepithelial Cell** موجود ہے ہیں۔ ان خلیات نے ان کو گھیر رکھا ہوتا ہے۔

Myoedithelial Cell: یہ وہ خلیات یا سیل ہوتے ہیں جو **Acini Cell** کے گرد موجود ہوتے ہیں۔ وہ یہ خلیات ہوتے ہوئے جو دودھ کے اخراج کے نظام میں حصہ لیتے ہیں۔
Lactiferous Duct: یہ خاص قسم کی نالیاں (**Ducts**) ہوتی ہیں جو دودھ کو **Alveoli** سے لے کر آتی ہیں اور پھر ایک بڑی نالی میں شامل ہو جاتی ہیں۔

Ampula: جب دودھ بڑی نالی میں آ جاتا ہے تو وہ لوبز سے الگ حرید بڑی ہو جاتی ہے اور چوڑی ہو جاتی ہے **Ampula** پستان کا وہ حصہ ہے جو دودھ کو عارضی طور پر جمع کرتا ہے۔

پستانوں کی سوزش (Mastitis)

دودھ پلانے والی عورتوں میں کبھی کبھار ایک یا دونوں پستانوں کی سوزش میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس سوزش کی وجہ سے پستان انتہائی تکلیف دہ حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب طبی خرابی سے ہوتا ہے اس صورت میں عورت کے لئے دودھ پلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

علامات (Symptoms):

- ☆ اس سوزش کی حالت کی وجہ سے پستانوں کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔
- ☆ پستانوں پر سوجن آ جاتی ہے اور ان میں درد ہوتا ہے۔
- ☆ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ حالت بگڑ کر زہر یا دہن جاتی ہے۔
- ☆ یہ سوزش کی حالت سطحی بھی ہو سکتی ہے اور گہری بھی ہو سکتی ہے۔
- ☆ سوزش کی وجہ سے پستان ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو۔
- ☆ اس سوزش کی وجہ سے پستان میں گانٹھیں بھی بن سکتی ہیں۔
- ☆ بعض اوقات سوزش اس وجہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ حرکت سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

علاج (Treatment): ☆ اس حالت میں بچے کو دودھ پلانے پر پابندی لگا دیں۔ دودھ کا لیبارٹری میں مکمل تجزیہ کروائیں تاکہ جراثیم کی تشخیص ہو سکے اور درست علاج ہو سکے۔
ہومیو پیتھک: ☆ مناسب ہومیو پیتھک دوا استعمال کریں۔

Calcarea Flour 6x	کلکیر یا فلور	Phytolaca 30	فائیٹولاکا
Kali Mur 6x	کالی مور	Aconite 30	اکونائٹ
Bryonia Alba 30	برائی اونیا البا	Ferrum Phos 30	فیرم فاس

ایلو پیتھک: ☆ درد کی صورت میں مناسب دوا استعمال کریں۔

Diclofan Tab	ڈیکلوران گولیاں	Brufen Tab	بروفین گولیاں
Diagesic Tab	ڈیاجیسک گولیاں	Proxen Tab	پروکسن گولیاں
Temgesic Inj	ٹیمجیسک انجکشن	Rheuban Tab	ریوبین گولیاں
		Ponstan Tab	پونستان گولیاں

☆ دافع سوزش ادویات

Chymocin Tab	کایمو سین گولیاں	Tantum Tab	ٹنٹم گولیاں
		Cymotrip Tab	کایمو ٹریپ گولیاں


☆ مناسب انسٹی یا ٹونک کا استعمال کریں۔

Proloxab Tab	پرولوکساب گولیاں	Ofloxed Tab	اوفلوکسید گولیاں
Septran Tab	سپٹران گولیاں	Bactrum Fort Tab	بیکٹرم فورت گولیاں
Dalacin-C Cap	ڈیلا سین کپسول	Penglob Tab	پنگلوب گولیاں
		Ampiclox Cap	امپی کلاکس کپسول

پستان کا کینسر

(Breast Cancer)

عورتوں میں پائے جانے والے کینسر میں پستان کے کینسر کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہ کینسر 50 سال کی عمر کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔



Sore
Nipple

نیل کا پک جانا

کسی بیجے عورت کے پستان کی بھٹنی یا نیل جس سے بچہ چوس کر دودھ اپنی غذا حاصل کرتا ہے پک جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے جس میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔

☆ پستان کا کینسر ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

☆ جو خواتین چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں ان میں اس کینسر کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔

☆ بعض خاص دائرس ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ کینسر کی نمو شروع ہو جاتی ہے۔

☆ بعض اوقات یہ کینسر آہستگی سے بڑھتا ہے اور بعض اوقات تیزی سے بڑھتا ہے۔

☆ اس کے علاج کا انحصار اس پر ہے کہ کس درجے پر کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔

☆ اس کی ابتدا ایک گٹھی سے ہوتی ہے بعد میں یہ کینسر بن جاتا ہے۔

علاج Treatment

☆ اس کی تشخیص کے لئے ایک خاص Mammography کرایا جاتا ہے۔

☆ ادویات کے ذریعے بھی علاج ممکن ہے اگر بروقت کیا جائے۔

☆ اس کے علاج کے لئے سرجری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

☆ آج کل اس کا علاج شعاعوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج

علامات کے مطابق مناسب دوا کا استعمال کریں تو کینسر ختم ہو سکتا ہے۔

Arsenicum Album	30-200	آر سینیکم البم
Apis Melifica	30-200	اپیس ملی فیکا
Asterias Robens	30-200	اسٹریا زربوبنس
Belladonna	200	بیلادونا
Hepar Sulf	30-1000	ہیپر سلف
Clematis	30-200	کلیمٹس
Lachesis	200-1000	لیکسیس
Lycopodium	30-1000	لائکوپوڈیم

بھٹنیوں کا پک جانا (Sore Nipple)

ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے عورت کے پستان کی بھٹنی یا نپل جو بچے کو غذا دینے کا کام کرتا ہے جو پک جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ ان میں درد کھ ہوتی ہے۔

- ☆ پہلی دفعہ ماں بننے والی عورت میں یہ شکایات ہو سکتی ہے۔
- ☆ دودھ زیادہ ہونے سے اکڑنے سے چیر آ جاتے ہیں۔
- ☆ موسمی حالات کی وجہ سے بھی بھٹنیاں پھٹ جاتی ہیں۔
- ☆ دودھ پیتے وقت بچہ درست و حالت میں نہ ہو تو بھٹنی پھٹ سکتی ہے۔
- ☆ بچہ نپل کو بہت دیر تک چوستا رہے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔
- ☆ علاج (Treatment): ☆ جب تک یہ حالت درست نہ ہو بچے کو دودھ نہ پلائیں۔
- ☆ اگر ڈاکٹر حالات کے پیش نظر اجازت دے تو نپل شیلڈ کا استعمال کریں۔

ہومیو پیتھک

ہیپر سلف Hepar Sulf 30-200

کیلنڈولا Calendula 30

کالی میور Kali Mur 6x-30

سلیشیا Silicia 6x-200

فیرم فاس Ferrum Phos 6x-30

ایلو پیتھک

☆ بھٹنیوں پر مقامی طور پر کریم لگائیں۔

می مول کریم Memol Cream

بی پین تھن پلس کریم Bepan Than Plus Cream

☆ مناسب اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں۔

سپٹران گولیاں Septran Tab

پنگلوب گولیاں Penglob Tab

ٹیرامائین کپسول Teramycin Cap

لنکوسین کپسول Lincocin Cap

بیکٹرم فورٹ گولیاں Bactrum Fort Tab



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

☆ درد کم کرنے کے لئے استعمال کریں۔

Ponstan Tab پونشان گولیاں

Dicloran Tab ڈکلوران گولیاں

Brufen Tab بروفن گولیاں

Diagesic Tab ڈایا جیسک گولیاں

Parcetamol Tab پیرا شامول گولیاں

دودھ پلانے والی عورت کی خوراک

(Diet of Lactating Woman)

جس طرح حاملہ کو خاص اور زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح وہ عورت جو بچے کو چھاتی سے دودھ پلاتی ہے اس کو بھی خاص خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کی نشوونما دودھ پر ہوتی ہے اور درست نشوونما کے لئے طاقتور دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح دودھ اس وقت ہی میسر آ سکتا ہے جب عورت کو درست غذا ملے۔

نارمل حالات میں عورت کو روزانہ 2200 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو عورت بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اس کو 2700 کیلوریز روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اس کو اس قدر قائلو غذا درکار ہوتی ہے جس سے وہ 500 کیلوریز حاصل کر سکے۔

عورت کو ایسی غذا چاہئے جو اس کی غذائی ضرورت بھی پوری کرے اور اس کے ساتھ دودھ کے لئے ضرورت پوری کرے۔

☆ دودھ پلانے والی عورت کو روزانہ گندم کی 6 عدد چپاتیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

☆ روزانہ کسی طرح کی سبزی کی 250 گرام مقدار درکار ہوتی ہے۔

☆ دالوں میں سے کسی طرح کی 250 گرام دال درکار ہوتی ہے۔

☆ روزانہ دودھ پلانے والی عورت 250 گرام گوشت درکار ہوتا ہے۔

☆ دودھ پلانے والی عورت کو روزانہ 1 لیٹر دودھ درکار ہوتا ہے۔

☆ دودھ پلانے والی عورت کو روزانہ 50 گرام مکھن یا گھی کی ضرورت ہوتی ہے۔

☆ دودھ پلانے والی عورت کو کسی موکی پھل کی 250 گرام مقدار روزانہ درکار ہوتی ہیں۔

اس کے علاوہ عورت کو پانی مناسب مقدار میں پینا چاہئے۔ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کی غذا تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ اگر موسم گرما میں لسی مل سکے تو وہ بھی بہترین چیز ہے۔

ثابت ہوا کہ جب تک دودھ پلانے والی عورت متوازن اور طاقتور غذا کا استعمال نہیں کرے گی اس کے دودھ میں وہ غذائیت ہی پیدا نہیں ہوگی جو بچے کو طاقتور بنا سکے۔ صحت مند بچے کو طاقتور دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور طاقت دودھ اس عورت کا ہی ہو سکتا ہے جو متوازن اور صحت بخش غذا کا استعمال کرے۔

صحت مند عورت کے بچے صحت مند ہوتے ہیں اور جو عورتیں کمزور ہوتی ہیں ان کو مناسب غذا نہیں ملتی ان کے دودھ میں طاقت کم ہوتی ہے اور ان کے بچے کمزور ہوتے ہیں اور غذائی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

صحت مند بچے کے لئے ماں کو صحت مند بنائیں۔

پستان میں پھوڑا (Abscess)

بیلادونا 3x (پھوڑا ہونے کی علامت میں) پستان سخت سرخ پھولے اور ان میں درد، برائیونیا 3x بیلادونا کی علامت کی بہ نسبت پستان زیادہ کڑے بہت تکلیف۔


فائی ٹو لکا اگر برائی او نیا سے دودن تک فائدہ نہ ہو، فائی ٹو لکا Q (دس گنے گرم پانی کے ساتھ) کا خارجی استعمال۔

ہیمر سلفر 6x مواد پیدا ہونے پر لسی کی پولس یا گرم کیلنڈولا Q (دس قطرے ایک اونس پانی کے ساتھ) کا خارجی استعمال۔

سلکا 3x پھوڑے کے بعد زخم (Sinus) امراض پستان کی سوزش اور پستان کی مٹھنڈی میں زخم ملاحظہ ہو۔

پستان میں دانے یا رسولی (Tumour): فائی ٹو لکا 3x مزمن رسولی کی اچھی دوا ہے۔

خارجی استعمال فائی ٹو لکا Q ایک حصہ دس گنے پانی کے ساتھ ملا کر پستان پر پٹی تر کر کے باندھ دینا چاہئے۔



پستانوں کی رسولیاں

کبھی ایک پستان میں اور کبھی دونوں پستانوں میں پہلے گلٹیاں (رسولیاں) محسوس ہوتی ہیں جن میں درد ہوتا ہے بلکہ ان کا پتہ ہی درد چلتا ہے۔



(د) سرطان پستان (Cancer): ہائیڈراشس 1x یہ سرطان کی ایک اچھی دوا ہے ہائیڈراشس Q (ایک ڈرام چار اونس پانی میں ملا کر) لوشن خارجی استعمال کرتا چاہئے۔ آرٹیک 3x یا آرٹیک آیوڈ 3x اس مرض کی یہ دوسری اچھی دوا ہے۔

کوئیم 3x یا سالیکیو 3x

اگر آرٹیک کے دو ماہ تک استعمال کرنے سے بھی فائدہ نہ ہو۔

امراض ورم پستان، پھوڑا یا امراض ایما اور سرطان ملاحظہ ہو۔

ورم پستان: پستان سرخ سخت بھاری، درد ہو جانے پر بیلاڈونا 3x، پستان سخت متورم ہو لیکن سرخی نہ ہو۔ ایسے علامات میں ہائیڈروٹیا 3x۔ ٹھنڈے پانی کی پٹی پر باندھنا فائدہ مند ہے۔ لیکن تشخی تکلیف میں گرم پانی کی پٹی ہونی چاہئے۔

پستان کی گھٹڑی میں سوزش یا زخم: چوٹ لگ کر سوزش ہونے پر آرٹیکا 3x کا داخلی استعمال اور آرٹیکا Q پانی کے ساتھ ملا کر پستان میں خارجہ لگانا چاہئے۔ گھٹڑی میں زخم ہونے پر یا ستر جلاتے پر ہائیڈراشس 3x کا اندرونی استعمال اور ہائیڈراشس Q (آٹھ گنے پانی میں ملا کر) پٹی لگانا چاہئے۔

پستان بڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف: درقونج کی طرح تکلیف میں کوئیم 3x، سوزش کی وجہ سے تکلیف ہونے پر بیلاڈونا 3x یا ہائیڈروٹیا 3x۔

دماغی تکلیف: حاملہ ہمیشہ افریقہ رہتی ہے۔ کی قہوگا 6، رنج سے بے چین رہتی ہو۔ اگیشیا 6 ڈرتے میں اگیشیا 6، قہور طبیعت ہونے پر کیو میلا 12۔

جھوٹا ہندو: آخر حالات میں جتنے کی طرح درد ہوا کرتا ہے (غیر طبی علامات ملاحظہ ہو) کیو میلا 6 اس کی عمدہ دوا ہے۔ پلساٹیل 3، کی سی قہوگا 3 یا کولیٹاگم 3 کی بخٹی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

حالات حمل میں اخراج خول: حاملہ کے ہتے ہونے کھاتے یا اگر جاتے پردہم میں سکا لگ کر رحم (Placenta) رحم سے کچھ ہٹ جائے گا۔ اسی سے خول گرتا ہے۔ آرٹیکا 3 اس کی اچھی دوا ہے۔

(2) حبس بیلا اسباب کے علاوہ اگر حمل رحم کے حر پر دھکن کی طرح رہے۔ اس کی وجہ سے خول گرتا ہے۔ مرض سخت خیال کر کے دیشیاہالی کرے یا ستر دالی کو ہلا کر کھاتا

چاہئے۔ یہ مرض حمل کے آخر حصہ میں یا ٹھیک ولادت کے وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اخراج خون ہی اس کی حالت علامت ہے۔ (طبعی دودھ میں بلغم کی طرح ایک چیز نکلتی ہے کبھی خون نہیں ولادت کی حالت دیکھئے) ٹرائیکیم Q اس اخراج خون کو بند کرنے کی ایک اچھی دوا ہے۔
کمی خون: ملیریا بخار میں مبتلا رہنا، کیڑے رہنے وغیرہ اسباب سے کمی خون ہو تو اس امراض کا علاج کرنا چاہئے۔

مرض پستان۔ پستان کے دن کی بیماری

ولادت کے بعد امراض پستان کا مقصد ملاحظہ ہو۔

وضع حمل کے بعد پستان کی بیماری

(Diseases of the Breast following Delivery)

معلومات پستان: پستان کے متعلق زچہ کو مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنی چاہئے۔

1- تین چار ماہ کا حمل ہوتے ہی پستان بڑھنے لگتے ہیں اسی وقت سے بھٹنی کی طرف خیال

رکھنا چاہئے آج کل کی تہذیب قائم رکھنے کے لئے کپڑا ایسا کس کر نہ پہننا چاہئے کہ جس سے پستان کی بھٹنی پر دباؤ پڑے اور اس کے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔

2- شروع میں کہا جا چکا ہے کہ ولادت کے آٹھ دس گھنٹہ بعد بچہ کو دودھ پلانا چاہئے اس

سے بچہ کو آسانی سے پاجات ہوتا ہے اور نہ چہ کو دودھ کا بخار وغیرہ نہیں ہوتا۔

3- ہر مرتبہ بچہ کو دودھ پلانے کے پہلے تھوڑا دودھ نچوڑ ڈالنا چاہئے۔ اس کے بعد پستان کی بھٹنی بچہ کے منہ میں دینا چاہئے۔

4- زچہ کی خراب غذا کی وجہ سے پستان کا دودھ خراب ہو سکتا ہے اس دودھ کو پینے سے

بچہ بے انتہا ہے اور امراض بد ہضمی وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہیں اس لئے کھانے پینے کے متعلق زچہ کو خوب ہوشیار رہنا چاہئے۔

5- بھٹنی میں زخم ہو یا ملاں کے بچہ میں بیماری ہو یا بخار وغیرہ ہو تو بچہ کو دودھ نہ پلانا چاہئے۔

6- سخت محنت کرنے کے بعد یا غصہ وغیرہ دماغی تحریک کے وقت یا مجامعت کے بعد ہی پستان کا دودھ خراب ہو جاتا ہے ایسی حالت میں بچہ کو دودھ پلانے سے اسی وقت بچہ کو کوئی سخت بیماری (یہاں تک کہ موت) بھی ہو سکتی ہے۔

دودھ کا بخار (Milk Fever)

وضع حمل کے بعد دودھ پیدا ہو جانے کی وجہ سے کسی کسی زچہ کے پستان میں کاغٹا چھنے کی طرح درد ہوتا ہے اور ایک دو دنوں میں ہی پستان کا دودھ جم کر بخار آ جاتا ہے اسی کو دودھ کو بخار کہتے ہیں اس میں کوئی دوا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف بخاری کی موجودگی میں بچہ کو دودھ نہ پلانا چاہئے اور پستان کو سردی سے بچانا چاہئے۔

لیکن یہ دودھ کا بخار اگر تیز ہو اور میں گھٹنے سے زیادہ رہے تو الگوناٹ 3x دینا چاہئے۔ اور بخار چھوٹنے پر بھی اگر پستان ملائم نہ ہو جائے تو (پستان سخت رہنے تک) برا یونیا 6x دینا چاہئے۔

درد پستان (Mastitis)

وضع حمل کے بعد (کسی وقت) درد پستان اور اس کے ساتھ بخار ہو سکتا ہے اس وقت زچہ کے کل پستان یا صرف بھٹنی میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کل پستان سرخ ہو کر اس میں جلن ہو تو برا یونیا 3x کسی کسی کی رائے ہے کہ بیماری کی شروع حالت میں بیلاڈونا اور برا یونیا باری باری سے دینا چاہئے اس سے درد جلد جھٹ سکتا ہے۔ بڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی تیز بخار رہنے پر الگوناٹ اور برا یونیا (یکے بعد دیگرے) دینے کی صلاح دیتے ہیں جلد نہ گھٹ کر اگر پستان درد کرتا جائے یا مواد پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو مرکبوس سول 6x پستان خوب سخت ہو تو فاسٹولک 3x کا استعمال اور فاسٹولک Q میں قطرے آدھا لونس گرم پانی میں ملا کر پستان کے اوپر پٹی باندھنی چاہئے۔

”پستان سخت ہونا“ ملاحظہ ہو۔

بھٹنی میں زخم (Sore nipples)

پستان کی بھٹنی میں زخم ہونے سے بچہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیلنڈر Q 200 قطرے

سے ایک چمٹا تک پانی میں ملا کر دھو ڈالنا اور پٹی باندھنا چاہئے اگر بھٹنی میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو کر ان سے پانی لکھتا ہو تو گریفائٹس 6x دینی چاہئے۔

پستان میں درد (Pain Full Nipples): جس وقت بچہ دودھ پئے اگر اسی طرح پستان میں درد ہو تو فلافٹرینم 1x.3x کا استعمال کرنا چاہئے کبھی کبھی بھٹنی سے کندھے تک تولنجی درد کی طرح درد پیدا ہو جاتا ہے ایسے وقت پر کروٹن ٹکسیم 3x دینا چاہئے۔

پستان خالی معلوم ہونے پر اور بچہ کے دودھ پینے کے وقت بہت تکلیف ہونے پر بوریکس 30، 6x دینا چاہئے۔

دودھ پلاتے وقت سستی، دودھ پلانے کے بعد اگر زچہ کو کمزوری معلوم ہو تو چائنا 6x ایسڈ فاس دینا چاہئے۔

پستان میں زیادہ دودھ ہونا: پستان میں دودھ یکبارگی بڑھ جائے تو کم کرنے کے لئے نیٹرم سلف 12x سفوف یا پلس دینا چاہئے۔

مسور کی دال پیس کر پستان پر لگانے سے دودھ خوب خشک ہو جاتا ہے۔

پستان میں دودھ نہ ہونا یا کم ہونا وضع حمل کے بیس گھنٹہ کے اندر دودھ نہ ہونے پر اکنس کیکٹس 3x دینا چاہئے یکا یک دودھ گھٹ جانے پر یا بند ہو جانے پر ایسا فلیڈ 3x دینا چاہئے کلمی ساگ کھانے سے اور براڈا کے پتے پانی میں جوش دے کر اس سے پستان دھو ڈالنے سے دودھ خوب بڑھتا ہے۔

دماغی تحریک کی وجہ سے کبھی کبھی دودھ خشک ہو جاتا ہے غصہ کی وجہ سے یکا یک دودھ خشک ہو جانے پر کیمولٹا 6x ڈر جانے پر ایکونائٹ 30 حسد کی وجہ سے ہایوسیماس 3x اور رنج کی وجہ سے کم ہو جانے پر اگنیشیا 6x دینا چاہئے۔

پستان سے خود بخود دودھ نکلتا، بوریکس 3x سفوف کلکیر یا کارب 6x چائنا 6x روزانہ تین چار مرتبہ ٹھنڈے پانی سے پستان دھو ڈالنا چاہئے۔

پستان کی سختی: کبھی کبھی دودھ جم کر پستان سخت ہو جاتے ہیں اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ برائیونیا 6x اس کی بہترین دوا ہے ورم پستان کا بیان ملاحظہ ہو۔

پستان میں پھوڑا ہونے کو ہو، یعنی پستان سخت ہو اور درد کرتے ہو برائیونیا 3x ہر گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہئے اس سے اکثر پھوڑا اینٹہ جاتا ہے اگر 36 گھنٹہ میں کچھ فائدہ نہ ہو تو فاسٹولکا 3x

ہر تین گھنٹہ پر استعمال کرنا چاہئے اور فاسٹو لکا Q (پانچ قطرے تین اونس خوب گرم پانی میں ملا کر) پستان کے اوپر بیچ بیچ میں چھڑک دینا چاہئے جو لمبے کی جلی مٹی کا لیپ پستان پر خوب فائدہ کرتا ہے فاسٹو لکا سے فائدہ نہ ہو (یعنی مواد پیدا ہو جانے پر) ہسپر سلف 16x.30 استعمال کرنا اور ایسی کی پلٹس لگانا چاہئے۔

ناسور ہونیپر سلفا 16x.30 استعمال کرنا چاہئے۔

دودھ کی کمی

Suppressed Milk

تعارف: اس میں زچہ کی چھاتیوں میں بعض اوقات دودھ اتنا پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے بچے کی پرورش ہو سکے۔

تفصیل مرض

یہ مرض پہلے سے موجود کچھ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مریضہ میں خون کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کا جریان خون ہو جائے تو بھی مریضہ میں دودھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسہال اور قے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زچہ میں دودھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکوریا اور دوسرے متعدی امراض کا شکار عورتوں میں دودھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پر بے نالی غدود کی ایک سیکریشن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس سیکریشن کو پرولیکٹن کہتے ہیں جو پچوٹری گلینڈز سے خارج ہوتی ہے اور دودھ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس کی کم ہو تو دودھ کی کمی ہو جاتی ہے۔

تشخیص: عام طور پر کلیدیکل ہسٹری ہی کافی رہتی ہے لیکن چند کیسوں میں پرولیکٹن ہارمون کی جانچ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات سیرم فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز اور لیوٹھائیزنگ ہارمونز کے ٹسٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

انگریزی علاج

1- آکسی ٹاسن Oxitocine ایک ٹیکہ روزانہ تین یوم تک لگائیں۔

- 2- فائزولکٹین Physulactin 5 سی سی 2 سی سی اور ایک سی سی کا 5 یوم تک ٹیکہ کریں۔
- 3- ڈی کیلس گولیاں Decalc Tablets ایک گولی صبح۔ ایک دوپہر۔ ایک شام چوبیس۔
- 4- سانگویان گولیاں Sangbion Tabs ایک گولی روزانہ رات دودھ سے کھائیں۔
- 5- سربیکس سیرپ Surbax Syrup ایک چمچہ صبح۔ ایک دوپہر۔ ایک شام پلائیں۔
- 6- فی فال وٹ کپسولز Fefol Vit Capsules ایک کپسول روزانہ دودھ سے۔

اس کے علاوہ کارڈیورائل ٹیکٹا گول اور کیلشیم وغیرہ کی گولیاں بکثرت استعمال کرائی جاتی ہیں۔
 ہومیو پیتھک علاج: اس مرض میں درج ذیل ہومیو پیتھک ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں۔
 ایکلنس کا سٹس 3x: دودھ کی مقدار زیادہ کرنے کے لئے بڑی اعلیٰ دوا ہے۔
 ایسا فوٹڈ 3x: یہ دوا ہر گھنٹے کے بعد دینی چاہئے اس سے دودھ میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔
 ریسینس کمونس 3x: دودھ پیدا کرنے والی یہ ایک بہترین دوا ہے۔
 چائنا 3x: اگر مریضہ بہت زیادہ کمزور اور اس میں خون کی کمی ہو تو یہ دوا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے یا پھر مریضہ لیکوریا کے امراض میں جملارہ چکی ہو۔
 سیمل سیرولینا Q: چھاتیوں میں دودھ کی کمی کی مجرب دوا ہے۔
 یونانی علاج: ارٹھ کاتیل چھاتیوں پر مالش کیا جائے۔ اس کے علاوہ تودری سرخ۔ ستاور سوف، زیرہ اور لالہ پتھی خود عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔



ماں کی چھاتی کا پہلا دودھ

پیدائش کے بعد بچہ کو پہلی دفعہ جو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے اسے کلو سٹرم کہتے ہیں جو کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کلو سٹرم ماں کی طرف بچہ کو قوت مدافعت میسر کرتا ہے۔

بریسٹ ٹریمنٹ معہ علاج

بریسٹ فیڈنگ (چھاتی کا دودھ پلانا)

(Breast Feeding)

بچے کی پیدائش کے بعد بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے بچے کو دودھ پلانے کا واحد قدرتی طریقہ ہے ماں کا دودھ تازہ۔ جسمانی درجہ حرارت کے مطابق۔ غذائیت سے بھرپور اور جراثیم سے پاک ہوتا ہے چھاتی کے دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق صحیح مقدار میں اجزاء Components موجود ہوتے ہیں جو بچے کی نشوونما ضرورت اور معیار کے مطابق ہوتے ہیں ماں کی چھاتی کا دودھ انمول اور نور ہے 95% عورتیں با آسانی اپنے بچے کو چھاتی کا دودھ پلا سکتی ہیں چھاتی کے دودھ کے ذریعے ماں کی طرف سے قوت مدافعت Immunity بھی منتقل ہوتی ہے۔ جس سے بچہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ماں کے دودھ کا درجہ حرارت بھی انسانی جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہوتا ہے دودھ پیتے وقت بے بی (بچہ) ماں کے ساتھ لپٹ کر قربت، اپنائیت، پیار، جسمانی حرارت اور خوراک حاصل کرتا ہے یہ نعمتیں بچے کو صرف اسی صورت میں نصیب ہوں گی جب ماں بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلائے گی۔

طریقہ Method Procedure:

بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یا کم از نصف سے ایک گھنٹہ کے اندر چھاتی (پستان) کو اچھی طرح دھونے کے بعد بے بی کو چھاتی کے ساتھ لگایا جائے تاکہ وہ نبل کو منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دے۔ پستانوں میں دودھ بچے کی پیدائش کے تیسرے دن آتا ہے پہلے اور دوسرے دن بریسٹ سے صرف کلاstrum آتا ہے۔ یہ ابتدائی دودھ نمارطوبت بچے کیلئے انتہائی مفید ہوتی ہے۔ یہ بچے کیلئے ابتدائی مکمل غذا ہے۔ یہ کلاstrum نکال کر پھینکے کی بجائے بے بی کو ضرور پلایا جائے۔ یہ بچے کی ضرورت کے عین مطابق ابتدائی غذا ہے۔ دیگر کوئی بھی شے جدید تحقیقات کے مطابق فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ابتدائی ایام میں بے بی جتنا زیادہ نبل کو چوسے گا اس کے چوسنے کے اثرات سے دودھ اتنا ہی زیادہ پیدا ہوگا اگر بچہ کسی وجہ سے براہ راست منہ کے ذریعے دودھ نہ پی سکے تو میڈیکل سٹور سے بریسٹ پمپ خرید کر اس کے ذریعے نکال کر

ابتدائی ایام کا دودھ ضرور بچے کو دیا جائے ہر صورت کوشش کی جائے کہ بچہ خود بریٹ سے دودھ پئے بعض بچے ایک دودن دودھ نہیں پیتے ہیں لیکن بعد میں خود ہی پینا شروع کر دیتے ہیں زیادہ کوش اور عمل یہ ہی کیا جائے کہ بچہ خود دودھ پئے۔

ماں کی چھاتی کے پہلے دودھ (کلو سٹرم) کے فوائد

☆ کلو سٹرم میں ماں کی طرف سے قوت مدافعت بھی میسر ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہونے کے بعد بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

☆ پیدا ہونے کے بعد کلو سٹرم بچے کی جسمانی ضرورت کے عین مطابق قدرت کی طرف سے تیار شدہ غذا ہوتی ہے کیونکہ شروع ہی سے بچہ دیگر جانوروں کا یا فارمولا دودھ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔

☆ پیدائش کے فوراً بعد یا کم از کم نصف سے ایک گھنٹہ کے اندر جب بچہ ماں کے پستان کی نپل کو منہ میں لے کر چوستا ہے تو چوسنے کے اثر سے ہارمون عورت کی بچہ دانی پر اثر انداز ہوتے ہیں جس سے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے جریان خون کم ہو جاتا ہے اور آنول کا اخراج ہو جاتا ہے۔

☆ ماں کے پیٹ میں بچہ ہر لحاظ سے محفوظ ہوتا ہے اسے ماں کے ذریعے صاف بہتر اور حسب ضرورت خوراک اور آکسیجن میسر ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں باہر نسبت کی خاص ٹیمپرچر ہوتا ہے جو نمی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے فوراً نئے ماحول سے واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے باہر کے درجہ حرارت کی تبدیلی سے واسطہ پڑتا ہے۔ سانس لینے کیلئے آلودگی والی ہوائی میسر ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کیلئے اسے فوری قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف کلو سٹرم سے مل سکتی ہے۔

جو نمی بچے کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ ختم ہو تو بچے کو فوراً دودھ پینے کیلئے ماں کی چھاتی سے لگا دیا جائے اس سے بچہ دانی کے سکڑنے کے عمل میں تیزی کی بنا پر جریان خون کم ہوگا اور تیسرے مرحلہ یعنی آنول اور جملی کا اخراج بھی جلدی ہوگا اور بچے کو نئے ماحول سے مقابلہ کرنے کے لئے انرجی (خوراک) بھی مل جائے گی۔

کلوٹر (پہلا دودھ بھلی) نہ دینے کے نقصانات

☆ اگر بچہ نپل کو منہ میں لے کر نہیں چوسے گا تو تین دن بعد قطعاً دودھ نہیں آئے گا بچہ بھوکا رہے گا۔

☆ بچہ ماں کی طرف سے ملنے والی قوت مدافعت سے محروم ہو جاتا ہے فطری اور حسب ضرورت خوراک نہ ملنے سے بھی کمزور ہو جاتا ہے جس سے بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔

☆ کلوٹر پانی کی طرح پتلا سا دودھ ہوتا ہے۔ اصل دودھ تیسرے دن آتا ہے۔ اصل دودھ تب ہی آئے گا جب بچہ پستان کو منہ میں لے کر چوسنا شروع کرے گا۔ اگر پہلے تین دن بچہ پستان کی نپل کو نہیں چوسے گا تو تین روز بعد بھی دودھ نہیں آئے گا اور بچہ بھوکا پیاسا رہے گا روئے گا چلائے گا نپل کو چوسنا شروع کرنے کے مزید تین دن بعد دودھ نصیب ہوگا۔

☆ جب بچے کو پیدائش کے تین دن بعد چھاتی سے لگایا جاتا ہے تو دودھ نہیں آتا ہے بچہ پہلے ہی تین دن کا بھوکا اور کمزور ہوتا ہے روتا ہے۔ چلاتا ہے ماں سمجھتی ہے کہ دودھ پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے پھر بچہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں دودھ پینے کی سکت ہی نہیں رہتی ہے اور ماں اسے مصنوعی دودھ پر ڈال دیتی ہے۔ جس سے تمام زندگی دودھ کے اخراجات اور بچے کے اکثر بیمار رہنے سے علاج کیلئے اخراجات کا بوجھ والدین کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ مصنوعی دودھ پینے والا بچہ زیادہ بیمار ہوتا ہے۔

☆ انسان کا دودھ انسانوں کیلئے اور جانوروں کا دودھ جانوروں کیلئے ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جانور کا بچہ دوسرے جانور کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق بچے کو پہلے چار ماہ تک صرف ماں کا دودھ دیا جائے حتیٰ کہ پانی بھی نہیں دینا چاہئے۔ یہی بچے کی صحت۔ صحیح نشوونما کیلئے انتہائی ضروری ہے جس کی ابتدا کلوٹر سے ہوتی ہے۔

لیکن اگر بچے کو پہلا دودھ (بوٹلی) نہیں دیا جائے گا تو بچہ پیدائش کے بعد نئے ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بیرونی ماحول کا درجہ حرارت کم اور آلودگی زیادہ ہوتی ہے جس کا مقابلہ کرنے کیلئے قوت مدافعت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو صرف خوراک کی صورت میں ماں کے

دودھ ہی سے میسر ہو سکتی ہے۔ بچے کو پہلے تین دن دودھ نہیں دیا جائے گا صرف گھٹی، پانی پر گزارہ ہوگا تو بچہ تقریباً 4-6 دن بھوکا رہنے سے انتہائی کمزوری محسوس کرے گا اور بیماریوں کی زد میں آ جائے گا بیدارش کے بعد معصوم بے بس نرم و نازک بچے کو چھ دن تک بھوکا رکھنا انتہائی ظلم ہے۔ کیونکہ پہلے تین دن کلوشرم آتا ہے پھر جب تین دن بعد بچے کو ماں کی چھاتی سے لگایا جاتا ہے تو چونے سے مزید تین دن بعد دودھ آتا ہے۔

کلاشرم (ماں کا پہلا دودھ) پلانے کیلئے فضول غلط روایات:

- ☆ ماں ڈلیوری کے بعد تھکی ہوئی ہوتی ہے اس لئے دودھ نہیں پلا سکتی۔
- ☆ ماں کو دودھ اترنے تک بریسٹ فیڈنگ کا انتظار کرنا چاہئے۔
- ☆ دودھ سے پہلے دیگر اشیاء معدہ صاف کرنے کے لئے ضروری ہیں۔
- ☆ فارمولا ملک بچے کی ضرورت کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔
- ☆ کلاشرم خراب دودھ ہوتا ہے جسے نکال کر ضائع کر دینا چاہئے۔
- ☆ چھاتی کا دودھ پلانے سے ماں کمزور اور چھاتی ڈھلک جاتی ہے۔

ماں کے دودھ میں ضروری اور اہم اجزاء

Potassium	ii- پوٹاشیم	FAT	i- فیٹ (روغنیات)
Protein	iv- پروٹین	Lactose	iii- لیکٹوز
Vitamin-A	vi- وٹامن اے	Vitamin-D	v- وٹامن ڈی
Vitamin-C	viii- وٹامن سی	Vitamin-K	vii- وٹامن کے
Iron	x- آئرن (فولاد)	Vit. B1-B2-B6-B12	ix- وٹامن بی کمپلیکس
Phosphorus	xii- فاسفورس	Zinc	xi- زنک
Sodium	xv- سوڈیم	Calcium	xiii- کیلشیم

مندرجہ بالا اجزاء کے علاوہ ماں کے دودھ میں اور بھی بہت سے مفید اجزاء شامل ہوتے ہیں مثلاً اینٹی باڈیز، لیکٹو فیرین، امینو گلوٹامین، لائوسوزائم، اینٹی انفیکٹو، فیکٹر اور امیونٹی وغیرہ۔ یہ مندرجہ بالا ماں کے دودھ میں شامل اجزاء بے بی کی نشوونما اور ابتدائی خوراک کے طور پر انتہائی مفید اور ضروری ہیں یہ اجزاء صرف ماں کے دودھ میں ہی صحیح نسبت سے شامل ہوتے ہیں۔

مصنوعی دودھ **Artificial Feed** (بوتل کا دودھ) کتنا ہی اچھا اور بہتر کیوں نہ ہو پھر بھی ماں کے دودھ کی نسبت گھٹیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی تیاری کے مراحل میں گزرنے سے اصلیت میں کمی آجاتی ہے مثلاً دودھ مختلف مقامات سے اکٹھا کرنا۔ مختلف مراکز پر خراب ہونے سے بچانے کیلئے کیمیکل کا استعمال۔ مختلف جگہوں سے اکٹھا کرنے کے بعد خوب گرم کر کے ٹھوس بنانا۔ خشک پوڈر کی صورت میں تیار کرنا۔ پوڈر کی صورت میں خراب ہونے سے بچانے کیلئے کیمیکل بطور پریزرویٹو **Preservative** کا استعمال وغیرہ سپلائی کے بعد اس کا استعمال بھی ایک دو سال بعد ہی ممکن ہوتا ہے مارکیٹ میں گھٹیا۔ جعلی اور ملاوٹ کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔

Fat: ماں کے دودھ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے صبح کے وقت بہت کم اور دوپہر کے بعد بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے ماں کے دودھ میں **Fat** کی مقدار بڑھتی رہتی ہے بعض دفعہ پانچ گنا زیادہ ہو جاتی ہے ماں کے دودھ میں **Enzyme Lipase** کی کمی ہونے کی بنا پر **Fat** بہت جلد استعمال میں آجاتی ہے یہ انزائم بچے کی انتڑیوں پر اثر انداز ہو کر **Fat** کے انجذاب کا باعث ہوتے ہیں۔

Lactose: صرف انسانی دودھ میں لیکٹوز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکٹوز انزائم کے زیر اثر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوکوز شوگر کے انداز میں تیزی کے ساتھ جسم کو طاقت پہنچاتی ہے اور دماغ کی تیزی کے ساتھ نشوونما ہوتی ہے مزید انتڑیوں کی تیزابیت کو بڑھاتے ہیں جس سے بیماری کے جراثیم **Pathogenic Organism** رک جاتے ہیں۔

Protein: ماں کے دودھ میں موجود پروٹین بہت جلد ہضم ہو جاتے ہیں اور گائے کے دودھ کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں ماں کا دودھ معدہ میں جا کر فوراً **Crud** کی مانند ہو جاتا ہے اور اجزاء میں منقسم ہو جاتا ہے دیگر دودھ کے علاوہ صرف ماں کے دودھ میں دو امائنو ایسڈ **Cystine** اور **Tourine** بھی پایا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ابتدائی تین یوم کے دودھ کو **Colostrum** میں پروٹین تین گنا زیادہ پائی جاتی ہے ماں کے میچور **Mature** (ہر لحاظ سے مکمل) دودھ میں تمام ضروری دس امائنو ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔

A: ماں کے دودھ میں وٹامن اے **280-iu** انٹرنیشنل یونٹ ہوتے ہیں جبکہ

گائے کے دودھ میں صرف 180-iu ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پہلے ابتدائی دو ایام یعنی کلو سٹرم میں ان کی مقدار گنی ہوتی ہے۔

وٹامن ڈی D: ماں کے دودھ میں وٹامن ڈی بے بی کی ضرورت کے مطابق موجود ہوتا ہے۔
وٹامن ای E: ماں کے دودھ میں گائے کے دودھ کی نسبت بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ابتدائی دو دنوں میں یعنی کلو سٹرم دودھ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔
وٹامن کے K: ماں کے دودھ (بریٹ فیڈنگ) میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وٹامن کے Vit-K ماں کے دودھ میں ابتدائی ایام میں زیادہ ہوتا ہے لیکن کلو سٹرم میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ وٹامن کے k خون کے جمنے Blood Clotting کیلئے ضروری ہے۔

وٹامن بی کمپلیکس B₁-B₂-B₆-B₁₂: ماں کے دودھ (بریٹ فیڈنگ) میں بے بی کی روزانہ ضروریات کے مطابق وٹامن بی کمپلیکس (بی ون، بی ٹو، بی سکس، بی ٹو الیو) موجود ہوتا ہے۔

وٹامن سی C: ماں کے دودھ میں 43mg/100ml وٹامن ہوتا ہے جبکہ گائے کے دودھ میں 21mg/100ml ہوتا ہے وٹامن سی پیٹ میں خوراک کے اجزاء مثلاً فولاد Iron وغیرہ کے انجذب کیلئے انتہائی ضروری ہے وٹامن سی کی صحیح موجودگی کی وجہ سے جسم میں فولاد کے جذب ہونے میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے بھی کام کرتا ہے۔

فولاد آئرن Iron: ماں کے پیٹ میں 49% فولاد استعمال ہوتا ہے جبکہ گائے کے دودھ میں 4% جذب ہوتا ہے ماں کے دودھ میں موجود وٹامن سی اور لیکٹوز فولاد کے جذب ہونے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں پیدائش کے بعد بچے کو فولاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پیدائش کے وقت بے بی کا ہیموگلوبین 12-18g/dl ہوتا ہے جو بے بی کی پیدائش کے بعد تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بے بی کے جسم میں ذخیرہ شدہ آئرن بھی 6-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے اس لئے بچے کی صحیح نشوونما کیلئے ماں کا اپنا دودھ انتہائی ضروری ہے۔

دیگر معدنیات: ماں کے دودھ میں زنک، کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم اور پوٹاشیم موجود ہوتے ہیں۔ یہ معدنیات ماں کے دودھ میں قلیل مقدار میں ہوتی ہیں لیکن گائے کے دودھ میں زیادہ ہوتی ہیں ماں کے دودھ پینے سے ان معدنیات کی تھوڑی مقدار کی بناء پر بے بی کے گردوں پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ہے۔

دودھ پیدا ہونے کے اسباب

چھاتی میں دودھ کی پیداوار بڑھنے کیلئے وہ اسباب ہیں جو ہارمون کے زیر اثر ہیں جو بچے چھاتی کے چھاتی کا دودھ پینے سے پیدا ہوتے ہیں۔

Oxytocin اوکسی ٹوسین B

Prolactin پرو لیکٹین A

پرو لیکٹین Prolactin: اس ہارمون سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے بچہ چھاتی کا دودھ پیتا ہے ایک حد تک دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے Milk Production reflex

اوکسی ٹوسین Oxytocin: اس ہارمون کے زیر اثر دودھ زیادہ اترتا ہے جس کی وجہ بھی صرف بچے کا چھاتی کا دودھ ہی پیتا ہے۔ جب بچہ چھاتی کا دودھ پیتا ہے تو اس سے ہارمون پیدا ہونے کے باعث دودھ زیادہ اترتا ہے۔ Milk Ejection or let down reflex

ماں کے دودھ کے فوائد

Advantages Breast Feeding

- | | |
|--|---|
| چھاتی کے دودھ کے بچے Infant کو فوائد | A |
| چھاتی کے دودھ کے خود ماں Mother کو فوائد | B |
| چھاتی کے دودھ کے خاندان Family کو فوائد | C |
| چھاتی کے دودھ کے ملک Country کو فوائد | D |
| ماں کا دودھ براہ راست آتا ہے انفیکشن کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ | ☆ |
| ماں کا دودھ تازہ، خالص اور جسمانی درجہ حرارت کے مطابق ہوتا ہے۔ | ☆ |
| بریسٹ فیڈنگ (چھاتی کا دودھ) فطری عمل ہے۔ | ☆ |
| بچے کی نشوونما کیلئے غذائیت سے بھرپور ہے۔ | ☆ |
| ماں اور بے بی میں اپنائیت قربت اور محبت بڑھتی ہے۔ | ☆ |
| ماں کے دودھ سے بے بی کو قوت مدافعت مل جاتی ہے۔ | ☆ |

- ☆ بچے تندرست چست اور ذہین ہوتے ہیں۔
- ☆ بچے کو انسانی درجہ حرارت کے مطابق دودھ ملتا ہے۔
- ☆ اکثر ماؤں میں خود بخود فیملی پلاننگ بھی ہوتی رہتی ہے۔
- ☆ رات کو دودھ تیار کرنے کیلئے ماں کے آرام میں خلل نہیں پڑتا ہے۔
- ☆ بچے کو کبھی ٹھنڈا دودھ پینے سے سانس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔
- ☆ بے بی ماں کے ساتھ لپٹ کر جسمانی درجہ حرارت سے مطمئن ہوتا ہے
- ☆ انسان کا دودھ انسان کے بچے کے لئے ہوتا ہے۔
- ☆ ماں کا دودھ مفت میسر ہونے سے مالی حالت پر اثر نہیں پڑتا۔
- ☆ ماں کا دودھ ہاتھوں برتنوں و دیگر آلودگی سے محفوظ رہتا ہے۔
- ☆ بچے کو پیٹ اور سانس کی بیماریاں بہت کم لگتی ہیں۔
- ☆ ماں کی خود اپنی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔
- ☆ جتنا زیادہ دودھ بچہ پئے گا خود بخود چوسنے سے زیادہ پیدا ہوگا۔
- ☆ ماں کے دودھ میں پروٹین اور چکنائی کو باسانی ہضم کر لیتا ہے۔
- ☆ بچے کو پیش کی امراض مثلاً پیچس وغیرہ کم لگتے ہیں۔
- ☆ بچوں کو کان کی بیماری Otitis media کم ہوتی ہے۔
- ☆ بچہ دن میں جب بھی دودھ پئے گا درجہ حرارت برقرار پائے گا۔
- ☆ بچے کا سب سے قریبی تعلق اپنی والدہ ہی سے ہوتا ہے۔
- ☆ بے بی اپنی ماں کے جسم کی بو سے ماں کو پہچانتا ہے۔
- ☆ ماں کا دودھ بے بی کیلئے ہر وقت باسانی دستیاب ہوتا ہے۔
- ☆ ماں کے دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء ہوتے ہیں
- ☆ جانور کا دودھ جانور کے بچے کے لئے ہوتا ہے۔
- ☆ ماں کا دودھ بچے کی طلب پر فوری اور تازہ دستیاب ہوتا ہے۔



مصنوعی دودھ (فارمولا ملک)

بوتل کے دودھ کے نقصانات

Desadvantages of Artificial Feeding

مصنوعی دودھ (بوتل کے ذریعے) پلانے کے نقصانات۔

☆ بے بی کو دودھ پلانے کا قدرتی طریقہ نہیں ہے دودھ تازہ اور خالص میسر نہیں ہو سکتا ہے۔

☆ بے بی کی اپیدائش کے بعد غذائی ضروریات پوری نہیں کرتا ہے۔

☆ یہ دودھ پینے کے دوران اپنا درجہ حرارت (گرمائش) برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔

☆ سردیوں کے دوران مصنوعی دودھ پینے کے دوران جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

☆ بعض مائیں سردیوں کے موسم میں بچا ہوا دودھ بغیر گرم کئے ہی پلا دیتی ہیں۔

☆ ٹھنڈا دودھ پینے سے سانس کی تکلیف اور نمونیہ ہو سکتا ہے۔

☆ سفر کے دوران تمام راستے ایک ہی فیڈر بار بار بچے کو دیا جاتا ہے جس کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔

☆ جو مائیں اپنے بچوں کو چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی ہیں انہیں خود چھاتی کے کینسر کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔

☆ بچے میں بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی کی بنا پر زیادہ بیماریاں لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔

☆ مصنوعی دودھ سوتے میں پلانے سے کانوں کی تکلیف اٹائٹس میڈیا Otitis Media ہو جاتی ہے۔

☆ مصنوعی دودھ بہت کم ہضم ہوتا ہے بچے کے ذریعے ضرورت پوری کئے بغیر جلدی خارج ہو جاتا ہے۔

☆ بچہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔

☆ نپل کا سوراخ ضرورت سے بڑا ہونے سے دودھ سانس کی نالی میں جانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔

☆ بوتل کے ذریعے مصنوعی دودھ پینے سے بچے کے دانت اور جبڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔

☆ اکثر دودھ پیتے وقت فیڈر پر دودھ اور کھیاں بیٹھتی رہتی ہیں جو بیماریوں کا سبب ہوتی ہیں۔

☆ بچے کو اکثر پیٹ کی تکلیف رہتی ہیں اور پچس لگتے رہتے ہیں۔

☆ مصنوعی دودھ کے استعمال سے ماں اور بے بی کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے۔

☆ مصنوعی دودھ میں ماں کے دودھ کی مانند اہم اجزاء صحیح نسبت میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔

☆ رات کو مصنوعی دودھ تیار کرنے کیلئے ماں کے آرام اور نیند میں خلل پڑتا ہے۔

☆ مصنوعی دودھ پلانے کیلئے دن رات کسی وقت بھی محنت کرنا پڑتی ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے۔

☆ مطلوبہ مصنوعی دودھ بعض جگہوں اور عام میڈیکل سٹور پر مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔

☆ جانوروں کے دودھ میں گوالوں، برتنوں، گندھے ہاتھوں، کیمیکل اور جوہروں تالابوں کا گندہ پانی ملانے سے بہت زیادہ آلودگی شامل ہو جاتی ہے جو نرم و نازک اور معصوم بچے کی صحت کیلئے انتہائی مضر ہے دودھ کو محفوظ کرنے کیلئے انتہائی معزز صحت کیمیکل استعمال کئے جاتے ہیں جو بچے کے لئے انتہائی خطرناک ہیں۔ دودھ گرم کرنے اور ابالنے سے بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔

☆ مطلوبہ اور مارکیٹ میں متعارف دودھ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

☆ مارکیٹ۔ سٹور۔ دکان سے گھنٹا، جعلی ملاوٹ شدہ اور نمبر 2 بھی ملنے کے امکانات

ہوتے ہیں۔

☆ مزدوری، تنخواہ۔ خون سپینے کی آمدنی کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔

مصنوعی دودھ مہنگا ہوتا ہے جس کے اخراجات کا خاندان پر بہت اثر پڑتا ہے۔ جب غیر ممالک سے دودھ درآمد کیا جاتا ہے تو ملکی زر مبادلہ ضائع ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 5 ارب کا مصنوعی دودھ منگوایا جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ نقصان ہے۔

دودھ پلانے کی مقدار اور وقفہ

نئی تحقیقات کے مطابق بے بی کو اس کی ضرورت اور خواہش کے مطابق دودھ دیا جائے جب صحت مند بے بی رونے لگے تو اس کا زیادہ تر مقصد ہوتا ہے کہ بے بی بھوکا ہے اور بھوک کی بنا پر بلک رہا ہے لہذا جتنا دودھ بے بی اپنی خواہش سے ضرورت کے مطابق پی سکے پلایا جائے اسی طرح جب وہ دوبارہ رو کر اظہار کرے اسے دودھ پلایا جائے پرانی تحقیق کے مطابق 3-4 گھنٹے بعد بے بی کو ضرور دودھ پلایا جاتا تھا لیکن اب نئی تحقیق کے مطابق 6-7 ہفتے کے بے بی کو اس کی اپنی طلب پر دودھ پلایا جائے۔ لیکن دن رات 24 گھنٹوں میں 8-10 دفعہ ضرور پلایا جائے۔

بے بی کا چھاتی کا دودھ پینا

کوشش کی جائے کہ بے بی کو روزانہ دونوں پستانوں سے بدل بدل کر دودھ پلایا جائے بعض بے بی دودھ پیتے وقت کافی دیر لگاتے ہیں لیکن اکثریت پہلے پانچ منٹ ہی میں دودھ پی لیتے ہیں بعد میں ویسے ہی لطف اندوزی کیلئے نپل کو چوستے رہتے ہیں بے بی کا نپل کو اسی طرح زیادہ سے زیادہ چوسنا دودھ کی پیداوار میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے اگر بے بی ایک طرف سے دودھ پیتے ہی سو جائے۔ تو دوسری بار دوسرے پستان سے دودھ پلایا جائے بچے کے منہ میں دودھ پلانے کیلئے زبردستی نپل نہ دی جائے بلکہ بے بی اپنی ضرورت کے تحت خود ہی اپنے آپ نپل تلاش کر کے دودھ پینا شروع کر دے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں کو چاہئے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ابتدائی اور پہلا دودھ ضائع نہ کرے کیونکہ پہلے ابتدائی دویوم کے اندر کولوسٹرم Colocstrum کہتے ہیں اور اس میں درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔

- ☆ یہ بے بی کی ابتدائی دنوں کیلئے قدرتی طور پر ضرورت کے عین مطابق ہوتا ہے۔
- ☆ جد تحقیق کے مطابق بے بی کیلئے کولوسٹرم ابتدائی اہم ضرورت ہے۔

- ☆ کولوسٹرم میں تین گنا زیادہ پروٹین ہوتے ہیں۔
- ☆ کولوسٹرم میں دو گنا وٹامن اے ہوتے ہیں۔
- ☆ کولوسٹرم میں وٹامن ای E زیادہ پایا جاتا ہے۔
- ☆ پیدائش کے بعد بے بی اے سے پنے کے بعد باسانی ہضم کر سکتا ہے۔
- ☆ عام دنوں کے دودھ کی نسبت اس میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔
- ☆ اس سے بیماریوں سے بچاؤ کیلئے قوت مدافعت ملتی ہے۔
- ☆ یہ ابتدائی طور پر مدافعتی ٹیکے کا کام دیتا ہے۔
- ☆ کولوسٹرم میں وٹامن K زیادہ موجود ہوتا ہے۔

دیے بھی جب بے بی پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے تین دن زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بے بی کی پیدائش کے بعد جو ابتدائی 3-2 دنوں کا دودھ زرد رنگت کا ہوتا ہے جسے کولوسٹرم کہتے ہیں۔ یہ کافی رہتا ہے اور یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جب بے بی کولوسٹرم کو چوس کر پئے گا تو اس کے دواہم فوائد حاصل ہوں گے ایک تو بچے کی ضرورت اور غذائی ضرورت پوری ہوگی دوسرے نمبر پر نیل کو چوسنے پر ہارمون پیدا ہونگے جن کے اثرات سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جس سے تین دن کے بعد بھی بچے کو حسب ضرورت ماں کے دودھ کی مقدار میسر ہوتی رہے گی۔

بریسٹ فیڈنگ کی ممنوعات

Contraindication to Breast Feeding

- ☆ چھاتی کا کینسر ☆ پستان میں پیپ پڑنا
- ☆ پستان پر چوٹ ☆ پستان کا آپریشن
- ☆ علاج کیلئے خاص ادویات کا استعمال ☆ تشنج (ٹیکس) کی بیماری کا بھرپور حملہ
- ☆ ایڈز ☆ باولا پن (آخری سٹیج - پانی سے خوف)
- ☆ زہر خوردنی - زہریلے اثرات ہو جانا ☆ پیٹ اور چھاتی کا جل
- ☆ مانع حمل کیلئے دودھ پلانے کے دوران ممنوع ٹیکہ لگوا لینا۔

دودھ کی زیادتی: بعض دفعہ ہارمونز Hormones کے زیر اثر یا عورت کے دیگر نظام میں خرابی کی بنا پر دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بے بی کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ اس اضافہ سے دودھ میں غذائی کمی بھی آسکتی ہے جو پرورش میں کمی کا باعث ہو سکتی ہے اگر دودھ کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کی علامات ہوں تو بریسٹ پمپ Breast Pump کے ذریعے دودھ نکال کر ضائع کر دیا جائے تاکہ پستان میں بوجھ نہ رہے اور دودھ خود بخود پستان سے ہر وقت رستانہ رہے۔

دودھ میں کمی: ہارمون کے اثرات عورت کے جسمانی نظام کی خرابی۔ جسمانی کمزوری کی بنا پر دودھ کی پیداوار میں کمی آسکتی ہے دودھ کی پیداوار میں کمی بچے کی نشوونما (گروتھ) میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے ہارمون کے اثرات کے علاوہ عورت کو دودھ کی کمی درج ذیل وجوہات کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے۔

☆ زچہ کو ضرورت کے مطابق اچھی خوراک میسر نہ ہونا۔

☆ پہلے بچوں کی زیادہ تعداد سے کمزوری ہونا۔

☆ خون کی کمی (انیمیہ) Anaemia۔

☆ مالی حالت بہت خستہ فاقہ کشی سے دن گزارنا۔

☆ دن رات محنت مشقت مزدوری کرنا۔ تھکاوٹ۔

☆ ذہنی پریشانی غم تفکرات۔ گھریلو پریشانیاں۔

☆ پیدائش کے بعد دیر سے دودھ شروع کرنا۔

☆ بچے کو اپنے دودھ کے علاوہ دیگر اشیاء بھی جاری رکھنا۔

☆ بچے کو دودھ پلانے کے دوران زیادہ وقفہ ہونا۔

☆ ماں خود ہی دودھ چھڑانا چاہتی ہو۔

☆ زچہ کو متوازن خوراک کی کمی ہونا۔

☆ شدید جسمانی کمزوری نقاہت۔

☆ لمبریا، ٹامیفائیڈ۔ یرقان وغیرہ ہو جانا۔

☆ ایک سے زائد بچوں کی بریسٹ فیڈنگ

علاج Treatment

دودھ کی کمی پوری کرنے کیلئے زچہ (ماں) کا طبی معائنہ کروایا جائے تشخیص کے بعد عورت کے علاج اور خوراک پر خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ ماں کی صحت پر بے بی کی پرورش کا انحصار ہوتا ہے ماں کو چاہئے کہ دودھ میں کمی کے پیش نظر بچے کو دودھ پلانے سے پہلے خود ایک گلاس پانی یا ایک گلاس لسی کا ضرور پئے خود روزانہ دو گلاس دودھ ضرور پیئے۔ جدید تحقیق کے مطابق ضروری ہے کہ خوراک اور اس میں موجود اجزاء کے جسم میں زیادہ سے زیادہ انجذاب کیلئے وٹامن سی Vit-C ضروری ہے اس لئے سردیوں کے موسم میں روزانہ ایک عدد کنو، مسکی، فروٹر ضروری کھایا جائے (جس پینے کی بجائے پھل ویسے ہی کھانا چاہئے) اگر گرمیوں کے موسم میں ایک عدد لیموں روزانہ استعمال کیا جائے اس سے اور آسان طریقے سے صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی وٹامن سی کی وجہ سے فولاد کا انجذاب بڑھ جائے اور خون زیادہ پیدا ہوگا۔

زچہ عورت متوازن خوراک میں روزانہ ایک گلاس دودھ اور ایک گلاس دہی لسی اور ایک انڈہ ضرور استعمال کرے موٹی پھلوں، سبزیوں، دالوں اور گوشت کو استعمال میں لائے۔ کیونکہ ایک جسم پر دو جانوں کا انحصار ہے۔ اسی حساب سے خوراک بھی دوگنی استعمال کرنی چاہئے یہی سب سے بہتر اور اچھا ہے اگر بچہ صرف اپنی ماں کے دودھ کے استعمال سے چھ سے زائد مرتبہ روزانہ دودھ بڑھانے کیلئے درج ذیل میڈیسن بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

ادویات Medicines

☆ گولی لار جیکٹیل Tab Largectil

☆ گولی میٹرنات Tab Maternat

☆ ایک دن چھوڑ کر ایک گولی رات کو، ایک گولی روانہ

☆ بے بی کی طرف سے بریسٹ فیڈنگ میں مشکلات

☆ بے بی کو پیدائش کے بعد بریسٹ فیڈنگ میں درج ذیل مشکلات ہو سکتی ہیں۔

☆ نالو پیداؤشی طور پر کشا ہوا ہوتا

☆ بچے کی دماغی جسمانی ساخت مکمل نہ ہونا

☆ زبان کا چھوٹا ہونا یا دیگر کسی وجہ سے نکل تک نہ پہنچنا

- ☆ بچے کی وقت سے پہلے ہی پیدائش ہونا
- ☆ بچے کا بے ہوش یا نیم بے ہوش ہونا
- ☆ بچے کا ذہنی توازن صحیح نہ ہونا۔

ماں کی طرف سے دودھ پلانے میں مشکلات

Maternal Breast Feeding Problems

Engorgement	انگورجنٹ	A
Sore or Cracked Nipple	زخمی نپل	B
Mastitis	پستان کی سوزش	C
Insufficient Milk	مقدار میں کمی	D
Multiple Birth	جڑواں بچے	E
Sick Mother	بیمار ماں	F
	نپل کا چھوٹا ہونا	G
	نپل کا بڑا ہونا	H
	اندر کو مڑی ہوئی نپل ہونا	I
	بڑی نپل کا صحیح نہ ہونا	J

مندرجہ بالا صورتوں میں بریسٹ پمپ Breast Pump سے دودھ نکال کر بچے کو دیا جائے پستانوں سے تمام کا تمام دودھ حسب ضرورت نکال لیا جائے اور بے بی کو دے دیا جائے تمام دودھ اس لئے بھی نکال لینا چاہئے تاکہ دودھ کی پیداوار میں کمی نہ آئے اگر کچھ دودھ چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ خود بخود پستانوں میں دودھ کم ہوتا چلا جائے گا اس لئے جب بھی بچے کو دودھ دینے کی ضرورت ہو تو بریسٹ پمپ کی مدد سے تمام نکال کر استعمال میں لانا چاہئے۔ اگر نپل چھوٹی یا مڑی ہوئی ہو تو ہاتھ کی دو پہلی انگلیوں کو سیدھا کر کے ان میں پست کی جانب سے نپل کو پکڑ کر باہر کھینچنے کی روزانہ پریکٹس کر کے صحیح کرنا چاہئے۔

بے بی کا دودھ باہر نکالنا

بعض بے بی ماں کا دودھ پینے کے تھوڑی دیر بعد دودھ باہر نکال دیتے ہیں اس کا علاج بالکل آسان ہے جب بے بی کو دودھ پلا چکے تو بے بی اپنے کندھے اور چھاتی سے لگا کر کمر کی طرف سے بے بی کو ہاتھ سے تھپتھپائے اس طرح معدے میں موجود زائد ہوا باہر نکل جاتی ہے۔ بے بی پیایا گیا دودھ تے یا مٹلی کی صورت میں باہر نہیں نکالتا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے تو چوسنے کے ساتھ ہوا بھی معدے میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ ہوا باہر نکلتی ہے تو ساتھ دودھ وغیرہ بھی بچے کے منہ سے باہر آ جاتا ہے دودھ پلانے کے فوراً بعد بے بی کی کمر پر ہاتھ سے نرمی اور آہستہ آہستہ ٹھوکر لگانے یا تھپتھپانے سے معدے سے ہوا نکل جاتی ہے اور پھر بعد میں دودھ باہر نہیں نکلتا ہے۔

چوسنی کے مضر اثرات

بے بی کو بہلانے کیلئے چوسنی منہ میں دینا غلط اور انتہائی صحت کیلئے مضر طریقہ ہے۔ اس چوسنی کے استعمال سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس سے بے بی کی صحیح پرورش اور نشوونما میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

☆ بچے کو اکثر دست لگے رہتے ہیں گیس بھر جاتی ہے

☆ بچہ کمزور اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے

☆ پیٹ کی خرابی۔ کیڑوں کی شکایت رہتی ہے۔

☆ مکھیوں کے منہ اور چوسنی پر بیٹھنے سے ٹائیفائیڈ بخار ہو جاتا ہے

☆ بچے کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔

☆ دانت نکلتے وقت نقصان دیتی ہے انفیکشن کا باعث ہوتی ہے

☆ خوراک صحیح ہضم نہیں ہوتی ہے ویسے ہی دستوں کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔

☆ بچہ اپنے آپ میں مست رہتا ہے ارد گرد کے ماحول سے سیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔

☆ اس لئے ماں کو سختی کیس اتھ ہدایت کی جائے کہ بچے کی اچھی صحت اور بہتر نشوونما کیلئے

آئندہ چوسنی کا استعمال بالکل ترک کر دے اگر چوسنی موجود ہو یا زیر استعمال ہو تو اسے اتار کر فوراً

ضائع کر کے پھینک دیا جائے۔ ماں کو اخلاق کے ساتھ سمجھا کر مطمئن کر دیا جائے کیونکہ چوسنی سے

کئی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔



نیل کا زخمی یا پھٹ جانا

نیل کے نیل کا زخمی یا پھٹ جانا ایسی صورت میں ہوتا ہے جب دودھ پلانے کی درست نہ ہو، چوسنی کے طور پر نیل کو بار بار منہ میں دینا، تنگ کپڑے پہننا وغیرہ



چھاتیوں کا دودھ سے بھرنا

بچہ کی پیدائش کے بعد عموماً ایسا شروع کے چند ہفتوں میں ہوتا ہے جب بچہ کمزور ہو اور ٹھیک سے دودھ پی سکتا ہو تو عموماً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھرنا ہوتا ہے تو ایسے میں دودھ کو چھاتیوں سے نکال لینا چاہیے۔

چوسنی کو تقریباً کبھی بھی دھو کر استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس پر گندگی جمع ہوتی رہتی ہے۔ وقت تھوک سے تر رہتی ہے اوپر سے لکھیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ جب بھی بچہ روتا ہے اس کو بہلا کر کیلئے منہ میں چوسنی ٹھونس دی جاتی ہے۔ یہ عمل بار بار استعمال ہونے کا لگا کار چوسنی کے خود تارک ہو۔ نے تک جاری رہتا ہے۔

چوسنی کے استعمال کے بے بی کی صحت پر بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔

زخمی یا پھٹا ہوا نپل

Sore of Carcked Nipple

وجوہات Causes

- | | |
|---|---|
| A | دودھ پیتے وقت بچے کی پوزیشن صحیح نہ ہونا |
| B | چھاتی کے زیادہ بھرنے کی وجہ سے نپل کو منہ میں نہ لے سکتا۔ |
| C | چوسنی کے طور پر نپل کو بچہ کے منہ میں بار بار دینا۔ |
| D | بچہ اگر بہت زور سے چوستا ہو۔ |
| E | نپل کو صاف کرنے کیلئے صابن یا دوسرے کیمیکل استعمال کرنا۔ |
| F | تھرش Thrush کا انفیکشن ہونا |
| G | تنگ کپڑے پہننا |
| H | بچے کا نپل کو دانتوں سے کاٹ لینا |

اقدامات Managment

- | | |
|---|---|
| ☆ | بچے کو صحیح رخ گود میں لے کر دودھ پلایا جائے۔ |
| ☆ | چھاتی کا دودھ پلانے کے بعد انگلی بچے کے منہ میں ڈال کر علیحدہ کرنا۔ |
| ☆ | تھرش Thrush کا علاج کرنا چاہئے۔ |
| ☆ | بچے کو کم وقت کے لئے بار بار دودھ پلائے |
| ☆ | دودھ پلانے کے بعد نپل کو ہوا میں خشک ہونے دیجئے۔ |
| ☆ | متاثرہ نپل پر اپنا ہی دودھ لگا کر ہوا میں خشک ہونے دیں۔ |

- ☆ دھیلے اور آرام دہ کپڑے پہنے جائیں۔
 ☆ وردوں کے لئے ایسی ادویات استعمال کریں جو دودھ پر اثر انداز نہ ہوں
 ☆ چھاتی کو صابن سے مت دھوئے کریم مت لگائیں۔
 ☆ بچے کو چھاتیوں پر صحیح طریقے سے لگائے اور طرف بدلتے رہے۔

چھاتیوں کا بھرنا

Engorgment of Breast

وجوہات Causes

- A چھاتیوں کی جانب خون اور لمف کا زیادہ آنا
 B دودھ کا اکٹھا ہونا۔
 C ماں کا صحیح وقت پر دودھ نہ پلانا
 D ہر فیڈ پر چھاتی کا اچھی طرح سے خالی نہ ہونا۔

اقدامات

- 1- جلد جلد دودھ پلائیں اور ہر دفعہ چھاتیوں کو خالی کر دیں۔
 - 2- اگر زیادہ بھرنے سے نپل بند ہو گیا ہے تو تھوڑا سا دودھ ہاتھ سے نکالیں۔ اور پھر بچے کو چھاتی سے لگائیں تاکہ بچے کو پینے میں آسانی رہے۔
 - 3- گرم پانی کی ٹکڑ کر دیں۔
 - 4- سہارا دینے والی بریڈر استعمال کریں۔
- احتیاطی تدابیر: A دن اور رات میں بار بار دودھ پلائیں۔
 B اگر بچہ پاس نہ ہو تو چھاتی کو ہاتھ سے ہی خالی کر دیں۔

متورم چھاتیاں:

بعض ماؤں کی چھاتیوں میں بہت زیادہ دودھ بنتا ہے اور ایسا عموماً پیدائش کے پہلے چند ہفتوں میں ہوتا ہے۔ اگر بچہ کمزور رہے تو وہ زیادہ دودھ نہیں پئے گا اور چھاتیاں خالی نہیں ہوں

گی۔ تو وقتی طور پر چھاتیاں دودھ کی وجہ سے سوج جائیں گی اور ماس ہی بہت تکلیف محسوس کریں گی چھاتیاں سخت ہو جائیں گی اور بچہ دودھ نہیں پی سکے گا اگر ایسا ہے تو ماں کی چھاتیوں سے فالٹو دودھ نکال دینا چاہئے۔ اور سوجنے کا علاج بھی کرنا چاہئے۔

چھاتیوں سے دودھ نکالنا:

اگر ماں کی چھاتیوں میں دودھ زیادہ مقدار میں بن رہا ہو تو ماں کو یہ سیکھنا چاہئے کہ اسے کیسے نکالا جائے ماں کو بتایا جائے کہ وہ پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئے اب وہ ایک پیالے اور دونوں ہاتھوں کی بند سے چھاتی کو آہستہ آہستہ دبا کر دودھ نکال لے یا در ہے کہ دودھ دونوں چھاتیوں سے نکالنا چاہئے جب چھاتیاں خالی ہو جائیں تو وہ نرم ہوں گی اگر ایک بھری ہوئی چھاتی کو خالی نہ کیا جائے تو دودھ کی مقدار بڑھنا کم ہو جائے گی اس دودھ کو مختلف طریقوں سے بچوں کو پلایا جاسکتا ہے۔

دکھتے ہوئے نپل Sore Nipple:

ماں کے نپل بہت حساس ہوتے ہیں اگر ان کی جلد بہت نرم ہو اور بچہ بہت زور لگا کر یا دبا کر دودھ پئے تو یہ دکھنے لگتے ہیں عام طور پر ایسا عورتوں میں ہو جاتا ہے جن کی چھاتیاں سوجی ہوئی ہوں یا نپل چھپے ہوں اور بچے کو نپل منہ میں لینے کے لئے بہت کوشش کرنی پڑتی ہو بعض دفعہ یہ تکلیف چھاتی کے زخم یا نپل پر زخمی لکیریں بننے کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ یہ زخمی لکیریں یا کر یک بچے کا کائے کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ بعض دفعہ اس کا سبب کسی قسم کا جراثیم اثر بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس تکلیف سے بچنے کیلئے ماں کو چاہئے کہ وہ چھاتیاں اور نپل بالکل صاف رکھے یا یہ بھی احتیاط کریں کہ بچہ ایک ہی چھاتی سے زیادہ وقت تک دودھ نہ پیتا رہے بلکہ دونوں چھاتیوں سے باری باری پلائیں تاکہ ان پر دباؤ کم رہے اور یہ بھی یقین کر لیں کہ بچے کے دودھ پینے کے بعد چھاتیاں خالی ہو گئیں ہیں اور نپل کو ہوا میں خشک ہونے دیں۔

دکھتے ہوئے نپلوں کا علاج چھاتیوں کو دودھ سے خالی رکھ کر کریں ان سے بچے کو دودھ نہیں پلایا جاسکتا کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اس لئے ماں کو چاہئے ان سے دودھ نکال کر بچے کو پلائے اور ان نپلوں پر کوئی مرہم نہ لگائے اپنا ہی دودھ اوپر لگا کر ہوا میں خشک ہونے دیں تاکہ انہیں جلدی آرام آجائے اور اگر چھاتیوں میں درد ہے تو کوئی درد کو رفع کرنے والی گولی بھی مثلاً اسپرین یا

امراض پستان اور ان کے علاج
پیراٹامول استعمال کی جاسکتی ہے۔ درد کے لئے ایسی میڈیسن استعمال کرنی چاہئے جو دودھ میں
کی کا باعث نہ بنے۔

چھاتی کی سوزش Mastitis

دجوابات Causes

- A نالیوں کا بند ہونا B چھاتی کا بھر جانا۔
C نامکمل طور پر چھاتی کا خالی کرنا۔
D پھٹے ہوئے نیپل Creaked Nipple سے انفیکشن کا داخل ہونا۔
E تھکاوٹ یا خوراک کی کمی کی وجہ سے ماں میں کمزور قوت مدافعت۔

علاج Mananement

- A دودھ پلانے سے پہلے گرم پانی کی ٹگور کرنی چاہئے۔
B درد کے لئے ہلکی سی دوا مثلاً اسپیرین استعمال کی جاسکتی ہے۔
C دودھ پلانا جاری رکھنا چاہئے۔ ہر دفعہ سوزش والی چھاتی سے شروع کرنا چاہئے۔
D ماں کو زیادہ آرام کا موقع دینا چاہئے۔ لیٹ کر دودھ پلائے اور بہتر خوراک مہیا کرنا چاہئے۔
E کم از کم دس منٹ تک ہر چھاتی سے دودھ پلانا چاہئے۔ اگر پھر بھی خالی نہ ہو تو ہاتھ
سے دودھ نکالنا چاہئے۔
F مناسب اینٹی بائیوٹک دینا چاہئے۔
G اگر ضروری ہو تو چیرا دے کر پیپ خارج کر دی جائے۔

بریسٹ انفیکشن Breast Infection: عورتوں میں پستانوں Breast کی
انفیکشن اکثر سٹیفیلوکوکس Staphylococcus Aureus کی وجہ سے ہوتی ہے اس
جراثیم کی منتقل زیادہ تر بے بی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بریسٹ انفیکشن چھوٹے بچوں کی آنکھوں
کی انفیکشن اور جلد کا بیرونی طور پر پھٹ جانے سے ہو سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں
انفیکشن جراثیم Staphylococcus کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں سے باسانی دودھ پینے
وقت پستان Breast تک جراثیم پہنچ جاتے ہیں۔

چھاتی کی انفیکشن دو طریقوں سے ہوتی ہے۔

☆ پھٹی ہوئی نپل Cracked Nipple کے ذریعے پستانوں کے اندر بیولر ٹھونک پہنچتی ہے۔

☆ اگر بریسٹ میں پہلے ہی جراثیم موجود ہوں تو انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔

علامات Signs and Symptoms

پستانوں کی سوزش Mastitis پیور پریم Puerperium کے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن ڈلیوری کے بعد آٹھ دن کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ بریسٹ انفیکشن کا آغاز جلد ہوتا ہے۔ ٹمپریچر میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ ٹمپریچر 40°C سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے نبض تیز ہو جاتی ہے پستان Breast میں درد ہوتا ہے۔ ہاتھ لگانے سے سخت اور سوزش کی علامت محسوس ہوتی ہیں۔

A.S Dressing	B پٹی کرنا	Antibiotic	A اینٹی بائیوٹک
Stop Lactation	D دودھ پلانٹارو کننا	Antipyretic	C اینٹی پارائیک

علاج Treatment

آئنلجیزک Analgesic

گولی میکوپا رول 8-6 گھنٹے بعد ایک گولی
گولی پیرا سمول 8-6 گھنٹے کے بعد ایک

Tab. Paracetamol (Paracetamol 500mg)

ٹیمپلٹ پونستان: ایک گولی تین مرتبہ روزانہ
Tab Ponstan (Mefenamic Acid) 500mg)

ٹیمپلٹ پیناڈول: 8-6 گھنٹے بعد ایک گولی
Tab Panadol (Paracetamol 500mg)
ٹیمپلٹ نوپین: 8-6 گھنٹے بعد ایک گولی

Tab. Novalgin (Pyrazolone Magnesium) 500mg)

ٹیمپلٹ میڈی پرن 8-6 گھنٹے بعد ایک گولی
Tab. Mediprin

ٹیمپلٹ بیسرول 8-6 گھنٹے بعد ایک گولی
Tab. Beserol (Paracetamol)

Tab. Famidol

ٹیبلٹ فامیدول ایک گولی 3-4 مرتبہ روزانہ

Tab Dispirin

ٹیبلٹ ڈسپیرین ایک گولی 3-4 مرتبہ روزانہ

Tab Calpol (Paracetamol) 500mg

ٹیبلٹ کال پول 8-6 گھنٹے بعد ایک گولی

:Anti Biotic اینٹی بائیوٹک

Cap. Doxyn (Doxycycline) 100mg

100mg

کپسول ڈوکسین 2-1 کپسول روزانہ ایک کپسول تین مرتبہ روزانہ

Cap. Dalacin-C (Clindamycin) 150-300mg

کپسول سیکلور ایک کپسول صبح و شام (ceecclor) 250, 500 mg

کپسول فاسفومائی سینا ایک کپسول ہر آٹھ گھنٹے بعد

Cap- Fosfomycin (250, 500mg)

کپسول لنکوسین ایک کپسول 2-1 مرتبہ روزانہ

Cap. Lincocin (lincomycin) 500mg

کپسول مائوسین ایک کپسول 2-1 مرتبہ روزانہ

Cap. Minocin (Minociline HCL) 50, 100mg

کپسول ویلوسیف ایک کپسول ایک مرتبہ روزانہ

Cap. Velosef (Cephadrine) 250, 500mg

چھاتی کا کینسر

Breast Cancer

خواتین میں چھاتی کے کینسر کی بیماری باقی تمام اعضاء کے کینسر سے زیادہ ہے۔ یہ بیماری مردوں کو بھی ہو سکتی ہے لیکن عورت اور مرد میں تناسب 1:1000 کا ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری عورتوں کو 55 سال کی عمر کے قریب ہوتی ہے۔ اس عمر سے پہلے امکانات کم ہوتے ہیں۔ والدین کو بیماری ہو تو اولاد میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جسم میں ہارمون کی کمی بیشی کا کینسر کی

افزائش سے تعلق ہے۔ بعض وائرس بھی اس بیماری کا موجب ہو سکتے ہیں لیکن جو عورتیں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں ان میں یہ بیماری نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔

تشخیص Diagnosis

چھاتی Breast کے سرطان میں تشخیص کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ جتنی جلدی علاج کیا جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ بریسٹ کینسر میں سب سے زیادہ چھاتی کا اوپر والا اور باہر والا چوتھائی حصہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ کینسر بہت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اپنا سائز 9-12 ماہ کے اندر دو گنا کرتا ہے۔ گلٹی محسوس ہونے کے قابل ہونے تک 5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ کینسر کی گلٹی ہڈی کی طرح سخت اور کنارے بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ گلٹی بعض دفعہ تیزی اور کبھی آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس میں عموماً درد نہیں ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اوپر کی جلد کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے گھاؤ پڑ جاتے ہیں۔ نپل اندر کو دھنس جاتا ہے اس سے اگلی سٹیج میں بغل کے غدد متاثر ہو جاتے ہیں اور بغل میں گلیٹیاں بن جاتی ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری پیچھے ہٹوں اور جگہ تک پہنچ جاتی ہیں۔

علاج Treatment:

تشخیص کے لئے حساس ٹیسٹ میموگرافی Mammography ہے جس میں ایکس رے کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی گلٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔

☆ ہر مریضہ کے بارے میں انفرادی طور پر علاج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

☆ میٹر اور ابتدائی علاج سر جری Surgery ہے۔ جس سے کچھ متاثر حصے یا مکمل

پستان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔

☆ بغل کی گلیٹیاں موجود ہوں تو سر جری کے ذریعے وہ بھی نکال دی جاتی ہیں۔

☆ ٹیسٹ کروانے کے بعد شعاعیں لگانے کا فیصلہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

☆ ہارمون کا استعمال اور اینٹی کینسر میڈیسن بھی علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

Diet of Lactating دودھ پلانے والی عورت کی خوراک

Women: حاملہ عورت کی طرح دودھ پلانے والی عورت پر بھی دو زندگیوں کا انحصار ہوتا

بے بی کی صحیح نشوونما اور صحت کیلئے حسب ضرورت دودھ کا میسر ہونا ضروری ہے ویسے بھی پہلے 8-4 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی دیا جاتا ہے کیونکہ ماں کا دودھ غذا بھی ہے شفا بھی ہے۔ اس دوران ماں کو زیادہ خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

2200Calories	کیلوری کی خوراک درکار ہوتی ہے	A عام عورت کو روزانہ
2500Calories	کیلوری کی خوراک درکار ہوتی ہے	B حاملہ عورت کو روزانہ
2200Calories	کیلوری کی خوراک درکار ہوتی ہے۔	C دودھ پلانے والی عورت کو روزانہ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ عورت کو خوراک کی ضرورت بچے کو دودھ پلانے کے دوران ہی پڑتی ہے اس لئے اسے خود بھی صحت مند اور بچے کی بھی صحیح نشوونما اور صحت کیلئے اچھی تازہ متوازن خوراک کی اشد ضرورت ہے۔

☆ عورت کی صحت اور تندرستی کیلئے خوراک اشد ضروری ہے۔

☆ صحت مند عورت اپنے بچے کی دودھ کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔

☆ کمزور عورت کو بیماریاں لگنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔

☆ کمزور اور کم وزن بچے کو زیادہ بیماریاں لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔

☆ عورت کو دودھ، لسی، دہی حسب ضرورت ضرور استعمال کرنا چاہئے ورنہ جسم میں کیلشیم کی

کمی سے آسٹو ملیشیا Osteomalacia ہو جائے گی۔

روزانہ کی خوراک کیلئے شیڈول

Daily Food Guide

6 عدد	Roti- Bread	روٹی	A
3 عدد (موہی پھل، سیب، کیلو، امرود، آم)	Fruit	فروٹ	B
ایک پاؤ	Vegetable	سبزی	C
ایک پاؤ	Legume	دال	D
ایک پاؤ	Egg یا گوشت	ایک انڈہ	E
	Yogurt یا دہی Mulk	1 کلو دودھ	F

آٹھ پیچھے

Oil or Fat

G تیل یا چربی

H کچی سبزیاں جو کھائی جاسکتی ہیں بطور سلاخ خوب اچھی طرح چبا کر کھائی جائیں۔

حمل کے ایام کے علاوہ دودھ پلانے کے دوران ڈیڑھ پاؤ دودھ کا اضافہ ہے باقی خوراک حمل والی ہوتی ہے دودھ پلانے کے دوران فلوئیڈ (مائع پانی) کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے خاص طور پر پکی لسی (دہی والی، چاٹی والی) زیادہ سے زیادہ پی جائے۔ کیونکہ 70-80 فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ گھر۔ ہمسائے۔ گلی۔ محلے سے باسانی مفت مل جاتی ہے یہ دودھ کا نعم البدل ہوتی ہے لسی میں بھی دودھ والے تمام اجزاء ہوتے ہیں صرف فیٹ (گھی) نہیں ہوتا ہے۔

عورت کو روزانہ متوازن۔ حسب ضرورت تازہ اور اچھی خوراک کھانی چاہئے کیونکہ ماں کے دودھ میں تمام غذائی ضروریات موجود ہوتی ہیں یہ ضروریات ماں کے اندر خود بخود نہیں بنتی ہیں بلکہ ماں جو خوراک کھاتی ہے اس کی مدد سے ہی دودھ میں تمام غذائی ضروریات پوری ہوتی ہے جبکہ خود ماں کو بھی ان غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ماں کو بہتر اور ڈبل خوراک چاہئے۔

لسی Lassi

دودھ سے دہی بنتا ہے اور پھر دہی سے لسی تیار ہوتی ہے اسے پکی لسی یا چاٹی والی لسی بھی کہتے ہیں۔ عام ہوٹلوں پر جو دہی سے تیار کر کے لسی فروخت کی جاتی ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے عام لوگوں کے ذہن میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دودھ اور لسی کی غذائیت میں فرق ہے حالانکہ دودھ اور لسی ایک جیسی ہی غذائیت کے حامل ہیں۔ صرف ایک چیز کی کمی آ جاتی ہے وہ فیٹ (مکھن۔ گھی) ہوتا ہے یہ واحد شے ہے باقی دودھ والے تمام کے تمام اجزاء لسی میں موجود ہوتے ہیں۔ تھوڑی بہت فیٹ بھی لسی میں رہ جاتی ہے۔ سپرٹا دودھ اور پکی لسی ایک جیسی ہی غذائیت رکھتے ہیں۔ دیہات میں تقریباً ہر گھر میں لسی تیار ہوتی ہے۔ ہمسائے سے مفت بھی مل سکتی ہے پاکستان میں 60-70 فیصد خواتین دیہات میں رہتی ہیں۔

A سپرٹا دودھ میں سے کریم (فیٹ) نکال لی جاتی ہے = جسے کچی لسی کہہ سکتے ہیں۔

B دہی میں سے مکھن (فیٹ) نکال لیا جاتا ہے = جسے پکی لسی کہتے ہیں۔

اگر سپرٹا دودھ سے دہی بنایا جائے اس میں سے مکھن نہیں نکلے گا۔

دودھ اکٹھا کرنے والی بڑی بڑی فیکٹریاں (حلیب۔ ملک پیک، پاک سپریم، نیسلے وغیرہ) دودھ میں موجود فیٹ کی مقدار کے مطابق ریٹ لگاتی ہے۔ سپریم دودھ قطعاً نہیں خریدتی ہیں لیکن دودھ بیچنے والے کریم (فیٹ) نکلا کر 200-300 روپے روزانہ کمالیتے ہیں باقی سپریم دودھ عام محلے گلی، دکانوں پر دودھ کے بھاؤ ہی فروخت کرتے ہیں سپریم دودھ کی غذائیت پہلے ہی لسی جیسی ہوتی ہے اس میں مزید نہروں، کنوؤں، نالوں، جوہڑوں، نمکوں کا آلودہ پانی تک مزید ڈال لیتے ہیں بعض دفعہ گاڑھا کرنے کیلئے گھٹیا سستا دودھ کا خشک پاؤڈر بھی استعمال کر دیتے ہیں فیکٹریوں والے بھی ڈبوں والے دودھ میں فیٹ (کھن۔ کریم۔ گھی) نکال کر علیحدہ فروخت کر دیتے ہیں۔ ٹیکنیکل طریقہ سے گاڑھا کر لیتے ہیں۔ ٹیڑا پیک (ڈبہ والا) بھی سپریم جیسا ہی غذائیت کے لحاظ سے اور مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے دونوں صورتوں میں کریم کھن نکل جانے سے باقی ایک جیسی ہی غذائیت رہ جاتی ہے۔

☆ سپریم دودھ فیٹ کے بغیر کچی لسی رہ جاتی ہے۔

☆ دہی بننے سے پکی لسی بن جاتی ہے۔

لسی میں سے ایک چیز (فیٹ) کے نکل جانے کے باوجود لسی کے فوائد میں دودھ کی نسبت اضافہ ہو جاتا ہے جو درج ذیل ہیں۔

☆ مفت اور بآسانی دستیابی۔

☆ دودھ کی طرح غذائی اجزاء سے بھرپور۔

☆ کیلشیم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ۔

☆ نظام انہضام کو تیز کرتی ہے بھوک لگاتی ہے۔

☆ اچھا ذائقہ کی وجہ سے زیادہ مقدار میں استعمال سے پانی کی کمی نہیں رہتی۔

☆ پیشاب آور Diuretic ہونے سے گردے صاف ہوتے رہتے ہیں۔

☆ دافع تیزابیت اثرات رکھتی ہے۔

☆ انٹرویوں میں بیکٹیریا پہنچاتی ہے جو وٹامن B12 پیدا کرتے ہیں۔

☆ وٹامن B12 خون پیدا کرتے ہیں اور خون کی کمی نہیں ہوتی ہے۔

☆ اکثر نمکین استعمال ہوتی ہے جسم میں نمکیات پورے ہو جاتے ہیں۔

لسی کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف جانوروں کے دودھ کو اکٹھا ہونے اور دے بننے کا موقع ملتا ہے اس طرح لسی میں غذائی مادوں کی نسبت اور مقدار اور بھی بہتر ہو جاتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے عام آدمی فخر سے کہتا ہے کہ مجھے بھیٹر بکری اونٹنی کا دودھ کا ذائقہ اور مہک پسند نہیں ہے اور نہ ہی ان کی لسی پسند ہے اس جاہل کم عقل اور کم علم کو کیا پتہ کہ انبیائے کرام نے انہیں جانوروں کا دودھ بڑے شوق سے استعمال کیا ہے ہم بحیثیت مسلمان تمام انبیائے کرام کے پیروکار اور ماننے والے ہیں۔ مختلف جانور مختلف جڑی بوٹیاں بطور چارہ استعمال کرتے ہیں جن کے مفید اجزاء دودھ میں زیادہ ہوتے ہیں اس لئے مختلف علاقوں کا دودھ اکٹھا کرنے سے تمام اجزاء بھی میسر ہو جاتے ہیں۔

لسی درج ذیل افراد کیلئے بہت بڑی نعمت ہے۔

☆ حاملہ عورت کے جسم کو کیلشیم کی مقدار کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔

☆ چھوٹے بچے کیونکہ ان کے جسم کی نشوونما ہونی ہوتی ہے کیلشیم ہڈیوں کیلئے انتہائی ضروری ہے۔

☆ دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے کی کی صورت میں جسم میں بھی کیلشیم کی کمی (آسیٹولیشیا) ہو جاتی ہے۔ تمام افراد کے ہڈیوں میں 98% کیلشیم ہوتی ہے۔

☆ بوڑھے اور ضعیف لوگ کیونکہ انہیں بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے کیلشیم کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

بیماری کے دوران علاج کے پیش نظر ادویات سے انٹریوں میں مفید بیکٹیریا بھی مر جاتے ہیں جس سے وٹامن بی بارہ B-12 بننا بند ہو جاتا ہے۔ یہ وٹامن خود پیدا کرنے کیلئے اشد ضروری ہے لسی یا دے کے استعمال سے وہ دوبارہ انٹریوں میں پہنچ کر اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دودھ سے دے میں بھی بیکٹیریا بدلتے ہیں اس لئے میڈیسن کے استعمال کے ساتھ ساتھ دے۔ لسی کا استعمال ضرور کیا جائے۔ لسی استعمال سے معدہ کی تیز بیت میں کمی ہوتی ہے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ اچھا ذائقہ ہونے کی بناء پر زیادہ مقدار میں پینے سے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے عذاب زیادہ آنے سے گردے ٹانڈ وغیرہ بھی صاف ہوتے رہتے ہیں۔

پستانوں کی بیماریاں اور علاج

دردِ پستانوں میں (Pain in Breast): اگر عورت کے دونوں پستانوں میں درد پایا جاتا ہو اور حیض میں بھی کم مقدار میں آئیں تو مریضہ کو "نیم" دینے سے فائدہ ہوگا۔

حیض کے دوران پستانوں میں درد (Breast pain in menses): اگر کسی عورت کو حیض کے دوران پستانوں میں درد ہو۔ پستان ہر وقت گرم اور درد کرتے ہوں یا اس کی وجہ پستانوں کا پھوڑا ہو تو "برائی اونیا" سے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

پستانوں میں اجتماعِ دودھ، دودھ چھڑانے کے بعد: اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلانا ترک کر دے جس سے پستانوں میں دودھ جمع ہو جائے تو "پلسا ٹیلا" اچھی دوا ہے۔ اس سے فائدہ نہ ہونے کی صورت میں "کلکیر یا کارب" دینی چاہئے۔

رسولی پستانوں کی (Breast Tumour): اگر کسی عورت کے پستانوں میں مہلک رسولی پائی جاتی ہو اور حیض بہت جلد اور مقدار میں بھی زیادہ ہوں اور بہت دیر تک رہیں تو مریضہ کو "ٹیوبرکولینم" 200 یا "مرک آئیوڈائیڈ" کی چار چار گولیاں یکے بعد دیگرے ہر روز چار مرتبہ دینے سے رسولی ختم ہو جائے گی۔

ورم اور دکھن پستانوں میں: اگر مریضہ کے پستانوں میں دکھن اور ورم پایا جاتا ہو تو "برائی اونیا" اور "پیلاڈونا" دینے سے فائدہ ہوگا۔

اگر درد دونوں پستانوں کے درمیان ہوتا ہو تو "ریفیس" عمدہ دوا ہے۔

پستانوں کی نشوونما عمر کے لحاظ سے نہ ہو (Breast not developing according to age): وہ عورتیں جن میں پستانوں کی نشوونما ان کی عمر کے لحاظ سے نہ ہو تو انہیں "لیسی تھین" 6x تین گرین اور "کلکیر یا قاس" 12x کی چار چار گولیاں ایک دوسرے کے بعد دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

گٹھی پستانوں کی (Lump in breast): جب عورت کے پستانوں میں دودھ پلانے کے ایام قبل گٹھی ہو یا کسی اور وقت فوٹھائی ٹولا کا، کوئیم یا "سپہر سلف" دینے سے گٹھی حل ہو جائے گی اور اس سے آپریشن سے بچا جائے گا۔ جب کہ پستانوں میں گٹیوں کے ظاہر ہونا کا شک ہو تو "سورائیم" سے ہر علاج سامنے آتے ہیں۔

پستانوں اور بھٹیوں کا سوکھاپن (Atrophy of nipples & breast): اگر کسی عورت کی بھٹیاں میں بڑھنے کی بجائے چھٹی اور سوکھا ہونے کا رجحان پایا جائے، تو ڈاکٹر جہار کے مطابق ”سار سا پر یلا“ دو تین قطرے پانی میں ملا کر ہر چار چھ گھنٹے کے بعد دینے سے فائدہ ہوگا۔

(2) اگر کسی جوان لڑکی کے پستانوں کی نشوونما بالغ ہونے کے وقت ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اسے ”نکس موسکاٹا“ دینا بہتر ہے۔

پھوڑا پستانوں کا (Mammory Abscess): اگر کسی مریضہ کے پستان متورم ہوں، بہت زیادہ گرم ہوں، سوجے ہوئے اور پردرد ہوں۔ لیکن دار ہو۔ جس وقت تک پھوڑا پھٹ نہ جائے تو ”یلا ڈوتا“ استعمال کر دائیں اور ہر دو گھنٹے کے بعد ”مرکیورس وائیوس“ کے بعد دیگرے دیں اگر مریض کا نپتا ہو اور پستان پھٹ پڑیں تو تین چار روز تک ”یلا ڈوتا“ اور ”ہیپر سلف“ دینا بہتر ہے اور دن میں تین بار ”ہائیڈراسٹس“ بھی دیں۔

2- اگر پستانوں کی نشوونما رک گئی ہو تو ڈاکٹر ڈیوی کے مطابق مریضہ کے لئے ”سٹیل سار یولاٹا“ اعلیٰ دوا ہے۔

3- جب عورت کے پستان دودھ پلانے کے دوران شدید حساس ہوں اور دودھ بھی شدید اخراج ہوتا ہو تو ”قائی ٹولا کا“ سے مریضہ تندرست ہو جائے گی۔

4- اگر عورتوں کے پستانوں پر زخم لگ جائے۔ رسولیاں پائی جائیں یا مکے وغیرہ کی چوٹ ہو کسی قسم کے دباؤ یا ورزش سے چوٹ آئے تو ”کونیم“ اس کی بہترین دوا ہے۔

دودھ کی زیادتی (Gala Ctorrhoea): دودھ کی حد سے زیادہ کثرت ہامون کی سیکرشن بعض صورتوں میں ایبنا رمل ہو جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں دودھ زیادہ بننے لگتا ہے۔ دودھ کو کم کرنے والی ادویات نہایت سوچ سمجھ کر دینی چاہئے۔

ادویات: نیلساٹیلہ۔ کلکیر یا کارب۔ برائی ادوینا۔

چھاتیوں سے دودھ کا بے اختیار نکلتے رہنا (Unnotice Milk From Breast): جب مریضہ حد سے زیادہ کمزور ہو تو چھاتیوں سے دودھ بے اختیار نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مریضہ کی خوراک کو بہتر کیا جائے تو دودھ کا بے اختیار نکلنا بند ہو جاتا ہے۔

ادویات: بوریکس، برائی ادوینا۔ چائنا۔ ہلساٹیلہ۔

دودھ کا خراب ہونا: دودھ کی خرابی کی وجہ سے بچہ دودھ کی تے آردیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دودھ خراب ہوتا ہے۔ جب صرف اور صرف دودھ بنانے والے گلینڈ اور ہارمون کے اندر حد سے زیادہ ایب نارملٹی دودھ کے خراب ہونے کا باعث بنتی ہے۔ یا پھر حمل بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔

ادویات: کلکیر یا کارب، پلساٹیل، فائی ٹولا کا۔

اگر آپ کسی موذی مرض میں مبتلا ہیں تو فوراً آپ رابطہ کر سکتی ہیں۔

پستان کی خرابیاں: پستان کی خرابیاں عموماً پستان چھوٹے یا معدوم ہونے سے لاشعوری طور پر بیمار معدوم ہوتی ہے۔ عورت کے جسم سے پستان معدوم کر دیں تو کشش 70 سے 80 فیصد کم ہو جاتی ہے۔

پستان کی خرابیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

پستان کا چھوٹا ہونا۔ پستان کا بڑا ہونا۔ پستان کی رسولیاں۔ پستان کا کینسر

پستان کا چھوٹا ہونا (Atrophy of Mammas): نسوانی حسن میں پستانوں کا ایک خاص حد تک ابھرا ہوا ہونا عورت کی کشش کو مکمل کرتا ہے۔ اگر عورت کے پستان نارمل حد سے چھوٹے رہ جائیں۔ سوکھ جائیں۔ کمزور پڑ جائیں۔ ڈھیلے پڑ جائیں یا بعض اوقات معدوم ہو جائیں تو پستان کا سائز میں فرق ہوتا ہے۔ پستانوں کی نشوونما میں رکاوٹ سے چہرے و جسم کی خوبصورتی پر پانی پڑ جاتا ہے۔

نفسیاتی طور پر لڑکیاں پریشان رہتی ہیں۔ لڑکیاں عموماً کریبیس، بلوشن، اشتہاری ڈاکٹروں کی بنی بنائی کریبیس لگا لگا کر بریسٹ کی اصل سائز کو مزید خراب کر لیتی ہیں۔ اس کا مکمل اور پائیدار علاج صرف اور صرف ہومیو پیتھک میں ہے۔

کیونکہ یہ نقص صرف اور صرف اندرونی یعنی ہارمون کی ایب نارملٹی کو دور کرنے، نفسیاتی الجھن کو دور کرنے سے یا کسی ناکامی محبت یا کوئی غم یا پریشانی کی ہسٹری تو موجود نہیں اس کو دور کرنے کے بغیر پستان کبھی بھی اپنی نارمل حالت میں نہیں آ سکتے۔

پستان کا بڑا ہونا (Hypertrophy of Mammas): خواتین کے پستان عموماً جسم کے لحاظ سے اگر حد سے بڑھ جائیں تو پستان بڑھ جاتے ہیں۔ اگر وہ بڑھ جائیں تو

کے پستان زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں جو کہ غیر موزوں نظر آتے ہیں۔ عموماً ایسا چوٹ لگنے کے بعد خون حیض کی زیادتی، سن یا س اور خون حیض کے دوران، بریسٹ نپل کی سوزش وغیرہ یا حد سے زیادہ جنسی خواہش بھی پستان کے بڑا ہونے کا سبب ہے۔

ڈاکٹر کینٹ کی ریپریٹری کی صفحہ 835 پر مندرجہ ذیل Rubric ہیں۔
پستان کا بڑا ہونا۔

(1) Hypertrophy- Mammæ (k.p 835)
Carb-an, Cham, Con, Iod, graph, Phyt, Phos.
Puls, Ruta, Sep Sil, Sulph, Thui

(2) Hypertrophy- Right (K.p 835)
پستان کے بڑا ہونا۔ دائیں طرف کا۔

Arn, Con, Phyl, Vip.

(3) Hypertrophy- Left (K.P 835).
پستان کا بڑا ہونا۔ بائیں طرف کا۔

Sil.

(4) Hypertrophy- Abscess- After (K.P 835)
پھوڑا ہونے کے بعد پستان کا بڑا ہونا۔

Con, Graph.

(5) Hypertrophy- Menses before (k.p 835)
خون حیض سے قبل۔ پستانوں کا بڑا ہونا۔

Con, Lac-c, Sang.

بروقت علاج کیجئے: پستانوں کے بڑے یا کم ہونے کی صورت میں کوئی کریم استعمال نہ کریں۔
(ڈاکٹر قمر تبسم)

پستان کی رسولیاں: رسولیاں کی دو بڑی اقسام ہیں۔

(Benign Cyst)

سادہ رسولی

(Malignant Cyst of Tumour)

خبیث رسولی

سادہ رسولی (Benign Cyst)

ایسی رسولی جو پستان کے اندر تو موجود ہو لیکن نقصان نہ دے۔ یا بہت کم دے سادہ رسولی یا Benign Cyst کہلاتی ہے۔ پستانوں میں اس طرح رسولیاں موجود ہیں تو اسے فائبروسٹک (Fibrocystic Disease) کا نام دیا جاتا ہے۔ نارمل پستان کی ساخت Texture میں کٹنی نما ابھار موجود ہو تو پستان کو کہہ سکتے ہیں کہ رسولیاں سادی ہیں۔ فائبروسٹک عارضہ یعنی ایسی رسولی دار ساقیں جن کے متوازی مثل کے طور پر کئی ریشوں کی غیر نارمل بھر مار آن موجود ہوں۔

خبیث رسولی Malignant Cyst of Tumor

ایسی رسولیاں جو پستان کے اندر موجود ہونے کے ساتھ پستان کے اندر نقصان دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہوں کیونکہ یہ رسولیاں جڑ دار ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کو خبیث رسولیاں (Malignant Cyst) کہتے ہیں۔ پستان میں سوزش ورم کا عارضہ عموماً کیفر کا سبب بن سکتا ہے اور خبیث رسولیاں نہایت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔

ادویات (Medicines): سادہ رسولیوں کے لئے اہم ادویات: کوئیم، کلکیر یا فلور، فاسفورس۔ (چھوٹی طاقتوں میں)۔


خبیث رسولیوں کے لئے اہم ادویات: کوئیم۔ کلکیر یا فلور۔ نیشرم میور۔ (اعلیٰ طاقتوں میں)۔

(iv) پستان کا کیفسر (Cancer of Breast)

اگر چھاتی میں سٹفل درد ہوتا رہے تو اپنے بریسٹ کا چیک اپ کروانا چاہئے کہ آیا پستان کا کیفسر تو نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر درد، یا چھاتی کی ٹیل کا پھٹنا، درد ہونا وغیرہ پستان کا کیفسر ہی ہو۔ لہذا یہ چیک اپ کے بعد ہی ناممکن ہے۔

چھاتی کے درد کی اصل وجوہات تو بے شمار ہیں۔

پتھالوجی کی رو سے چھاتی میں مستقل درد کا رہنا کسی بیماری کا نشاۃ ہی کرتا ہے۔



بریسٹ کینسر

چھاتی کا ایسا پھوڑا یا ایسا درد ایسی سوزش جو ٹھیک ہونے میں نہ آئے بریسٹ کینسر کہلاتا ہے۔ چھاتی میں کینسر ہو جائے تو بذریعہ آپریشن چھاتی نکال دی جاتی ہے۔

چوٹ کا لگنا، چھاتی کی ٹی بی، چھاتی میں گھٹلی یا دوسرے زائد گھٹلیاں ہونا، چھاتی کی خارش، چھاتی کا درد کی شدت ہلکی یا بروقت محسوس ہونے والا درد ہو سکتی ہے۔
چھاتی کے کینسر کی تشخیص کے لئے ایک خاص ایکس رے ہوتا ہے جسے میموگرافی (Mamo Graphy) کہتے ہیں۔ جو کہ بیماری کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔

کینسر کی تعریف

ایسا پھوڑا۔ یا ایسا درد، ایسی سوزش جو ٹھیک ہونے میں نہ آئے کینسر کہلاتا ہے۔ کینسر ایک پھیلنے والا مرض ہے۔ اگر چھاتی میں شروع سے جبکہ کینسر کی نشاندہی کی گئی ہو تو بذریعہ آپریشن نکال دیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر برنٹ کے یہ الفاظ کتنے سنہری ہیں۔

سیب کے درخت سے سیب اتارنے سے کیا سیب پھل دینا بند کر دے گا۔ یقیناً نہیں اگر کینسر کی تشخیص بروقت ہو جائے تو ہو میو پیتھک میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل علاج ہے۔ اگر ایلو پیتھک طریقہ علاج اپنایا جائے تو پھر متاثرہ حصہ کو بذریعہ آپریشن کرا کے نکال دینے سے باقی حصہ بچ سکتا ہے۔ چھاتی کے جسم سے الگ ہو جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس کو نئے سرے سے چھاتی لگادی جاتی ہے جسے Prosthesis کہتے ہیں۔

بریسٹ کینسر کی مزید وجوہات: غام وجوہات

- ☆ چوٹ لگنا
- ☆ غیر فطری فعل (یعنی حد سے زیادہ غیر محرم مردوں سے مباشرت)
- ☆ دودھ نہ پلانا
- ☆ ٹی بی
- ☆ چھاتی میں گھٹلیاں

سرپستان، گھنڈیاں Nipples

30	گرچا بیٹس	پستان کی گھنڈیوں میں صفاف
30	سار سا پر ملا	گھنڈیوں کی نوکیں اندر کی طرف تھسی ہوئی۔
200	میڈورٹیم	پستان اور گھنڈیاں ڈھی اور دھناک، پستان برف کے

مانند ٹھنڈے خصوصاً سرپستان۔

4	اوسیم کین	سرسپستان میں شدید درد کہ چھو بھی نہ جاسکے۔
30	رٹھیا	دودھ پلانے والی مستورات کے پستانوں میں شکاف
200	پٹرو لیم	سرسپستان میں خارش
30	گریفائٹس	سرسپستان میں شکاف اور جلن دار درد، چھونے سے ذکی الحسی
30	فلینڈریم	سرسپستان میں شدید درد اور درم، شکاف اور زخمی۔
30	کروٹن ٹنگ	گھنڈیوں سے درد شروع ہو کر کندھوں تک پہنچے۔
30	کلکیر یا کارب	گھنڈیوں میں پھوڑے کا سادرد اور گہرے شکاف۔
30	سلفر	گھنڈیوں میں پھوڑے کا سادرد اور گہرے جن میں جلن اور خون۔ سلفر

پستانوں کی تکلیفیں

Diseases of Breast

دبیل Abscess

ابتداء میں سختی شروع ہونے پر برائی اونیا 30 کا استعمال بالکل کافی ہوتا ہے۔ اگر برائی اونیا پورے کام نہ کر سکے اور پک جانے کا اندیشہ ہو تو۔

فائی ٹولا کا 200

ہیپر سلفر 200-30

سلیشیا 200-30

فائی ٹولا کا 30

اگر دبیل پک جائے اور ذکی الحسی ہو تو

پستانوں کی ماسوری کیفیت کے لئے۔

سردی لگ جانے سے یا سرد موسم میں پستانوں میں درد اور گھٹیاں

دودھ پلانے کے زمانے کی خرابیاں

(Disorders of Lactation)

دورانِ حمل کی تکلیفات کا اثر والدہ کے دودھ پر ہوتا ہے کہ دودھ میں نشوونما کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لئے بچہ پوری طرح نشوونما نہ ملنے سے تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ بچے کو اس دودھ میں پوری غذائیت نہیں ملتی نتیجہ کمزوری ہوتا ہے۔

سرپستانوں (گھنڈیوں) کا پک جانا

یا ان میں درد (Sore Nipples)

دودھ پلانے کیلئے ہمیشہ والدہ کو تیار رہنا چاہئے اور اس بات کی احتیاط کرنی چاہئے کہ دوران حمل پستانوں کی گھنڈیاں نہ تو درد کریں نہ پھٹیں اور نہ پکیں۔ ان حالات کے لئے عموماً دوائیں گریفائٹس، لائیکوپوڈیم، پٹرولیم، پلساٹیل، سلیمیا، سپیاسلقر ہوتی ہیں۔ دوران حمل میں ان دواؤں کے استعمال سے دودھ پلانے کے وقت کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی اور اگر دودھ پلانے کے زمانہ میں تکلیف ہو یعنی پستان درد کریں، پک جائیں تو مفصلہ ذیل دواؤں میں سے کوئی دوا بالکل ہوگی۔

اگریکس: اگر سرریضہ کی گھنڈیاں پھٹ جاتی ہوں یا ان میں بوائیاں آ جاتی ہوں۔ جلن خارش ہوتی ہو اور سرخی ہوتی ہو یا اگر گھنڈیوں میں بے حد سرخی اور جلن و خارش ہو۔

آرنیکا: جب پہلی دفعہ بچہ کو دودھ پلانے سے گھنڈیوں میں پھوڑے کا سا چوٹ کا سا درد ہو، یہ دوا عموماً اس وقت کام آتی ہے جب پہلی دفعہ بچے کے چھاتیوں سے لگانے سے درد پیدا ہو جائے۔ کلکیر یا کارب: گھنڈی پر زخم ہو جائے جس میں سے مواد نکلے، یہ دوا عموماً کلکیر یا کیٹس مریضوں کے لئے مفید ہے۔

کیموٹا: گھنڈیوں میں ورم اور درد، مریضہ بچے کو دودھ پلانے کے وقت کا درد برداشت نہیں کر سکتی اور چڑچڑاہٹ اور بے صبری۔

کیسٹرا کوئی: ان حالتوں میں جبکہ ابتداء میں اس تکلیف کی پروا نہ کی گئی ہو اور جہاں گھنڈیوں میں زخم ہو چکے ہوں۔ گھنڈیاں اس طرح لٹک جائیں جیسے مے کے چھوٹے ٹکڑے۔ کروٹن ٹک: ہر بار جب بچہ دودھ کھینچتا ہے تو درد اسی طرف کندھے میں جائے جو تیز سوزش پیدا کرنے والا ہے۔ گھنڈیوں کو ہاتھ لگانے سے بہت درد ہو لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس درد کی ہو جو کندھوں کو جائے۔

گریفائٹس: گاڑھی شہد کی سی رطوبت کمرٹھ کی طرح سے جم جائے اور دودھ پلانے سے اتر جائے اور دودھ پلا چکنے کے بعد پھر وہی کمرٹھ بن جائے اور پھر دودھ پلانے کے وقت اتر جائے وغیرہ وغیرہ۔

لائیکو پوڈیم: گھنڈیوں سے بہت خون ہے اور بہت درد کریں چنانچہ گھنڈیوں کے راستے پر اس قدر خون پی جائے کہ جب تے کرے تو خون کی ہو، لائیکو پوڈیم ایسی حالت میں فوراً زخموں کو درست کر دیتا ہے اور پھر خون گھنڈیوں سے نہیں نکلتا۔

مرکیور لیس: گھنڈی پھوڑے کا سادہ درد کرے اور پکی معلوم ہو، مسوزھوں میں ذکی انجی اور دانٹوں میں درد، حلق کے غدود بڑھ جائیں یا مری کی دیگر علامات پیدا ہو جائیں۔

فاسفورس: گھنڈیاں گرم ہوں اور درد کریں، معدے میں خالی پن کا احساس اور کمزوری، مکر کے نیچے گردوں کے مقام میں حدت۔

قانی ٹولا کا: گھنڈیاں پھٹ جائیں اور حد سے زیادہ درد کریں جب بچہ دودھ سے پئے تو بعض وقت والدہ کو تشنگی کیفیت پیدا ہو جائے یا درد بازوؤں اور ٹانگوں میں تمام جسم میں جائے۔

پلساٹیل: متحمل مزاج، سنگسرا المزاج عورتوں کے لئے جو ہرقت آنسوؤں سے بڑے ریں یا جو ہر دھ دودھ پلاتے وقت روئیں، دودھ پلانے سے درد سینہ میں، گردن میں اور پیٹھ کے نیچے کمر میں جائے اور اکثر اپنی کیفیت تبدیل کیا کرے۔

سپہیا: گھنڈیوں کی جڑ میں شکاف یا گھنڈیوں کی جڑیں پھٹ جائیں، مگرے شکاف، پھوڑے کا سادہ۔

سلیسیا: گھنڈیوں میں بہت جلد زخم پڑ جائیں اور ان میں بہت درد اور ذکی انجی ہو۔ دودھ پلاتے وقت درد جو پیٹھ کی طرف جائے۔

سلفر: دودھ پلا پکنے کے بعد گھنڈیوں میں جلن اور درد، گھنڈیاں جڑ میں پھٹ جائیں اور ان میں سے خون نکلے۔

قلینڈرینم: دودھ پلاتے وقت درد دودھ کی نالیوں میں جائے۔

یہ والدہ کا قدرتی اور اخلاقی فرض ہے کہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ وضع حمل کے بعد ہر دفعہ دودھ پلانے سے رحم میں سکڑن پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ رحم اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ والدہ کی اپنی صحت بچے کو دودھ پلانے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن وہ والدہ انجی صحت کے خراب ہونے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی یا دودھ پلانے کے ناقابل ہیں یا اس بچہ کو دودھ سے پالنا چاہیے۔

دودھ کی غیر معمولی تراوش

بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ یہ والدہ کے نظام کی ابتری کا باعث ہوتا ہے۔ دودھ کی زیادتی کے ہوتے ہوئے یہ ضروری نہیں کہ دودھ عمدہ ہو یا دودھ کی غذائیت کافی ہو بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار کو بڑھی ہوئی ہے لیکن اس میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ عموماً بیمار رہتا ہے اور دودھ کو بچہ عموماً پسند نہیں کرتا ہے ایسی حالت میں یہ ضروری ہے کہ اس ابتری کو دور کیا جائے۔

مندرجہ ذیل ادویہ اس ابتری کو رفع کرنے کے لئے کافی ہوں گی:

اکوٹائٹ: اس دوا کا استعمال تب کرنا چاہئے جب جلد گرم خشک ہو، بے حد پیاس، بے چینی اور بے حوصلگی، ناامیدی، چھاتیاں سخت اور گانٹھ دار۔

ایتھوزا: بچہ دودھ کافی مقدار میں پیتا ہے پھر کافی مقدار میں یہاں تک تے کرتا ہے کہ تھک جاتا ہے لیکن جونہی کچھ طاقت آتی ہے پھر دودھ پینے کے لئے چلاتا ہے۔ بچہ کے پاخانے قبض یا ڈھیلے ہوتے ہیں، بچہ بہت روتا ہے۔ والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، نفاس بہت پتلا اور پانی کا سا ہوتا ہے۔ وہ اعصابی ہوتی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا، دودھ موافق نہیں آتا، شکم پھولا ہوا ایسے حالات میں ایتھوزا ماں اور بچہ دونوں کو دینا چاہئے۔

انکس کا سس: والدہ بہت غمگین عموماً یہی کہتی ہے کہ وہ مرجائے گی، دودھ کی تراوش بہت کم۔ بیلا ڈونا: چھاتیاں بھاری محسوس ہوں، سخت اور سرخ ہوں۔ ان پر سرخی کی لکیریں دوڑتی دکھائی دیں، چہرے پر تھماہٹ، آنکھیں سرخ، نبض بھری ہوئی اور سخت غنودگی، ٹپکن والے درد سر، شور اور روشنی سے ذکی الحسی، تکلیفات ٹھنڈ لگنے سے پیدا ہوں۔

بورکس: دودھ بہت گاڑھا اور بد مزہ، کھینچنے کے بعد فوراً دہی کی طرح مٹھکیاں بن جائیں، صبح کے وقت مٹکی جیسے حمل میں ہوں۔

برائی اونیا: چھاتیاں بھری جیسے پتھر ہو، پیلی لیکن سخت، منہ اور ہونٹ خشک، قبض، پاخانہ خشک اور جلا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے درد سر، بیٹھنے پر مٹکی اور غشی سے۔

کلکیر یا کارب: دودھ مقدار میں کم، چھاتیاں تنی ہوئی، مریضہ ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحسی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریضہ کی قوت حیات میں دودھ لانے کی طاقت نہیں رہی، دھواں مزاج مستورات۔

کاربوائٹکس: چھاتیوں میں درد، گھٹیاں، دودھ پلانے سے چھاتیوں میں سونیاں چبنے کے سے درد، جس کی وجہ سے تنفس رکے، مریضہ چھاتیوں کا چھوا جانا یا ہاتھ لگانا برداشت نہ کر سکتی ہو، دودھ پتلا اور نمکین سا، مریضہ کھانا کھاتے کھاتے رک جائے۔

کاسٹیکم: زیادہ محنت راتوں کو جاگنا اور پریشانی کی وجہ سے دودھ بالکل غائب ہو جائے۔ عموماً نازک اندام، خوبصورت، پتلے چہرے والی مستورات کے لئے مفید ہے۔ معدے میں چونا جلنے کا احساس۔

کیموملا: چھاتیاں ذکی الحسی، گھٹیاں متورم اور پھولی ہوئی، بے چین، خیال کرے کہ وہ اپنی تکلیفات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ گھبرائی ہوئی، سہی ہوئی بے خوف اور چڑچڑی خصوصاً جبکہ تکلیفات غصہ کے دورے سے پیدا ہوئی ہوں۔

چائنا: مریضہ وضع حمل کے دوران سیلان خون کی زیادتی یا نفاس کی زیادتی کی وجہ سے بہت کمزور ہو، ہر دوسرے دن بدتر محسوس کرے۔ شکم میں بھراؤ کا احساس دودھ مقدار میں کمی پتلا۔ پانی کا سا۔

سنا: معدے میں نوچن کا احساس جیسے بھوک سے ہو جو مسلسل بتا رہے، ناک میں کھجلی اچھی طرح سونہ سکے، چڑچڑی اور لڑاکی جس کی جلد تشفی نہ کی جاسکے۔

کروٹن ٹک: چھاتیاں متورم بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی لیکن ہر وقت جب بچہ چھاتی کو چوسے، گھٹئی سے کندھے کی ہڈی تک درد جونہایت پریشان کن اور ناقابل برداشت ہو، چھاتیوں کی سختی اور درم کے لئے بھی یہ ایک نہایت عجیب دوا ہے۔

ڈلکامارہ: دودھ کی تراوش بند ہو جائے کیونکہ مریضہ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ جس کا اثر خاص طور پر چھاتیوں میں ہوا ہے۔ پستان متورم، بے درد کے دوران پر خارش۔

کالی بائیکرام: دودھ جب چھاتیوں سے بہے تو ایسا دکھائی دے جیسے وہ تاروں اور پانی کا بنا ہوا ہے۔ لیکسیس: دودھ پتلا اور نیلگوں جن کو بچہ پینے سے انکار کر دے۔ مریضہ صبح اٹھنے پر غمگین اور غیر تسلی یافتہ ہوتی ہے اور تمام دن افسردگی اور ناخوشی میں گزارتی ہے۔ یہ سب تکلیف کسی لمبی دماغی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔

مرکیور لیس: یہ دوا خصوصاً اس حالت میں مفید ہے جب آتشک کی کچھ لاگ نظام میں موجود ہو، چھاتیاں سخت اور متورم اور ان کے اندر پھیلن اور پھوڑے کے سے درد کا احساس، تھوک کی زیادتی،

سوزھوں میں زخم اور خون بہے نیز مری کی دیگر علامات اس دوا کے چناؤ میں بہترین مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

نگس وامیکا: یہ دوا خصوصاً ان مسورات کے لئے مفید ہے جو عادتاً چھٹی مصالحہ دار مرغن غذا میں اور پیر شراب وغیرہ کی عادی ہوں یا جن میں غذا کی غلطی کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہو، قبض اور نفاس کی حالت میں ابتری۔

پلسا ٹیلا: چھاتیاں بے حد متورم اور بائی کے درد جو سینہ کے اعضاء کندھے گردن بغلوں اور پاؤں میں جائیں، مریضہ کو خفیف سی حرارت آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی بغیر پیاس کے ٹھنڈے کمرہ میں بہت محسوس کرے، دودھ پتلا اور پانی کا سا اور اس میں سے دودھ کے اصلی اجزاء بالکل غائب ہوں۔ صبح کے وقت منہ میں بڑا ذائقہ، مرغن اور چہیلی غذا میں موافق نہ آئیں۔ مریضہ ٹھنڈی تازہ ہوا کی خواہش کرے۔ گرم بند کمرہ مریضہ کو برا محسوس ہو۔

ریوہم: کھٹی بودالے دست، درد شکم کے ساتھ پاخانہ کے دوران کپکپی، دودھ اسی قسم کے دست بچے میں پیدا کرے، دودھ پینے کے فوراً بعد ہی بچہ کو پتلا پاخانہ ہو جس سے کھٹی بو آئے۔ جس کے ساتھ درد شکم ہو۔

رسٹاکس: چھاتیوں میں دردناک تناؤ اور سرخ دھاریاں، جس کے ساتھ تمام جسم میں بائی کی حالت، جوڑوں میں اکثر پہلی حرکت دردناک اور اکثرین کے ساتھ ہو لیکن مریضہ بعد میں آسانی سے چل سکے، مریضہ ایک وضع میں بہت دیر تک نہیں لیٹ سکتی، اسے بار بار آرام حاصل کرنے کے لئے کروٹ بدلتی پڑتی ہے۔

سپیا: نرم اور ذکی الحسن جلد والی مریضائیں تمناہٹ کے دورے، فم معدہ میں کمزوری اور درد کا احساس، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے، مریضہ غذا کی خوشبو سے پریشان ہو جائے۔ سلیسیا: بچہ چھاتی کو منہ لگائے یا دودھ پینے کے فوراً بعد تے کر دے، پہلے چھاتی کو منہ لگانے سے انکار کر دے پھر دودھ پینا شروع کرے۔ جس کے بعد تے ہو اور بچہ جیسے کہ اسے بڑھانا چاہئے نہ بڑھے۔ والدہ عموماً صحت ور نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سلیسیا کا قبض اور دیگر علامات پائی جاتی ہیں۔

زنگم: مریضہ میں کچکاہٹ خصوصاً پاؤں میں جن کو وہ چلا نہیں رکھ سکتیں۔ دودھ کا نہ ہونا یا دودھ میں کمی: جب والدہ میں کچکاہٹ والہ کے لئے کافی مقدار دودھ کی نہیں

ہوتی تو اس کی وجہ سے والدہ کے نظام کی کوئی ابتری ہوا کرتی ہے اور ٹھیک ہو سید پیتھک دوا ایسی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے جس سے دودھ کی مقدار قدرتی ہو جاتی ہے۔ (Porter) یا ہچو قسم کی دیگر نشلی ادویات سے دودھ کا بڑھانا، ماں اور بچہ ہر دو کے لئے نقصان دہ ہے۔ اس لئے والدہ کا مزاجی علاج ایسی حالتوں میں اس کے نظام کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ جس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں دودھ میں کمی ہو وہاں مندرجہ ذیل ادویہ مفید ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی سرخی کی ادویہ کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اکونائٹ: چھاتیوں میں اجتماع خون جلن دار گرمی سخت اور تناؤ، دودھ کے نہ ہونے یا کمی کے ساتھ پریشانی اور بے چینی۔

اگنس کاسٹس: عام طور پر مفید ہے۔ خصوصاً جب ناامیدی اور غمگینی، رہنما کن علامات موجود ہوں۔

اسافوٹیدا: جہاں بے حد ذکی الحسی ہو۔ دریدیں غیر قدرتی طور پر پھولی ہوئی ہوں، کم و بیش استعمال ہوتی ہے۔

بیلا ڈونا: چھاتیاں لمبی اور بھاری معلوم ہوں، درد سر آنکھوں میں سرخی مریضہ اچھی طرح نہ سو سکے، آدھی سوتی اور جاگتی ہو۔

برائی اونیا: خشک پھٹے ہوئے ہونٹ خشک منہ قبض، پاخانہ جلا ہوا، بھوک نثار دکھانے کے بعد متلی۔

کلکیر یا کارب: دموی مزاج مستورات، سرد مزاج جن کے حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ رہے ہوں اور عموماً لیکور یا کی شکار ہوں۔

کاسٹیکم: جہاں بینائی کے جاتے رہنے کا خدشہ ساتھ موجود ہو۔ کانوں میں شور و غل اور حکم پریشانی اور غمگینی، مریضہ عموماً راتوں کو جاگنے یا تفکرات کی عادی ہوں۔

کیمومیل: چھاتیاں سخت، چھونے سے ذکی الحس اور ان میں کھینچنے والی درد ہوں۔ لڑاکی غیر مہذب اور دوسروں کو برا بھلا کہے۔

چائنا: جہاں رطوبات زندگی خصوصاً خون یا دست یا سیلان رحم وغیرہ کے ضائع ہو جانے سے کمزوری ہو، کندھوں کے درمیان شدید درد۔

کانیا: بے خوابی اور شدید اعصابی اکساہٹ۔

ڈنکارہ: نموسا جب منڈی مرطوب ہوائے لگنے سے دودھ کی تراوش رک گئی ہو۔ دودھ مقدار میں کمی، جلد ٹھنڈک سے ذکی الحس اور ٹھنڈ لگنے سے جلد پر دانے پڑ جائیں۔

مرک سالی: دودھ مقدار میں کم، مسوڑھوں میں زخم اور خون بہے، غدود پھولے ہوئے وغیرہ۔
فاسفورک ایسڈ: دودھ مقدار میں کم کمزوری اور دماغی طور پر لا پرواہی سی۔

پلسا نیلا: عظیم الطبع منکسر اج، رونے کی رغبت والی مستورات جو ظاہراً طور پر صحت اور معلوم ہوں، دودھ مقدار میں کم، اس دوا کو ایسے حالات میں عموماً استعمال کرنا چاہئے۔

رشاکس: بھوک بالکل ندارد، دماغی خرابیاں، خودکشی کے خیالات نفاس بہت عرصہ تک جاری رہے، ہانگوں میں ناطاقتی۔

سیکیل کار: ایسی مستورات جو سیلان کی وجہ سے بے حد تھک گئی ہوں۔ دہلی پتی سوء المزاج مستورات، چھاتیاں قدرتی طور پر دودھ سے نہیں بھرتیں، چھاتیوں میں ڈنگ لگنے کے سے درد۔
سلفر: حدت کے دورے، کمزوری اور غشی کے دورے، چاند پر حدت، پاؤں ٹھنڈے 11 بجے قبل دوپہر دھوپ، کلیجہ بیٹھنے کا احساس، مریضہ کھانے کا انتظار نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ۔

اگر دودھ مقدار میں زیادہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی بچہ کی نشوونما ٹھیک نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ماں میں ہو یا بچہ میں۔ ایسے حالات میں ماں کو کلکیر یا، چائنا، سنا، مرکوریس یا سلفر یا بچہ کو کلکیر یا، سلیسیا، برٹنا کارب، بورکس یا دیگر ادویہ جن کی علامات آپ کو بچہ یا والدہ میں مکتس، منتخب کر کے دینا چاہئے۔

۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵



ضرورت سے زیادہ خون امتن جاتا ہے تو نظام آہستہ آہستہ ٹھک جاتا ہے اور کمزور طبیعتوں میں تو دودھ کے کم مقدار میں بننے سے بھی نظام ٹھک کر تباہ ہو جاتا ہے۔ دودھ کا یہ زیادہ بننا مقدم الذکر حالت میں قوت حیات کی زیادتی سے ہوتا ہے جبکہ موخر الذکر حالت میں قدرتی تکلیفات کا سامنا کرتے ہوئے بھی دودھ کی مصلحت میں زیادتی کو برقرار رکھتی ہے۔

لیکن ایسے بھی کیس ہائیں ملتے ہیں جن میں دودھ کی مصلحت میں زیادتی بھی دودھ میں کی یہ دودھ کے نہ بننے کی طرح اندرونی نظام کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ دودھ کی تراوت میں زیادتی یا دوسرے الفاظ میں غیر ضروری طور پر پلاتے رہتا۔ (جس کا مطلب قریب قریب وہی ہے یعنی ضرورت ہے بغیر دودھ پلاتے رہتا بھی دودھ کی زیادتی کے ضمن میں آ جاتا ہے) پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ذیل کا اقتباس جو ڈاکٹر ٹیلر اسمتھ کی کتاب سے لیا گیا ہے ناظرین کی خدمت میں اس دودھ کی زیادتی سے پیدا شدہ خطرناک اثرات کو سمجھانے کے لئے دیا جاتا ہے ناظرین انتہائی علامات سے اس خطرے سے محفوظ ہو سکیں۔

پاگل پن کے تمام کیس جو بغیر ضرورت کے دودھ پلانے یا دیگر وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقی پاگل پن سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ ہر دو میں پاگل پن آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں جب قوت ساعد یا قوت باصرہ دوسروں کی شکایت کریں تو یا تو ان کی غذا میں تشو و تما والی اشیاء کی زیادتی کر دینا چاہئے یا بچہ کا دودھ فوراً پھیرا دینا چاہئے۔ جہاں پاگل پن کی ذرا سی بھیر غیبت ہو جہاں تک ممکن ہو والدہ کو بچوں کو دودھ پلانے سے روک دینا چاہئے۔ اس طرح کی تمام سرینتاؤں کا پاگل پن کمزوری پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ عموماً ایسے وقتوں میں واقع ہوتا ہے۔ جب حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ ساتھ ساتھ جاری رہے۔

انہی مستورات میں ان سب بیماریوں کی بھی رغبت ہوتی ہے جن میں حقیقی دیوانگی اور خودکشی کی رغبت پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک لکڑی سرینہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے بڑوں نے بچے کو تھوڑے تھوڑے وقت تک دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس قسم کی دیوانگی دودھ پلانے کے فائدے کے ختم ہونے کے بعد تو اس کے بعد شروع ہوئی ہے اس قسم کی دیوانگی کو روکنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دیوانی یا ملا لیا کے آثار شروع ہوں۔

مندرجہ بالا بیان سے یہ اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے کہ دودھ کی زیادتی یا ناجائز طور پر دودھ کا پلاتے رہنا نظام جسم اور دماغ کے اندر ہیبت ناک اور خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ ظاہر ہو کہ والدہ پر دودھ پلانے کا اثر ہو رہا ہے۔ ان علامتوں کو مختصر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

فم معدہ میں خالی پن کا احساس، ڈوبنے اور کمزوری کا احساس جو بہت دیر تک قائم رہے اور کھانے کے فوراً بھر ہی پھر پیدا ہو جائے۔ عام تھکاوٹ اور کمزوری نیند کے بعد طبیعت میں فرحت نہ ہو، رانوں میں کھنچن اور درد اور ٹانگیں ٹھنڈی ذرا سا زینہ چڑھنے سے سانس میں تنگی اور پھلاوٹ اور اگر یہ حالت بڑھتی جائے اور اس کو نہ روکا جائے تو درد سر، چکر، کانوں میں آوازیں، بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، بینائی میں خرابی، حافظہ میں کمی، چڑچڑاہٹ اور مایوسی، پیاس، زبان میں خشکی رات کے پسینوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں کی دق بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے خون کی کمی، لیکوریا، ہاتھوں، پاؤں اور چہرے میں استسقاء کی کیفیت اور مختلف قسم کے اعصابی درد کی بھی نمود ہو سکتی ہے۔ ان تکلیفوں کے ساتھ دماغ، پھیپھڑوں اور رحم میں عضوی تبدیلیاں بھی شامل کی جاسکتی ہیں۔ یہ تکلیفات جو ناجائز طور پر دودھ پلاتے رہنے سے وقوع میں آسکتی ہیں۔ (ازڈاکٹر لیڈھم)

ان حالات میں سب سے بہتر علاج ہومیو پیتھک بالٹل دوا کا دینا ہے جو قریب قریب ان تمام شکایات کو جلد جلد رفع کر دیتی ہے۔

دودھ کی زیادہ تراوش یعنی دودھ کے حد سے زیادہ آنے میں بیلاڈونا، برائی اونیا، بورکس، چائنا، کلکیر یا کارب، کوئیم، فاسفورس، ہلسا ٹیلا، رساکس، سٹرامونیم دوائیں ہوا کرتی ہیں۔

دودھ پلانے کی وجہ سے معدے میں ایٹھمن کے لئے کاربوائینی ملے، کاربووج، چائنا فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔

فم معدہ میں خالی پن کے احساس دودھ پلانے کی وجہ سے کاربوائینی ملے، سپہا، اگنیہا اور اولنڈر میں پائے جاتے ہیں۔



Breast Pain Mastitis Breast Swelling

چھاتیوں کا ورم/سوجن

ورم پستان کے اوپر والے حصے میں خصوصاً سیاہ حلقے کو مائل کر سکتا ہے اور اس میں ہر باد کی سی حالت ہو سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کے ایک دو پستانوں میں ورم نمودار ہو سکتا ہے اور اسکے بعد وہ پک بھی سکتے ہیں۔

پستانوں کا سوجنا

پستانوں میں ورم (Mastitis)

دودھ پلانے والی مستورات کے ایک دو پستانوں میں ورم نمودار ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ پک بھی سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تکلیف درحقیقت طبعی خراب سے پیدا ہوتی ہے یا جہاں ایک بار پیدا ہو جاتی ہے تو بار بار عادتاً یہ نمودار ہوتی ہے اور اس لئے ایسی مستورات اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتیں یا دودھ پلانے کے زمانے میں ہمیشہ پریشان رہتی ہیں۔

ورم پستان کے اوپر والے حصے میں خصوصاً سیاہ حلقے کو ماؤف کر سکتا ہے اور اس میں زہر بادی کی سی حالت ہو سکتی ہے۔ یا یہ ورم پستانوں کے علاوہ مادہ میں گہرا واقع ہو سکتا ہے یا ورم پستانوں کے غدودوں میں ہو سکتا ہے۔ بعض کیس ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جن میں ورم تمام کی تمام پستان کی بناوٹ کو گھیر لیتا ہے اور پستان محض ایک گوشت کا لوتھڑا دکھائی دیتا ہے کئی دفعہ وریڈیں پستان میں بکھر جاتی ہیں اور ورد بھری گانٹھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے پستانوں کے غدود ایک تکلیف کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔

مولچین کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان درموں کی یا ان تکلیفوں کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح یہ تکلیفات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ فرض کیجئے کہ اگر پستان سردی لگ جانے کی وجہ سے سوج گیا ہے جبکہ دودھ پلانے کا ابتدائی زمانہ ہے تو تمام کے تمام پستان میں ایک ورم ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے دودھ کی پیدائش اور اس کا اجزاء نالیوں کے متورم ہو جانے سے بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پستان کی تکلیف میں طبعی خرابی اور طبعی کیفیت بہت حد تک ذمہ دار ہوتی ہے۔ تاہم ظاہراً اور موجودہ علامات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ طبعی اور مزاجی خرابیوں کو روکنے کے لئے ایک آدھ خوراک اتنی سورک دوا کی دینا از بس لازمی ہوتا ہے۔

جب دودھ کی تراوش حد سے زیادہ ہوتی ہے اور چاہے بچہ کی کمزوری کی وجہ سے یا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے یا گھنڈیوں کے سوراخ بند ہو جانے کی وجہ سے ہو تو دودھ کافی طور پر نہیں کھینچتا۔ ایسی حالت میں جہاں تک ممکن ہو سکے، دودھ عارضی اور مصنوعی طریقہ سے کھینچ کر پستانوں کو خالی کر دینا چاہئے۔ بعض اوقات پستانوں کو خالی کرانے کے لئے دوسرے بچوں کو یا کتے کے پلوں کو

دودھ پلانا پڑتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ پستانوں کو خالی کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر ورم اور سوجن بڑھنے نہ پائے۔ اس کے بعد ٹھیک بالمشال دوا دینی چاہئے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے تکلیف رفع ہو یا رکاوٹ دور ہو۔

اکونائٹ: جب ٹھنڈی خشک ہوا کے لگنے سے پستانوں میں تحریک پیدا ہوئی ہو یا بخار ہو، ڈر، پریشانی، بے چینی، ٹھنڈے پانی کی پیاس وغیرہ ایسی حالتوں میں موجود ہوتی ہے۔
بیلڈونا: جب پستان بھاری معلوم ہوں، پستان کے درمیان سے چاروں طرف دھاریاں جاتی ہوئی معلوم ہوں۔ پستان چھونے سے گرم معلوم ہوں۔

برائی اونیا: پستانوں میں پتھر جیسا بھاری پن پستان سخت اور درد کریں لیکن سرخ نہ ہوں۔ مریضہ پہلی دفعہ اٹھ کر بیٹھنے پر متلی محسوس کرے اور کھڑے ہونے پر اس سے زیادہ متلی کا احساس ہو۔ ہونٹ کھرکھرے، خشک، پیاس اور قبض، پاخانہ خشک جیسے جلا ہوا ہو۔ مریضہ حرکت سے بدتر محسوس کرے۔ اس لئے چپ چاپ پڑی رہے۔

کاربوائیمیلٹس: پستانوں میں تیر لگنے کے سے درد جس کی وجہ سے تنفس میں رکاوٹ ہو دبانے سے تکلیف بڑھ جائے۔ مریضہ بچہ کو دودھ نہ پلا سکے۔ دودھ پلانے سے مریضہ محسوس کرے کہ اس کا آخری سانس ہے۔

کیکیٹس: یہ دوا عموماً خنازیری مزاج کی مستورات کے لئے مفید ہے۔ جہاں ٹھنڈی ہوا سے حد وجہ کی ذکی آنسی ہو۔ پستانوں میں ورم اور ان کا پک جانا سینہ میں بھراؤ یا اچھار کے احساس کے ساتھ۔ گریفائٹس: ان تمام حالتوں میں جہاں گھنڈیوں کے گرد اس قدر شگاف اور زخم ہوں کہ دودھ بالکل نہ نکل سکے۔ یہ دوا اونچی طاقت میں دودھ کے سیلان کو جاری کر دیتی ہے اور ہونے والے ذیل کے خدشہ کو مٹا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فائی ٹولا کا میں بھی طاقت موجود ہے۔

کونیم: پستانوں میں گوٹھر چیرنے والے دردن کے ساتھ جس کی زیادتی رات کے وقت ہو۔ پستانوں کے غدد دودھ سے زیادہ ذکی الحس، دہنی طرف کے پستانوں میں سختی جس کو چھونے سے درد ہو اور رات کے وقت سوئیاں چھیں، ہائیں پستانوں میں سوئیاں چھنے کے درد۔

ہیپر سلفر: جب پستانوں کا پک جانا رک نہ سکے۔ ایسی حالت میں اس دوائی کی ایک ٹھراک اونچی طاقت میں دینی چاہئے اور نتیجہ کا انتظار کرنا چاہئے۔ یہ یاد رہے کہ ہمہ میں حد وجہ کی ذکی الحس اور درد ہوتا ہے۔

لیکیسیس: جب پستانوں کا رنگ نیلگون یا ارغوانی ہو اور مریضہ کورات کے وقت جائزہ اور دن کے وقت گرمی کی تمنا ہٹ ہو۔

مرک سال: پستان میں سختی والا ورم پھوڑے کے سے درد کے ساتھ دودھ اچھا نہ ہو۔ اسی لئے بچہ دودھ کو منہ نہ لگائے، مسوڑھوں کی خرابی اور مرکری کی دوسری علامات۔

فاسفورس: پستانوں میں ورم یہاں تک کہ زخموں کا خدشہ ہو۔ سوئیاں چبھنے کے سے یا کائے والے دردوں کے ساتھ یہ یاد رہے کہ جب ناسور ہوتا ہے تو اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔

قائی ٹولا کا: خصوصاً اس وقت جبکہ سختی آغاز مرض سے ہی ہو۔ گھنڈیاں یا پستان حد سے زیادہ ذکی الحسی جن میں کم دبیش درد ہوا اگر سیلان پک بھی جائے جب بھی مندرجہ صدر علامات ہوتی ہیں۔

سلیسیا: پستانوں میں ذیل جن میں اس بات کا خدشہ ہو کر پک جائیں گے۔ اگر یہ دوا وقت پر دے دی جائے تو تمام کی تمام تکلیف رفع ہو جاتی ہے اگر یہ دوا کچھ دیر میں پہنچے تو یقیناً پستان پک جاتے ہیں۔ پستانوں میں ٹپکن، ذکی الحسی اور بوجھ، یہ دوا ایسے وقت میں بھی پستانوں کے تباہ ہونے کو روک دیتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ان حالتوں میں کبھی گرم پلٹس یا گرم چیز نہ لگانا چاہئے کیونکہ ان گرم اشیاء سے سب کا خون مقام ماؤف میں جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے پستان کے غدود ماؤف ہو کر ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جاتے ہیں اگر بالٹل دوا کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو یقیناً ایک یا دو اونچی طاقت کی خوراکیں تمام تکالیف کو قدرتی طور پر رفع کر دیتی ہے اگر ناسور پیدا ہو جائے اور رطوبت یا مواد پتلا پانی کا سا گاڑھا اور متعفن ہو تو بھی یہ دوا اس قسم کی تکلیف کو رفع کر دیتی ہے۔

سلفر: گھنڈیوں سے چاروں طرف ورم جاتا معلوم ہوتا ہے، حد سے زیادہ پک جانے یا پکنے کی رغبت، دن کے پہلے حصہ میں سردی اور دوسرے حصہ میں گرمی اور تمنا ہٹ یہ دوران پستانوں کے لئے بھی مفید ہے۔ جن میں پرانے زخم ہوں یا ایسی جگہ موجود ہوں جو چھونے سے درد کرے، پستان گرم معلوم ہوں۔

کروٹن ٹک: جب دودھ پلانے سے درد، پستانوں سے نکل کر پیٹھ میں جائے۔ پھوڑے کا سا کھینچنے والا شدید درد۔

کالی کارب: دودھ کے سیلان سے پٹن اور سوئیاں چبھنے کے سے درد۔
ریشاکس: سرفی، مریضہ کو چلنا پڑے یا ہر بار روت، رہتی پڑے۔

دودھ پھڑانے کے متعلق چند ہدایات

اگر والدہ کی صحت قائم رہے تو اس وقت تک دودھ نہ چھڑانا چاہئے جب تک کہ بچہ دوسری غذائیں کھانا نہ شروع کر دے یا ان کا عادی نہ ہو جائے۔ اگر ماں کی صحت اس قدر اچھی نہیں ہے کہ بچہ کو دودھ پلایا جاسکے تو بچہ کو چھ مہینے کی عمر سے مختلف غذاؤں پر رکھنا سکھانا چاہئے۔ اس طرح سے بچہ دوسری چیزوں کا عادی ہوتا جائے گا اور اس طرح کسی قدر ماں کا دودھ بھی ملتا رہے گا۔ بچہ کی پیدائش کے دوسرے دن ہی ماں کا اس بات کا دھیان رکھنا چاہئے کہ بچہ کو اپنی چھاتی پر ملانے کا عادی نہ کرنا چاہئے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بچہ ماں کے سو جانے کی حالت میں دودھ پیتا رہے گا۔ مندرجہ ذیل وقفوں میں حتی الامکان بچہ کا دودھ نہ چھڑانا چاہئے۔

1- جب بچے کے نچلے دودانت نکل رہے ہوں یہ دانت عموماً چھٹے یا ساتویں مہینے تک نکلتے ہیں اور ان کا وقفہ عموماً پندرہ دن دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد چار سے چھ ہفتہ تک بچہ کے اور کوئی دانت نہیں نکلتا۔

2- اوپر کے اگلے دودانت، یہ دانت عموماً چھٹے سے دسویں مہینے تک نکلتے ہیں اور اس کے بعد کچھ وقفہ پھر ملتا ہے۔

3- بارہویں سے چودھویں مہینے میں۔

ان وقفوں کے نزدیک بچے کا دودھ نہ چھڑانا چاہئے کیونکہ بچے کی جسمانی اور دماغی صحت پر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جس زمانہ میں بچے کے دانت نہ نکل رہے ہوں اس زمانہ میں بچہ کا دودھ چھڑانا بچہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں کرتا۔

خون بہنا۔ (Bleeding)

لائکوپوڈیم (Lycopodium): چھاتیوں میں خون بچہ اتنی مقدار میں پی لے کہ جب تے کرے تو خون کی ہی ہو۔ پستانوں سے کون اور پانی کا اخراج جلدی سے خون ہے۔

ہیمامیلس (Hamamelis): شدید کمزوری کے ساتھ خون ہے۔

سپہیا: خون ہے ہیمپ کا بھی امکان ہے۔

کینسر۔ (Cancer)

پستانوں کا حجم بڑھ جانا۔ (Hypertrophy)

(دیکھئے رسولیاں)

فائیولا کا (Phytolacca)۔ پستان بڑھ جائیں۔ پھر سے جوئے کے بعد حاملہ پڑے۔
فرنگیوارسکا (Fragria Vesca)۔ یہ پستانوں کے حجم کو کم کر دیتا ہے اور دودھ کو
سکھا دیتا ہے۔

کونیم (Conium)۔ عام برصورتی یا حصے کی برصورتی۔

چمافیلہ (Chimaphila)۔ یہ بھی پستانوں کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا کیلئے کھینک کرتی ہے۔

سوزش (Inflammation)

برائی اونیا (Bryonia)۔ دودھ کے جم جانے یا کسی اور وجہ سے پستانوں کی سوزش۔

بیلادونا (Balladonna)۔ جب سے سرخ اور گرم ہوں۔

مرکوریس (Mercurius)۔ جب بیلادونا اور برائی اونیا کا کام ہو جائیں۔

بیلس پر (Bellis Per)۔ چوٹ یا مکا گتے کے بعد جب سوزش اور خارش قائم رہے۔

کونیم (Conium)۔ سوزش کی خارش کی گتے سے مضبوط۔ سخت اور پھل ہو جائیں۔

پستان میں سونیاں یا چھس سوزش اور خارش کے ساتھ۔

فائیولا کا (Phitolacca)۔ جب پستان زیادہ تکلیف کے ساتھ پتھر کی طرح سخت
ہوں۔ پستانوں میں سوزش اور پھل کا پڑ جانا۔ پستانوں میں دھن دھن کا
ہونا۔

دودھ (Milk)

کلکریا کارب (Calcarea Carb)۔ دودھ جانے کے لئے۔

لیک ویک ڈیفلو (Lac Vace Deff)۔ دودھ کم کرنے کے لئے۔

چوئیس (Choinanthus) - دودھ کورو کتے کے لئے۔

سبیل سر (Sabal Serr) - دودھ کی پیداوار میں بڑھانے کے لئے۔

لیکوسا وائرڈوسا (Lactusa Virosa) - دودھ پلانے والی گھرتوں میں دودھ

بڑھانا اور کتوار لیاں میں بھی۔

سٹیکٹا فاس (Sticta Phos) - کم دودھ یہ دودھ کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے جبکہ دودھ

دب گیا ہو ہمیشہ دودھ کی کمی کا دوا بنے۔

براکس (Brax) - دودھ بہت گاڑھا اس کا ذائقہ ہرا۔ یہ بات دالہ کو بچے کو دودھ پلانے

سے روکتی ہے۔ یہ دوائی حمل کے دوران دی جاتی چاہئے تاکہ پیداوار کے بعد دودھ بڑھوں اور

ذائقہ دار ہو جائے۔ بچہ ہر روز ذائقہ کی وجہ سے چھاتیوں کو مت میں لے کر پستان نہ کرے۔

آرنیکا یورٹیکا (urtica Ur) - چھاتیوں کی سوزش کے ساتھ دودھ کم اترے۔ جو گھرتوں

دودھ چھراتا چاہیں۔ ان کا دودھ کھانا دیتا ہے۔

پلساٹیللا (Pulsatilla) - دودھ کورو کتے کے لئے ان ملاؤں میں جو اپنے بچوں کا دودھ

چھراتا چاہیں۔ یہ دودھ چھراتانے کے فوراً بعد دی جاتی چاہئے۔ اگر یہ دودھ اتفاقاً نہ دے یا

آسانی پیدا نہ کر سکے تو کلکیر یا کلارب دی جاتی چاہئے۔ یہ دودھ کو دیا تے اور سوجی ہوئی چھاتیوں

اور دودھ کورو کتے کے لئے مفید ہے۔

ایسا فوئیڈا (Asafoetida) - دودھ بڑھانے کے لئے اس کی قسم اچھی کرنے کے

لئے۔ پستان دودھ سے تھے ہوئے حمل کے اخیر بھی۔

لیسی تھین (Laceithin) - دودھ بڑھانے والی شائد اور دوائی ہے۔ یہ دودھ تیار

تقویت دے والا اور مقدار میں زیادہ ہو۔

مرکیورس (Mercurius) - حیض کی بجائے پستانوں میں دودھ لڑکیوں میں بھی

چھاتیوں میں دودھ ہو سکتا ہے کے لئے مفید ہے۔ غیر شادی شدہ۔

لڑکیوں کی چھاتیوں میں دودھ

کلکیر یا فاس (Calcarea Phos) - بچہ دودھ پنے سے انکار کر دے کیونکہ دودھ

تمکین ذائقہ کا ہو۔

فاسٹولا کا (Phytolacca): چھاتیوں کی سوزش جب دودھ تار دار ہو اور نیل سے نیچے لٹکے۔ جما ہوا دودھ۔ دودھ کم، گاڑھا غیر صحت مند اور جلد خشک ہو۔ پانی کی طرح کا خونی اخراج جو برسوں جاری رہے۔ بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

بیوفو (Bufo): جب دودھ خونی ہو۔

آرم سلف (Aurum Sulph): پستانوں کی سوزش کے ساتھ دودھ دب جائے یا بالکل نہ رہے۔

لیک کینی نم (Lac Can): دودھ کو سکھانے کے لئے جب وہ بہت کثرت سے ہو۔

سیکل کار (Secale Cor): بچہ کی پیدائش کے بعد دودھ دب جائے یا ظاہری ہی نہ ہو یعنی نہ اترے۔

اگنس کاسٹس (Anus Castus): دودھ کی کمی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو جب اس ذہنی کیفیت کے بعد زچگی پر دودھ ظاہر نہ ہو۔

کیمومیلا (Chmomilla): جب غصے کے دورے کی وجہ سے دودھ دب جائے۔

الفالفا (Alfalfa): دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ 5 سے 10 قطرے مد روز چمچر دن میں چار بار دی جائے۔

سرپستان۔ بھٹنی۔ نیپل (Nipples)

فاسٹولا کا (Phytolacca): بھٹنیاں دکھیں اور پستانوں میں پھوڑے کا رجحان۔ بھٹنیاں اندر کو دھنس جائیں بچوں کو دودھ پلاتے وقت شدید درد۔ بھٹنیاں پھٹی ہوئی یا چری ہوئی۔ بھٹنیاں حساس دکھیں اور چیرے آئے ہوئے۔ دودھ پلانے پر زیادتی ہو۔

سارسپریلا (Sarsaparilla): بھٹنیاں سکڑی ہوئیں درد والے حیض کے ہمراہ۔ اسہال۔ تھکاوٹ اور غشی کے دورے۔ بھٹنیاں چھوٹی مرجھائی ہوئی اور غیر جوش پذیر ہوں۔ یعنی جذبات برا بیگشتہ نہ ہوں۔

کیسٹر اگوی (Castor Equi): بھٹنیاں دکھیں۔ چربی ہوئی اور پھٹی ہوئی۔ شدید حساس چھو جانا برداشت نہ کر سکیں۔

ہائیڈراستس (Hydrastis): دودھ پلانے والی عورتوں میں پستانوں پر خراش۔
بھٹیاں اندر کودھنسی ہوئیں۔

گرافیٹس (Graphites): کھا جانے والی چھالے یا پھوڑے یا ناسور جن سے
چپکنے والا مادہ خارج وقت اتارا جائے۔ لیکن دوبارہ ہو جائے۔ بھٹیاں دودھ پلانے سے چڑھ
جائیں یا پھٹ جائیں۔

کاسٹیکم (Causticum): پھنسیاں جن کے گرد داد ہوں۔

کاربوائنی میلس (Carbo Ani): بھٹنیوں پر گوڑہ سخت اور مرغیوں کے انڈے کے
برابر ہوں۔


کروٹن ٹیگ (Croton Tig): بھٹنیوں سے درد کمر تک جائے، بچوں کو دودھ پلاتے
وقت۔ بھٹنیوں کا درد کی وجہ سے کھنچاؤ جیسے کہ رسی سے کھینچا جا رہا ہو۔

سلیشیا (Silicea): سارے جسم اور بھٹنیوں میں دودھ پلاتے وقت درد۔

فلینڈریم (Phellandrium): دوران دودھ پلانے کے ناقابل برداشت درد ہو۔

بوریکس (Borax): جب دودھ پلائے تو مخالف بھٹنی میں درد ہو۔

رٹانہیا (Ratanhia): بھٹیاں دودھ پلانے سے پھٹ جائیں اور چر جائیں۔



Tibbi Books for
Atiba Karam

پستانوں کے امراض

ورم پستان، پستان میں پھوڑا Mammary Abscess, Mastitis

پستانوں سے دودھ نہ نکلنے پر وہ تن جاتے ہیں، عورت کے حلقے اندر کو دھنس جاتے ہیں، بچہ دودھ نہیں پی سکتا، تھکاؤ بڑھ جانے پر پستان کی سوزش اور التهاب، شدید درد، بخار اور ورم وغیرہ جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور دودھ نہ نکلنے پر پیپ پیدا ہو کر پھوڑا بن جاتا ہے، چھاتی پر زور سے ہاتھ یا چوٹ لگ جانے پر بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علاج:

☆ بریسٹ پمپ سے دودھ نکال دیں۔

☆ گرم پانی میں بورک ایسڈ ڈال کر گرم گرم لوشن سے پستانوں کی کھور کریں۔

☆ کلورومائی شین Chloramphenicol (Chloromycetin)

ایک کپسول روزانہ ۲ بار کھانا پستان کے پیپ دار انفکشن اور ولادت کے بعد سیلان (Lochia) رک جانے سے پیدا ہونے والے ورم پستان میں مفید ہے۔

☆ Amclox ایسکلاکس Cloxacillin + Ampicillin 1 سے 2

کپسول دن میں 4 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دیں۔ خصوصی فائدے کے لئے 500 ملی گرام والے 1 سے 2 واپس کا کافی واٹر فار انجکشن میں اچھی طرح ملا کر کوہے کے گہرے عضلے میں روزانہ انجکشن لگائیں۔

توجہ! اپنی سیلن سے حساس افراد اور انفکشن والے ایک نواتی کثرت خلیات ابیض میں اس کا استعمال نہ کریں۔

☆ اینٹرو مائی شین Chloramphenicol (Enteromycetin) ایک کپسول یا سیرپ 5 سے 10 ملی لیٹرون

میں 4 بار دیں۔

- ☆ ٹیرامائی سین (Terramycin) Oxytetracycline ایک
کپسول 250 ملی گرام والا دن میں تین بار دیں۔
- ☆ سوگنرل (Suganril) Piroxicam ایک دو ٹکیہ 1-2 بار روزانہ
کھلائیں۔
- ☆ رفاسنڈ کیسٹر آئل کو گرم کر کے اس میں کافور (Camphor) ملا کر، اس سے
مالش کریں۔

حلمے (نپل) کے گھاؤ

Nipples Cracked

پستانوں کے حلمے صاف نہ کرنے پر دودھ اور میل کچیل جم کر گھاؤ یا خراش پیدا کر
دیتا ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے بعد پستانوں کو گرم پانی سے صاف کر دینا چاہیے۔ گھاؤ
ہو جانے پر بچے کو دودھ نہ پلائیں۔

علاج:

- ☆ ٹینک ایسڈ 4 ملی گرام کو 30 ملی لیٹر گلسرین میں ملا کر ایک یا دو بار لپ کریں یا
بورک گلسرین لگائیں یا بوروفیکس مرہم لگائیں۔
- ☆ نیو پرکینال (Nupecainal) Cinchocain مرہم کو نپل پر
لگائیں۔
- ☆ بورولین (Borolin) مرہم نپل پر دن میں 3-4 بار لگائیں۔
- ☆ فوراسین (Nitrofurazone) Furacin مرہم نپل پر اور حلمے پر
2-3 بار لگائیں۔ ساتھ ہی سہراں ایک ٹکیہ دن میں 3-4 بار پانی سے کھلائیں۔
- ☆ جلی سین ٹائپیکل کریم (cream typical Genticin) متاثرہ حلمے
پر دن میں 3-4 بار لگائیں۔
- ☆ نیوسپورین ایچ + Neomycin + sulph B Polymixin

Hydrocortisone (H-Neosporin) مرہم کو حلے پر دن
میں 2-3 بار لگائیں۔

☆ ہیا سلف اسکن آسکٹنٹ (oint. skin Nebasulf) اسے متاثرہ حلے پر
دن میں 2-3 بار لگائیں۔

توجہ! دوا سے حساس مریضوں میں اس کا استعمال نہ کریں۔

☆ کامیلوسان (Camilosan) infective-Anti مرہم حلے کے گھاؤ
پر دن میں 2-3 بار لگائیں۔

☆ لیڈر مائی سین (Ledermycin) Demeclocycline مرہم کو
متاثرہ پستان کے حلے پر 2-3 بار لگائیں۔

☆ ٹتراڈاکس (Tetradox) Doxycycline پہلے دن 2 کپسول
(200 ملی گرام) اور اس کے بعد ایک کپسول (100 ملی گرام) یا سیرپ 10
ملی لیٹر روزانہ دیں۔

پستانوں میں دودھ کی زیادتی

کبھی کبھی ماں کے پستان میں دودھ کی اتنی زیادتی ہو جاتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی
سکتا، ایسی حالت میں دودھ کو کم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

علاج:

☆ پستانوں پر بلا ڈونا گلسرین لگائیں۔

☆ چھاتیوں پر چمپا کے پھول باندھیں۔ پروکٹینال (Proctinal) 1 سے 2 ٹکیہ دن میں 2-3 بار غذا کے ساتھ دیں۔

☆ بریسٹ پمپ سے پستانوں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دودھ نکالتے رہیں۔ ساتھ
ہی ڈینوجن (Danogen) Danazol 100 سے 400 ملی گرام
روزانہ دیں۔

☆ اے سیڈرکس (Esedrex) Hydrochlorthiazide آدھی
 سے ایک ہلکیہ دن میں تین بار دیں۔
 ☆ سسٹان 100 (100 Sustanon) ایک ملی لیٹر کا ہر 2-3 ہفتے بعد
 عضلاتی انجکشن لگائیں۔

پستانوں میں دودھ کی کمی

کبھی کبھی ماں کے پستانوں میں بچے کی پرورش کے لئے لازم دودھ نہیں آتا یا
 بہت کم دودھ آتا ہے۔ ایسی حالت میں ماں کو دودھ، مکھن، گوشت اور دوسری مقوی غذائیں
 کھلائیں۔ گرم اور خشک اشیاء نہ کھانے دیں۔ مسور کی دال کافی مقدار میں کھلائیں۔

علاج:

☆ اگر عورت کو تغذیاتی غذائیں جیسے دودھ، مکھن، ملائی، گندم کی دلیاں، سینویاں
 دودھ میں پکا کر کھلائیں اور بنولے کی کھیر وغیرہ زیادہ مقدار میں کھلائیں، رات کو
 بار بار بچے کو دودھ پلانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، تاکہ دودھ پلانے والی
 عورت کم سے کم 6 گھنٹے تک سو سکے۔ آرام کرنے سے ماں کا دودھ بڑھ جاتا
 ہے۔

☆ پستانوں پر کیسٹر آئل کی مالش کرتے رہیں اور ارٹھ کے پتے پستانوں پر باندھنے
 سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔

☆ لیکٹونک (Lactonic) گرینولس دو چای چمچہ بھردن میں دو بار دیں۔
 ☆ عورت کے جسم میں لیکٹو جینک ہارمون کی کمی ہو جانے سے دودھ آنا کم ہو جاتا
 ہے۔ ساتھ ساتھ کافی مقدار میں کھجی مونگ پھلی کے دانے اور مشا اور صبح شام
 کھلاتے رہیں۔

دودھ کا رک جانا یا جم جانا

بعض اوقات پستانوں میں دودھ بہت گاتر جاکر رک جاتا ہے اور مٹے (نیل) کے یا دیکر سوراخ سے نکلیں نکل سکا نہ دیا اور وقت تک پستان میں دودھ جم جاتا ہے۔ دوسرے لگتا ہے اس انگلیوں سے حرکت کو بخار، پستانوں میں دودھ اوردے چٹکی وغیرہ کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔

علاج:

☆ حرکت کو بستر پر لٹائے رکھیں۔ گرم پانی میں بھدک لاسٹ ملا کر قلابین یا کسی صاف کپڑے کو اس میں بھگو کر دھو کر دھو کر پستان پر رکھ کر دیں۔ سخت دودھ ہونے پر کپڑے کو نچوڑ کر گرم حالت میں پستان پر رکھ دیں۔ ٹکڑے سے دودھ پٹکا ہونے پر برسٹ پمپ سے نکال دیں۔

☆ برسٹ پمپ سے دودھ نکال لینے کے بعد پستان کو پونچھ کر اکٹھی ل بلا ڈھونٹا پلاسٹریک اکٹھی ل رہیم لگائیں۔

دودھ کا بخار

پستانوں میں دودھ رک جانے اور دودھ مڑنے سے حرکت کو بخار ہو جاتا ہے اور پستان میں دودھ ہونے لگتا ہے۔ پستان میں کافی دودھ لالی پن، اکثر ان اور چھوٹے سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔

علاج:

☆ برسٹ پمپ سے اگر تھوڑا بھی دودھ نکل سکے تو نکال دیں۔ اگر دودھ نہ نکلے تو بھول کر بھی نہ ہدایتی دودھ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ پستان پر بھدک لاسٹ ملا کر گرم پانی سے یا دیا آہستہ آہستہ نکھڑ کریں۔ اس کے بعد اسے کچا کو اس بھدک ملا کر گرم پانی میں بھگو کر قلابین برسات گرم اسے کچا کو دودھ پستان پر رکھیں۔ پھر اسے

طرح تکرار کریں۔ ایسا کرنے پر دودھ پتلا ہو جائے تو بریٹ پیپ سے تھوڑا
تھوڑا نکالنے کی کوشش کریں یا عورت کا اپنا لڑکا یا لڑکی یا شوہر منہ سے دودھ کو
دھیرے دھیرے کھینچ کر پھینک دے اور منہ کو ضد جراثیم ڈائیلوشن سے صاف کر
لے۔

دودھ نہ نکلے تو زبردستی نہ نکالیں۔

انٹروائیٹین (Enteromycetin) 250 ملی گرام ایک کپسول

وائی سولون (Prednisolone) (Wysolone) 5 ملی گرام ایک ٹکیہ

سیلن (Celin) CVitamin 500 ملی گرام آدھی ٹکیہ

تینوں کو ملا کر ایسی ایک مقدار ہر 4 گھنٹے بعد کھلائیں۔ دافع تپ و التهاب ہے۔

اومناٹاکس (Omnatax) Cfotoxim ایک وائل میں اچھی طرح واٹر

فار انجکشن ملا کر روزانہ عضلاتی انجکشن لگائیں۔

ایمکلاکس (Amclox) Cloxacillin + Ampicillin 500 ملی

گرام کے ایک وائل کا روزانہ گہرے عھلے میں انجکشن لگائیں۔

بسٹری پن (Bistrepin) Streptomycin + sod. G Penicillin + penicillin Procain

آدھے سے ایک گرام جیسی

ضرورت ہو ویسی مقدار میں روزانہ عضلاتی انجکشن لگائیں۔

سیکس (Caffein + Aspirin) سی

(C-Micropyrin) 2 سے 4 ٹکیہ 4-2 بار روزانہ کھانے کے بعد

دییں۔

پستانوں کا پورا نہ ابھرنا

بعض کنواری لڑکیوں کی چھاتی اچھی طرح نہیں ابھرتی، جس کو مرض کہا جاتا ہے۔

قدرت کا نظام ہے کہ شادی ہو جانے کے پر ایسی لڑکیوں کی چھاتیاں اچھی طرح ابھر آتی
ہیں۔ اگر شادی کے بعد بھی چھاتیوں میں ابھار نہ آئے تو علاج کرنا چاہیے۔

☆

بے سنٹریکس (Placentrex) placenta human of Ext. 2 ملی لیٹر کا عضلاتی انجکشن روزانہ یا تیسرے دن لگائیں۔ کل 15 سے 20 انجکشن لگائیں۔

☆

سینے دینی (Santevini) Calcium & B Vit. سیرپ 3 چھوٹے چمچے (15 ملی لیٹر) 2 بار روزانہ پلائیں۔

☆

نیوگیڈین الکور 15 سے 30 ملی لیٹر کھانے کے بعد یا پہلے روزانہ 2 بار دیں۔

☆

درخت بڑکی داڑھی کے سرے پر جو سرخ اور زرد رنگ کے نرم و نازک ریٹے ہوتے ہیں انہیں لے کر پانی میں پیس کر کے پستانوں پر لپ کریں ایک ہفتہ تک روزانہ استعمال کرنے سے پستان سکڑ کر سخت ہو جائے گی۔

☆

کٹائی کی جڑ اور انار کی چھال کو پانی میں پیس کر کے چند روز پستان پر لپ کریں اس سے پستان کا ڈھیلا پن جاتا رہیگا۔

☆

چھال انار دو چھٹانک، مازو ایک تولہ، دونوں کو آدھا سیر پانی میں جوش دے کر چھان لیں پھر اس میں تل کا تیل آدھا پاؤ ملا کر دوبارہ اتنا جوش دیں کہ پانی کا حصہ ختم ہو جائے۔ روغن کو حفاظت سے رکھ لیں اور چھاتیوں پر روزانہ ملیں اس سے پستان کا ڈھیلا پن جاتا رہے گا۔

☆

چھوٹی موٹی بوٹی (لاجنتی) کی جڑ کو پانی میں پیس کر پستانوں لگائیں اس سے پستان سکڑ جاتی ہے۔

☆

پتھر ملی زمین کی مٹی کو باریک کر کے سرکہ میں ملا کر پستان پر لپ کریں چند روز کے استعمال سے پستان کا ڈھیلا پن جاتا رہے گا اور سختی آ جائے گی۔

دودھ کی تراوش

قدرت کا کھیل اس معاملہ میں عجیب و غریب ہے۔ جب بچہ ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو قدرت پستانوں کو بڑھا دیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا فعل کر رہے ہیں اور بچہ دنیا میں سانس لیتا ہے اور پہلی دفعہ ماں کے پستانوں سے لگتا ہے تو کم و بیش دودھ کا بخار شروع ہو جاتا ہے اور جھٹ پٹ تمام نظام میں ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دودھ کی تراوش شروع ہو جاتی ہے۔

بعض مستورات کے بچہ پیدا ہونے کے قبل ہی دودھ دیکھا گیا ہے لیکن یہ دودھ اصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اجزاء دودھ کے نہیں ہوتے مگر اصل دودھ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بخار سے تحریک پیدا ہوتی ہے۔

دودھ کی مقدار مختلف مستورات میں مختلف ہوتی ہے۔ بعض عورتوں میں دودھ کم ہونے کے باوجود بھی دودھ زیادہ طاقت والا ہوتا ہے اور بعض میں دودھ کی زیادتی ہوتی ہے۔ دودھ میں نشوونما فراہم کرنے والے اجزاء کی کمی ہوتی ہے۔ قدرت کی طرف سے ہر عورت کو اتنا کافی دودھ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی طرح نشوونما دے سکے لیکن اگر عورت میں نشوونما کی یہ طاقت موجود نہ ہو تو عورت کے نظام میں کوئی خرابی ہوتی ہے۔

ہر ماں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ ایک تو بچہ کا پیٹ بھرتا ہے اور دوسرے زچہ بہت سی آنے والی تکلیفوں سے بچ جاتی ہے۔

اگر بچہ رحم کے اندر مرجائے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد قدرت کی طرف سے دودھ نہیں نکلتا اور جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اصل دودھ نہیں ہوتا۔

عام طور پر کھینچے بغیر پستانوں سے دودھ نہیں نکلا کرتا لیکن جب عورتوں کے بغیر کھینچنے یا چوسنے سے دودھ نکلا رہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔

زمانہ قدیم کی طب پر مخصوص واصلی کتابیں

طب کی عظیم و قدیم کتابیں جو ۹۰ سال سے لکر ایک سو بیس (۱۲۰) پرانی اصل جوں کی توں کتابیں اصل تحریر قدیم چھاپہ قدیم رسم الخط: نہ کپی و نہ لکھیوں کا مسئلہ: نہ ہجرات تحریر میں کوئی کمی۔ ابھی فون کریں اور کمر بیٹھے کتابیں منگوائیں۔

قرا بادین کبیر اول دوم یکجا حکیم کبیر الدین قیمت 1500 روپے	قرا بادین نجم الثقی حکیم نجم الثقی رام پوری قیمت 1500 روپے	قرا بادین اکمل اعظم حکیم اعظم خان قیمت 1200 روپے
رموز اطباء اول دوم یکجا حکیم فیروز الدین قیمت 1500 روپے	مخزن علاج بیاض جیلانی ڈاکٹر حکیم غلام جیلانی قیمت 1500 روپے	الا کسیر المعروف الا کسیر اعظم حکیم اعظم خان قیمت 1200 روپے
رسان شاستر وید کرشن دیال قیمت 900 روپے	القانون اول دوم یکجا (عربی اردو) حکیم کبیر الدین..... یوعلی سینا قیمت 1350 روپے	مخزن حکمت اول دوم یکجا حکیم وڈاکٹر غلام جیلانی قیمت 960 روپے
مفرا القلوب حکیم اکبر ارزانی قیمت 2500 روپے	کلیات نفس اول دوم یکجا حکیم امین الدین قیمت 450 روپے	خزان الادویہ 8 حصے یکجا علامہ حکیم نجم الثقی رام پوری قیمت: باتصویر 3000، بغیر تصویر 2500
کلیات الادویہ حکیم کبیر الدین قیمت 900 روپے	معالجات شرح اسباب 4 حصے یکجا حکیم کبیر الدین (دو جلدوں میں) قیمت 960 روپے	طب اکبر حکیم اکبر ارزانی قیمت 600 روپے
بیاض کھنڈرات وید جوگی سوامی داس قیمت 360 روپے	تاریخ الاطباء حکیم وڈاکٹر غلام جیلانی قیمت 1200 روپے	مہجرات اعظم حکیم اعظم خان قیمت 250 روپے

عثمان پبلی کیشنز

جلال دین وقف ہسپتال ماروہ بازار لاہور فون: 042-37640094 سہاگل 0311-41412906 - 0333-4275783

عثمان پبلی کیشنز کی مایہ ناز بکس



پتھریا

حکیم عبدالرحمن
ڈاکٹر ظفر اقبال

تیز مرج مصالحو جات اور گندی چیزوں میں جتنے پتھر یعنی مٹی، گند ہوتا ہے وہ اندر جا کر پتھری بن جاتا ہے ان سے نجات کیسے حاصل ہو، آئیں علاج کریں۔

قیمت - 150/- روپے



کلونجی

حکیم عبدالرحمن
نور محمد چوہدری

موت کے سوا ہر مرض کا علاج کلونجی کرتی ہے لیکن کیسے کلونجی سے دوائے بنائی جائے، کلونجی سے درست فائدہ اٹھانا اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔

قیمت - 120/- روپے



سلک مروارید
جنسی امراض

حکیم عبدالرحمن
حکیم عبدالرحمن

جنسی الجھنوں کے حل پر ایک مکمل جنسی کتاب جنسی بیماریوں کا بھرپور علاج، تشخیص علاج اسباب علامات کا ذکر با تصویر، جنسی بیماریوں کا حل مردانہ امراض پر ڈاکٹر بیماریوں کو کیسے درست کرتے ہیں۔

قیمت - 450/- روپے



نبض اور تشخیص امراض

حکیم بوعلی سینا
حکیم عبدالرحمن

نبض اور تشخیص پر قدیم کتاب بوعلی سینا کی بہترین اور تشخیص یکجا موضوع کئی سال سے گم تھی اب ملی تو چھاپ دی ہے قدیم کتابوں کے شوق رکھنے والے حضرات ضرور دیکھیں۔

قیمت - 390/- روپے

عثمان پبلی کیشنز، زجلال دین ہسپتال چوک اردو بازار لاہور

Ph # 042-7640094 Mob # 0333-4275783

منہ کا پتہ