آسان علاج

(روزمرہ بیماریوں اور علاج پر آسان کتاب)

ڈاکٹر محمد عثمان

آسان علاج

(روزمرہ بیماریوں اور علاج پر آسان کتاب)

ڈاکٹر محمد عثمان

عثمانیہ پبلی کیشنز

قیمت: 120 روپے

عثمانیہ پبلی کیشنز۔ پشاور، فون: 091-2262443

”قارئین سے گزارش“

اس کتاب میں عام قارئین کی معلومات کیلئے روزمرہ امراض سے متعلق مختصر سا تعارف اور اِن امراض کا ہومیو پیتھک اور انگریزی علاج تجویز کیا گیا ہے۔ کسی بھی مرض کے علاج کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ علاج کے ضمن میں لکھی گئی ادویات بڑوں یعنی بالغوں کیلئے تجویز کی گئی ہیں۔ اِن ادویات کو 18 سال سے بڑے افراد میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تجویز کی گئی ادویات چونکہ بچوں کیلئے نہیں ہیں اس لئے اِن ادویات کا استعمال 18 سال سے کم عمر افراد اور بچوں میں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نیز کسی بھی مرض کے علاج کیلئے تجویز کی گئی ادویات سے پہلے کسی مستند ہومیو پیتھک ڈاکٹر یا ایلو پیتھک ڈاکٹر سے ضرور رجوع فرمالیں۔ (شکریہ)

ڈاکٹر محمد عثمان
ہومیو پیتھک جنرل کلینک
کرشن پورہ نزد بلال ٹاؤن، جی، ٹی، روڈ پشاور شہر
فون: 091-2262443۔ موبائل: 0310-9662362
اوقات مشورہ: صبح 9 بجے تا 1 بجے، شام 4 بجے تا 7 بجے۔ تعطیل بروز اتوار
YouTube Homeo Clinic Online Chanel

نمبر	عنوان		صفحہ
01	آشوب چشم	OPHTHALMITIS	07
02	آگ سے جلنا	FIRE BURNS	08
03	آواز بیٹھ جانا	HOARSENESS OF VOICE	09
04	اپھارہ۔نفخ شکم۔گیس	FLATULANCE	10
05	احتلام۔جریان	SPERMATORRHOEA	11
06	الرجی	ALLERGY	12
07	اسہال۔دست	DIARRHOEA	13
08	انفلوئنزا	INFLUENZA	14
09	ایگزیما	ECZEMA	15
10	بھوک میں کمی	ANOREXIA	16
11	بخار	FEVER	17
12	بدہضمی	DYSPEPSIA	18
13	بلڈپریشر کم ہونا	HYPOTENSION	19
14	بلڈپریشر زیادہ ہونا	HYPERTENSION	20
15	بواسیر	HAEMORRHOIDS	21
16	پیٹ کا درد	ABDOMINAL COLIC	22

نمبر	عنوان		صفحہ
17	پیٹ کے کیڑے	ABDOMINAL WORMS	23
18	پھوڑا پھنسی	ABSCESS	24
19	پیشاب کی جلن	BURNING MICTURATION	25
20	پرسوتی بخار	PUERPERAL FEVER	26
21	پیچش	DYSENTERY	27
22	پستانوں میں دودھ کی کمی	SUPPRESSED MILK	28
23	تپ محرقہ۔ٹائی فائیڈ	TYPHOID FEVER	29
24	جوڑوں کا درد	ARTHRITIS	30
25	جریانِ خون	HAEMORRHAGE	31
26	چوٹ لگنا	TRAUMA	32
27	چکر آنا	GIDDINESS	33
28	چھپاکی	URTICARIA	34
29	حیض کا درد سے آنا	DYSMENORRHOEA	35
30	حیض کی کثرت	MENORRHAGIA	36
31	حیض کی بندش	AMENORRHOEA	37
32	خسرہ	MEASLES	38

نمبر	عنوان		صفحہ
33	خارش و کھجلی	SCABIES	39
34	دانت درد	TOOTHACHE	40
35	دردِ کان۔کان بہنا	OTALGIA / OTORRHOEA	41
36	دردِ سر۔درد بدن	HEADACHE / PAINS	42
37	دردِ شقیقہ۔آدھے سر کا درد	MIGRAINE	43
38	دردِ کمر	BACKACHE	44
39	دمہ	ASTHMA	45
40	زکام و نزلہ	CORYZA	46
41	عرق النساء	SCIATICA	47
42	قبض	CONSTIPATION	48
43	قے و متلی	NAUSEA / VOMITING	49
44	کھانسی	COUGH	50
45	کمی خون	ANAEMIA	51
46	کیل۔مہاسے۔چھائیاں	FRECKLES / ACNES	52
47	گردوں کا ورم	NEPHRITIS	53
48	گلے پڑنا	TONSILLITIS	54

نمبر	عنوان		صفحہ
49	گردوں میں درد و پتھری	RENAL COLIC / CALCULI	55
50	گوہا نجنی	STYE	56
51	لیکوریا	LEUCORRHOEA	57
52	مردانہ کمزوری	SEXUAL WEAKNESS	58
53	منہ میں چھالے	MOUTH ULCERS	59
54	ملیریا بخار	MALARIAL FEVER	60
55	ناک میں گوشت/رسولی	NASAL POLYP	61
56	نکسیر بہنا	EPISTAXIS	62
57	یرقان	JAUNDICE	63
58	ہدایات برائے صحت	HEALTH ADVICES	64

عثمانیہ پبلی کیشنز

آشوب چشم

(OPHTHALMITIS)

دنیا بھر کے سارے ممالک میں آنکھوں کی بیماریوں میں یہ بیماری سب سے زیادہ عام ہے۔ مریض آنکھوں میں خارش اور جلن کی شکایت کرتا ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آنکھیں سوجھی ہوئی سرخ نظر آتی ہیں۔ گاڑھی رطوبت کی موجودگی کی وجہ سے پلکیں آپس میں چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ مریض کی آنکھیں سرخ ہو کر سوجھ جاتی ہیں۔ ایسا عموماً بیکٹیریل، وائرل اور پیراسائیٹک والرجک انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آشوب چشم وائرس یا الرجی کی وجہ سے ہو تو آنکھوں سے گاڑھی رطوبت کی جگہ پتلا پانی بہتا ہے۔ ایسا مریض دھوپ، روشنی اور ٹی وی کی جانب نہیں دیکھ سکتا۔ اس بیماری کے علاج کے سلسلے میں مریض کو چاہیے کہ وہ ادویات استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو وقتاً فوقتاً ٹھنڈے پانی سے دھوئے اور باہر نکلنے کی صورت میں کالے چشموں کا بھی استعمال کرے۔ اس کے علاوہ آنکھوں سے نکلنے والی رطوبات کو صاف کرنے کے لئے ٹشو پیپر یا علیحدہ رومال کا استعمال کرے۔ اسی طرح مریض کی تولیہ بھی گھر کے دوسرے افراد سے علیحدہ ہونا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: یوفریزیا 30 پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ یوفریزیا آئی ڈراپس دو دو قطرے دن میں تین مرتبہ آنکھوں میں ڈالیں۔

آشوب چشم کا انگریزی علاج		
➢	Cap Velosef 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Prednisynth Eye Drops	2+2+2 قطرے آنکھوں میں ڈالیں
➢	Tab Rigix	ایک گولی روزانہ رات کو

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

آگ سے جلنا

(FIRE BURNS)

آگ سے جلنا عموماً اتفاقی یا حادثاتی طور پر ہوتا ہے، کئی مرتبہ بے احتیاطی کی وجہ سے بھی لوگ جل جاتے ہیں۔ بچے عموماً کھیلتے ہوئے جل جاتے ہیں۔ سرجری کے اصول کے مطابق جلنے کے کئی درجے ہیں۔ لیکن عام طور پر گریڈ ون، ٹو یا تھری تک مریض جلتے ہیں جس میں کہ مریض کی جلد جل جانے کے بعد سرخ ہو جاتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ جلد کے بال جل کر غائب ہو جاتے ہیں اور جلد پر چھالے بن جاتے ہیں اور مریض کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ زیادہ گہرائی تک جل جانے کی وجہ سے مریض کو جلن محسوس نہیں بھی ہو سکتی ہے جو کہ میڈیکل اصطلاح میں ایک خطرناک علامت سمجھی جاتی ہے۔ بہر حال اگر مریض معمولی درجے کا جلا ہے تو اسے فرسٹ ایڈ کے طور پر درج ذیل ادویات استعمال کرائی جا سکتی ہیں۔ زیادہ حد تک جل جانے کی صورت میں مریض کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرسنکم البم 30 دن میں تین مرتبہ اور بروکس برن کریم لگائیں۔

آگ سے جلنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Augmentin 625mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Ponstan Forte	1+1 کھانے کے بعد
➢	Quench Cream	جلے ہوئے مقام پر صبح شام لگائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

آواز بیٹھ جانا

(HOARSENESS OF VOICE)

عام طور پر آواز بیٹھ جانے کی وجہ لیرنکس کی خرابی ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ ووکل کارڈز کے صحیح طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مقامی طور پر لیرنکس یا ووکل کارڈز میں انفلے میشن۔ انفیکشن، ٹیومرز، کینسر، نوڈیولز یا پالپس بن جانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک دم اچانک گلا بیٹھ جانے کی وجہ عام طور پر وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے جس میں کہ مریض کو آواز بیٹھ جانے کے ساتھ ساتھ ہلکی کھانسی، بخار اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ گلے کے بے قاعدہ استعمال اور الرجی کی وجہ سے بھی آواز بیٹھ سکتی ہے۔ لیرنکس پر ہوائی راستوں کے دوسرے انفیکشن بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ اونچی اور تیز آواز کا استعمال بھی آواز کے بیٹھ جانے کا موجب بن سکتا ہے۔ اکثر بچوں اور ٹیچروں میں بھی چیخ چیخ کر بولنے کی عادت کی وجہ سے بھی گلا متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لیرنکس کی سوزش ہو جاتی ہے اور ووکل کارڈز پر بلیڈنگ کے باعث آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح لمبے عرصے تک گانا گانے والے فنکاروں میں بھی آواز کے زیادہ استعمال کے باعث گلا اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آواز وقتی طور پر کچھ دنوں سے بیٹھی ہو تو درج ذیل علاج کرنا چاہیے؛

ہومیوپیتھک علاج: کاسٹیکم 200 پانچ قطرے صبح، شام نہار منہ استعمال کریں۔

آواز کے بیٹھ جانے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Erythrocin 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Danzen D.S	1+1 کھانے کے بعد
➢	Listerine Mouth Wash	صبح، شام آدھ گلاس پانی میں ملا کر غرارے کریں

☆☆☆☆☆☆☆☆

اپھارہ ۔ گیس

(FLATULANCE)

پیٹ کی گیس یا اپھارہ پاکستان میں پایا جانے والا ایک عام مرض ہے۔ عام طور پر لوگوں میں اس کی شکایت کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ کھانا صحیح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے یا آنتیں مکمل حرکات نہ کر کے پیدا ہونے والی گیس کو آگے نہیں دھکیلتیں جس کی وجہ سے کھانے کے بعد مریض کو پیٹ تنا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ڈکاریں یا تو نہیں آتیں یا پھر بار بار آتی ہیں۔ کئی مریض پیٹ میں گیس کے باعث اپنے دل اور دماغ کی جانب بوجھ سا محسوس کرتے ہیں۔ کئی طرح کی دالیں، سبزیاں اور فروٹس زیادہ گیس پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ کئی مرتبہ مریض کو گیس کی وجہ سے پیٹ میں درد اور الٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانے یا ہلکی چہل قدمی نہ کرنے کے باعث بھی پیٹ میں گیس ہو جایا کرتی ہے۔ اکثر مریضوں میں تشویش یا ڈر و خوف کے باعث بھی گیس ہو جایا کرتی ہے۔ بہر حال گیس کی بیماری کے لئے درج ذیل علاج کیساتھ ساتھ مرچ مصالحوں اور بادی اشیاء مثلاً آلو، کچالو، گوبھی، لوبیا وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: کاربو ویج 30 صبح، شام اور نکس وامیکا 30 دوپہر، رات نہار منہ لیں۔

گیس کا انگریزی علاج		
➢	Syp Gaviscon	1+1+1 بڑا چمچہ کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ

★★★★★★★★

احتلام۔ جریان

(SPERMATORRHOEA)

رات کو سوتے میں منی کے ڈسچارج ہونے کو احتلام کہتے ہیں جبکہ چلتے پھرتے اگر مریض کو منی کے قطرے آنے لگیں تو اس کنڈیشن کو جریان کہا جاتا ہے۔ ہفتہ میں دو ایک بار احتلام ہونے کو نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مرتبہ احتلام ہو تو یہ ایک ابنارمل کنڈیشن ہے جس کا فوری اور بروقت علاج ضروری ہے۔ احتلام اور جریان کی وجوہات عام طور پر ایک ہی ہوتی ہیں۔ فحش لٹریچر کا مطالعہ، اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنا، ذہنی خیالات کا جنسی جانب رجحان ہونا، جنسی طور پر کمزوری، جلق و خود لذتی اور گرم اشیاء کا زیادہ استعمال عام طور پر احتلام و جریان کا موجب بنتا ہے۔ احتلام و جریان کا مریض دن بدن بغیر کسی ظاہری وجہ کے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے گال اندر کو پچک جاتے ہیں۔ آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ آنکھوں کے ارد گرد سیاہ سے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سی تیز آواز اور تشویش سے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور چہرے پر مردنی سی چھائی ہوتی ہے۔ ایسا مریض زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتا اور تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ مریض کی ذہنی اور اعصابی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: چائنا30+ایسڈ فاس30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

احتلام کا انگریزی علاج		
➢	Tab Prothiaden 25mg	ایک گولی روزانہ رات
➢	Cap Vivioptal	ایک روزانہ
➢	Cap E-Vion 400mg	ایک روزانہ

☆☆☆☆☆☆☆☆

الرجی

(ALLERGY)

الرجی ایک براڈ ٹرم ہے۔ جس کے معنی کسی بھی چیز سے حساس ہونے کے ہیں۔ آج کل یہ مرض پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ بڑے تو بڑے چھوٹے بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یوں تو الرجی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے لیکن ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے آجکل دھول، گرد و غبار اور دھوئیں سے الرجی بہت کامن ہے۔ الرجی کی وجہ سے مریض کی ناک بہتی ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ چھینکیں آتی ہیں۔ کھانسی ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کئی بچوں میں استھما ہو سکتا ہے۔ جِلد پر جلن اور جِلدی ریش بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مریض کی آنکھوں، ہونٹوں اور زبان پر سوجن، جِلد اور آنکھوں میں خارش جلن اور سرخی ہو جاتی ہے۔ بہر حال الرجی کسی بھی وجہ سے ہو اور اگر یہ الرجی قابل برداشت ہو تو درج ذیل ادویات استعمال کرنی چاہئیں اور خدانخواستہ اگر الرجی کا اٹیک انتہائی تیز ہو تو مریض کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: سلفر 30+آرسنکم 30+پوتھوز 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

الرجی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Zyrtec 10mg	ایک گولی روزانہ
➢	Betnovate Ointment	الرجی والی جگہ پر صبح، شام لگائیں

★★★★★★★★

اسہال ۔ دست

(DIARRHOEA)

یہ مرض عام طور پر بچوں اور بوڑھوں کو ہوتا ہے لیکن جوانوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام مرض ہے جس میں مریض کو ایک دم پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پانی جیسے پتلے دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں مروڑ، متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا عموماً بیکٹیریا، پیراسائٹس یا وائرسز کے ٹاکسن پیدا ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایکولائی۔ جیارڈیا لیمب لیا۔ شائی گیلا۔ اینٹ میبا ہسٹولائیٹیکا اور وابریو کالرا جراثیموں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر مریض کو دست زیادہ تعداد میں آجائیں تو اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پیروں میں ناطاقتی سی آجاتی ہے۔ کمزوری کے باعث مریض نڈھال سا ہو جاتا ہے اور جسم کا پانی و نمکیات ضائع ہو جانے کے باعث مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ اسہال کی صورت میں مریض پر فوری توجہ دینی چاہیے اور علاج کے ساتھ ساتھ مریض کی خوراک اور پانی نہایت صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ٹائلٹ سے آنے کے بعد ہر مرتبہ مریض کو ہاتھ صابن سے صاف کرنے چاہئیں۔ دستوں کے علاج کیلئے درج ذیل ادویات استعمال کریں اور افاقہ نہ ہونے کی صورت میں مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے جا کر ڈرپ لگوانی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: وریٹرم البم 30+اپی کاک 30+پوڈوفائلم 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

اسہال ۔ دست کا انگریزی علاج		
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Ciprox 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 کھانے سے پہلے

★★★★★★★★

انفلوئنزا

(INFLUENZA)

یہ ایک وبائی مرض ہے جو کھانسنے اور چھینکیں آنے کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا سبب انفلوئنزا وائرس اے اور بی ہیں۔ مریض کو یکدم نزلہ اور زکام و خشک کھانسی اور سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں بخار بھی چڑھ جاتا ہے اور سارے جسم میں درد کے ساتھ کمر درد بھی محسوس ہوتا ہے بخار چڑھنے کے وقت سردی بھی لگتی ہے۔ بچوں میں یہ انفیکشن شدید صورت اختیار کر کے نمونیا کا بھی موجب بن سکتا ہے لہٰذا اس مرض میں بچوں کی بہت زیادہ نگہداشت کرنی چاہیے اور ایسے مریض کو دوسرے اشخاص سے دور رکھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ بڑی عمر کے مریضوں میں انفلوئنزا کے حملے کے دوران سخت کمر درد کی شکایت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر ناک سے رطوبات کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہو تو ناک سرخ ہو جاتی ہے اور کئی مریضوں میں ناک کی ایک سائیڈ یا دونوں سائیڈیں بند ہو کر سخت سر درد کی شکایت پیدا کر دیتی ہیں۔ اکثر اوقات اگر انفلوئنزا کا علاج درست طریقے پر نہ کیا جائے تو مریض سائینوسائی ٹس کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انفیکشن پھیل کر آنکھوں پر بھی حملہ کر کے آنکھوں کو سرخ اور پانی بہنے کی شکایت کر سکتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: برائی اونیا 30+یوپاٹوریم 30+جیلسی میم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

انفلوئنزا کا انگریزی علاج		
➢	Tab Arinac Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Toot Siah	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Joshanda Sachets	صبح، دوپہر، شام گرم پانی میں پئیں

★★★★★★★★

ایگزیما

(ECZEMA)

یہ ایک جلدی مرض ہے اور جِلد کے بیماریوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ ایگزیما جسم کے کسی بھی حصہ کی جِلد پر پایا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر چہرے، سر اور ہاتھوں کی جِلد پر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس مرض میں کسی جراثیم کا دخل نہیں لیکن چند بیکٹیریا کی موجودگی ایگزیما کے مرض کو تقویت دیتی ہیں۔ ایگزیما کی جگہ چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں بہت گنجان پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں کی جِلد سرخ ہو جاتی ہے۔ اس میں درد، جلن، اور خارش ہوتی ہے۔ بسا اوقات رطوبت بھی خارج ہوتی ہے۔ ایگزیما کے اوپر یہ رطوبت پپڑیوں اور کھرنڈوں کی صورت میں جمتی جاتی ہے۔ عام طور پر ایگزیما کی دو اقسام دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک قسم کو ڈرائی ایگزیما یعنی خشک ایگزیما کہتے ہیں جبکہ دوسری قسم کو ویٹ ایگزیما یعنی بہنے والا ایگزیما کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگوں میں ایگزیما کی ایک اور قسم دیکھنے میں آتی ہے جسے کانٹیکٹ ایگزیما یعنی رگڑ کے ذریعے پیدا ہونے والا ایگزیما کہتے ہیں۔ کانٹیکٹ ایگزیما عام طور پر تنگ جوتا پہننے سے پیر میں پیدا ہو سکتا ہے یا ٹائی لگانے والے مردوں میں ٹائٹ کالر کے گردن پر رگڑ لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو ڈھیلا ڈھالا جوتا یا ڈھیلا کالر پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: مزیریم 30+آرسنیکم 30+رسٹاکس 30+سلفر 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

ایگزیما کا انگریزی علاج		
➢	Tab T-Day	ایک گولی روزانہ
➢	Cap Vibramycin	ایک کیپسول روزانہ
➢	Clobederm-NN Oint:	صبح، شام متاثرہ جِلد پر لگائیں

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

بھوک میں کمی

(ANOREXIA)

بھوک میں کمی کسی بھی عمر کے افراد میں پائی جاسکتی ہے۔عام طور پر اس کی وجوہات یہ ہیں۔نفسیاتی دباؤ، مرغن غذاؤں کا استعمال، معدہ اور جگر و آنتوں کا صحیح کام نہ کرنا، کاروباری مصروفیات، کھانا کھانے کا وقت صحیح نہ ہونا، ڈائجسٹو انزائمز کی کمی، پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی اور رہن سہن کے طریقوں کا صحیح نہ ہونا، بسا اوقات جسم میں کسی بڑی اور پرانی بیماری کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مریض کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔اس کے علاوہ جگر کے امراض اور جگر کے فنکشن درست نہ ہونے کے باعث بھی بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔عام طور پر جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ویسے ویسے اس کی بھوک میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص تساہل پسند ہو یعنی کھانا کھانے کے بعد بالکل چہل قدمی نہ کرتا ہو تو چہل قدمی نہ کرنے کی اس عادت سے بھی بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: ایلفلفا 30+ نکس وامیکا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ نہار منہ دیں۔

بھوک میں کمی کا انگریزی علاج		
➢	Syp Tres-Orix Forte	1+1+1 بڑا چمچہ نہار منہ
➢	Tab Plasil with Enzyme	1+1 گولی نہار منہ
➢	Tab Surbex-Z	ایک گولی روزانہ

☆☆☆☆☆☆☆☆

بخار

(FEVER)

جسم میں کئی طرح کی انفیکشنز کی پہلی نشانی بخار چڑھنا ہو سکتی ہے۔ چند دنوں کے بعد انفیکشن کی دوسری علامات و نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کی بناء پر مرض کی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے۔ کئی بار بخار بار بار چڑھتا ہے لیکن سب طرح کے لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کے باوجود اصل وجہ کا پتہ نہیں چلتا لہٰذا ایسے بخار کو PUO یعنی پائریکسیا آف اَن ناؤن اوریجن کہتے ہیں۔ بہر حال بخار چڑھنے کی عام وجوہات نظام تنفس کا انفیکشن، گیسٹرو انٹرائی ٹس، یوٹی آئی، متعدی امراض، ٹی بی، جسم میں کینسر کی موجودگی، جسم میں چھپی ہوئی انفیکشن، ڈرگزری ایکشن اور تھکاوٹ وغیرہ ہیں۔ اسی طرح بچوں اور نوجوانوں میں بخار کی ایک عام وجہ گلوں کا پکنا یعنی ٹانسی لائی ٹس بھی ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر اگر بخار 99 ڈگری فارن ہیٹ سے 101 ڈگری فارن ہیٹ کے درمیان ہو تو اس کا علاج عام دافع بخار ادویات سے کیا جاتا ہے لیکن اگر بخار 102 ڈگری فارن ہیٹ سے اوپر ہو جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے جس کی تشخیص کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ بخار کی وجہ کے مطابق مریض کا علاج کیا جا سکے کیونکہ جب تک اصل وجہ کا علاج نہ کیا جائے بخار نہیں اترا کرتا ہے۔ بخار کی وجہ کے مطابق دافع بخار دوا کے ساتھ ساتھ بہر حال اینٹی بائیوٹک دوا کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر صرف دافع بخار دوا دینے سے بخار نہ اترے یا اتر کر بار بار چڑھ جائے تو پھر ایسے بخار کی تشخیص کے لئے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

ہومیوپیتھک علاج: ایکونائٹ 30+آرسنکم 30+جیلسی میم 30+یوپاٹوریم 30 ملا کر دیں۔

بخار کا انگریزی علاج		
➢	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

بد ہضمی

(DYSPEPSIA)

خوراک کا درست طور پر مقررہ وقت میں ہضم نہ ہونا دراصل بد ہضمی کہلاتا ہے۔ کئی مرتبہ ثقیل اور مرغن غذاؤں کے استعمال سے بھی بد ہضمی ہو جایا کرتی ہے۔ بد ہضمی پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن کئی مریضوں کو پیٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ سارے ٹیسٹ کروانے کے باوجود خوراک کی نالی، معدہ، ڈیوڈینم، پتے یا پینکریاز میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی لیکن مریض پھر بھی پیٹ میں گیس اور کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ ایسا عموماً بار بار سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس سے کہ پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے۔ ورزش اور چہل قدمی نہ ہونے کی وجہ سے، مرغن غذاؤں کے بکثرت استعمال سے، انتڑیوں کی حرکات سست ہونا، معدہ، آنتوں، پینکریاز، جگر کی رطوبات انزائمز اور بائل کا صحیح طور پر خارج نہ ہونا بد ہضمی کی عام وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نفسیاتی عوارض مثلاً ٹینشن، ڈپریشن یا تشویش جیسے مرض میں مبتلا ہو تو بھی نظام انہظام کا فنکشن بگڑ سکتا ہے اور اس طرح مریض کے لئے بد ہضمی کی صورت سامنے آسکتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+پلسٹلا30+کاربو ویج30+ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

بد ہضمی کا انگریزی علاج		
➢	Cap Eplazyme	1+1+1 نہار منہ
➢	Syp Colic	1+1+1 بڑا چمچ کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ

★★★★★★★★

بلڈ پریشر کم ہونا

(HYPOTENSION)

اکثر کمزور حضرات میں بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک حد تک بلڈ پریشر کم ہو تو مریض کو دل ڈوبنے، کمزوری، سستی اور غنودگی کی شکایت ہو گی لیکن بلڈ پریشر کافی حد تک گر جائے تو مریض شاک کی حالت میں چلا جاتا ہے جو کہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ عام طور پر نمکیات کا کم استعمال، بھوکا رہنے، پسینہ کی زیادتی، کام کی زیادتی اور آرام کی کمی، مختلف ہارمونز کی کمی، جسم میں وٹامنز اور منرلز کی کمی، پرانی بیماریوں کی موجودگی، فلوئیڈز کا کم استعمال اور نفسیاتی و اعصابی بیماریاں وغیرہ بلڈ پریشر کی کمی کا باعث بنتی ہیں اور مریض ہر وقت کمزوری و سستی محسوس کرتا ہے۔ آج کل کم عمر لڑکیوں اور خصوصاً نوجوان عورتوں میں بلڈ پریشر کی کمی کا عارضہ کافی پایا جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں اور عورتوں میں اسمارٹ نظر آنے کیلئے کھانا انتہائی کم مقدار میں کھانے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ذیابیطس میں مبتلا مریض اگر حد سے زیادہ پرہیز کریں اور لیکوئڈ بالکل نہ لیں تو بھی بلڈ پریشر اور شوگر دونوں گر جاتی ہیں جو ایک انتہائی خطرناک، ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: چائنا30+اگنیشیا30+الفلفا30+کالی فاس30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

بلڈ پریشر کے کم ہونے کا انگریزی علاج		
➢	Calcee Sachets	جب بلڈ پریشر گرے تو فوراً پانی میں ملا کر پئیں
➢	Tab CaC Plus 1000	ایک گولی روزانہ پانی میں حل کر کے پئیں
➢	Tab Theragran Ultra	ایک گولی روزانہ کھائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

بلڈ پریشر زیادہ ہونا

(HYPERTENSION)

ہائی بلڈ پریشر بڑی عام بیماری ہے۔ کئی لوگوں میں خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں صرف اوپر والا سسٹولک بلڈ پریشر بڑھا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں دونوں یعنی اوپر اور نچلے والے پریشر بڑھے ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک کرانک مرض ہے۔ جو شروع میں کوئی تکلیف نہیں دیتا لیکن بعد میں جسم کے مختلف اعضاء کی بلڈ ویسلز تنگ ہو کر فالج، ہارٹ اٹیک، گردوں کے فیل ہونے، ٹانگوں میں خون کی سپلائی کم کرنے اور بینائی ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی عام وجوہات میں نمک، مرچ مصالحہ جات، چکنائی، گھی، تیل کا زیادہ استعمال، اعصابی، نفسیاتی دباؤ، رینل وابنڈو کرائن بیماریاں، نظام دوران خون اور دل کی بیماریاں اور مختلف ڈرگز کا استعمال شامل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروعات میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کوئی خاص علامات سامنے نہیں آتیں بلکہ یہ مرض روٹین میڈیکل چیک اَپ کے دوران پکڑا جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کچھ علامات سامنے آسکتی ہیں جن میں سر درد ہونا، چکر آنا، دل متلانا، پیشاب کا زیادہ آنا، جسم میں بے چینی سی ہونا، چہرے اور آنکھوں کا سرخ ہو جانا، نظر کا دھندلانا اور غصے کا زیادہ آنا وغیرہ شامل ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: گلونائن 30+کریٹیگس 30+پیسی فلورا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Sofvasc 5mg	ایک گولی روزانہ
➢	Tab Lexotanil 3mg	آدھی گولی روزانہ رات

☆☆☆☆☆☆☆☆

بواسیر

(HAEMORRHOIDS)

ریکٹم کی اندرونی سطح کی وریدوں کا اجتماع خون کی وجہ سے پھُول جانا بواسیر کہلاتا ہے۔ان پھُولی ہوئی وریدوں کو عام زبان میں بواسیری مسے کہا جاتا ہے۔پرانا قبض، زیادہ مرچ مصالحوں کا استعمال، زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرنا، ورزش اور چلنے پھرنے کی کمی اور زیادہ گرم اشیاء کا استعمال بواسیر کے مرض کا عام سبب ہیں۔اس مرض میں مسوں کے بن جانے کی وجہ سے مقعد کے اندر خارش، جلن اور درد ہوتا رہتا ہے۔رفع حاجت کے وقت یہ مسے مقعد سے باہر نکل آتے ہیں۔اگر یہ مسے خون سے بھرے ہوئے ہوں تو پھر مریض کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ بواسیر بلیڈنگ والی یعنی خونی بواسیر اور نان بلیڈنگ یعنی بادی بھی ہو سکتی ہے۔بواسیر کا مریض شروعات میں مقعد میں محض بے چینی یا ہلکی سی خارش محسوس کرتا ہے اگر مریض اس مرحلے پر ہی اپنا علاج کروالے تو نوبت اگلے تکلیف دہ مرحلے تک نہیں پہنچ پاتی لیکن اکثر مریض مقعد کی اس بے چینی اور ہلکی خارش کو کوئی توجہ نہیں دیتے جس کے باعث یہ مرض بڑھ کر ایک تکلیف دہ صورت اختیار کر جاتا ہے جس میں پھر مریض کو مقعد میں انتہائی درد، جلن، بے چینی اور یہاں تک کہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+ایلوز30 ملا کر تین مرتبہ دیں اور میکٹم ہیمورائیڈ کریم لگائیں

بواسیر کا انگریزی علاج		
➢	Tab Daflon 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Hadensa Forte Oint:	مقعد میں تکلیف کی صورت میں لگائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

پیٹ کا درد

(ABDOMINAL COLIC)

پیٹ میں درد کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کئی بار پیٹ میں درد ایک دم شدید شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایمرجنسی صورتحال ظاہر کرتا ہے اور اس کی فوری وجہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کئی صورتوں میں فوراً سرجری کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اپنڈے سائی ٹس، انٹسٹائنل آبسٹرکشن، گال سٹونز وغیرہ۔ پیٹ کی کئی خرابیوں میں پیٹ میں بار بار درد کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس کی عام وجوہات گیسٹرائی ٹس، پیپٹک السر، گیسٹرو انٹرائی ٹس، اپنڈی سائی ٹس، کولی سسٹ ٹائی ٹس، گال سٹونز، انٹسٹائنل آبسٹرکشن، رینل اور یوریٹریک سٹونز، پیٹ میں گیس، پیری ٹونائی ٹس، سٹرینگولیٹڈ ہرنیا، قبض اور ماہواری کا درد سے آنا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر پیٹ کا درد نان سرجیکل وجوہات کی بناء پر ہو تو درج ذیل ادویات بہترین رزلٹ دیتی ہیں اور اگر خدانخواستہ کسی سرجیکل بیماری کے باعث پیٹ کا درد ہو تو اس کے لئے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہلکے پیٹ درد میں درج ذیل ادویات دے کر افاقہ کی صورت دیکھی جائے۔ اگر پیٹ درد میں ادویات دینے کے باوجود افاقہ نہ ہو تو مریض کو فوراً کسی ہسپتال یا سرجن کو دکھائیں۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوسنتھ 30+کاربو ویج 30+ڈائسکوریا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

پیٹ کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Nospa Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Mucain	2+2+2 کھانے کے بعد
➢	Syp Lilac	2+2+2 اگر قبض ہو

★★★★★★★★

پیٹ کے کیڑے

(ABDOMINAL WORMS)

پیٹ کے کیڑے بچوں میں پائی جانے والی سب سے زیادہ عام انفیکشن ہے۔ ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ انفیکشن بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ عام طور پر کچی سبزیاں استعمال کرنے، مٹی میں کھیلنے کودنے اور ٹائلٹ سے آنے کے بعد ہاتھ صحیح طور پر صاف نہ کرنے سے یہ انفیکشن لگ جاتا ہے۔ ایسے مریض بچے کھاتے زیادہ ہیں۔ لیکن سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ خون کی کمی اور پیٹ درد ہوتا ہے۔ سوتے میں دانت رگڑتے ہیں۔ ناک سے رطوبت بہتی رہتی ہے اور بچے کا پیٹ نارمل سے بڑھا ہوتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کی عام اقسام راؤنڈ ورم، ہک ورم، تھریڈ ورم اور ٹیپ ورم ہیں جن کا لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر پیٹ کے کیڑوں کا درست علاج نہ کرایا جائے تو بچہ خون کی کمی کا شکار ہو کر انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا رنگ دن بدن پیلا پڑتا جاتا ہے۔ وزن کھانے پینے کے باوجود کم ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ کئی بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے باعث تنفسی امراض یا دمہ جیسی تکلیف دہ بیماری بھی پائی جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: سائنا30+سینٹونائنم30+ٹیوکریم30+فلکس فاس30 ملا کر دیں۔

پیٹ کے کیڑوں کا انگریزی علاج		
➢	Tab Vermox 100mg	1+1 روزانہ تین دنوں تک دیں
➢	Syp Antipar	ایک چھوٹا چمچہ رات کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد
➢	Syp Faulad	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

پھوڑا ۔ پھنسی

(ABSCESS)

پھوڑا، پھنسی پیدا ہو جانا دراصل ایک عام جِلدی بیماری ہے۔ ایسا عام طور پر جِلد کے انفیکشن کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے کہ جسم میں کسی بھی مقام پر پھوڑا یا پھنسیاں پیدا ہو جائیں لیکن بعض اوقات جِلد پر سے بالوں کا اُکھڑنا یا ٹوٹنا، خون کی خرابیاں، کسی کیڑے مکوڑے کا کاٹنا، زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال، ڈرائی فروٹس کی زیادتی، مرچ مصالحہ جات کا زیادہ استعمال، پانی کا کم استعمال اور موسمی اثرات بھی پھوڑے پھنسی کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جراثیموں کی موجودگی بھی ہے جس کی وجہ سے بھی جلد پر پھوڑا یا پھنسی نمودار ہو سکتی ہے۔ پھوڑا جسم کے کسی بھی حصے پر ہو تو پیپ کی موجودگی کے باعث انتہائی تکلیف دہ جلن دار درد کرتا ہے۔ کئی مرتبہ پھوڑے سے خون ملا مواد یا پیپ رِس کر خود بخود باہر بہتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر پھنسیاں چہرے پر پیدا ہو جائیں تو یہ تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ چہرے کی خوبصورتی کو بھی انتہائی متاثر کرتی ہیں۔ چہرے پر دانے، ایکنی اور پھنسیاں نکلنے کی ایک بڑی وجہ نفسیاتی عوارض خصوصاً ٹینشن اور ڈپریشن بھی ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج : بیلاڈونا 30+ ہیپر سلف 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ اس کے علاوہ چہرے کے دانوں پر لگانے کے لئے کینٹ ایکنی سیلبی کریم صبح، شام استعمال کریں۔

پھوڑا ۔ پھنسی کا انگریزی علاج		
➢	Cap Lincocin 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymotrip Forte	1+1 کھانے کے بعد
➢	Betnovate-N Cream	صبح، شام دانوں پر لگائیں

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

پیشاب کی جلن

(BURNING MICTURATION)

پیشاب میں جلن آج کل پائی جانے والی ایک عام کیفیت ہے۔اس کیفیت میں مریض کو عموماً پیشاب کرنے کے دوران، پیشاب کی نالی میں گرمائش، بے چینی، درد اور جلن کا احساس پایا جاتا ہے۔پیشاب کی جلن عام طور پر یوریزی ٹریکٹ کے کسی انفیکشن کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔عام طور پر یوریزی انفیکشن ای کولائی یا اسٹریپٹو کوکائی جراثیموں کے باعث ہوا کرتا ہے۔اگر پیشاب میں جلن کسی انفیکشن کے باعث نہ ہو تو پھر گرم غذاؤں کا استعمال، کسی مصروفیت کے باعث زیادہ دیر تک پیشاب کا روکے رکھنا، پانی کا کم استعمال، ہائی پوٹینسی ادویات کا زیادہ استعمال، مثانے کی فالجی کیفیت اور مثانے و پیشاب کی نالی پر چوٹ کے لگنے کے باعث بھی پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے۔کئی مریضوں میں پیشاب کم آنے کی شکایت ہوتی ہے۔پیشاب رک رک کر آنے کی شکایت ہوتی ہے۔پیشاب میں جلن اور درد کی شکایت ہوتی ہے اور خدانخواستہ اگر انفیکشن ترقی کر جائے تو پھر پیشاب میں خون، پیپ اور جراثیموں کا بھی اخراج ہوا کرتا ہے جس کیلئے یورین روٹین ایگزامی نیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرنیکا 3X+ایپس 3X+بربیرس 3X+سارسپریلا 3X ملا کر دیں۔اس کے علاوہ بروکس یو، ٹی، آئی سیرپ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پیشاب کی جلن کا انگریزی علاج		
➢	Tab Noroxin 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Caflam 50mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Citro Soda Sachets	دن میں تین مرتبہ پانی میں ملا کر استعمال کریں

★★★★★★★★

پرسوتی بخار

(PUERPERAL FEVER)

بچے کی ڈیلیوری یا ابارشن کے بعد کچھ عورتوں کو بخار چڑھ سکتا ہے جو کہ اندرونی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بخار ڈیلیوری کے پہلے دن کے بعد اگلے دس روز کے اندر متواتر 100 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بخار یوٹرس کے اندر سٹریپٹو کوکس، بیکٹیرائیڈز فریجی لس، ای کولائی اور اینٹیرو کوکس جراثیموں کے انفیکشن کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹے فی لو کوکس اور کلاس ٹریڈیم جراثیموں کی وجہ سے بھی یوٹرائن انفیکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح پرسوتی بخار کی ایک بڑی وجہ ڈیلیوری کے بعد پلے سینٹا کے کسی حصے کا اندر یوٹرس میں ہی رہ جانا ہے۔ بہر حال پرسوتی بخار کی وجہ کچھ بھی ہو یہ ایک تکلیف دہ بیماری ہے جس میں زچہ کو سخت ٹھنڈ لگ کر بخار آتا ہے، تمام جسم میں دردیں ہوتی ہیں اور دُکھن کا احساس ہوتا ہے۔ مریضہ انتہائی کمزور اور بیمار دکھائی دیتی ہے۔ اگر درج ذیل نسخہ سے بخار کو آرام نہ آئے تو کسی مستند لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں۔

ہومیوپیتھک علاج : آرنیکا200+ایکی نیشیا200+پائیروجینم200+بیلاڈونا200+ہیپر سلف200 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

پرسوتی بخار کا انگریزی علاج		
➢	Cap Cefspan 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Calpol	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

پیچش
(DYSENTERY)

کرانک ڈائریا ہی کو پیچش بھی کہا جاتا ہے۔ پیچش کا مرض عموماً گندی خوراک، گندے پانی اور مکھیوں کے ذریعے پھیلا کرتا ہے۔ پیچش کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک بیسلری ڈائسنٹری جو کہ ایک خاص جراثیم شائی گیلا سے ہوتی ہے جبکہ دوسری امیبک ڈائسنٹری جو کہ ایک خاص جراثیم اینٹامیبا ہسٹولائیٹیکا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مرض میں مریض کو بار بار پاخانے آتے ہیں۔ پاخانوں کے ساتھ ساتھ میوکس یعنی بلغم اور بلڈ بھی آتا ہے۔ زیادہ پاخانے آنے سے جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ زیادہ خون خارج ہونے سے جسم میں خون کی کمی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کو پیٹ میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر موشن زیادہ آجائیں تو مریض کے جسم میں نمکیات کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو مریض بے ہوش ہو کر صدمے کی کیفیت میں بھی جا سکتا ہے لیکن ایسا عموماً کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر ذیل کا نسخہ کار گر نہ ہو تو مریض کو فوراً ہسپتال لے جا کر ڈرپ لگوانی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: کرچی Q+کالوسنتھ 3X+چائنا 3X+مرک کار 3X ملا کر دیں۔

پیچش کا انگریزی علاج		
➢	Tab Ciprox 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Metodine DF	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Relispa Forte	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

پستانوں میں دودھ کی کمی

(SUPPRESSED MILK)

کئی مرتبہ زچہ کے پستانوں میں دودھ کی کمی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ایسا عموماً ایسی ماؤں میں ہوا کرتا ہے جو پہلی مرتبہ بچے کو جنم دیں یا پھر اس کی کئی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔مثال کے طور پر زچہ کی خوراک میں کمی، دودھ کا کم استعمال، ٹانک، وٹامنز اور منرلز کی جسم میں کمی، پچوٹری ہارمونز کی کمی اور نفسیاتی و اعصابی امراض کا پایا جانا وغیرہ۔اگر ماں کے پستانوں میں دودھ کی کمی ہو تو بچے کو بہت تکلیف ہوتی ہے بچہ صحیح طور پر سیر ہو کر ماں کا دودھ نہیں پی سکتا اور کمزور رہ جاتا ہے۔اسی طرح اگر ماں کے پستانوں میں دودھ کی کمی رہے تو بچے کی نشوونما متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت مدافعت بھی کمزور ہو کر امراض کے خلاف موثر طور پر نہیں لڑ سکتی۔بہتر یہ ہے کہ اگر ماں کا دودھ کم ہے تو ادویات کے استعمال سے پہلے بریسٹ پمپ کا استعمال کر لیا جائے کیونکہ کئی مرتبہ بریسٹ پمپ کے استعمال سے ہی ماں کو دودھ درست طریقے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔اسی طرح زچہ کی خوراک میں بھی پھل فروٹ کے ساتھ ساتھ دودھ کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: رسی نس Q+ارٹیکا یورنس Q ہم وزن ملا کر استعمال کریں۔

پستانوں میں دودھ کی کمی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Hi-Lacta	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Sangobion	ایک روزانہ
➢	Tab CaC 1000	ایک گولی روزانہ پانی میں حل کر کے پئیں

★★★★★★★★

تپ محرقہ۔ٹائی فائیڈ

(TYPHOID FEVER)

یہ ایک قسم کا متعددی میعادی بخار ہے۔اس مرض میں ایک خاص جراثیم سالمونیلا ٹائی فی یا سالمونیلا پیراٹائی فی آنتوں پر حملہ کر کے سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔یہ جراثیم متاثرہ خوراک، پانی یا مکھیوں کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔یہ بخار مسلسل تین چار ہفتے رہتا ہے۔پہلے ہفتہ کے دوران بخار روز بروز ایک ایک درجہ کر کے بڑھتا جاتا ہے حتی کہ 103 یا 104 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔دوسرے ہفتہ میں علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں۔مریض کی زبان سفید اور دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔تیسرے اور چوتھے ہفتہ میں علامات کم ہو جاتی ہیں۔ٹائی فائیڈ بخار کے دوران مریض شدید متاثر ہوتا ہے۔اسے انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔مریض اٹھ، چل پھر کر بالکل کام نہیں کر سکتا۔مریض چاہتا ہے کہ مکمل آرام کرتا رہے۔مریض کی بھوک بالکل اُڑ جاتی ہے اگر کچھ کھا پی لے تو قے ہو جاتی ہے۔مریض کو پیٹ میں ہر وقت میٹھا میٹھا سا درد ہوتا رہتا ہے۔مریض کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور مریض ثقیل و سخت اشیاء بالکل ہضم نہیں کر سکتا۔

ہومیوپیتھک علاج: بیپ ٹیشیا 30X + رسٹاکس 3X + برائی اونیا 3X ملا کر دیں۔

ٹائی فائیڈ کا انگریزی علاج		
➢	Tab Cefiget 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد
➢	Syp Lysovit	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

جوڑوں کا درد

(ARTHRITIS)

جسم کے مختلف جوڑ کئی بیماریوں کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان میں انفلے میشن، سوجن اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی کنڈیشن ایک دم شروع ہوتی ہیں اور کئی کنڈیشن آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور کرانک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جوڑوں کے درد کی عمومی وجوہات ڈی جنریٹو ڈیزیزز، آسٹیو آرتھرائی ٹس، ریوماٹائیڈ آرتھرائی ٹس، ریویٹک فیور، ریٹرز آرتھرائی ٹس، گاؤٹی آرتھرائی ٹس، آسٹیو پروسس، آسٹیو میلے شیاء، پولی مائیل جیاریومیٹیکا اور کئی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ اس بیماری میں مریض کو متاثرہ جوڑ یا جوڑوں میں سخت درد محسوس ہوتا ہے اور مریض حرکت نہیں کر سکتا۔ کئی مریضوں میں چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے تک میں انتہائی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جوڑوں کا مرض ایک انتہائی ہٹیلا اور تکلیف دہ مرض ہے جس کے علاج کے دوران مریض کو انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ مرض موروثی طور پر بھی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اور باقاعدہ علاج کے باوجود بھی کم رسپانس دیتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: روٹا30+رسٹاکس30 ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

جوڑوں کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Cap Esso 40mg	ایک روزانہ صبح نہار منہ
➢	Tab Arnil 75mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Kak-D	ایک روزانہ کھانے کے بعد

★★★★★★★★

جریان خون

(HAEMORRHAGE)

خون کے بہہ جانے کو جریان کہتے ہیں۔ عام طور پر خون کی کسی رگ کے کٹ جانے یا پھٹ جانے سے جریان خون ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جریان خون جسم میں کلاٹنگ فیکٹرز کی کمی یا خرابی کے باعث بھی ہوا کرتا ہے یا پھر خون میں تھرامبوسائٹس کی کمی کی وجہ سے بھی جریان خون ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات اور پیچیدگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ خون کتنا اور کس قدر رفتار سے ضائع ہوا۔ اگر زیادہ خون ضائع ہوا ہے تو مریض کا دل ڈوبتا ہے۔ نبض تیز اور باریک چلتی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور مریض شاک میں جا سکتا ہے۔ اگر اس موقع پر مریض کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو شاک کے باعث مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مریض میں جریان خون زیادہ ہو رہا ہو جو ادویات سے نہ رک سکے تو ایسے مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے جانا چاہیے تاکہ سرجیکل پروسیجر کر کے مریض کا جریان خون روک کر اس کی جان بچائی جا سکے۔ درج ذیل ادویات معمولی جریان خون مثلاً نکسیر آنا، خونِ حیض کا معمولی زیادہ آنا، کسی تیز دھار چیز سے جِلد کا معمولی کٹ جانے کے نتیجے میں جریان کیلئے استعمال ہوتی ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: اپی کاک 30+ملی فولیم 30+فیرم فاس 30+ہیما میلس 30 ملا کر دیں۔

جریان خون کا انگریزی علاج		
➢	Cap Brino 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cap Amoxil 250mg	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

چوٹ لگنا

(TRAUMA)

چوٹ لگنا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ زندگی میں تقریباً ہر شخص نے کسی نہ کسی طرح کی چوٹ کھائی ہوتی ہے۔ چوٹ کی مختلف اقسام ہیں۔ فزیکل ٹراما، تھرمل ٹراما، الیکٹریکل ٹراما، برنز ٹراما، ایکسیڈنٹل ٹراما وغیرہ۔ بہر حال کسی بھی ایکسیڈنٹ یا حادثے کے نتیجے میں کسی بھی شخص کو فزیکل ٹراما ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو حالات اور کنڈیشن کے مطابق ٹراما کا علاج کر دیا جاتا ہے لیکن اکثر مریضوں کو ٹراما کے نتیجے میں زندگی کے بعد کے حصے میں تکلیفات ہوتی ہیں یعنی پرانی چوٹوں کا درد کرنا اور دکھنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ٹراما کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دردوں کو وقتی علاج سے فوری آرام تو آجایا کرتا ہے لیکن اکثر مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوٹ لگنے والی جگہ پر اکثر کچھ نہ کچھ عرصے بعد دردوں کا حملہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مریض کو چاہیے کہ چوٹ لگنے والے عضو سے اب بھاری کام نہ لیا کرے اور اسی طرح چوٹ لگنے والے عضو کو جتنا ممکن ہو سکے ٹھنڈک سے بچانا چاہیے۔ ذیل میں چوٹ لگنے کے نتیجے میں ہونیوالی دردوں کا علاج دیا گیا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرنیکا30+سمفائٹم30+ہائپریکم30+روٹا30 ملا کر استعمال کریں۔

چوٹ لگنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Dolor D.S	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymoral Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Pyodine Solution	جِلد پر کوئی کٹ یا زخم ہو تو اس سے صاف کریں

☆☆☆☆☆☆☆☆

چکر آنا

(GIDDINESS)

سر چکرانا عام علامات میں سے ایک ہے۔ بہت سارے مریض ڈاکٹر کے پاس آکر چکر آنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں مریض ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے آس پاس کی چیزیں گھوم رہی ہیں اور وہ بھی لڑکھڑا کر گر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کئی مریض متلی اور قے آنے کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ ایسا عموماً ویسٹی بیولر نیورائی ٹس، لے برنتھائی ٹس، ملی نائن پوزیشنل ورٹیگو، مے نیئر زڈیزیز، موشن سیک نس، برین سٹیم ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیکس، ملٹی پل سکلروسس اور پچوٹری پوسٹرئیر فوساٹیومرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اکثر مریضوں میں کمزوری، خون کی کمی اور بلڈ پریشر کی کمی یا انتہائی زیادتی کے باعث بھی چکر آ سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ نفسیاتی عوارض خصوصاً خوف کی کنڈیشن میں بھی چکر آتے ہیں۔ بچوں اور بوڑھوں میں چکر آنے کی ایک بڑی وجہ دماغ کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات یہ چکر اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ مریض بغیر سہارے کے بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انتہائی تیز چکروں میں متلی کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: کونیم 30+چائنا 30+کاکولس 30+اپی کاک 30 ملا کر دیں۔

چکر آنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Stemetil	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Serc 16mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Neurobion	1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

چھپاکی
(URTICARIA)

یہ ایک الرجک مرض ہے۔اس کے دھبے جسم پر اس طرح ہوتے ہیں گویا کسی جانور نے ڈنگ مارا ہو۔جِلد اور بعض اوقات میوکس ممبرین پر سرخ سرخ دھبے بن جاتے ہیں جن کو اصطلاحاً وہیلز کہتے ہیں۔یہ مرض کئی قسم کی غذاؤں اور کئی قسم کی دواؤں کے خلاف رد عمل کے طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔مرض کے حملے سے پہلے خارش شروع ہو جاتی ہے۔بعد میں جلد پر مختلف قسم کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں جو کہ جلد کی عام سطح کی نسبت قدرے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔مذکورہ دھبے کئی مرتبہ خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔کئی مریضوں میں چھپاکی کے یہ دھبے گرم غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔تیز گرم مصالحہ، تیز مرچ مصالحہ، مچھلی، انڈا، گوشت اور اکثر اوقات چاول کھانے سے بھی جسمانی رد عمل کے طور پر جِلد پر چھپاکی کے دھبے اُبھر آتے ہیں۔اسی طرح ادویات میں عموماً سلفاڈرگز اور اسپرین وغیرہ ری ایکشن کر کے چھپاکی کے دھبے اُبھار سکتی ہیں۔اگر درج ذیل ادویات خاطر خواہ رزلٹ نہ دیں تو مریض کو ہسپتال لے جا کر انجکشن لگوانا چاہیے

ہومیوپیتھک علاج: ارٹیکا یورنس Q+ایپس میلی فیکا Q+بووسٹا Q+اوزالک ایسڈ Q ملا کر دیں۔

چھپاکی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Avil 25mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Clobevate Ointment	چھپاکی کے دھبوں پر صبح شام لگائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

حیض کا درد سے آنا

(DYSMENORRHOEA)

لڑکیوں کا بالغ ہونے پر ماہواری آنا بلوغت کی ایک انتہائی اہم نشانی ہے۔ عام طور پر ایک صحت مند لڑکی یا عورت کو ایک ماہ میں صرف ایک مرتبہ معمولی درد کے ساتھ ماہواری آیا کرتی ہے جو کہ عموماً تین سے پانچ دن تک جاری رہتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں میں ماہواری کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں جن میں ایک اہم نقص ماہواری کا درد کے ساتھ آنا ہے۔ اس مرض میں عورت کو ماہواری درد کے ساتھ آتی ہے۔ ڈسمینوریا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پرائمری ڈسمینوریا جس میں عورت کو پیلوس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ یہ نوجوان لڑکیوں کو بالغ ہونے پر ماہواری کے شروع کے سالوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا سیکنڈری ڈسمینوریا جو کہ زیادہ عمر کی عورتوں میں ہوتا ہے اور جس میں کہ عورت کو پیلوس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی وجوہات اینڈومیٹریوسس، یوٹرس کے فائبرائیڈز، یوٹرس کے پالپس، اووری کے ٹیومرز، پیلوک انفلے میٹری ڈیزیز، سرویکس کے منہ کا تنگ ہونا، یوٹرس کے اندر مانع حمل آئی۔یو۔ڈی کا استعمال وغیرہ ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوفائلم 30+ پلسٹلا 30+ میگ فاس 30 ملا کر استعمال کریں۔

حیض کے درد سے آنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Brufen 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Relispa 40mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Aletris Cordial	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

حیض کی کثرت

(MENORRHAGIA)

عام عورتوں میں ماہواری کا سائیکل اٹھائیس دن کا ہوتا ہے لیکن کئی عورتوں میں یہ چھوٹا یا بڑا ہو کر چوبیس سے 38 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات کسی بھی عورت میں ماہواری کے دوران یا بعض اوقات ایک ماہواری سے دوسری ماہواری کے درمیان غیر نارمل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ بلیڈنگ کئی وجوہات کی بناء پر ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر عورتوں کے جسم میں ہارمونز کے لیولز میں خرابیاں پڑ جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہر حال ایسی بلیڈنگ میں پیلوس کی اندرونی بیماریوں مثلاً پیلوس کے اعضاء کی سوزش یا کینسر کی موجودگی کے شک کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ عام طور پر عورتوں یا لڑکیوں میں حیض کی یہ کثرت چند ماہ کے لئے ہوتی ہے جو بغیر کسی علاج کے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر معمولی علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر حیض کی یہ زیادتی مسلسل رہے اور مریضہ کے لئے تکلیف دہ بن جائے تو پھر کسی مستند لیڈی ڈاکٹر سے اس کی تشخیص اور علاج کرانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: ٹریلیئم Q+سبائنا Q ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

حیض کی کثرت کا انگریزی علاج		
➢	Cap Transamin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cap FefolVit	ایک روزانہ
➢	Syp Faulad	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

حیض کی بندش

(AMENORRHOEA)

لڑکی کی بلوغت کی ایک اہم نشانی ماہواری کا آنا ہے۔ اکثر لڑکیوں میں شروع شروع میں ماہواری آنے کا سلسلہ قدرے گڑبڑ رہتا ہے۔ عورتوں میں ماہواری کی کئی اقسام کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن میں سے ماہواری کی ایک اہم بیماری اے مینوریا یعنی حیض کا نہ آنا ہے۔ اگر ایک لڑکی کو جوان ہونے پر سترہ سال کی عمر تک ماہواری آنا شروع نہ ہو تو اس کو پرائمری اے مینوریا کہتے ہیں۔ لیکن اگر مریضہ کو پہلے ماہواری آئی ہو لیکن پھر بند ہو کر چھ ماہ تک نہ آئے تو اس کو سیکنڈری اے مینوریا کہتے ہیں۔ ماہواری نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ پیدائشی نقائص ہو سکتے ہیں ۔ کچھ اووریز میں خرابیوں کی وجہ سے نارمل مقدار میں ایسٹروجنز اور پروجسٹرون نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور کئی بار ایسا پچوٹری گلینڈز میں نقص ہونے کی وجہ سے نارمل مقدار میں گونیڈوٹرافک ہارمون کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اے مینوریا کے علاج سے پہلے اس بات کا مکمل یقین کر لیں کہ عورت کو حمل تو نہیں؟

ہومیوپیتھک علاج: پلسٹلاQ+ گوسی پیئمQ+ایپیQ+کینتھرسQ ملا کر تین مرتبہ دیں۔

حیض کی بندش کا انگریزی علاج		
➢	Tab Premarin 0.625mg	ماہواری ختم ہونے کے بعد سے پچیس دن تک ایک گولی روزانہ استعمال کریں
➢	Syp Aletris Cordial	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

خسرہ

(MEASLES)

یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک خاص جراثیم R.N.A وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مرض مریض کی ناک کی رطوبت اور اسکے تنفس کے ذریعے پھیلا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے استعمال شدہ لباس اور برتنوں وغیرہ کے ذریعے بھی لگ سکتا ہے۔ اس مرض میں پہلے نزلہ، زکام ہوتا ہے اور چوتھے روز جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں۔ پھر لرزے سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ زکام ہوتا ہے۔ ناک اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ بار بار کھانسی اٹھتی ہے۔ بخار کے 72 گھنٹے بعد چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نمایاں طور پر پہلے پیشانی و چہرے پر اور پھر سارے جسم پر نکل آتے ہیں۔ یہ دانے ایک دو دن تک نکلتے رہتے ہیں۔ دانوں کے نکلتے وقت زکام کی شدت ہوتی ہے۔ اکثر کمزور بچوں میں یہ مرض انہیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک شخص سے دوسرے اشخاص کو لگنے والا مرض ہے لہٰذا یہ مرض بہت جلد دوسرے بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے لہٰذا جس گھر میں خسرہ کا مریض پایا جائے تو اسے دوسرے بچوں سے علیحدہ ہی رکھنا چاہیے تاکہ گھر کے دوسرے افراد اور بچے اس مرض کے لگنے سے محفوظ رہ سکیں۔

ہومیوپیتھک علاج: ایکونائٹ 3X + برائی اونیا 3X ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

خسرہ کا انگریزی علاج		
➢	Syp Actidil	1+1 چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد
➢	Syp Brufen	1+1+1 چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد
➢	Syp Augmentin	1+1+1 چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

خارش و کھجلی

(SCABIES)

یہ ایک متعدی جِلدی مرض ہے جو کہ ایک جراثیم "سارکوپیٹز سکے بیائی" نامی گول حیوانی کیڑے سے پھیلتی ہے۔اس مرض کا انفیکشن مریض سے یا اس کے لباس سے تندرست اشخاص کو لگ سکتا ہے۔یہ جراثیم جلد کی بالائی سطح میں سوراخ کر کے نیچے اپنا مقام بنالیتا ہے اور خاص قسم کے ایسے نشان جِلد پر نقطوں اور ٹیڑھے نشانوں کی شکل میں ڈال دیتا ہے کہ جیسے جِلد پر سوئی سے معمولی خراش ہوتی ہے۔جس حصہ جسم پر اس مرض کے باریک دانے نکلتے ہیں وہاں پر خارش ہونے لگتی ہے۔بڑوں میں ہاتھ کی انگلیوں کی درمیانی جگہ اور چھوٹے بچوں میں پنڈلیوں پر شدت کی خارش ہوتی ہے۔اس مرض میں خاص طور پر رات کو ناقابل برداشت خارش ہوا کرتی ہے۔ کئی مریضوں میں یہ خارش خاص رات کو بستر پر جاتے ہی شروع ہو جاتی ہے جو انہیں انتہائی تکلیف دیتی ہے یہاں تک کہ ایسا مریض سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتا۔اگر یہ خارش پرانی ہو جائے تو جِلد کو اس قدر خراب کر دیتی ہے کہ دیکھنے میں جِلد انتہائی متاثر نظر آتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: ہیپر سلف 30+سلیشیا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

خارش و کھجلی کا انگریزی علاج		
➢	Tab T-Day	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Kenadex-N Cream	صبح، شام خارش والی جگہوں پر لگائیں
➢	Scabion Forte Lotion	روزانہ رات چہرے کے علاوہ تمام جسم پر لگائیں

★★★★★★★★

دانت درد

(TOOTHACHE)

دانت درد ایک ایکیوٹ ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔اس کنڈیشن میں اچانک مریض کو بیٹھے بٹھائے کسی بھی دانت میں سخت قسم کا درد محسوس ہوتا ہے جو کہ اکثر اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے۔اس کی عام وجہ دانتوں میں کیڑا لگ جانا ہے۔ کیڑے والی کھوڑیں دانت کی بیرونی سطح سے گہری ہوتی ہوئی دانت کے اندرونی سافٹ حصے پلپ تک پہنچ جاتی ہیں۔اس پلپ کے اندر دانت کو سپلائی کرنے والی نروز موجود ہوتی ہیں جو کہ درد اور ٹمپریچر محسوس کر سکتی ہیں۔لہٰذا مریض کو ٹھنڈی یا گرم چیزیں کھاتے ہوئے یا دانت کی سطح پر دباؤ ڈالتے ہوئے سخت قسم کا درد محسوس ہوتا ہے۔بسا اوقات انفیکشن کی وجہ سے متاثرہ دانت کے ارد گرد کا حصہ سُوج کر پُھول جاتا ہے۔ بہر حال وجہ کچھ بھی ہو دانت کا درد ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔اس ضمن میں قارئین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دانت میں ہلکا سا بھی درد ہو تو فوراً کسی ڈینٹل سرجن کو دکھا دینا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: پلانٹیگو30+کریازوٹ30+رسٹاکس30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں اور پلاٹینگو Q روئی پر لگا کر مقامی طور پر دانت پر لگائیں۔

دانت درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Ansaid 100mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Cap Amoxil 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

دردِ کان۔ کان بہنا

(OTALGIA / OTORRHOEA)

دردِ کان یا کان بہنا عموماً کان کی بیرونی کینال کے اندر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن نہروں، تالابوں یا جوہڑوں میں نہانے یا پھر کان کو صاف کرنے کے لئے بار بار کان میں تنکے ڈالنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انفیکشن عموماً پروٹی اس، سیوڈوموناس، سٹے فی لوکوکس یا سٹریپٹوکوکس جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مریض کو شروع شروع میں کان میں خارش محسوس ہوتی ہے جو کہ بعد میں درد کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کان کی بیرونی کینال میں سوجن کی وجہ سے کان بہنا بند محسوس ہوتا ہے۔ کان کی کینال سے گاڑھی یا پتلی قسم کی رطوبت خارج ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ کان کا یہ درد اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ یہ درد کنپٹی، جبڑے اور گردن تک میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر کان کا یہ درد انتہائی شدید ہو تو مریض کو کان میں ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوتی ہیں جو مریض کیلئے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ کان درد اگر ناقابل برداشت ہو تو ہسپتال سے رجوع کریں۔

ہومیوپیتھک علاج : بیلاڈونا30+ پلسٹیلا30+ کیمومیلا30+ مرکسال30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ ضرورت ہو تو میولین آئل دو قطرے متاثرہ کان میں ڈالیں۔

کان کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Caflam 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Augmentin 625mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Otosporin Ear Drops	درد والے کان میں ڈالیں

★★★★★★★★

دردِ سر۔ دردِ بدن

(HEADACHE / PAINS)

درد سر اور بدن کا درد ایک عام پائی جانے والی شکایت ہے۔ سر درد کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کو یہ پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتے لیکن کچھ خطرناک وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عموماً اعصابی سر درد، می گرین ہیڈ ایک، مسل کنسٹرکشن ہیڈ ایک، ایگزر شنل ہیڈ ایک، برین ٹیومر کی وجہ سے ہیڈ ایک، دماغ میں انفیکشن کی وجہ سے ہیڈ ایک، سر میں چوٹ لگنے کے بعد کا ہیڈ ایک، گلاکوما کی وجہ سے ہیڈ ایک، سائنوسائی ٹس کی وجہ سے ہیڈ ایک اور بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن درد عموماً زیادہ کام، تھکاوٹ، سستی اور غذائی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کئی مریضوں میں اُن کی حساس اور نازک طبعیت کے باعث بھی سر درد اور جسم درد ہو سکتا ہے۔ آج کل کے انتہائی مصروف دور میں راتوں کو دیر تک جاگنا ایک فیشن بن گیا ہے لہٰذا اکثر اوقات رات دیر تک جاگنے کے باعث بھی جسم اور سر میں درد رہنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کئی نفسیاتی عوارض مثلاً ٹینشن، ڈپریشن، غم، غصہ اور حساسیت کی وجہ سے بھی سر درد اور جسم درد ہو سکتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: فیرم فاس 6X + میگ فاس 6X + کالی فاس 6X ملا کر تین مرتبہ دیں۔

دردِ سر۔ دردِ بدن کا انگریزی علاج		
➢	Tab Omnidol	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Voren 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Trihemic 600	ایک روزانہ

★★★★★★★★

دردِ شقیقہ ۔ آدھے سر کا درد

(MIGRAINE)

می گرین ہیڈ ایک میں مریض کو بار بار سر کے ایک یا دونوں جانب درد کے اٹیک ہوتے ہیں۔ یہ درد سر کے ایک طرف آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور بعد میں تیز ہوتا ہوا سر کے ایک یا دونوں طرف پھیل جاتا ہے۔ مریض کو متلی اور قے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ درد کچھ دیر کے بعد بہت شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت روشنی اور شور مریض کو ناگوار گزرتا ہے اور وہ اندھیرے کمرے میں خاموشی سے لیٹے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر مریض درد کے دوران سو سکے تو اس سے عموماً درد کا اٹیک ختم ہو جاتا ہے ورنہ یہ اٹیک عموماً 4 سے 14 گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ کئی مریضوں میں اس درد کا اٹیک ہلکا یا درمیانہ لیکن مسلسل کئی کئی دن تک جاری رہتا ہے جو مریض کو اس کے روزمرہ کے معمولات سرانجام نہیں دینے دیتا۔ بہتر یہ ہے کہ آدھے سر کے درد کا علاج خود گھر پر کرنے کے بجائے کسی نیورو فزیشن سے معائنہ کروائیں تاکہ سر کی سی، ٹی، اسکین یا ایم، آر، آئی کروا کر آدھے سر کے اس درد کی صحیح تشخیص کی جا سکے اور تشخیص کے مطابق درست اور موثر علاج کیا جا سکے۔

ہومیوپیتھک علاج: بیلاڈونا 30+ آئرس ورسیکلر 30+ سینگونیزیا 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

آدھے سر کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Dicloran 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Medidol	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Inderal 10mg	ایک روزانہ

★★★★★★★★

دردِ کمر

(BACKACHE)

کمر کا درد بیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جو کہ محنت مشقت کا کام کرتے ہیں اور وزنی چیزیں اٹھاتے ہیں۔ جوان عورتوں میں لیکوریا اور پیلوس کی بیماریوں کی وجہ سے کمر درد رہتا ہے۔ کمر درد کی دوسری وجوہات لمبو سیکرل سپرین، پوسچرل بیک ایک، ڈی جنریٹو لمبو سیکرل آرتھرائی ٹس، لمبر ڈسک ڈیزیز، سپائن میں کینسر کی موجودگی، ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرض میں مریض کمر کے مقام پر سخت درد محسوس کرتا ہے اور مریض آگے پیچھے، دائیں بائیں آزادانہ طور پر جھک نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ کئی مریض اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کئی مریض نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے لہٰذا انہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز کا فریضہ انجام دینا پڑتا ہے۔ اکثر مریضوں میں یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کئی مرتبہ بستر سے خود اٹھ بھی نہیں پاتے۔ بڑی عمر کے افراد میں عموماً وزن کی زیادتی یعنی موٹاپا اس مرض کا ایک اہم سبب ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: کلکیریا فلور 30+رسٹاکس 30+سمی سی فیوگا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں

کمر کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Arnil 75mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Diagesic-P	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Qalsan-D	ایک روزانہ چوسیں

★★★★★★★★

دمہ
(ASTHMA)

دمے کا مرض بوڑھوں اور بچوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ نوجوان لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کو آزادانہ اور نارمل طریقے سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور مریض فضاء میں سانس اندر کھینچتے ہوئے دقت محسوس کرتا ہے۔ سانس لیتے ہوئے سینے سے سیٹیاں بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ خشک کھانسی آتی ہے اور اگر کھانسی کے ساتھ بلغم ہو بھی تو یہ کم مقدار میں آتا ہے۔ مریض کو بار بار اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ موسم میں تبدیلیاں یا ہوا میں گرد و غبار اور ایلرجیز پیدا کرنے والے مادوں کی موجودگی ان اٹیکس کا سبب بنتی ہے۔ کئی افراد میں پرفیوم اور تیز خوشبو کا استعمال بھی دمہ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دمے کا مرض موروثی طور پر بھی خاندانوں میں نسل در نسل چلا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کچھ خاص ادویات خصوصاً اسپرین کے استعمال سے بھی دمے کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ علاج کے ضمن میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ دمے کی اصل وجہ کی معلومات کر کے اس کے مطابق مریض کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر درج ذیل ادویات سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو مریض کو جلد از جلد ہسپتال لے جانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرسنکم البم 30+اینٹم ٹارٹ 30+اپی کاک 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

دمہ کا انگریزی علاج		
➢	Tab Ventolin 2mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Montiget 10mg	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Ventide Inhaler	جب دمے کا دورہ شروع ہو تو دیں

★★★★★★★★

زکام ونزلہ

(CORYZA)

نزلہ زکام کی شکایات عام ہیں۔ زیادہ تر نزلہ زکام سردیوں اور ٹھنڈ کے موسم میں وائرسز کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان علامات کو پیدا کرنے والے وائرسز بھی بہت ہیں۔ وائرسز کی وجہ سے ہونے والی علامات کچھ دن رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں میں وائرسز کی انفیکشن کے فوراً بعد بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نمونیا، سائی نسز کی انفیکشن، اوٹائی ٹس میڈیا اور برانکائی ٹس ہو سکتا ہے۔ کئی بار نزلہ زکام ارد گرد کی ہوا میں پولن کی موجودگی اور گرد و غبار سے الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس طرح کا نزلہ زکام عموماً موسم بہار اور گرمیوں میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کرانک نزلہ زکام لگا ہی رہتا ہے۔ اس مرض میں عام طور پر مریض کی ناک یا تو بند رہتی ہے اور یا پھر بہتی رہتی ہے۔ کئی مریضوں میں ناک کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی بہنا شروع کر دیتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریضوں کو اکثر سر درد، سر میں بھاری پن، آنکھوں میں پانی اور نظر کی دھندلاہٹ کی شکایات لاحق رہتی ہیں۔ کسی کسی مریضوں میں حلق میں ریشہ گرنے کی شکایت بھی ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+سلفر 30+کالی سلف30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

نزلہ وزکام کا انگریزی علاج		
➢	Tab Arinac Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Xynosine Nasal Spray	جب ناک بند ہو تو کریں
➢	Joshanda Sachets	صبح، شام گرم پانی میں ملا کر پئیں

★★★★★★★★

عرق النساء

(SCIATICA)

عرق النساء کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مثلاً لنگڑی کا درد، سُرین کا درد، رگ النساء، رینگن کا درد وغیرہ۔ آج کل یہ درد بہت عام ہے۔ یہ درد مریض کو کبھی کبھار آدھی ٹانگ میں کولہے سے لے کر گھٹنے کی پچھلی جانب محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کبھی ہلکا اور کبھی تیز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو درد کے ساتھ ساتھ متاثرہ ٹانگ سوئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مریض صحیح طور پر جھک کر کام نہیں کر سکتا، نہ ہی زیادہ تیزی کے ساتھ چل پھر سکتا ہے اور ٹانگ میں شدید درد کی شکایت کرتا ہے۔ عرق النساء دراصل کمر کے مقام سے نکل کر ٹانگوں کی جانب آنے والی " گریٹ شیاٹک نرو" کے مہروں کے درمیان دب جانے سے ہوا کرتا ہے۔ عرق النساء عام طور پر بھاری کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی بساط سے زیادہ بوجھ وزن کا کام کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کو غلط پوزیشن میں لیٹنے کی عادت ہو تو بھی مہروں کے ہل جانے کے باعث یہ درد ہوا کرتا ہے۔ عورتوں میں اس درد کی ایک عام وجہ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوسنتھ 30+رسٹاکس 30+نیفائلم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

عرق النساء کا انگریزی علاج		
➢	Tab Brexin	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Gabica 75mg	صبح، شام کھانے کے بعد
➢	Tab Neuromet 500mcg	صبح، شام کھانے کے بعد

★★★★★★★★

قبض

(CONSTIPATION)

قبض آج کل پایا جانے والا ایک عام مرض ہے۔اس مرض کے لاحق ہونے میں زیادہ تر ہاتھ ہمارے رہن سہن، خوراک اور سونے جاگنے کے معمولات میں بے قاعدگی ہے۔اس مرض میں پاخانہ خشک سیاہی مائل، سخت، مقدار میں تھوڑا اور بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے۔ بعض اوقات رفع حاجت کے وقت زیادہ زور لگانے اور سخت براز کی وجہ سے خون بھی آجاتا ہے۔اس مرض کا مریض کئی مرتبہ پیٹ میں بے چینی، گیس اور پھولنے کی شکایت کرتا ہے۔ مریض اکثر سر درد اور سر میں بوجھ کی بھی شکایت کرتا ہے۔پرانے قبض کے مریضوں کی آنکھوں کے نیچے پپوٹے بھی قدرے سوجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبض ہو جانے کی عام وجوہات میں کھانا کم مقدار میں کھانا، سبزیوں اور فروٹوں کا استعمال نہ کرنا، پریشانی یا ڈپریشن میں مبتلا ہونا، آنتوں کا کینسر اور آنتوں کی دوسری بیماریاں، جسم میں مختلف بیماریوں کی موجودگی، کچھ ادویات کے استعمال کرنے سے انکے بُرے اثرات ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ قبض کی ایک عام پیچیدگی مریض کو بواسیر کا ہو جانا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: برائی اونیاء3X+پلیسم میٹ3X+ایلومینیا3X+ہائیڈراسٹس3X ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ قبض کے پرانے مریض اس نسخے کے ساتھ اسپغول کا چھلکا بھی استعمال کریں۔

قبض کا انگریزی علاج		
➢	Syp Laxoberon	دو سے تین بڑے چمچے رات سوتے وقت
➢	Syp Colic	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Ispaghol Husk	رات کو ایک بڑا چمچہ نیم گرم دودھ میں پئیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

قے و متلی

(NAUSEA / VOMITING)

جی متلانا، قے آنا بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ کسی نہ کسی مرض کی علامت ہے۔ بعض قسم کے بخاروں میں قے آتی ہے۔ اکثر معدہ، آنتوں یا جگر کے امراض یا نظام ہضم کے ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے قے آیا کرتی ہے۔ بد ہضمی، قبض اور خوراک کے صحیح جذب نہ ہونے کی وجہ سے بھی قے آتی ہے۔ بعض خواتین کو دوران حمل بھی بہت زیادہ قے ہوا کرتی ہے۔ کئی مرتبہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی دل متلاتا اور قے آتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی پتھری، یوریمیا، دماغ یا سپائنل کارڈ اور یوٹرس کی بعض بیماریوں میں متلی و قے ہوا کرتی ہے۔ عام متلی و قے تو درج ذیل نسخے سے بہتر ہو جاتی ہیں لیکن اگر ان ادویات کے استعمال سے متلی و قے میں افاقہ نہ ہو تو مریض کو ہسپتال لے جانا چاہیے تاکہ اس متلی و قے کی درست تشخیص کی جا سکے اور اس کے مطابق مریض کی متلی اور قے کا علاج کیا جا سکے۔ بعض نازک طبع افراد میں نفسیاتی عوارض خصوصاً خوف و دہشت کے باعث بھی متلی و قے ہوا کرتی ہے۔ کئی لوگوں کو سفر کرنے سے بھی متلی و قے ہوا کرتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: اپی کاک 30+ کاکولس 30+ سمفوری کارپس 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

قے و متلی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Motilium	1+1+1 کھانے سے پہلے
➢	Tab Novidat 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Colic	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

کھانسی

(COUGH)

عام صحت مند لوگوں کو نارمل طور پر کئی بار کھانسی ہو جاتی ہے جو کہ گرد و غبار کے سانس کی نالیوں میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ تھوڑی دیر کے لئے رہتی ہے۔ کھانسی جسم میں کئی طرح کی خرابیوں اور بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مثلاً نظام تنفس میں وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہو جانا، موسمی تغیرات کی وجہ سے الرجی ہو جانا، پوسٹ نیزل ڈرپ کی وجہ سے کھانسی ہونا، استھما، کرانک برانکائی ٹس، ایم فائی سیما، کالی کھانسی، پھیپھڑوں کا کینسر وٹی بی، سسٹک فائبروسس اور سارکائیڈوسس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناک اور گلے کی بیماریوں میں بھی کھانسی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی ادویات کے مضر اثرات کے باعث بھی کھانسی ہوا کرتی ہے۔ کھانسی عموماً دو اقسام کی ہوا کرتی ہے۔ ایک قسم کی کھانسی کو ڈرائی کف یعنی خشک کھانسی کہا جاتا ہے جس میں کھانسنے کے نتیجے میں بلغم نہیں نکلتا جبکہ دوسری قسم کی کھانسی کو پروڈیکٹیو کف یعنی بلغمی کھانسی کہا جاتا ہے جس میں کھانسنے کے نتیجے میں بلغم نکلتا ہے۔ کئی مرتبہ اس بلغم میں خون بھی ملا ہو سکتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: پلسٹلا30+آرسنک البم30+برائی اونیا30+بیلاڈونا30 ملا کر دیں۔

کھانسی کا انگریزی علاج		
➢	Syp Hydryllin DM	1+1+1 اگر خشک کھانسی ہو
➢	Syp Hydryllin	1+1+1 اگر بلغمی کھانسی ہو
➢	Tab Leflox 250mg	1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

کمی خون

(ANAEMIA)

انیمیا کا مطلب خون کے اندر سرخ سیلز میں موجود ہیموگلوبن یعنی فولاد کی کمی ہے جو کہ آکسیجن کی جسم میں ترسیل کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں۔انیمیا کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ بون میرو صحیح مقدار میں ریڈ بلڈ سیلز نہیں بنا رہے ہیں یا دوسرے یہ کہ ریڈ بلڈ سیل کسی وجہ سے تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں ایسا عموماً آئرن، وٹامن B-12، فولیٹ اور غذائی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔اس کے علاوہ پرانی بیماریاں، جریان خون، کینسر، لیوکیمیا، لیمفوما، گردوں و جگر کا فیل ہو جانا بھی انیمیا کا سبب بن سکتا ہے۔انیمیا کے مریض کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ سستی محسوس کرتا ہے۔دل دھڑکتا ہے۔کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ بسا اوقات مریض اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ کر روزمرہ کا کوئی کام کاج تک نہیں کر سکتا۔ مریض کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ مریض کو چکر آتے ہیں۔ مریض کو ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔اکثر مریضوں پر خون کی کمی کے باعث نیند کا غلبہ اور غنودگی سی بھی طاری رہتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نیٹرم فاس 6X+فیرم فاس 6X+کلکیریا فاس 6X+کالی فاس 6X دیں۔

خون کی کمی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Iron-Polymoltose	ایک روزانہ چوسیں
➢	Cap Fefol Vit	ایک روزانہ
➢	Syp Faulad	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

کیل۔مہاسے۔چھائیاں

(FRECKLES / ACNES)

کیل اور مہاسے چھوٹے چھوٹے نوکیلے دانے ہوتے ہیں۔جو کہ چہرے، گردن یا سینے پر پیدا ہوتے ہیں۔جب یہ دانے پک جاتے ہیں تو ان میں سے کیل نکل آتے ہیں اور تھوڑی سی پیپ بھی خارج ہوتی ہے۔جب جلد میں چکناہٹ پیدا کرنے والے غدودوں کی رطوبت بند ہو جاتی ہے تو یہ کیل نکل آتے ہیں۔جوانی میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جبکہ چھائیاں دراصل ایسے سیاہی مائل چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے داغ ہوتے ہیں جو چہرے یا ہاتھوں کی پشت پر پڑ جاتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتے ہیں۔دھوپ، گرمی، خون میں نقص اور ماہواری و حمل وغیرہ اس کی وجوہات ہیں۔کئی مرتبہ ہارمونز کی کمی زیادتی بھی اس کا سبب بنتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج : کالی بروم 30+ نکس وامیکا 30+ ہیپر سلف 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔بروکس کمپنی کی ایکنی پمپ کریم صبح، شام لگائیں اور سلفر سوپ سے چہرہ دھوئیں۔

کیل، مہاسے اور چھائیوں کا انگریزی علاج		
➢	Tab Azomax 500mg	ایک گولی روزانہ کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے
➢	Cap Vibramycin 100mg	ایک کیپسول روزانہ
➢	Derma-clin Cream	صرف چھائیوں پر روزانہ رات لگائیں
➢	Acne Aid Soap	منہ ہاتھ دھویا کریں
➢	Betnovate Cream	کیل، مہاسوں، دانوں پر صبح، شام لگائیں

★★★★★★★★

گردوں کا ورم

(NEPHRITIS)

گردے ہمارے جسم کا ایک اہم ترین عضو ہیں۔ گردوں کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ گردے ہمارے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں۔ گردے ہمارے خون سے ہر لمحہ فاسد مادوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات گردوں پر سوجن واقع ہو جاتی ہے جسے نیفرائی ٹس کہتے ہیں۔ نیفرائی ٹس میں مریض کے دونوں گردوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور کرانک بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرض کی وجوہات میں گردوں اور جسم کے دوسرے مقامات پر جراثیمی حملہ، کونیکٹیو ٹشوز کی بیماریاں، گردوں کی گلامیرولائی کی دیواروں میں مدافعاتی اجزاء کا بیٹھ جانا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ بیماری سٹریپٹو کوکائی جراثیموں کے انفیکشن کے بعد ہوا کرتی ہے۔ مریض کے پیشاب میں خون اور البیومن پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد اور پیروں و آنکھوں کے ارد گرد اُڈیما ہو جاتا ہے۔ پیشاب کم مقدار میں آتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اگر صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض بڑھ کر نیفرائٹک سائنڈروم بھی بن سکتا ہے جس سے جسم کی بائیو کیمسٹری بگڑ سکتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: اپس 30+ ٹیری بن تھینا 30+ کینتھرس 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں

گردوں کے ورم کا انگریزی علاج		
➢	Tab Novidat 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymotrip Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cran Berry Sachets	1+1 پانی میں ملا کر پئیں

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

گلے پڑنا

(TONSILLITIS)

یہ ایک عام کنڈیشن ہے جس میں گلا اور ٹانسلز سُوجھ جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ مریض کو سردی کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے اور مریض کوئی چیز آسانی سے نگل نہیں سکتا اور گلے میں درد محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کا انفیکشن کئی طرح کے وائرس کی وجہ سے یا مائیکو پلازما نمونیا کی وجہ سے یا کلے میڈیا کی وجہ سے یا گروپ جی اور سی سٹریپٹو کوکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بچوں میں گلے اور ٹانسلز کا انفیکشن تقریباً تیس فیصد مریضوں میں گروپ "اے" بیٹا ہیمولیٹک سٹریپٹو کوکس کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ تقریباً تیس فیصد مریضوں میں گلے اور ٹانسلز کی سوزش کی وجہ کا پتہ نہیں چلتا۔ انفیکشن کے علاوہ ٹانسلز کی سوزش عام طور پر ٹھنڈی اور تُرش اشیاء کے زیادہ استعمال سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مختلف الرجنز اور دھول و دھواں کے ذرات بھی ٹانسلز کی سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر ٹانسلز میں پیپ پڑ جائے تو مریض کا بخار 103 ڈگری فارن ہیٹ سے زیادہ تک ہو جاتا ہے جسے پھر ادویات کے ساتھ ساتھ کولڈ اسپنجنگ یعنی ٹھنڈی پٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: بیلاڈونا 3X + برائٹا کارب 3X + فیرم فاس 3X ملا کر تین مرتبہ دیں۔

گلے پڑ جانے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Erythrocin 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Brufen 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymoral Forte	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

گردوں میں درد و پتھری

(RENAL COLIC / CALCULI)

گردوں کے دوسرے امراض کے علاوہ گردوں میں پتھری ہونا بھی گردوں کا ایک عام پایا جانے والا مرض ہے۔ گردوں میں پتھری پیدا ہونے کی عام وجوہات میں کیلشیم کا زیادہ استعمال، طویل وقت تک پیشاب روکے رکھنے کی عادت، گردوں کا پیشاب میں نمکیات درست طور پر خارج نہ کرنا اور ریت و مٹی کے ذرات سے آلودہ پانی وغیرہ پینا ہے۔ اسی طرح پانی کا کم پینا بھی پتھری بننے کا باعث بن سکتا ہے۔ کئی مریضوں کے گردے میں چھوٹی پتھری موجود ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کو کوئی علامات نہیں ہوتیں۔ کچھ مریضوں میں پتھری کی موجودگی کی وجہ سے بار بار پیشاب میں خون ملا ہوا آتا ہے۔ اگر پتھری گردے میں سے نکل کر یوریٹر میں چلی جائے تو مریض پر ایک دم شدید درد کا اٹیک ہوتا ہے جس کو رینل کالک کہتے ہیں۔ گردوں میں پتھری کی موجودگی کی وجہ سے مریض کو بار بار پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پتھری یوریٹر میں پھنس کر زیادہ رکاوٹ ڈال دے تو گردے سے پیشاب مثانے تک نہیں پہنچ سکتا اور متاثرہ گردہ پیشاب کی رکاوٹ کے باعث پھول سکتا ہے۔ اگر پتھری کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ گردے کو بے کار کر سکتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: بربیرس Q+اوسی مم کین Q+سارسپریلا Q ملا کر تین مرتبہ دیں۔

گردوں میں درد و پتھری کا انگریزی علاج		
➢	Cap Cefspan 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Caflam 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cran Max Sachets	1+1 پانی میں ملا کر پئیں

★★★★★★★★

گوہانجنی

(STYE)

یہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب مریض آنکھوں کی صفائی کا صحیح خیال نہ رکھ رہا ہو۔ مریض کے پپوٹوں کے کناروں پر پلکوں کی جڑوں میں عموماً سٹے فلوکوکس بیکٹیریا کے انفیکشن کے نتیجے میں ایک پھنسی سی بن جاتی ہے جو کہ سرخ رنگ کی اور پُر درد ہوتی ہے۔ اس کو ہاتھ سے دبانے پر درد اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ انفیکشن گندے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلنے سے اور گندے تولیے کو استعمال کرنے سے ہوتی ہے اور ایک ہی تولیہ استعمال کرنے سے گھر کے دوسرے افراد تک یہ انفیکشن پہنچ جاتی ہے۔ چند دنوں کے اندر یہ پھنسی پھٹ جاتی ہے اور رطوبت باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سرجری کے ذریعے چیرا دے کر رطوبت کو ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پھنسی سے رطوبت خارج نہ ہو تو یہی رطوبت اندر ہی اندر سخت سی سسٹ بن جاتی ہے جس کے لئے پھر بعد میں لازماً آپریشن کرانا ہی پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کو گوہانجنی کی تکلیف ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر فوری توجہ دیتے ہوئے درج ذیل نسخہ استعمال کرے۔

ہومیوپیتھک علاج: پلسٹلا 3X + سٹافی سیگریا 3X ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

گوہانجی کا انگریزی علاج		
➢	Cap Lincocin 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Ponstan Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Prednicol Eye Drops	2+2+2 قطرے صرف متاثرہ آنکھ میں ڈالیں

★★★★★★★★

لیکوریا

(LEUCORRHOEA)

اس بیماری میں عورتوں کی اندام نہانی سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوا کرتی ہے۔ کبھی گاڑھی، کبھی پتلی، کبھی سفید دودھیا رنگ کی۔ بعض اوقات یہ بدبودار ہوتی ہے اور کبھی بغیر بُو کے ہوتی ہے۔ عام طور پر اس بیماری کی وجہ پیلوس کی اندرونی انفیکشن، کثرت مجامعت، اندام نہانی میں کسی خراش دار شے کا داخل کرنا، یوٹرس کی سوزش، سرویکس کی سوزش وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر یہ مرض زیادہ اور پرانا ہو جائے تو مریضہ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ مریضہ کمزور اور گال اندر کو دھنس جاتے ہیں۔ چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ لیکوریا کے باعث بانجھ پن بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح لیکوریا کے باعث عورت کو تمام جسم میں دردیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لیکوریا کی زیادتی کے باعث عورت کو انتہائی سخت اور تکلیف دہ کمر درد لاحق ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات عورتوں میں لیکوریا کا مرض زیادہ وزن دار چیزیں اٹھانے اور پیروں کے بل دیر تک بیٹھنے کے باعث ہوتا ہے۔ عورتوں کی مخصوص بیماریوں سے متعلق جاننے اور خود علاج کرنے کے لئے ہمارے ادارے کی دوسری کتاب عورتوں کے امراض کا مطالعہ کریں۔

ہومیوپیتھک علاج: اشوکاQ+ہیلونائزQ+ایلٹرس فیری نوساQ ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

لیکوریا کا انگریزی علاج		
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Novidat 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Clotrima Vaginal Cream	صبح، شام ویجائنہ میں لگائیں

★★★★★★★★

مردانہ کمزوری

(SEXUAL WEAKNESS)

اس کنڈیشن میں مرد جماع کے دوران عضو تناسل کے پوری طرح پھیلنے اور سختی کی حالت میں نہ جانے کی وجہ سے عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ کنڈیشن یا تو ہر وقت ہی رہتی ہے یا کبھی کبھار ہو جاتی ہے اس کی عام وجوہات بچپن کی غلط کاریاں، مشت زنی، اغلام بازی، جنسی ہارمونز کی کمی، ادویات کے بُرے اثرات، ذیابیطس، ڈپریشن، کاروباری پریشانی اور نفسیاتی عوامل ہیں۔ بسا اوقات مریض کا عضو تناسل صحیح طور پر پھیلتا ہے لیکن مریض عورت کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہوئے جلد ڈسچارج ہو جاتا ہے یا پھر بعض مریض جریان منی اور احتلام کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں بھی مردانہ کمزوری کے زمرے میں آتی ہیں۔ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جنسی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں اور ہر وقت اپنے جنسی نظام پر نظر رکھ کر طرح طرح کے واہموں میں مبتلا رہتے ہیں تو انہیں بھی مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے جسے میڈیکل کی اصطلاح میں سائیکو جینک نیور ستھینیا کہتے ہیں۔ مردانہ امراض سے متعلق مزید تفصیل سے جاننے اور ان کا علاج خود کرنے کے لئے ہمارے ادارے کی دوسری کتاب مردوں کے امراض کا مطالعہ کریں۔

ہومیوپیتھک علاج: ڈامیانہ Q+ایگنس کاسٹس Q+یوہمبینم Q ملا کر دیں۔

مردانہ کمزوری کا انگریزی علاج		
➢	Tab Evion 400mg	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Tab Surbex-Z	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Cap Gonadil-F 300mg	1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

منہ میں چھالے

(MOUTH ULCERS)

اس مرض میں بے شمار چھوٹے چھوٹے چھالے منہ میں مسوڑھوں، زبان اور لبوں پر رخساروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا رنگ سفید یا خاکستر ہوتا ہے اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے زخموں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ عام طور پر مریض کو کھانے پینے اور بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور درد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مریض کو بخار بھی چڑھ جایا کرتا ہے۔ اگر تکلیف بڑھ جائے تو یہی چھالے ایسوفیگس کی میوکس ممبرین پر بھی پھیل جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں وائرل، بیکٹیریل اور پھپھوندی کا انفیکشن، معدے کی گرمی، گرم غذاؤں کے استعمال، ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹ، وٹامنز اور آئرن کی کمی وغیرہ شامل ہیں۔ کئی مریضوں میں جلد بازی میں منہ میں برش کرنے کے باعث ہونٹوں یا گالوں کے اندرونی حصوں پر زخم اور چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح حد سے زیادہ مرچ مصالحوں، ترش و گرم اشیاء کا استعمال بھی منہ کے چھالوں کی بیماری کا باعث بنا کرتا ہے۔ اکثر مریضوں میں نفسیاتی عوارض ٹینشن اور ڈپریشن کے باعث بھی منہ میں چھالے بن جاتے ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: بوریکس30+مرکسال30+کالی میور30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

منہ میں چھالوں کا انگریزی علاج		
➢	Daktarin Oral Gel	صبح، دوپہر، شام متاثرہ جگہ پر لگائیں
➢	Listerine Mouthwash	دن میں تین مرتبہ پانی میں ڈال کر غرارے کریں
➢	Cap Esso 20mg	ایک صبح نہار منہ

★★★★★★★★

ملیریا بخار

(MALARIAL FEVER)

ملیریا بخار کو جاڑے کا بخار بھی کہا جاتا ہے۔ ملیریا بخار خاص قسم کے ہیمو پیراسائٹ پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس جراثیم کی چار اقسام ہیں۔ پلازموڈیم وائی ویکس، پلازموڈیم ملیریائی، پلازموڈیم اوویلی اور پلازموڈیم فیلسی پیرم، ملیریا کے جراثیم متاثرہ شخص کے خون سے کسی دوسرے صحت مند شخص کے خون تک ایک خاص قسم کی مادہ مچھر اینافلیز کے کاٹنے کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ ملیریا بخار میں پہلے مریض کو ٹھنڈ لگتی ہے اور جاڑا چڑھتا ہے۔ پھر بخار تیز ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ 103 سے 105 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ مریض کے تمام بدن میں دردیں اور دُکھن ہوتی ہے۔ مریض کو متلی ہوتی ہے اور الٹیاں آتی ہیں۔ اسکے بعد مریض کو پسینہ آ کر بخار اُتر جاتا ہے اور مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی بخار دوبارہ 24 یا 48 یا 72 گھنٹوں کے بعد دوبارہ ہو جایا کرتا ہے۔ ملیریا کے بخار کا علاج ہمیشہ خون کے ٹیسٹ میں ملیریا کے جراثیم کنفرم کرنے کے بعد شروع کرنا چاہیے۔ اگر درج ذیل نسخہ سے زیادہ افاقہ نہ ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ کسی قریبی ہسپتال سے رجوع کرے۔

ہومیوپیتھک علاج: چائنا 30+اپی کاک 30+آرسنیکم البم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

ملیریا بخار کا انگریزی علاج		
➢	Tab Fansidar	پہلے 2 گولی دودھ سے پھر 1 گولی چھ گھنٹہ بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ اگر متلی یا قے ہو
➢	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

ناک میں گوشت / رسولی

(NASAL POLYP)

آج کل ناک میں بد گوشت ہو جانا بہت عام ہے جو کہ مریض کے لئے ایک انتہائی تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب ناک میں اور سائی نسز کے اندر کرانک انفلے میشن رہے تو اندرونی سطح ڈھیلی ہو کر نیچے کی طرف ایک پالپ یا گوشت ابھار کی شکل اختیار کر کے بڑھ جاتی ہے۔ یہ پالپ سائی نسز کے اندر شروع ہو کر ناک کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یا یہ ناک کی اندرونی سطح پر بن جاتے ہیں۔ مریض کو اکثر زکام لگنے کی ہسٹری ہوتی ہے۔ بعد میں پالپ کی وجہ سے ناک بند رہتی ہے۔ مریض کو اپنی ناک اندر سے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ پالپ ناک کے ایک جانب نتھنے میں بنا کرتے ہیں لہٰذا متاثرہ نتھنا اکثر بند رہتا ہے۔ ناک بند رہنے کے باعث ایک طرف جہاں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو دوسری جانب مریض کو ہر وقت سر درد کی بھی شکایت رہتی ہے۔ اگر مریض کی ناک کے اندر نیزل سپے کو لم ڈال کر دیکھا جائے تو پالپ نظر آتے ہیں۔ یہ پالپ نرم اور ہموار انگور کے دانے کی طرح ہوتے ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: کلکیریا کارب 30+ٹیوکریم 30+سینگونیریا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں

ناک میں گوشت / رسولی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Prednisolone 40mg	صبح، شام کھانے کے بعد صرف ایک ہفتہ تک
➢	Beconase Nasal Spray	بوقت ضرورت ناک میں سپرے کریں
➢	Tab Rigix 10mg	ایک روزانہ رات کھانے کے بعد

★★★★★★★★

نکسیر بہنا

(EPISTAXIS)

ناک سے بلیڈ نگ ہونے کو نکسیر بہنا کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ معمولی اور وقتی طور پر ہوتی ہے لیکن کئی بار یہ بلیڈ نگ زیادہ مقدار میں بھی بار بار ہو سکتی ہے۔ جس صورت میں اس کی وجہ جاننے اور اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں نکسیر کی وجہ ناک کے اندر کی سطحوں کا خشک ہو جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار ناک میں انگلی ڈال کر صاف کرنے، بیرونی طور پر ناک پر چوٹ لگنے، حمل کے دوران، ناک کے اندر پالپس، زخم، کینسر یا ارد گرد کے سائی نسز کے کرانک انفلے میشن کی وجہ سے، ہائی بلڈ پریشر، اسپرین یا کوماڈین کے استعمال کے دوران، ہیمو فیلیا، اے پلاسٹک انیمیا اور خون کی پلیٹ لیٹس کی کمی وغیرہ بھی نکسیر کا موجب بنتی ہیں۔ کئی مرتبہ بچے جب زیادہ دیر تک دھوپ میں کھیل کود کر لیں تو زیادہ گرمی لگ جانے کے باعث بھی انہیں ناک سے بلیڈ نگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عام طور پر سکول وغیرہ میں اگر بچے کو سزا کے طور پر سر پر مارا جائے تو بھی بچے کو نکسیر آسکتی ہے۔ کئی بچوں میں نکسیر بار بار آتی ہے لہٰذا اس کی تشخیص اور علاج انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص یا بچے میں نکسیر آئے تو اسے فوری طور پر لٹا کر اس کی ناک سختی سے پکڑ لینی چاہیے تاکہ پریشر دینے سے خون رُکنے میں مدد مل سکے اور سر پر تازہ پانی ڈالنا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: ملی فولیم 30+ چائنا 30+ فیرم فاس 30+ آرنیکا 30 ملا کر دیں۔

نکسیر بہنے کا انگریزی علاج		
➢	Cap Brino 250mg	1+1 کھانے کے بعد (16 سال سے بڑوں میں)
➢	Syp Faulad	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

یرقان

(JAUNDICE)

یرقان میں جِلد، آنکھوں اور دوسرے ٹشوز کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے جو کہ خون میں ایک خاص مادے "بیلی روبن" کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض کی آنکھیں اور منہ کی اندرونی سطح پیلی پڑ جاتی ہے۔ پیشاب بھی گہرے رنگ کا آتا ہے اور پاخانے کا رنگ بھی مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ بھوک نہیں لگتی، دل متلاتا ہے اور ہاضمہ صحیح کام نہیں کرتا۔ اس کی وجوہات میں خون میں بیلی روبن کا زیادہ بننا، خون کے سرخ خلیات کا ٹوٹنا پھوٹنا، جگر کی خرابی، صفراء کی نالیوں میں رکاوٹ، جگر پر وائرسز کا حملہ، جگر میں کینسر کی موجودگی، جگر کی سختی، شراب نوشی، صفراء کے راستوں میں پتھری اور جگر کی سوزش وغیرہ شامل ہیں۔ بچوں میں عام طور پر یرقان ہیپاٹائی ٹس "اے" وائرس کے حملے کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے جب کہ بڑوں میں یرقان عام طور پر ہیپاٹائی ٹس "بی" یا ہیپاٹائی ٹس "سی" وائرس کے حملے کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ بہر حال یرقان ایک علامت ہے اس کا علاج تشخیص کے بعد کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ یرقان کا علاج کسی مستند ڈاکٹر کے زیر نگرانی کرائیں۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+نیٹرم سلف30+چیلی ڈونیم30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

یرقان کا انگریزی علاج		
➢	Syp Hepa-Merz	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ اگر متلی یا قے ہو
➢	Tab Silliver 200mg	1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

ہدایات برائے صحت

(HEALTH ADVICES)

- ہمیشہ زود ہضم ہلکی غذا استعمال کرنی چاہیے۔
- جب کھانے کی رغبت ہو صرف اسی وقت کھانا چاہیے۔
- اپنی نیند ہمیشہ پوری کرنا چاہیے۔
- رات کو وقت پر سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔
- صبح سویرے کسی بھی وقت خالی پیٹ چہل قدمی کرنی چاہیے۔
- زیادہ اور فالتو دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔
- سگریٹ نوشی اور دوسری منشیات سے بچنا چاہیے۔
- پانی زیادہ اور صاف ستھرا پینا چاہیے۔
- زیادہ مرغن اور چربیلی و مرچ مصالحوں والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
- وقت بے وقت غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
- پیشاب اور پاخانہ ہمیشہ وقت پر کرنا چاہیے۔
- وقتاً فوقتاً اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہیے۔
- ہر پندرہ بیس دن بعد احتیاطاً بلڈ پریشر چیک کرائیں۔
- اگر جسم میں مستقل اور ہلکا ہلکا بخار ہو تو فوراً معالج سے رجوع کریں۔
- معالج کے مشورے کے بغیر کوئی دوا خود سے کبھی استعمال نہ کریں۔
- سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز پنجگانہ قائم کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

مردوں کے امراض

ایک ایسی کتاب جس میں مردانہ امراض پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ہر مرض کے لئے فوری اثر ہومیو پیتھک ادویات لکھ دی گئی ہیں۔

عورتوں کے امراض

عورتوں کی مخصوص بیماریوں کے لئے لکھی گئی کتاب جس میں عورتوں کے امراض کیلئے ہومیو پیتھک اور انگریزی علاج تحریر کر دیا گیا ہے۔

آسان علاج

عام بیماریوں کیلئے اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عام امراض کیلئے ہومیو پیتھک اور انگریزی علاج پر مبنی بہترین کتاب۔

روحانی علاج

یہ کتابچہ آجکل کی بے سکون زندگی کے مسائل کا روحانی علاج ہے۔ اس کتابچے میں مجرب اسلامی اور نورانی وظائف دیئے گئے ہیں۔

انگلش ٹینسز

اب انگلش سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا کی آسان ترین زبان ہے۔ صرف 12 روز میں انگلش ٹینسز سیکھنے کی آسان کتاب۔

انگلش سپیکنگ کورس

روزمرہ زندگی میں انگریزی بول چال کے اصول وضوابط اور عام فہم فقرے وضرب الامثال جو انگلش بولنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔

پشاور ڈسٹری بیوٹرز

ناصر بک ایجنسی: ڈھکی نعلبندی، قصہ خوانی بازار، پشاور شہر

فون: 0307-8317755 / 0302-8884377 / 091-2572277

عثمانیہ پبلی کیشنز

Usmania Publications

1385-Krishanpura Near Bilal Town,
G.T. Road, Peshawar. Ph: 091-2262443