
امراض گردہ و مثانہ

تشخیص و علاج





حکیم محمد عبداللہ

Facebook | کتب خانہ طبیب

عثمان پبلی کیشنز

Oureshi

فہرست

- تشریح افعال گردہ مثانہ اور ان کے متعلقات 5
- گردے پیشاب کو کس طرح بناتے ہیں 5
- گردے خون سے کیا کیا اجزاء خارج کرتے ہیں 6
- طریقہ تشخیص امراض گردہ مثانہ 7
- تشخیص و علاج امراض گردہ و امراض بول 9
- ذیابیطس 10
- ورم گردہ حاد 13
- ورم گردہ مزمن 14
- گردہ کا سکڑ جانا (تلیف گردہ) 15
- ضغط الکلیہ (رینل کنجن) 18
- پیشاب میں خون کا آنا/بول الدم (ہیمے چوریا) 18
- مثانہ سے خون آنے کے اسباب 18
- گردوں سے خون آنا 19
- سنگ گردہ (گردہ کی پتھری) 20
- پیشاب میں پیپ آنا 21
- اندمال زخم میں مفید نسخے 22
- ورم مثانہ 23
- مزمن ورم مثانہ 23
- قارورے کا وزن مخصوص 25
- ذیابیطس سادہ 26
- بندش بول (پیشاب کا رُک جانا) 27
- بندش بول سدی 27
- بندش بول بلا سدہ 28

Oureshi

- چند مجربات مدارات بول 29
- تسلسل بول 29
- سلسل بول 29
- کثرت بول 30
- بول بستری 31
- رسوبات بول 32
- مجربات مسیح الملک حکیم اجمل خان 33
- چربی کا اخراج 34
- امراض مثانہ وغدہ قدامیہ 34
- ورم مثانہ حاد 35
- ورم مثانہ مزمن 36
- سلعہ مثانہ یا مثانہ کی رسولی 37
- سرطان مثانہ 37
- سنگ مثانہ 37
- مثانہ کی سستی 37
- عوارضات غدہ قدامیہ 38
- عظم غدہ قدامیہ (غدہ مذی کا بڑھ جانا) پراسٹیٹ گلینڈز 39
- علامات ورم غدہ مذی 39
- امراض گردہ کے لئے مجرب نسخہ جات 41
- امراض گردہ وامراض بول کے متعلق مفرد ومرکب ادویات 45
- گردہ ومثانہ کے لئے مفید ادویات 46
- حفاظت گردہ کے لئے چند مفید باتیں 46
- امراض گردہ کے لئے مفید پھل 48

Oureshi

تشریح افعال گردہ مثانہ

اور

اُن کے متعلقات

گردہ:

گردے دو ہیں ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ یہ چار سے ساڑھے چار انچ لمبے اور 2 سے 2½ انچ چوڑے اور تقریباً ڈیڑھ دو انچ موٹے ہوتے ہیں۔

غشاء گردہ:

گردے کے گرد ایک تھیلی ہوتی ہے جو کہ گردہ کی حفاظت کرتی ہے۔ گردہ کے اوپر ایک غدود ہوتی ہے جس کا نام غدہ کلاہ گردہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم غدہ ہے۔ یہ خون کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر خدانخواستہ اس میں تحریک ہوتی رہے تو انسان کی جنس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔

شریان گردہ:

یہ ایک بہت بڑی شریان ہے جو کہ گردہ میں آتی ہے اور شاخ در شاخ ہو کر گردے میں پھیل جاتی ہے اور گردے اس رگ میں سے خون کا فالتو پانی اور دیگر ناکارہ اجزائے بدن زہریلے مواد خارج کر دیتے ہیں۔

ورید گردہ:

یہ ایک ورید ہے جو کہ گردہ سے صاف شدہ خون لے کر جگر میں جاتی ہے۔


حالبین:

یہ دو نالیاں ہیں جو کہ گردوں سے اجزائے مائیہ (جن کو پیشاب کہا جاتا ہے) مثانہ میں آتی ہیں۔

گردے پیشاب کو کس طرح بناتے ہیں:

گردے کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جن کو اناب کلیہ یا گردہ کی نالیاں

Oureshi



حالب اور گردے کی طولانی تراش

کہتے ہیں۔ یہ نہایت باریک در باریک کیسات (Capsules) سے ملحق ہوتی ہیں۔ یہ کیسات یا Capsuls شریان گردہ کی باریک در باریک شاخوں کے اوپر لپٹے ہوتے ہیں اور انجذاب کے ذریعے خون کے اندر کا زائد پانی جذب کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو بڑی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے یہ اجزائے پانی حالبین میں آتے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے مثانہ میں آتے ہیں۔ اسی کا نام پیشاب ہے۔

گردے خون سے کیا کیا اجزاء خارج کرتے ہیں؟

1- گردے خون کے اندر سے زائد پانی کو جذب کرکے پیشاب کی صورت میں خارج کرتے رہتے ہیں۔
2- زہریلے مواد، ناکارہ اجزائے بدن خارج کرتے رہتے ہیں۔
3- زہریلے مواد جو بدن کے اندر کسی وجہ سے پہنچ جائیں۔
4- یورک ایسڈ۔
5- یوریا۔
6- مختلف نمکیات، اگر گردے نمکیات کو بدن سے خارج نہ کریں تو مرض استسقاء پیدا ہو جاتا ہے۔

Facebook | کتب خانہ طب
Oureshi

7- خون کے زائد اجزاء مثل شوگر۔ اگر پیشاب کے اندر زائد شوگر بڑھ جائے تو گردے اس کو خارج کرتے ہیں جیسا کہ ذیابیطس شکری میں ہوتا ہے۔

گردوں کی اہمیت:


مذکورہ بالا بیان سے ہی گردوں کی اہمیت ظاہر ہے اس لئے اس کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔

گردے دوران خون کو صحیح حالات میں رکھنے کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں خرابی پیدا ہونے سے' دیگر اعضائے رئیسہ دل و دماغ اور جگر متاثر ہونے سے بچ نہیں سکتے جیسا کہ آئندہ بیان میں واضح کیا جائے گا۔

طریقہ تشخیص امراض گردہ مثانہ

مریض کی ہسٹری لینی چاہئے۔ اس سے تمام حالات مرض معلوم کرنے چاہئیں۔ معالج کو چاہئے کہ مریض کا چار طریقوں سے معائنہ کرے اور پھر صحیح تشخیص کرے۔ چار طریقہ ہائے تشخیص درج ذیل ہیں:

1- معائنہ بالبصر 2- معائنہ باللمس



Oureshi

3- معائنہ بالقرع 4- معائنہ بالسمع

1- معائنہ بالبصر:

آنکھ سے قارورہ دیکھنے کی مہارت رکھنے والا طبیب معائنہ بالبصر سے بہت جلد مرض کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔

2- معائنہ باللمس:

چھونے سے اعضائے ماؤف کی سختی، نرمی، ورم، سوجن وغیرہ معلوم کرنی چاہئے۔

3- معائنہ بالقرع:

ماؤف حصہ جسم کو ٹھونکنے سے بہت کچھ معلوم ہوا ہے مثلاً ورم اور پھوڑے کی تشخیص، اعضاء کا اکڑاؤ اور سوجن وغیرہ معلوم کیا جا سکتا ہے تا کہ صحیح تشخیص ہو سکے۔

4- معائنہ بالسمع:

آلہ مسماع الصدر سے دل کے امراض اور پھیپھڑے کے امراض جو کہ امراض گردہ وغیرہ کے تابع ہوں، معلوم کئے جا سکتے ہیں۔ گویا ہر طرح سے احتیاط، غور و فکر اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ امراض بول میں کیمیاوی و خوردبینی ذرائع تشخیص میں بہت مدد لینی چاہئے۔ علاوہ ازیں جدید آلات تشخیص ایکس رے (X-Ray) سے بھی ضرور مدد لینی چاہئے تا کہ جلد از جلد تشخیص مکمل ہو۔

بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کئی سال مریض درد، جلن پیشاب میں مبتلا رہا اور معالجین نے غلطی سے سوزاک تشخیص کیا لیکن معائنہ X-Ray کے ذریعے مریض کے مثانہ میں پتھری ظاہر ہوئی جس کا علاج بذریعہ آپریشن ہوا اور شفاء نصیب ہوئی اور مریض چین کی نیند سویا۔

اس کے علاوہ جن کوائف کا ہم ذکر کریں گے مثلاً:

1- مقدار

2- رنگت

3- رسوب

پیپ کا آنا، البیومن، شوگر، بدبو، خون، قارورہ کا مکدر و غلیظ ہونا یا صاف (Clear) کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے اور ان کی طرف خاص توجہ دینی چاہئے۔

Oureshi

بچوں میں مقدار کے لحاظ سے دو سال سے پانچ سال کی عمر تک عموماً سولہ اونس سے چھبیس اونس قارورہ آتا ہے۔ پانچ سال سے آٹھ سال تک بیس اونس سے چالیس اونس تک' آٹھ سال سے چودہ سال تک 32 اونس سے 48 اونس تک۔

تناسب وزن کے لحاظ سے بچے جوانوں سے زیادہ پیشاب کرتے ہیں جس کی وجہ ان میں نشوونما کا فروغ (زیادتی) ہے۔ بہ نسبت رات کے دن میں پیشاب زیادہ آتا ہے لیکن اگر اس کا اُلٹ ہو یعنی رات کو پیشاب زیادہ آئے تو یہ کسی آنے والی مرض کا پتہ دیتا ہے مثلاً مرض گردہ۔ قارورہ کے رنگ سے تشخیص میں مدد لی جاتی ہے۔

قارورہ کا زیادہ زرد ہونا۔ گرمی اور صفرا (Bile) کی زیادتی کا نتیجہ ہے اور عموماً مرض یرقان میں پیدا ہوتا ہے۔ ذیل میں رنگت کے لحاظ سے قارورہ کے اسباب پر روشنی ڈالی جاتی ہے:

رنگ	اسباب	رنگ	اسباب
سفید	پانی کی زیادتی ذیابیطس سادہ	گہرا زرد	یرقان زدہ تحلیل اعضاء
سرخ	خون کا آنا	ہلکا زرد	محنت
سفید دودھیا	خرابی ہضم وغیرہ		

تشخیص و علاج امراض گردہ و بول

امراض گردہ و امراض بول میں ہم مندرجہ ذیل امراض کا ذکر کریں گے:

1- پیپ آنا
2- قارورے کا وزن مخصوص بڑھ جانا
3- کثرت بول
4- چربی آنا (البیومی نوریا)
5- بندش پیشاب
6- سلسل بول
7- رسوب کا آنا
8- ورم گردہ یا عظم گردہ

Oureshi

مذکورہ امراض کی تشریح حسب ذیل ہے:

ذیابیطس

یہ ایک حالت مرض ہے جس میں قارورہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کا وزن مخصوص بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ تھکاوٹ' پیاس کی شدت' بھوک کی شدت ہوتی ہے۔ مریض کا بدن آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے اور دبلا ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

علامات:

پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات دن رات میں تین سیر سے آٹھ سیر تک قارورہ آتا ہے۔ اس کی رنگت ہلکی زرد' سونگھنے سے میٹھی بو آتی ہے۔ اگر چوڑے برتن میں رکھا جائے تو قلمی مادہ تہہ نشین ہو جاتا ہے۔ وزن مخصوص 1-30 سے 1-40 تک ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں شکر کی مقدار 20 سے 40 گرین فی اونس ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات شوگر 6 اونس سے ایک پونڈ تک روزانہ خارج ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں فاسفیٹ خارج ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی البیومن بھی خارج ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر تھکاوٹ' کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ جلد خشک ہوتی ہے۔

ذیابیطس کو ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں:

1- متوسط درجے کا مرض:

اس میں علامات اتنی شدید نہیں ہوتی ہیں۔ صرف غذا پر کنٹرول رکھنے سے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

2- شدید درجے کا مرض:

یہ حالت پرانے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں یا جوانوں میں سر پر چوٹ لگنے سے بڑی عمر کے آدمیوں میں دماغی پریشانیوں سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

اسباب:

ذیابیطس شکری بہ نسبت عورتوں کے مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے اسباب میں غدہ بانقراس میں خرابی کا آ جانا ایک اہم سبب ہے۔ اگرچہ اور اسباب بھی ہیں

Oureshi

مثلاً:

1- جگر کی خرابی (جگر گلائیکوجن کا سٹور ہاؤس ہے)۔

2- غدہ درقیہ کی خرابی جیسے کہ غدہ درقیہ کے بڑھنے سے پیشاب میں شکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ غدہ نخامیہ کبھی پیچوٹری گلینڈ (ایک دماغی غدہ) کی خرابی سے بھی پیشاب میں شکر آنے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ غدہ شکر پر کنٹرول رکھتا ہے۔

3- ایڈرینالین غدود (غدہ کلاہ گردہ) کی خرابی بھی شکر آنے کا موجب ہے جیسے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اعصابی جوش و خروش یا ایڈرینالین کے انجکشن سے قارورہ میں شکر آنے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں غدہ کلاہ گردہ میں تحریک پہنچاتی ہیں۔

عوارضات:

ذیابیطس شکری کے عوارضات بہت ہیں۔ مثلاً:

1- سل و دق

2- جلدی امراض وغیرہ

دیگر امراض:

پھوڑے پھنسیاں، ایگزیما، خارش وغیرہ ابتدائی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ کاربنکل اور گنگرین یعنی جلد کا مُردہ ہو جانا، پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ پھوڑے پھنسیاں اور کاربنکل کے حالات میں اور خارش اعضائے مخصوصہ جیسے امراض میں پیشاب کو ٹیسٹ کرایا جائے۔

اعصابی عوارضات:

ورم اعصاب محیطی، جسمانی دردیں وغیرہ ذیابیطس سے پیدا ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں بے چینی، مالیخولیا، قوما ذیابیطسی وغیرہ۔

امراض بصارت:

مثلاً موتیابند، ورم طبقہ قرنیہ اور دیگر امراض چشم پیدا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں عصبی امراض جو کہ مرض ذیابیطس سے پیدا ہوتے ہیں، بے شمار ہیں مثلاً دماغی محنت پڑھنے لکھنے کی طاقت کا زائل ہو جانا، اعضاء کا کانپنا، قوت مردانہ کی کمی، تھوڑی محنت سے

Oureshi

تھکاوٹ کا ہو جانا' مرض کی شدت سے فالج وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوران سر' چلنے پھرنے میں تھکاوٹ۔

تشخیص:

عوارضات کے ماتحت جن علامات کا ہم نے ذکر کیا ہے' پائی جائیں تو قارورہ کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔ ذیابیطس سادہ میں جس میں پیشاب زیادہ آتا ہو لیکن شکر نہیں پائی جاتی' تشخیص مرض میں دو اصولوں کو مدنظر رکھیں۔ پھوڑے پھنسیوں اور ایگزیما کے مریض کے پیشاب کا شوگر ٹیسٹ کرایا جائے۔

کمزوری اور جسم کے دن بدن دبلا ہونے کی حالت میں پیشاب کا شوگر ٹیسٹ کرنا چاہئے۔

انجام مرض:

اگر ذیابیطس شروع میں پکڑ لیا جائے تو علاج پذیر ہو سکتا ہے اور علامات شدید ہو جائیں مثلاً سل ودق' کوما' ذیابیطس (ذیابیطس کی وجہ سے غشی کے دورے) اس صورت میں زندگی کے خطرے میں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ کوما کے وقت مریض کے منہ سے خاص قسم کی میٹھی بو آتی ہے۔

علاج:

غذا پر کنٹرول رکھا جائے۔ زیادہ شکم سیری سے پرہیز رکھا جائے۔ زیادہ مٹھاس سے پرہیز رکھا جائے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار روزہ رکھا جائے۔ مریضان ذیابیطس کے لئے انڈا اور گوشت بہترین غذائیں ہیں۔ دالوں میں دال چنا اور دال مونگ مفید ہے۔ اس مرض کے لئے انسولین کے انجکشن جو کہ بانقراس کا جوہر ہے' مفید پائے گئے ہیں اور ان کا استعمال مریض ذیابیطس کے لئے ضروری ہے۔ مریض روزانہ اپنے پیشاب کا خود معائنہ کرے اور غذا پر خود بخود کنٹرول رکھے۔ کوما کی حالت میں انسولین کا انجکشن معجز نما اثر دکھاتا ہے۔ کوما کے وقت اس کی مقدار بیس سے تیس یونٹ تک فی سی۔ سی دی جاتی ہے۔ آنتوں کے فعل کو درست رکھا جائے۔ کسی قسم کا زخم مثلاً پھوڑا پھنسی' کان کا زخم وغیرہ کی حفاظت کی جائے اور ان کو صاف رکھا جائے کیونکہ مریضان ذیابیطس کے لئے معمولی زخم سے جراثیم کا انجذاب خطرناک عوارضات پیدا کر دیتا ہے۔ دیگر یونانی

Oureshi

آیورویدک ادویات جو اس مرض میں مفید ہیں' ان کا ذکر اگلے صفحات مین کیا جائے گا۔

ورم گردہ حاد

علامات:

البیومن زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ گرم کرنے سے قارورہ جم جاتا ہے جیسے انڈے کی سفیدی ہوتی ہے۔ قارورہ کم مقدار میں آتا ہے مثلاً دس سے بیس اونس روزانہ۔ قارورہ کا وزن مخصوص بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس میں خون بھی ہوتا ہے جس سے اس کی رنگت دھوئیں کے مانند ہوتی ہے۔ قارورہ کا معائنہ کرنے سے گردے کی اندرونی جھلی کے اجزاء خون کے ٹکڑے ظاہر ہوتے ہیں۔ مرض استسقاء کا آغاز یا علامات پائی جاتی ہیں جس کی ابتدائی علامات چہرے پر ورم کا ہونا نیز خصیوں اور اعضائے تناسل پر ورم کا ہونا' منہ کی رنگت زرد ہوتی ہے۔ دردسر' بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ قے بھی ہوتی ہے۔ پیشاب رُکنا شروع ہو جاتا ہے جس سے زہریلی علامات پیدا ہوتی ہیں۔

اسباب:

شدید بخاروں کا ہونا خصوصاً محرقہ امراض قلب' دوسری جراثیمی رطوبات کا جذب ہونا اور ورم لوذتین' ضرب' چوٹ' بعض زہریلی ادویہ' روغن تارپین' الکوحل' سردی کا لگنا وغیرہ اسباب میں شامل ہیں۔

انجام مرض:

انجام مرض بخیر ہوتا ہے۔ چند ہفتوں میں مکمل صحت ہو جاتی ہے بشرطیکہ حفظان صحت کے اصولوں کو مدنظر رکھا جائے۔ اگر مرض تین ماہ سے زیادہ قائم رہے تو ورم گردہ مزمن پیدا ہو جاتا ہے۔ مرض بڑھنے سے استسقاء' ورم غشاء قلب اور ورم باریطون پیدا ہو جاتا ہے۔ قلب پھیل جاتا ہے۔ علاوہ بریں امراض جلد پیدا ہو جاتے ہیں۔

علاج:

قبض نہ ہونے دی جائے۔ جلد کے فعل کو درست رکھا جائے۔ گردوں پر بوجھ نہ آئے۔ پانی کی مقدار کم استعمال کی جائے۔ ابتدا میں صرف دودھ یا دودھ سوڈا دیا جائے۔

Oureshi

مریض بستر پر لیٹا رہے۔ مریض کو گرم رکھا جائے۔ معرقات' پسینہ آور ادویات استعمال کی جائیں۔ قبض کشا ادویات مفید رہتی ہیں۔ نمکین ادویات خاص طور پر مفید ہیں۔ میگ سلفاس' سوڈا سلفاس چار ڈرام ایک اونس پانی میں' ہلکے مدررات مثلاً پوٹاشیم بائی کاربونیٹ یا پوٹاشیم سائٹرس یا پوٹاشیم ایسی ٹاس دس گرین پانی ایک اونس دن میں تین مرتبہ دیں۔ اگر دل کمزور ہو تو دل کی طاقت کے لئے سپرٹ ایمونیا' ایرومیٹک بیس قطرے پانی ایک اونس ملا کر دیں۔

اگر پیشاب میں خون آتا ہے تو گردے کے مقام پر پلٹس لگانا' دافع ورم چیزوں کا استعمال' جونکیں لگانا بھی مفید ہے۔ کمزوری کی حالت میں مقویات مفید ہیں۔ مندرجہ ذیل نسخہ مفید و مجرب ہے:

- لائیکوار بینزائی پرکلورائیڈ 15 منم
- لائیکوار ایمونیا ایسی ٹاس ایک ڈرام
- ایسی ٹک ایسڈ ڈام گیرٹ 15 منم
- پانی ایک اونس

ایسی ایک خوراک دن میں دو تین بار پلائیں۔ مفید و مجرب ہے۔ غذا میں دودھ دینا مفید ہے۔ امراض گردہ میں تین چیز مضر ہیں:

1- افیم
2- کنتھری ڈس
3- ٹرپن ٹاس آئل

ورم گردہ مزمن (کرونک البیومن)

انابیسی گردہ کی نالیوں کا ورم۔ یہ کیفیت ورم گردہ حاد کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یا جراثیمی امراض کے بعد ازخود پیدا ہوتی ہے۔

علامات:

1- البیومن زیادہ مقدار میں آتی ہے۔ یعنی پیشاب کا تیسرا چوتھا حصہ۔
2- ابتدا میں پیشاب کم مقدار میں آتا ہے' بعد میں گردہ سکڑ جاتا ہے تو پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ پیشاب غلیظ ہوتا ہے اور اس میں رسوب زیادہ ہوتا ہے۔ اس

Oureshi

میں کبھی کبھی خون بھی ہوتا ہے۔

3- استسقاء کی علامات ہوتی ہیں خصوصاً چہرے کی رنگت زرد' کمزوری اور ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ قلبی دورے پڑتے ہیں۔

اسباب:

1- ورم گردہ حاد

2- قلبی امراض مثلاً ورم غشاء القلب

3- دیگر امراض سے جراثیم کا جذب ہونا مثلاً خناق' ورم جنجرہ یا قولون میں جراثیمی انفیکشن' کثرت شراب نوشی۔

انجام مرض:

انجام مرض عموماً مہلک ہوتا ہے۔ مریض زیادہ سال تک زندہ نہیں رہ سکتا اور موت عموماً ہارٹ فیل یا تسمم بول سے آتی ہے۔ عموماً استسقاء اور پیشاب میں البیومن کی شکایت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر گردہ سکڑ جائے تو زندگی کی اُمید ہو سکتی ہے۔

علاج:

سردی سے بچایا جائے۔ ہلکی ورزش مفید ہے۔ قبض نہ ہونے دیں۔ استسقاء کے لئے ڈاکٹر میکلین نے 15 گرین کی مقدار میں یوریا پانی میں حل کر کے دینا مفید بتایا ہے۔ بعض طبیبوں کا خیال ہے کہ غذا تھوڑی مقدار میں دی جائے لیکن جدید تحقیق کے لحاظ سے مریضوں کو غذا کم دینا ان کی قوت دافعہ کو کمزور بناتا ہے۔ بہر حال مریض کو گوشت کا شوربہ' مچھلی' انڈے کی سفیدی' مٹر' پھل' شلغم' پالک اور چاول وغیرہ دینے چاہئیں۔

پھلوں میں مالٹا' کیلا مفید ہیں۔ سبزیاں مثلاً آلو' اروی' گوبھی درست ہیں۔ شراب بالکل استعمال نہیں کرنی چاہئے۔ تھوڑی مقدار میں نمک کو گول کر پینا مفید ہے۔ علاوہ بریں یونانی علاج آئندہ صفحات میں درج ہے۔

گردے کا سکڑ جانا یا تلیف گردہ

علامات:

البیومن آتی ہے لیکن تھوڑی مقدار میں' پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ بعض

Oureshi

اوقات سو اونس روزانہ تک بھی ہوتا ہے۔ مریض کو کئی دفعہ رات کو اُٹھنا پڑتا ہے۔ قارورے کا وزن مخصوص کم ہو جاتا ہے 105 سے 112 تک کیونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ قارورے میں نمکیات کی مقدار کم ہوتی ہے۔ قارورہ صاف زرد ہوتا ہے اس میں چھلکے وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے۔ استسقاء پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر اثر ہوتا ہے یا ورم گردہ بڑھ جاتا ہے۔ مریض کی رنگت زرد ہوتی ہے اگرچہ وہ کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو۔ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دل کا بائیں اذن موٹا ہوتا ہے' آخر میں دل پھیل جاتا ہے۔ استسقاء پیدا ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں البیومن آنے لگ جاتا ہے۔ مرض کی تمام وقت میں تسمم بول کی کیفیت رہتی ہے جس کی علامات غنودگی' درد سر' جسمانی دماغی قوتوں کا کمزور ہونا' تشنج' بدہضمی' تنگی تنفس۔

عوارضات:

1- بلڈ پریشر
2- آنکھ کی طبقہ غیبہ کا ورم
3- دماغی جریان خون جس سے فالج ہوتا ہے۔
4- مختلف جریان مثلاً نکسیر' بزاز دم۔

نکسیر سے علامات میں تخفیف ہوتی ہے اس لئے اس کو فوراً بند نہیں کرنا چاہئے۔
امراض جلدیہ پیدا ہوتے ہیں مثلاً خارش' پتی' ایگزیما۔

اسباب:

اسباب صرف مذکورہ ہیں جو مرض گردہ حاد اور مزمن میں ہیں۔

1- نقرس
2- گنٹھیا
3- کھانے پینے میں بے احتیاطی
4- سیسے کے زہر کا چڑھ جانا
5- مختلف زہروں کا جذب ہونا وغیرہ

انجام مرض:

اگر علامات قلب شدید نہ ہوں اور تسمم بول کی کیفیت زیادہ نہ ہو تو انجام مرض

Oureshi

مہلک نہیں ہوتا ہے۔ آخیر مرض میں جریان خون دماغی ہونے کے باعث زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے جس سے مرض سکتہ پیدا ہو جاتا ہے جو موت کا باعث ہوتا ہے یا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔

علاج:

سردی سے مریض کو بچایا جائے۔ تمام جسمانی دماغی کام کرنے سے روکا جائے۔ غذا کے متعلق جو ہدایات پیچھے دی گئی ہیں یعنی ورم گردہ انابیسی میں مدنظر رکھا جائے چونکہ یہ مرض زیادہ بوڑھوں میں ہوتا ہے۔ غذائی مقدار معین کی جائے تاکہ لحمی خوراک جس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے' کم کی جائے۔ سبزیاں زیادہ کھائی جائیں۔ روغن والی غذا بھی کم کھائی جائے۔ شراب بالکل ترک کر دی جائے۔ اس طرح زیادہ مصالحے دار غذا کم کی جائے۔ نبض اور دوران خون کا معائنہ کیا جائے تاکہ بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے۔ ہلکے ملینات مفید ہیں۔ فولادی مرکبات زیادہ استعمال نہ کی جائیں کیونکہ قبض پیدا کرتے ہیں۔

ہارٹ فیل کے لئے جبکہ دل کی حرکات بے قاعدہ ہوئی ہوں' آرام کرانا ضروری ہے۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو سوڈیم نائٹریٹ ایک گرین یا آدھا گرین دن میں ایک دو دفعہ دیا جائے۔ اگر گردے کی وجہ تنگی تنفس ہو تو سوڈیم نائٹریٹ آدھا گرین یا کھاری نمکیات مثلاً سوڈا بائی کارب اور سپرٹ ایمونیا ایرومیٹک دس قطرے پانی میں ملا کر دینا مفید ہے۔

اگر دل کی کمزوری سے چہرے پر سوج کے آثار ظاہر ہوں تو مریض کو بستر پر لٹا کر اور آرام سے مریض کو صرف دودھ دیا جائے۔ ہر چار گھنٹے کے بعد سات اونس صرف دن میں چار بار دیں۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی انڈے کی زردی ملا دی جائے یا ہلکا سا شوربا دیا جائے۔ ہلکی سبزیاں اور ایک انڈا اگر یوریمیا' تسمم بول ہو جائے تو یہی خوراک اور پرہیز ضروری ہے۔ پرانے تسمم بول میں ملینات دیتے رہنا چاہئے۔ غذا ہلکی دیں' جلد کے فعل کو تیز کریں۔

یوریمیا' زہر بول میں جس کی علامات ہذیان' بہکی بہکی باتیں کرنا' تشنج' قوما (غنودگی) اس حالت میں ایک اچھا جلاب دینا چاہئے مثلاً پلوجلپ کو دو ڈرام یا میگنیشیا ایک اونس پانی ایک اونس۔ جلد کے فعل کو تیز کریں۔ گرم پاشویہ سے یا گرم پانی کی بوتلوں سے یا پائیلوکارپین کی جلدی انجکشن سے فصد کرنا بھی ابتدائی حالت میں مفید ہے مثلاً:

Oureshi

پانچ سے بیس اونس مریض کی قوت کے مطابق خون نکالنا چاہئے۔ اگر خون نکلنے سے یا جلاب سے کمزوری ہو جائے تو اس صورت میں سیلائن سلوشن مریض کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف ماہر ڈاکٹر کرے۔ اگر خون میں تیزابی مادہ ہو تو سوڈا بائی کارب پانی میں حل کر کے دیا جائے۔

ضغط الکلیہ (رینل کنجن)

گردہ پر دباؤ پڑنا

یہ ایک کیفیت ہے جس میں گردے پر دباؤ پڑتا رہتا ہے اور البیومن خارج ہوتی ہے۔ اس کے درج ذیل اسباب ہیں:

1- امراض قلب
2- امراض استسقاء
3- سعات بطن
4- حمل

علاج:

سبب کے ازالہ کے ساتھ مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

بول الدم (پیشاب میں خون آنا) ہیمے چوریا

جب پیشاب میں خون آئے' مریض سے دریافت کیا جائے کہ آیا خون پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔

طریقہ تشخیص جدا:

اگر پیشاب سے پہلے خون آئے تو سمجھنا چاہئے کہ وہ مجری بول سے آتا ہے یا پراسٹیٹ گلینڈ (غدہ مذی) سے آتا ہے۔

نوٹ: یہ صورتیں چوٹ یا سوزاک سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب کے بعد خون آتا ہے اور جمے ہوئے ٹکڑوں کی طرح آتا ہو تو یہ خون مثانہ سے آتا ہو گا۔

مثانہ سے خون آنے کے اسباب:

مثانہ سے خون آنے کے اسباب حسب ذیل ہیں:

1- ورم مثانہ حاد
2- پتھری

Oureshi

اس صورت میں حرکت کرنے سے خون آتا ہے اور عضو مخصوص کے سر پر درد زیادہ ہوتا ہے۔ پتھری کی مزید تشخیص الٹرا ساؤنڈ یا ایکسرے سے ہو سکتی ہے۔

علامات پتھری:

اس میں مثانہ سے بکثرت خون آتا ہے۔ اس کے علاوہ مثانہ کے سرطانی علامات میں وقفوں کے ساتھ آتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے۔ رسولی کا وجود ناف کے نیچے چھونے سے یا مستقیم کی راہ سے چھونے سے معلوم ہوتا ہے۔ ایکسرے (X-Ray) اور مثانہ دیکھنے کے آلہ سے تشخیص میں مدد لینی چاہئے۔

گردوں سے خون آنا

علامات:

پیشاب کے ساتھ خون مل کر آتا ہے۔ پیشاب کی رنگت دھوئیں کی مانند ہوتی ہے۔

اسباب:

التہاب ورم گردہ، سنگ یا ریگ، زخم بعض اوقات ملیریا کے اثر سے بھی، چوٹ، امراض قلب، زہریلی ادویات کا استعمال، تیز بخار، مرض پرپورا اور دیگر جراثیم مرض پیدا کرتے ہیں۔

علاج:

مریض کو آرام سے لٹائیں۔ ترش دوا نہ دیں۔ سبب مرض کو دور کریں۔ سفوف دافع بول الدم، دم الاخوین، سنگ جراحت، گیرو، طباشیر، گوند کیکر ہر ایک چھ ماشہ۔ مقدار خوراک تین ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت انجبار دیں۔

دیگر: چاکسو تین ماشہ، سفوف صندل تین ماشہ۔ باریک پیس کر پانی میں شیرہ نکال کر پلائیں۔

دیگر: تخم خرفہ، تخم کاہو، تخم کاسنی گھوٹ کر پلائیں۔

دیگر: لیکسم لیکٹیٹ دس گرین پانی کے ساتھ دن میں دو تین بار دیں۔

دیگر: انار کھلائیں اور سبب مرض دور کریں۔

Oureshi

دیگر: چاکسو ایک ماشہ، تخم کاہو ایک ماشہ، صندل سفید ایک ماشہ پانی میں گھول کر چھان کر صبح و شام پلائیں اور سخت حرکات سے پرہیز کریں۔

سنگ گردہ

سنگ گردہ گردہ کے حوض میں یا گردہ کے جسم میں ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ یا دوسرے اسباب سے بنتی ہے۔ یورک ایسڈ کی پتھریاں قدرے زرد رنگ کی ہوتی ہیں۔ یہ مریضان نقرس اور مریضان گنٹھیا میں اکثریت سے پیدا ہوتی ہیں۔ یا ان مریضوں میں زیادہ ہوتی ہیں کہ جن میں رسوبات زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔

دوسری قسم کی پتھری:

زرد رنگ کی ہوتی ہے اور کیلشیم اوگزیلیٹ کی بنتی ہے۔ گردے میں ایک سے زیادہ پتھریاں بھی ہوتی ہیں۔ مقام پتھری گردے کے حوض میں پتھری سالہا سال بھی رہ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ ورم گردہ بھی پیدا کرتی ہیں۔

2- پتھری اپنی حرکت میں آنے کی وجہ سے شدید درد گردہ پیدا کرتی ہے۔

3- حالبین میں کوئی پتھری رُک کر درد گردہ شدید پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ورم گردہ نمبر 1 مائی پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات اس کے رُکنے سے پیشاب رُک جاتا ہے یا اس کی بالکل بندش ہو جاتی ہے یا یہ مثانہ میں چلی جاتی ہے اور ورم مثانہ پیدا کر دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی پتھریاں ٹوٹ کر نکل جاتی ہیں۔ بعض اوقات بالکل ذرات خارج ہوتے ہیں جن کو ریگ گردہ کہتے ہیں۔

علامات:

مقام گردہ پر شدید درد ہوتا ہے۔ اس کی ٹیس مردوں میں خصیوں اور عورتوں میں اندام نہانی تک جاتی ہے۔ اس کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے۔ جسمانی رنگت زرد ہوتی ہے۔ بعض اوقات غشی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بعض اوقات کبھی کبھی پیشاب میں خون بھی بہہ جاتا ہے جو پتھری کیلشیم اوگزیلیٹ سے پیدا ہو اس میں خون زیادہ بہہ جاتا ہے۔ تشخیص میں ایکسرے سے ضرور مدد لینی چاہئے۔

Oureshi