گلے پڑنا

(TONSILLITIS)

یہ ایک عام کنڈیشن ہے جس میں گلا اور ٹانسلز سُوجھ جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ مریض کو سردی کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے اور مریض کوئی چیز آسانی سے نگل نہیں سکتا اور گلے میں درد محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کا انفیکشن کئی طرح کے وائرس کی وجہ سے یا مائیکو پلازما نمونیا کی وجہ سے یا کلے میڈیا کی وجہ سے یا گروپ جی اور سی سٹریپٹو کوکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بچوں میں گلے اور ٹانسلز کا انفیکشن تقریباً تیس فیصد مریضوں میں گروپ "اے" بیٹا ہیمولیٹک سٹریپٹو کوکس کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ تقریباً تیس فیصد مریضوں میں گلے اور ٹانسلز کی سوزش کی وجہ کا پتہ نہیں چلتا۔ انفیکشن کے علاوہ ٹانسلز کی سوزش عام طور پر ٹھنڈی اور تُرش اشیاء کے زیادہ استعمال سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مختلف الرجنز اور دھول و دھواں کے ذرات بھی ٹانسلز کی سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر ٹانسلز میں پیپ پڑ جائے تو مریض کا بخار 103 ڈگری فارن ہیٹ سے زیادہ تک ہو جاتا ہے جسے پھر ادویات کے ساتھ ساتھ کولڈ اسپنجنگ یعنی ٹھنڈی پٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: بیلاڈونا 3X + برائٹا کارب 3X + فیرم فاس 3X ملا کر تین مرتبہ دیں۔

گلے پڑ جانے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Erythrocin 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Brufen 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymoral Forte	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

گردوں میں درد و پتھری

(RENAL COLIC / CALCULI)

گردوں کے دوسرے امراض کے علاوہ گردوں میں پتھری ہونا بھی گردوں کا ایک عام پایا جانے والا مرض ہے۔ گردوں میں پتھری پیدا ہونے کی عام وجوہات میں کیلشیم کا زیادہ استعمال، طویل وقت تک پیشاب روکے رکھنے کی عادت، گردوں کا پیشاب میں نمکیات درست طور پر خارج نہ کرنا اور ریت و مٹی کے ذرات سے آلودہ پانی وغیرہ پینا ہے۔ اسی طرح پانی کا کم پینا بھی پتھری بننے کا باعث بن سکتا ہے۔ کئی مریضوں کے گردے میں چھوٹی پتھری موجود ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کو کوئی علامات نہیں ہوتیں۔ کچھ مریضوں میں پتھری کی موجودگی کی وجہ سے بار بار پیشاب میں خون ملا ہوا آتا ہے۔ اگر پتھری گردے میں سے نکل کر یوریٹر میں چلی جائے تو مریض پر ایک دم شدید درد کا اٹیک ہوتا ہے جس کو رینل کالک کہتے ہیں۔ گردوں میں پتھری کی موجودگی کی وجہ سے مریض کو بار بار پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پتھری یوریٹر میں پھنس کر زیادہ رکاوٹ ڈال دے تو گردے سے پیشاب مثانے تک نہیں پہنچ سکتا اور متاثرہ گردہ پیشاب کی رکاوٹ کے باعث پھول سکتا ہے۔ اگر پتھری کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ گردے کو بے کار کر سکتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: بربیرس Q+اوسی مم کین Q+سارسپریلا Q ملا کر تین مرتبہ دیں۔

گردوں میں درد و پتھری کا انگریزی علاج		
➢	Cap Cefspan 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Caflam 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cran Max Sachets	1+1 پانی میں ملا کر پئیں

★★★★★★★★

گوہانجنی

(STYE)

یہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب مریض آنکھوں کی صفائی کا صحیح خیال نہ رکھ رہا ہو۔ مریض کے پپوٹوں کے کناروں پر پلکوں کی جڑوں میں عموماً سٹے فلوکوکس بیکٹیریا کے انفیکشن کے نتیجے میں ایک پھنسی سی بن جاتی ہے جو کہ سرخ رنگ کی اور پُر درد ہوتی ہے۔ اس کو ہاتھ سے دبانے پر درد اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ انفیکشن گندے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلنے سے اور گندے تولیے کو استعمال کرنے سے ہوتی ہے اور ایک ہی تولیہ استعمال کرنے سے گھر کے دوسرے افراد تک یہ انفیکشن پہنچ جاتی ہے۔ چند دنوں کے اندر یہ پھنسی پھٹ جاتی ہے اور رطوبت باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سرجری کے ذریعے چیرا دے کر رطوبت کو ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پھنسی سے رطوبت خارج نہ ہو تو یہی رطوبت اندر ہی اندر سخت سی سسٹ بن جاتی ہے جس کے لئے پھر بعد میں لازماً آپریشن کرانا ہی پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کو گوہانجنی کی تکلیف ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر فوری توجہ دیتے ہوئے درج ذیل نسخہ استعمال کرے۔

ہومیوپیتھک علاج: پلسٹلا 3X + سٹافی سیگریا 3X ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

گوہانجی کا انگریزی علاج		
➢	Cap Lincocin 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Ponstan Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Prednicol Eye Drops	2+2+2 قطرے صرف متاثرہ آنکھ میں ڈالیں

★★★★★★★★

لیکوریا

(LEUCORRHOEA)

اس بیماری میں عورتوں کی اندام نہانی سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوا کرتی ہے۔ کبھی گاڑھی، کبھی پتلی، کبھی سفید دودھیا رنگ کی۔ بعض اوقات یہ بدبودار ہوتی ہے اور کبھی بغیر بُو کے ہوتی ہے۔ عام طور پر اس بیماری کی وجہ پیلوس کی اندرونی انفیکشن، کثرت مجامعت، اندام نہانی میں کسی خراش دار شے کا داخل کرنا، یوٹرس کی سوزش، سرویکس کی سوزش وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر یہ مرض زیادہ اور پرانا ہو جائے تو مریضہ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ مریضہ کمزور اور گال اندر کو دھنس جاتے ہیں۔ چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ لیکوریا کے باعث بانجھ پن بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح لیکوریا کے باعث عورت کو تمام جسم میں دردیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لیکوریا کی زیادتی کے باعث عورت کو انتہائی سخت اور تکلیف دہ کمر درد لاحق ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات عورتوں میں لیکوریا کا مرض زیادہ وزن دار چیزیں اٹھانے اور پیروں کے بل دیر تک بیٹھنے کے باعث ہوتا ہے۔ عورتوں کی مخصوص بیماریوں سے متعلق جاننے اور خود علاج کرنے کے لئے ہمارے ادارے کی دوسری کتاب عورتوں کے امراض کا مطالعہ کریں۔

ہومیوپیتھک علاج: اشوکاQ+ہیلونائزQ+ایلٹرس فیری نوساQ ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

لیکوریا کا انگریزی علاج		
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Novidat 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Clotrima Vaginal Cream	صبح، شام ویجائنہ میں لگائیں

★★★★★★★★