بد ہضمی

(DYSPEPSIA)

خوراک کا درست طور پر مقررہ وقت میں ہضم نہ ہونا دراصل بد ہضمی کہلاتا ہے۔ کئی مرتبہ ثقیل اور مرغن غذاؤں کے استعمال سے بھی بد ہضمی ہو جایا کرتی ہے۔ بد ہضمی پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن کئی مریضوں کو پیٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ سارے ٹیسٹ کروانے کے باوجود خوراک کی نالی، معدہ، ڈیوڈینم، پتے یا پینکریاز میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی لیکن مریض پھر بھی پیٹ میں گیس اور کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ ایسا عموماً بار بار سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس سے کہ پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے۔ ورزش اور چہل قدمی نہ ہونے کی وجہ سے، مرغن غذاؤں کے بکثرت استعمال سے، انتڑیوں کی حرکات سست ہونا، معدہ، آنتوں، پینکریاز، جگر کی رطوبات انزائمز اور بائل کا صحیح طور پر خارج نہ ہونا بد ہضمی کی عام وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نفسیاتی عوارض مثلاً ٹینشن، ڈپریشن یا تشویش جیسے مرض میں مبتلا ہو تو بھی نظام انہظام کا فنکشن بگڑ سکتا ہے اور اس طرح مریض کے لئے بد ہضمی کی صورت سامنے آسکتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+پلسٹلا30+کاربو ویج30+ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

بد ہضمی کا انگریزی علاج		
➢	Cap Eplazyme	1+1+1 نہار منہ
➢	Syp Colic	1+1+1 بڑا چمچ کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ

★★★★★★★★

بلڈ پریشر کم ہونا

(HYPOTENSION)

اکثر کمزور حضرات میں بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک حد تک بلڈ پریشر کم ہو تو مریض کو دل ڈوبنے، کمزوری، سستی اور غنودگی کی شکایت ہو گی لیکن بلڈ پریشر کافی حد تک گر جائے تو مریض شاک کی حالت میں چلا جاتا ہے جو کہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ عام طور پر نمکیات کا کم استعمال، بھوکا رہنے، پسینہ کی زیادتی، کام کی زیادتی اور آرام کی کمی، مختلف ہارمونز کی کمی، جسم میں وٹامنز اور منرلز کی کمی، پرانی بیماریوں کی موجودگی، فلوئیڈز کا کم استعمال اور نفسیاتی و اعصابی بیماریاں وغیرہ بلڈ پریشر کی کمی کا باعث بنتی ہیں اور مریض ہر وقت کمزوری و سستی محسوس کرتا ہے۔ آج کل کم عمر لڑکیوں اور خصوصاً نوجوان عورتوں میں بلڈ پریشر کی کمی کا عارضہ کافی پایا جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں اور عورتوں میں اسمارٹ نظر آنے کیلئے کھانا انتہائی کم مقدار میں کھانے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ذیابیطس میں مبتلا مریض اگر حد سے زیادہ پرہیز کریں اور لیکوئڈ بالکل نہ لیں تو بھی بلڈ پریشر اور شوگر دونوں گر جاتی ہیں جو ایک انتہائی خطرناک، ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: چائنا30+اگنیشیا30+الفلفا30+کالی فاس30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

بلڈ پریشر کے کم ہونے کا انگریزی علاج		
➢	Calcee Sachets	جب بلڈ پریشر گرے تو فوراً پانی میں ملا کر پئیں
➢	Tab CaC Plus 1000	ایک گولی روزانہ پانی میں حل کر کے پئیں
➢	Tab Theragran Ultra	ایک گولی روزانہ کھائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

بلڈ پریشر زیادہ ہونا

(HYPERTENSION)

ہائی بلڈ پریشر بڑی عام بیماری ہے۔ کئی لوگوں میں خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں صرف اوپر والا سسٹولک بلڈ پریشر بڑھا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں دونوں یعنی اوپر اور نچلے والے پریشر بڑھے ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک کرانک مرض ہے۔ جو شروع میں کوئی تکلیف نہیں دیتا لیکن بعد میں جسم کے مختلف اعضاء کی بلڈ ویسلز تنگ ہو کر فالج، ہارٹ اٹیک، گردوں کے فیل ہونے، ٹانگوں میں خون کی سپلائی کم کرنے اور بینائی ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی عام وجوہات میں نمک، مرچ مصالحہ جات، چکنائی، گھی، تیل کا زیادہ استعمال، اعصابی، نفسیاتی دباؤ، رینل وابنڈو کرائن بیماریاں، نظام دوران خون اور دل کی بیماریاں اور مختلف ڈرگز کا استعمال شامل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروعات میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کوئی خاص علامات سامنے نہیں آتیں بلکہ یہ مرض روٹین میڈیکل چیک اَپ کے دوران پکڑا جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کچھ علامات سامنے آسکتی ہیں جن میں سر درد ہونا، چکر آنا، دل متلانا، پیشاب کا زیادہ آنا، جسم میں بے چینی سی ہونا، چہرے اور آنکھوں کا سرخ ہو جانا، نظر کا دھندلانا اور غصے کا زیادہ آنا وغیرہ شامل ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: گلونائن 30+کریٹیگس 30+پیسی فلورا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Sofvasc 5mg	ایک گولی روزانہ
➢	Tab Lexotanil 3mg	آدھی گولی روزانہ رات

☆☆☆☆☆☆☆☆

بواسیر

(HAEMORRHOIDS)

ریکٹم کی اندرونی سطح کی وریدوں کا اجتماع خون کی وجہ سے پھُول جانا بواسیر کہلاتا ہے۔ان پھُولی ہوئی وریدوں کو عام زبان میں بواسیری مسے کہا جاتا ہے۔پرانا قبض، زیادہ مرچ مصالحوں کا استعمال، زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرنا، ورزش اور چلنے پھرنے کی کمی اور زیادہ گرم اشیاء کا استعمال بواسیر کے مرض کا عام سبب ہیں۔اس مرض میں مسوں کے بن جانے کی وجہ سے مقعد کے اندر خارش، جلن اور درد ہوتا رہتا ہے۔رفع حاجت کے وقت یہ مسے مقعد سے باہر نکل آتے ہیں۔اگر یہ مسے خون سے بھرے ہوئے ہوں تو پھر مریض کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ بواسیر بلیڈنگ والی یعنی خونی بواسیر اور نان بلیڈنگ یعنی بادی بھی ہو سکتی ہے۔بواسیر کا مریض شروعات میں مقعد میں محض بے چینی یا ہلکی سی خارش محسوس کرتا ہے اگر مریض اس مرحلے پر ہی اپنا علاج کروالے تو نوبت اگلے تکلیف دہ مرحلے تک نہیں پہنچ پاتی لیکن اکثر مریض مقعد کی اس بے چینی اور ہلکی خارش کو کوئی توجہ نہیں دیتے جس کے باعث یہ مرض بڑھ کر ایک تکلیف دہ صورت اختیار کر جاتا ہے جس میں پھر مریض کو مقعد میں انتہائی درد، جلن، بے چینی اور یہاں تک کہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+ایلوز30 ملا کر تین مرتبہ دیں اور میگنم ہیمورائیڈ کریم لگائیں

بواسیر کا انگریزی علاج		
➢	Tab Daflon 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Hadensa Forte Oint:	مقعد میں تکلیف کی صورت میں لگائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆