پرسوتی بخار

(PUERPERAL FEVER)

بچے کی ڈیلیوری یا ابارشن کے بعد کچھ عورتوں کو بخار چڑھ سکتا ہے جو کہ اندرونی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بخار ڈیلیوری کے پہلے دن کے بعد اگلے دس روز کے اندر متواتر 100 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بخار یوٹرس کے اندر سٹریپٹو کوکس، بیکٹیرائیڈز فریجی لس، ای کولائی اور اینٹیرو کوکس جراثیموں کے انفیکشن کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹے فی لوکوکس اور کلاس ٹریڈیم جراثیموں کی وجہ سے بھی یوٹرائن انفیکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح پرسوتی بخار کی ایک بڑی وجہ ڈیلیوری کے بعد پلے سینٹا کے کسی حصے کا اندر یوٹرس میں ہی رہ جانا ہے۔ بہر حال پرسوتی بخار کی وجہ کچھ بھی ہو یہ ایک تکلیف دہ بیماری ہے جس میں زچہ کو سخت ٹھنڈ لگ کر بخار آتا ہے، تمام جسم میں دردیں ہوتی ہیں اور دُکھن کا احساس ہوتا ہے۔ مریضہ انتہائی کمزور اور بیمار دکھائی دیتی ہے۔ اگر درج ذیل نسخہ سے بخار کو آرام نہ آئے تو کسی مستند لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں۔

ہومیوپیتھک علاج: آرنیکا200+ایکی نیشیا200+پائیروجینم200+بیلاڈونا200+ہیپر سلف200 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

پرسوتی بخار کا انگریزی علاج		
➢	Cap Cefspan 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Calpol	2+2+2 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

پیچش

(DYSENTERY)

کرانک ڈائریا ہی کو پیچش بھی کہا جاتا ہے۔ پیچش کا مرض عموماً گندی خوراک، گندے پانی اور مکھیوں کے ذریعے پھیلا کرتا ہے۔ پیچش کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک بیسلری ڈائسنٹری جو کہ ایک خاص جراثیم شائی گیلا سے ہوتی ہے جبکہ دوسری امیبک ڈائسنٹری جو کہ ایک خاص جراثیم اینٹامیبا ہسٹولائیٹیکا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مرض میں مریض کو بار بار پاخانے آتے ہیں۔ پاخانوں کے ساتھ ساتھ میوکس یعنی بلغم اور بلڈ بھی آتا ہے۔ زیادہ پاخانے آنے سے جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ زیادہ خون خارج ہونے سے جسم میں خون کی کمی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کو پیٹ میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر موشن زیادہ آجائیں تو مریض کے جسم میں نمکیات کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو مریض بے ہوش ہو کر صدمے کی کیفیت میں بھی جا سکتا ہے لیکن ایسا عموماً کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر ذیل کا نسخہ کارگر نہ ہو تو مریض کو فوراً ہسپتال لے جا کر ڈرپ لگوانی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: کرچی Q+کالوسنتھ 3X+چائنا 3X+مرک کار 3X ملا کر دیں۔

پیچش کا انگریزی علاج		
➢	Tab Ciprox 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Metodine DF	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Relispa Forte	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

پستانوں میں دودھ کی کمی

(SUPPRESSED MILK)

کئی مرتبہ زچہ کے پستانوں میں دودھ کی کمی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ایسا عموماً ایسی ماؤں میں ہوا کرتا ہے جو پہلی مرتبہ بچے کو جنم دیں یا پھر اس کی کئی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔مثال کے طور پر زچہ کی خوراک میں کمی، دودھ کا کم استعمال، ٹانک، وٹامنز اور منرلز کی جسم میں کمی، پچوٹری ہارمونز کی کمی اور نفسیاتی و اعصابی امراض کا پایا جانا وغیرہ۔اگر ماں کے پستانوں میں دودھ کی کمی ہو تو بچے کو بہت تکلیف ہوتی ہے بچہ صحیح طور پر سیر ہو کر ماں کا دودھ نہیں پی سکتا اور کمزور رہ جاتا ہے۔اسی طرح اگر ماں کے پستانوں میں دودھ کی کمی رہے تو بچے کی نشوونما متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت مدافعت بھی کمزور ہو کر امراض کے خلاف موثر طور پر نہیں لڑ سکتی۔بہتر یہ ہے کہ اگر ماں کا دودھ کم ہے تو ادویات کے استعمال سے پہلے بریسٹ پمپ کا استعمال کر لیا جائے کیونکہ کئی مرتبہ بریسٹ پمپ کے استعمال سے ہی ماں کو دودھ درست طریقے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔اسی طرح زچہ کی خوراک میں بھی پھل فروٹ کے ساتھ ساتھ دودھ کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: رسی نس Q+ارٹیکا یورنس Q ہم وزن ملا کر استعمال کریں۔

پستانوں میں دودھ کی کمی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Hi-Lacta	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Sangobion	ایک روزانہ
➢	Tab CaC 1000	ایک گولی روزانہ پانی میں حل کر کے پئیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

تپ محرقہ۔ٹائی فائیڈ

(TYPHOID FEVER)

یہ ایک قسم کا متعددی میعادی بخار ہے۔اس مرض میں ایک خاص جراثیم سالمونیلا ٹائی فی یا سالمونیلا پیراٹائی فی آنتوں پر حملہ کر کے سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔یہ جراثیم متاثرہ خوراک، پانی یا مکھیوں کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔یہ بخار مسلسل تین چار ہفتے رہتا ہے۔پہلے ہفتہ کے دوران بخار روز بروز ایک ایک درجہ کر کے بڑھتا جاتا ہے حتی کہ 103 یا 104 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔دوسرے ہفتہ میں علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں۔مریض کی زبان سفید اور دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔تیسرے اور چوتھے ہفتہ میں علامات کم ہو جاتی ہیں۔ٹائی فائیڈ بخار کے دوران مریض شدید متاثر ہوتا ہے۔اسے انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔مریض اٹھ، چل پھر کر بالکل کام نہیں کر سکتا۔مریض چاہتا ہے کہ مکمل آرام کرتا رہے۔مریض کی بھوک بالکل اُڑ جاتی ہے اگر کچھ کھا پی لے تو قے ہو جاتی ہے۔مریض کو پیٹ میں ہر وقت میٹھا میٹھا سا درد ہوتا رہتا ہے۔مریض کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور مریض ثقیل و سخت اشیاء بالکل ہضم نہیں کر سکتا۔

ہومیوپیتھک علاج: بیپ ٹیشیا 30X+رسٹاکس 3X+برائی اونیا 3X ملا کر دیں۔

ٹائی فائیڈ کا انگریزی علاج		
➢	Tab Cefiget 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد
➢	Syp Lysovit	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★