جوڑوں کا درد

(ARTHRITIS)

جسم کے مختلف جوڑ کئی بیماریوں کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان میں انفلے میشن، سوجن اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی کنڈیشن ایک دم شروع ہوتی ہیں اور کئی کنڈیشن آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور کرانک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جوڑوں کے درد کی عمومی وجوہات ڈی جنریٹو ڈیزیز، آسٹیو آرتھرائی ٹس، ریوماٹائیڈ آرتھرائی ٹس، ریویٹک فیور، ریٹرز آرتھرائی ٹس، گاؤٹی آرتھرائی ٹس، آسٹیو پروسس، آسٹیو میلے شیاء، پولی مائیل جیاریومیٹیکا اور کئی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ اس بیماری میں مریض کو متاثرہ جوڑ یا جوڑوں میں سخت درد محسوس ہوتا ہے اور مریض حرکت نہیں کر سکتا۔ کئی مریضوں میں چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے تک میں انتہائی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جوڑوں کا مرض ایک انتہائی ہٹیلا اور تکلیف دہ مرض ہے جس کے علاج کے دوران مریض کو انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ مرض موروثی طور پر بھی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اور باقاعدہ علاج کے باوجود بھی کم رسپانس دیتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: روٹا30+رسٹاکس30 ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

جوڑوں کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Cap Esso 40mg	ایک روزانہ صبح نہار منہ
➢	Tab Arnil 75mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Kak-D	ایک روزانہ کھانے کے بعد

★★★★★★★★

جریان خون

(HAEMORRHAGE)

خون کے بہہ جانے کو جریان کہتے ہیں۔ عام طور پر خون کی کسی رگ کے کٹ جانے یا پھٹ جانے سے جریان خون ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جریان خون جسم میں کلاٹنگ فیکٹرز کی کمی یا خرابی کے باعث بھی ہوا کرتا ہے یا پھر خون میں تھرامبوسائٹس کی کمی کی وجہ سے بھی جریان خون ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات اور پیچیدگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ خون کتنا اور کس قدر رفتار سے ضائع ہوا۔ اگر زیادہ خون ضائع ہوا ہے تو مریض کا دل ڈوبتا ہے۔ نبض تیز اور باریک چلتی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چکر آتے ہیں۔ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور مریض شاک میں جا سکتا ہے۔ اگر اس موقع پر مریض کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو شاک کے باعث مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مریض میں جریان خون زیادہ ہو رہا ہو جو ادویات سے نہ رک سکے تو ایسے مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے جانا چاہیے تاکہ سرجیکل پروسیجر کر کے مریض کا جریان خون روک کر اس کی جان بچائی جا سکے۔ درج ذیل ادویات معمولی جریان خون مثلاً نکسیر آنا، خونِ حیض کا معمولی زیادہ آنا، کسی تیز دھار چیز سے جِلد کا معمولی کٹ جانے کے نتیجے میں جریان کیلئے استعمال ہوتی ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: اپی کاک 30+ملی فولیم 30+فیرم فاس 30+ہیما میلس 30 ملا کر دیں۔

جریان خون کا انگریزی علاج		
➢	Cap Brino 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cap Amoxil 250mg	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

چوٹ لگنا

(TRAUMA)

چوٹ لگنا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ زندگی میں تقریباً ہر شخص نے کسی نہ کسی طرح کی چوٹ کھائی ہوتی ہے۔ چوٹ کی مختلف اقسام ہیں۔ فزیکل ٹراما، تھرمل ٹراما، الیکٹریکل ٹراما، برنز ٹراما، ایکسیڈنٹل ٹراما وغیرہ۔ بہر حال کسی بھی ایکسیڈنٹ یا حادثے کے نتیجے میں کسی بھی شخص کو فزیکل ٹراما ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو حالات اور کنڈیشن کے مطابق ٹراما کا علاج کر دیا جاتا ہے لیکن اکثر مریضوں کو ٹراما کے نتیجے میں زندگی کے بعد کے حصے میں تکلیفات ہوتی ہیں یعنی پرانی چوٹوں کا درد کرنا اور دکھنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ٹراما کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دردوں کو وقتی علاج سے فوری آرام تو آجایا کرتا ہے لیکن اکثر مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوٹ لگنے والی جگہ پر اکثر کچھ نہ کچھ عرصے بعد دردوں کا حملہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مریض کو چاہیے کہ چوٹ لگنے والے عضو سے اب بھاری کام نہ لیا کرے اور اسی طرح چوٹ لگنے والے عضو کو جتنا ممکن ہو سکے ٹھنڈک سے بچانا چاہیے۔ ذیل میں چوٹ لگنے کے نتیجے میں ہونیوالی دردوں کا علاج دیا گیا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرنیکا30+سمفائٹم30+ہائپریکم30+روٹا30 ملا کر استعمال کریں۔

چوٹ لگنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Dolor D.S	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymoral Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Pyodine Solution	جِلد پر کوئی کٹ یا زخم ہو تو اس سے صاف کریں

☆☆☆☆☆☆☆☆

چکر آنا

(GIDDINESS)

سر چکرانا عام علامات میں سے ایک ہے۔ بہت سارے مریض ڈاکٹر کے پاس آکر چکر آنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں مریض ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے آس پاس کی چیزیں گھوم رہی ہیں اور وہ بھی لڑکھڑا کر گر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کئی مریض متلی اور قے آنے کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ ایسا عموماً ویسٹی بیولر نیورائی ٹس، لے برنتھائی ٹس، ملی نائن پوزیشنل ورٹیگو، مے نیئر زڈیزیز، موشن سیک نس، برین سٹیم ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیکس، ملٹی پل سکلروسس اور پچوٹری پوسٹرئیر فوساٹیومرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اکثر مریضوں میں کمزوری، خون کی کمی اور بلڈ پریشر کی کمی یا انتہائی زیادتی کے باعث بھی چکر آ سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ نفسیاتی عوارض خصوصاً خوف کی کنڈیشن میں بھی چکر آتے ہیں۔ بچوں اور بوڑھوں میں چکر آنے کی ایک بڑی وجہ دماغ کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات یہ چکر اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ مریض بغیر سہارے کے بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انتہائی تیز چکروں میں متلی کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: کونیم 30+چائنا 30+کاکولس 30+اپی کاک 30 ملا کر دیں۔

چکر آنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Stemetil	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Serc 16mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Neurobion	1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★