چھپاکی
(URTICARIA)

یہ ایک الرجک مرض ہے۔اس کے دھبے جسم پر اس طرح ہوتے ہیں گویا کسی جانور نے ڈنگ مارا ہو۔جِلد اور بعض اوقات میوکس ممبرین پر سرخ سرخ دھبے بن جاتے ہیں جن کو اصطلاحاً ویلز کہتے ہیں۔یہ مرض کئی قسم کی غذاؤں اور کئی قسم کی دواؤں کے خلاف رد عمل کے طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔مرض کے حملے سے پہلے خارش شروع ہو جاتی ہے۔بعد میں جلد پر مختلف قسم کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں جو کہ جلد کی عام سطح کی نسبت قدرے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔مذکورہ دھبے کئی مرتبہ خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔کئی مریضوں میں چھپاکی کے یہ دھبے گرم غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔تیز گرم مصالحہ، تیز مرچ مصالحہ، مچھلی، انڈا، گوشت اور اکثر اوقات چاول کھانے سے بھی جسمانی رد عمل کے طور پر جِلد پر چھپاکی کے دھبے اُبھر آتے ہیں۔اسی طرح ادویات میں عموماً سلفاڈرگز اور اسپرین وغیرہ ری ایکشن کر کے چھپاکی کے دھبے اُبھار سکتی ہیں۔اگر درج ذیل ادویات خاطر خواہ رزلٹ نہ دیں تو مریض کو ہسپتال لے جا کر انجکشن لگوانا چاہیے

ہومیوپیتھک علاج: ارٹیکا یورنس Q+ایپس میلی فیکا Q+بووسٹا Q+اوزالک ایسڈ Q ملا کر دیں۔

چھپاکی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Avil 25mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Clobevate Ointment	چھپاکی کے دھبوں پر صبح شام لگائیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

حیض کا درد سے آنا

(DYSMENORRHOEA)

لڑکیوں کا بالغ ہونے پر ماہواری آنا بلوغت کی ایک انتہائی اہم نشانی ہے۔ عام طور پر ایک صحت مند لڑکی یا عورت کو ایک ماہ میں صرف ایک مرتبہ معمولی درد کے ساتھ ماہواری آیا کرتی ہے جو کہ عموماً تین سے پانچ دن تک جاری رہتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں میں ماہواری کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں جن میں ایک اہم نقص ماہواری کا درد کے ساتھ آنا ہے۔ اس مرض میں عورت کو ماہواری درد کے ساتھ آتی ہے۔ ڈسمینوریا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پرائمری ڈسمینوریا جس میں عورت کو پیلوس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ یہ نوجوان لڑکیوں کو بالغ ہونے پر ماہواری کے شروع کے سالوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا سیکنڈری ڈسمینوریا جو کہ زیادہ عمر کی عورتوں میں ہوتا ہے اور جس میں کہ عورت کو پیلوس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی وجوہات اینڈومیٹریوسس، یوٹرس کے فائبرائیڈز، یوٹرس کے پالپس، اووری کے ٹیومرز، پیلوک انفلے میٹری ڈیزیز، سرویکس کے منہ کا تنگ ہونا، یوٹرس کے اندر مانع حمل آئی۔یو۔ڈی کا استعمال وغیرہ ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوفائلم 30+ پلسٹلا 30+ میگ فاس 30 ملا کر استعمال کریں۔

حیض کے درد سے آنے کا انگریزی علاج		
➢	Tab Brufen 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Relispa 40mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Aletris Cordial	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆

حیض کی کثرت

(MENORRHAGIA)

عام عورتوں میں ماہواری کا سائیکل اٹھائیس دن کا ہوتا ہے لیکن کئی عورتوں میں یہ چھوٹا یا بڑا ہو کر چوبیس سے 38 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات کسی بھی عورت میں ماہواری کے دوران یا بعض اوقات ایک ماہواری سے دوسری ماہواری کے درمیان غیر نارمل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ بلیڈنگ کئی وجوہات کی بناء پر ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر عورتوں کے جسم میں ہارمونز کے لیولز میں خرابیاں پڑ جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہر حال ایسی بلیڈنگ میں پیلوس کی اندرونی بیماریوں مثلاً پیلوس کے اعضاء کی سوزش یا کینسر کی موجودگی کے شک کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ عام طور پر عورتوں یا لڑکیوں میں حیض کی یہ کثرت چند ماہ کے لئے ہوتی ہے جو بغیر کسی علاج کے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر معمولی علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر حیض کی یہ زیادتی مسلسل رہے اور مریضہ کے لئے تکلیف دہ بن جائے تو پھر کسی مستند لیڈی ڈاکٹر سے اس کی تشخیص اور علاج کرانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: ٹریلیئم Q+سبائنا Q ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

حیض کی کثرت کا انگریزی علاج		
➢	Cap Transamin 500mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Cap FefolVit	ایک روزانہ
➢	Syp Faulad	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

حیض کی بندش

(AMENORRHOEA)

لڑکی کی بلوغت کی ایک اہم نشانی ماہواری کا آنا ہے۔ اکثر لڑکیوں میں شروع شروع میں ماہواری آنے کا سلسلہ قدرے گڑبڑ رہتا ہے۔ عورتوں میں ماہواری کی کئی اقسام کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن میں سے ماہواری کی ایک اہم بیماری اے مینوریا یعنی حیض کا نہ آنا ہے۔ اگر ایک لڑکی کو جوان ہونے پر سترہ سال کی عمر تک ماہواری آنا شروع نہ ہو تو اس کو پرائمری اے مینوریا کہتے ہیں۔ لیکن اگر مریضہ کو پہلے ماہواری آئی ہو لیکن پھر بند ہو کر چھ ماہ تک نہ آئے تو اس کو سیکنڈری اے مینوریا کہتے ہیں۔ ماہواری نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ پیدائشی نقائص ہو سکتے ہیں ۔ کچھ اووریز میں خرابیوں کی وجہ سے نارمل مقدار میں ایسٹروجنز اور پروجسٹرون نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور کئی بار ایسا پچوٹری گلینڈز میں نقص ہونے کی وجہ سے نارمل مقدار میں گونیڈوٹرافک ہارمون کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اے مینوریا کے علاج سے پہلے اس بات کا مکمل یقین کر لیں کہ عورت کو حمل تو نہیں؟

ہومیوپیتھک علاج: پلسٹلاQ+ گوسی پیئمQ+ایپیQ+کینتھرسQ ملا کر تین مرتبہ دیں۔

حیض کی بندش کا انگریزی علاج		
➢	Tab Premarin 0.625mg	ماہواری ختم ہونے کے بعد سے پچیس دن تک ایک گولی روزانہ استعمال کریں
➢	Syp Aletris Cordial	1+1+1 کھانے کے بعد

☆☆☆☆☆☆☆☆