مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

حمل اور مختلف جسمانی امراض

ذیابیطس

اگر دوران خون میں شکر کی مقدار 180 ملی گرام فی 100 ملی لٹر سے بڑھ جائے تو گردے پیشاب میں شکر (Glucose) کا اخراج شروع کر دیتے ہیں اس عارضہ کو ذیابیطس شکری (Diabetes Mellitus) کہتے ہیں۔

بالعموم یہ مرض لبلبہ (Pancreas) میں انسولین (Insulin) پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہونے کی صورت میں لاحق ہوتا ہے۔

بعض عورتوں کو دوران حمل پیشاب میں شکر آنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ خون میں شکر کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ ایسی خواتین کو زچگی یا وضع حمل کے بعد پیشاب میں شکر آنا خودبخود بند ہو جاتی ہے۔

حاملہ عورتوں کی بلڈ شوگر (Blood Sugar) ضرور ٹیسٹ کروائی جائے تاکہ مکمل تشخیص ہو سکے کیونکہ ذیابیطس میں مبتلا خواتین کو دوران حمل خاص احتیاط اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ اس نامراد مرض سے زچہ و بچہ دونوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً

* اندرون رحم حمل کے پانی (Amniotic Fluid) کا نارمل سے زیادہ ہونا
* بچہ میں پیدائشی نقائص
* قبل از وقت پیدائش
* رحم میں بچہ کی موت واقع ہو جانا
* بچہ کا سر بڑا ہو جانا اور حجم میں نارمل سے زیادہ ہونا
* بچہ کی سانس کی نالی میں ایک جھلی (Hyoline Membrane) بن جانا
* زچہ کا (Pre-eclampsia) یا (Eclampsia) میں مبتلا ہو جانا
* حاملہ کے اعضائے حمل گردے، پیشاب کی نالی یا سینہ میں انفیکشن ہو جانا
* دل کا عارضہ یا بلڈ پریشر میں زیادتی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

* آنکھوں کی بینائی کا متاثر ہونا یا اعصابی طور پر کمزور ہو جانا
* ذیابیطس کی مریضہ حاملہ خواتین کے 10-20 فیصد تک مردہ بچے جنم لیتے ہیں یا پیدائش کے بعد چند دنوں میں مر جاتے ہیں۔
* دوران زچگی مرنے والی خواتین کی کثیر تعداد ذیابیطس کی مریضاؤں کی ہوتی ہے۔

علاج و احتیاط

* ذیابیطس کی مریضہ حاملہ عورتوں کو دوران حمل اور زچگی ڈاکٹر سے مسلسل رابطہ رکھنا چاہیے اور تھوڑے تھوڑے دنوں بعد مکمل چیک اَپ کرواتے رہنا چاہیے۔
* خوراک میں چینی، نشاستہ دار اشیاء وغیرہ سے پرہیز کر کے اس پر قابو پایا جائے اگر خوراک کے ذریعہ اس پر کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو خون اور پیشاب میں شوگر کی مقدار کے مطابق انسولین (ڈاکٹر کے مشورہ سے) لگائی جائے کیونکہ حمل سے قبل کنٹرول شدہ ذیابیطس کو دوران حمل نئے سرے سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ حمل کی وجہ سے جسم میں (Insulin) کی ضرورت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شوگر کم کرنے کی گولیاں بھی بامرمجبوری کھائی جا سکتی ہیں ۔ ایلوپیتھک علاج میں انسولین ہی آخری علاج ہے۔
* پیشاب کو بلا ناغہ چیک کر کے شوگر کی مقدار معلوم کی جائے۔
* بلڈ شوگر ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور چیک کروائی جائے۔
* دوران حمل، حاملہ کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔
* الٹراسونک سکین کے ذریعہ پیٹ میں بچہ کے پیدائشی نقائص معلوم کر کے قبل از وقت اس کی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں اور ذہنی طور پر انہیں قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔
* اگر 7 ماہ کے حمل کے بعد بچہ کے نظام تنفس یا دل کی دھڑکن میں کوئی خطرناک تبدیلی واقع ہو جائے تو فوری طور پر قبل از وقت مصنوعی طریقہ سے زچگی کر لی جائے ورنہ بچہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جبکہ دوران زچگی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

شوگر کا مکمل کنٹرول زچہ بچہ دونوں کے لئے ضروری ہے۔

* ولادت کے بعد بچہ کو ڈاکٹر کے زیرنگرانی رکھا جائے اور اس کے نظام تنفس کو بھی جلد از جلد بحال کر لیا جائے۔ اس کے بعد بچہ کی بلڈ شوگر چیک کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اسے پیدائشی طور پر ذیابیطس تو نہیں ہے۔
* ذیابیطس والی عورتوں کو آئندہ حمل سے بچنے کے لئے خاندانی منصوبہ بندی پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

ہائی بلڈ پریشر

بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر بھی دوران حمل پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس بات کا معلوم کرنا اشد ضروری ہے کہ آیا مریضہ حمل سے پہلی بھی ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا تھی یا موجودہ حمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے

* گردوں کا ٹیسٹ
* پیشاب میں البیومن کی مقدار
* خون میں یوریا اور یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ
* دل کی کیفیت
* آنکھوں کا معائنہ اشد ضروری ہے

ایسی مریضہ کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے

* خوراک میں نمک اور چکنائی بند کی جائے
* جنین کی کیفیت کا بھی وقفہ وقفہ سے جائزہ لیا جائے
* بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جانے کی صورت میں اسقاط حمل کی نوبت آ سکتی ہے۔

بہتر یہ ہے کہ خوراک اور مروج (ایلوپیتھک) ادویات سے اسے کنٹرول رکھا جائے یاد رہے کہ ہومیوپیتھی اس تمام مرض کو ہی سرے سے نہیں مانتی بلکہ وہ اس کی جہ' سبب معلوم کر کے اس کو دور کرنے والی ادویات دے کر مریض کو تندرست کرتی ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

امراض قلب

استقرار حمل کے بعد عورت کے قلب پر 30% بوجھ بڑھ جاتا ہے جن عورتوں کو دل کا عارضہ ہو تو ان کے دل پر حمل کے بعد بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔

* ایسی خواتین کی خوراک میں نمک اور چکنائی کی مقدار کم
* آرام و سکون زیادہ اور ورزش اور زور آور کام کم کرنے چاہیں
* گاہے گاہے دل کا معائنہ کرتے رہنا چاہیے
* حمل کے آخری ایام میں ایسی حاملہ کو شدید نگرانی کے یونٹ (Intensive Care Unit - ICU) میں رکھا جائے اور ولادت با سہولت کا انتظام کیا جائے تاکہ دل پر بوجھ نہ پڑے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو ولادت بذریعہ اپریشن کی جائے۔

ایسی عورتوں کا آئندہ حاملہ ہونے سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ دل کے عارضہ میں مبتلا عورت حمل اور زچگی کی تکالیف برداشت کرنے سے عاری ہوتی ہے۔ البتہ ہومیوپیتھک علاج کے ذریعہ جب دل کا معاملہ درست ہو جائے تو بصد شوق حاملہ ہوں اور دودھوں نہائیں اور پوتوں پھلیں۔

خون میں فولاد کی کمی

استقرار حمل کے بعد جسم میں آئرن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے جو عورتیں پہلے سے خون کی کمی کا شکار ہوں ان میں فولاد کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے خون میں ہیموگلوبن کی سطح 10-10 گرام فی 100 ملی لٹر تک گر جاتی ہے۔

عام طور پر سے یہ کمی خوراک میں فولادی اجزاء کی غیر موجودگی' فولک ایسڈ اور وٹامنز کی کمی یا خون میں سرخ جرثوموں کی کسی بیماری کے سبب ہوتی ہے۔

ایک حاملہ عورت کو اپنی اور پیٹ کے بچے کی ضرورت پوری کرنے کیلئے پھل' سبز پتوں والی ترکاریاں' گوشت' انڈا وغیرہ کی خاطر خواہ مقدار روزانہ استعمال کرنی چاہیے۔

اگر اس طرح خون کی کمی پوری نہ ہو تو ہیموگلوبن پیدا کرنے والی ادویات استعمال کی جائیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

رحم میں بچہ کی بے چینی

رحم میں بچہ کے دل کے فیل ہو جانے' پیٹ کے اندر بچہ کو چوٹ لگنے' آکسیجن یا خوراک کی سپلائی متاثر ہونے' ماں کے بلڈ پریشر یا شوگر میں اضافہ ہو جانے' متوقع تاریخ پیدائش پر زچگی نہ ہونے یا دیگر نفسیاتی و ذہنی عوارض کی وجہ سے بچہ رحم میں شدید بے چینی کا اظہار کرتا ہے اس کی بے چینی کا علم اس کی حرکات و سکنات میں اضافہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس تکلیف کا ازالہ فوری طور پر نہ کیا جائے تو بچہ کی زندگی کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔

* خطرے کا احساس ہوتے ہی مریضہ کو ہسپتال داخل کرا دیا جائے جہاں پر اسے مکمل آرام و سکون فراہم ہو سکے۔
* بچہ کے دل کی دھڑکنوں اور حرکات و سکنات کا بغور جائزہ (Monitor) لیا جائے اور اگر کسی بھی مرحلہ پر بچہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو مصنوعی طور پر ولادت کی جائے یا بذریعہ اپریشن بچہ کو پیٹ سے نکال لیا جائے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

رحم مادر میں بچہ کی موت واقع ہونا
(INTRA UTERINE DEATH)

اگر کسی بھی وجہ سے رحم مادر میں بچہ کی حرکات و سکنات رک جائیں اور بچہ کے دل کی دھڑکن سونی کیڈ سے بھی سنائی نہ دے تو بچہ کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں عورت کا بلڈ پریشر گر جاتا اور پستانوں کا سائز بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض مخصوص حالات میں عورت کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

* پیٹ کا سائز حمل کی مدت کے حساب سے کم ہو جاتا ہے۔
* بچہ دانی کا سائز کم ہو جاتا ہے۔
* الٹرا سونو گرافی میں بچہ حرکت کرتا دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی خون کا بہاؤ نظر آتا ہے۔
* ایکسرے میں بچہ کے سر کی ہڈیاں ایک دوسرے پر چڑھی نظر آتی ہیں۔
* بچہ کے دل کے اندر گیس کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔
* پیٹ میں بچہ کی وفات کے ایک ہفتہ بعد پیشاب کا حمل ٹیسٹ بھی Ve- ہو جاتا ہے۔

متوقع وقت سے قبل رحم مادر میں بچہ کی موت کی اہم وجوہات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔

* ماں کو ذیابیطس ہونا
* بلند فشار خون (High Blood Pressure)
* گردوں کا عارضہ
* پری ایکلمپسیا (Pre-eclampsia)
* ایکلمپسیا (Eclampsia)
* رحم کے اندرونی عوارضات و نقائص
* آنول (Placenta) کا چوٹ لگنے کی وجہ سے کام چھوڑ جانا
* زچگی سے قبل زیادہ خون بہہ جانا
* زچگی کا عمل بروقت شروع نہ ہو سکنا

اس کے علاوہ۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

* پیٹ کے اندر بچہ کو شدید ضرب لگنے
* حمل کا پانی (Amniotic Fluid) زیادہ مقدار میں خارج ہو جانا
* ماں کے خون میں شامل جراثیم سارے اعضاء کو متاثر کر دیں
* زہریلی یا مہلک ادویات کا استعمال
* نشہ آور ادویات کا اندھا دھند استعمال

اس کے علاوہ دوران زچگی کسی غفلت یا پیچیدگی کے سبب بھی بچہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔

علاج

عام طور پر رحم مادر میں مر جانے والا بچہ نارمل زچگی کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے جبکہ بعض عورتوں کے رحم میں مردہ بچہ کافی دنوں تک پڑا رہتا ہے جسکی وجہ سے ماں کی زندگی خطرہ میں گھر جاتی ہے لہذا مردہ بچہ کو جتنی جلدی ہو سکے عورت کے پیٹ سے خارج کر دیا جائے اس کے لئے مصنوعی طریقہ ولادت اختیار کیا جائے اور بلاوجہ گھبراہٹ کا شکار ہو کر یا ہوس زر میں مبتلا ہو کر اپریشن سے گریز کیا جائے لیکن ماں کی حالت خراب ہونے کی صورت میں خون میں زہر پھیلنے یا پھیل جانے سے بچنے کے لئے فی الفور اپریشن کر کے عورت کی جان بچانا فرض ہوتا ہے۔

عورت کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے اور Infection سے بچاؤ کے لئے ضروری ادویات دی جائیں۔ اس کے گردوں کے افعال اور دل کی حالت پر متواتر نگاہ رکھی جائے۔

بوقت ولادت بچہ کی پوزیشن

حمل کے آخری دنوں میں جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کی تیاریوں میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ پیڑو کی ہڈی کے درمیان آ کر فٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا رخ بچہ دانی کے منہ کی طرف ہوتا ہے۔ رحم کے اندر یہ بچہ کی آخری پوزیشن ہوتی ہے اور اس کا اندازہ لگا کر ہی زچگی کے طریقہ کار کا انتخاب کیا جاتا ہے بالعموم بچہ چار پوزیشنوں میں سے کسی ایک پوزیشن میں آ جاتا ہے اور اسی حالت میں ہی پیٹ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سے باہر آتا ہے۔

1۔ چہرہ کے بل (Face Presentation)

2۔ پیشانی کے بل (Brow Presentation)

3۔ کندھے کے بل (Shoulder Presentation)

4۔ کمر یا کولہے کے بل (Breach Prersentaiton)

پیدائش کے وقت بچہ کی سب سے بہتر پوزیشن چہرہ کے بل والی ہوتی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی دیگر پوزیشن ہو تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر دیں وہ زچہ کو کھلانے کی دوا دے گا جس سے بچہ کی پوزیشن بوقت ولادت درست ہو جائے گی اور زچہ اپریشن سے بچ جائے گی اور ولادت بھی آسانی سے ہو جائے گی بالعموم اس موقع پر کالوفائلم اور پلساٹیلا کام آتی ہیں۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ولادت

قبل از وقت PREMATURE LABOUR

37 ویں ہفتہ سے قبل اور 28 ہفتہ کے بعد واقع ہونے والی زچگی کو قبل از وقت ولادت کہتے ہیں یہ عموماً درج ذیل وجوہات کے سبب ہو سکتی ہے۔

* زیادہ بچوں کی پیدائش
* حادثہ' لڑائی یا زور آور کام کرنے
* خوف' صدمہ یا شدید غصہ کے باعث
* دھماکہ سے
* رحم سے Amniotic Fluid ضائع ہونے
* خون بہہ جانے
* کمزور یا بیمار خواتین کے ہاں بھی قبل از وقت پیدائش ہو جاتی ہے

احتیاط و علاج

اگر متوقع ایام پیدائش سے قبل ہی دردیں شروع ہو جائیں یا اس کا معمولی سا بھی خدشہ محسوس ہو تو حاملہ عورت کو فوری طور پر آرام دہ بستر پر لیٹ جانا چاہیے اور ہر قسم کے کام کاج' سفر اور سخت کام چھوڑ دینے چاہیں حتیٰ کہ رفع حاجت کے لئے بھی نہ اٹھے ہو سکے تو قریبی ہسپتال میں داخل کرا دیں۔

مریضہ کو نرم اور زود ہضم غذا دی جائے۔ قبض نہ ہونے دیں لیکن جلاب بھی نہ دیں غیر ضروری اندرونی معائنہ جو بالعموم ان پڑھ اور جاہل دائیوں کا کام ہوتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے اس طرح بھی زچگی کا عمل قبل از وقت شروع ہو جاتا ہے۔

بچہ کی حرکات و سکنات اور اس کے دل کی دھڑکنوں کا مسلسل جائزہ لیا جائے اگر ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود افاقہ نہ ہو تو زچگی کے عمل کو موخر یا ملتوی کرنے کے لئے ہومیوپیتھک دوا استعمال کی جائے۔

ایلوپیتھک علاج میں ماں کو Inj. Dexamethasone لگایا جائے تاکہ پیدا ہونے والے بچہ کے پھیپھڑوں کے اندرونی جانب پیدائشی جھلی کا عارضہ نہ بن جائے۔

قبل از وقت پیدا ہونے والے بچہ کو مصنوعی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی زندگی کو لاحق خطرات کو دور کیا جا سکے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ولادت

بعد از وقت POSTMATURE LABOUR

بچہ اگر متوقع تاریخ کے کافی دن بعد پیدا ہو تو اسے بعد از وقت ولادت کہتے ہیں۔ ان حالات میں ماں اور بچہ دونوں خطرے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بچہ کے رحم مادر میں مرنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔

بعض اوقات بچہ کا حجم بڑھ جاتا ہے اور اس کے باہر آنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ مشیمہ (Placenta) کے کام میں کمی واقع ہونے سے بچہ کو آکسیجن اور خوراک کی پوری مقدار نہیں مل پاتی لہذا اس صورت حال کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے۔

سب سے پہلے متوقع تاریخ پیدائش کا ازسرنو جائزہ لیا جائے بعض عورتیں اپنی آخری ماہواری کی تاریخ (LMP) کو بھول جاتی ہیں جس کی بناء پر ڈاکٹر کو اس کی درست متوقع تاریخ زچگی (EDD) بتانے میں غلطی لگ جاتی ہے ۔ لہذا صرف حاملہ کی بیان کردہ آخری ماہواری کی تاریخ (LMP) کو ہی معتبر نہ جانا جائے بلکہ بچہ کی پہلی حرکت محسوس کرنے کی تاریخ سے بھی متوقع تاریخ پیدائش کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے۔ الٹراسونوگرافی کے ذریعہ بچہ کی لمبائی' سر کی چوڑائی اور ہڈیوں کی کیفیت سے بھی حمل کی صحیح عمر کا اندازہ لگایا جائے۔

زچگی کا عمل متوقع تاریخ پیدائش سے ایک آدھ ہفتہ قبل یا بعد شروع ہو سکتا ہے لیکن اس میں مزید تاخیر ہوتی چلی جائے تو نئے سرے سے دنوں کا حساب لگانا ضروری ہو جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ مختلف نشانیوں کی مدد سے حمل کی عمر کا اندازہ لگا کر تشخیص مکمل کی جائے اگر ضروری جانیں تو مصنوعی طور پر زچگی کا عمل شروع کر دیا جائے۔ بعض عورتوں کے اپریشن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

غرض متوقع تاریخ پیدائش گزر جانے کی صورت میں فوری طور پر کسی ہسپتال کا رخ کیا جائے اور مستند قابلہ (Obstetrician) کی زیر نگرانی زچگی کے دور سے گزرا جائے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

احتیاطی تدابیر

* عمل ولادت کسی تربیت یافتہ دائی' نرس' لیڈی ہیلتھ وزیٹر یا ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونا ضروری ہے۔ صرف نارمل ولادت کے کیس کو ہی گھر پر کروایا جائے۔
* مریضہ کا کمرہ گرم' آرام دہ' روشن' ہوادار اور غیرضروری اشیاء سے خالی ہو۔ اسے تنہائی میسر ہو اور اردگرد خواتین کا جمگھٹا نہ ہو اور شوروغل سے بھی مکمل اجتناب کیا جائے اور پورے عمل کو پرسکون ماحول فراہم کیا جائے۔
* بستر صاف ستھرا اور آرام دہ ہو۔
* بعض دائیوں کو بلاوجہ اندر انگلیاں مارنے کا مرض یا علت ہوتی ہے اسے اس حرکت سے منع کیا جائے اس طرح وہ اپنا وقت بچانے کے لئے کرتی ہیں۔ عورت کو گدگدی ہوتی ہے جس سے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور درد کا احساس کم ہو جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے دائی کے اس طرح کرنے سے معتدد اقسام کی عفونتیں جسم کے اندر داخل ہو کر عورت کو بیمار کر دیں۔
* جس کسی نے بھی اندرونی معائنہ کرنا ہو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے کسی اچھی قسم کے صابن اور نیم گرم پانی سے اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھوئے اور بغیر تولیہ کے ہوا میں خشک ہونے دے اس کے بعد جراثیم سے پاک Disposable دستانے پہنے تاکہ ہاتھ عورت کے جسم سے براہ راست مس نہ ہوں۔
* دائیوں کو بھی چاہیے کہ زچگی کے سارے عمل کے دوران اس قسم کے دستانے ہاتھوں پر چڑھائے رکھیں۔
* زچگی میں استعمال ہونے والے اوزار اور ناف باندھنے کا کلمپ یا دھاگہ پہلے ہی جراثیم سے پاک کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔
* دوران ولادت' قبل یا بعد گندے کپڑے' خون یا حمل کے پانی کی صفائی کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ جراثیم سے پاک روئی استعمال کی جائے۔
* پیدائش سے فوری بعد بچہ کے نظام تنفس کو بحال کرنے کے لئے پہلے سے ضروری انتظامات مکمل کر لئے جائیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

* قابلہ یا دائی کی مدد کے لئے ایک معاون کی موجودگی ضروری ہے۔
* کمرہ گرم اور جراثیم سے پاک کپڑے قریب موجود ہوں۔
* بچہ کی ولادت کے فوری بعد زچہ کو بستر سے اٹھنے نہ دیا جائے ورنہ بلڈ پریشر میں یکدم کمی واقع ہو جانے سے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔
* بچہ کی ناف کو پہلے آنول کی طرف سے اور پھر بچہ کی طرف سے باندھنے کے بعد کاٹا جائے۔
* مشیمہ (Placenta) کو اچھی طرح چیک کر لیا جائے تاکہ کوئی جھلی بچہ دانی میں نہ رہ جائے ورنہ بعد میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

ولادت کے بعد جریان خون
(POST PARTUM HAEMORRHAGE)

ولادت کے وقت تھوڑا بہت خون ضرور نکلتا ہے لیکن اگر اس کی مقدار 500 ملی لٹر سے زیادہ ہو جائے تو تکلیف دہ صورت حال بنتی ہے جس کا فوری ازالہ اور علاج ضروری ہے۔

اسباب

* خون زیادہ بہنے کا سبب مشیمہ (Placenta) کا کچھ حصہ یا جھلی اندر رہ جانا بنتا ہے۔
* اگر رحم ولادت کے بعد سکڑ نہ سکے۔
* دوران ولادت زخم آ جائے۔
* زچہ پہلے سے ہیموفیلیا کی مریضہ ہو۔
* زچہ کے جسم میں خون کی مقدار کم ہوتے ہی اس کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ نبض کمزور اور تیز ہو جاتی ہے ۔ چہرہ پر سفیدی جھلکتی ہے اور سانس بھی تیز اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

علاج

مریضہ کو فوری طور پر لٹا کر اس کی پائنتی اونچی کر دیں اور اسے خون بند کرنے اور بلڈ پریشر کو قائم کرنے والی ادویات دیں اور خون کی کمی کو خون کی بوتل لگا کر پورا کریں اس کے بعد آنول کی جھلی جو بھی اندر رہ گئی ہو اس کو نکالنے کے لئے صفائی کا عمل D&C کر کے نکال دیں۔

ولادت کے بعد بخار
POST PARTUM PYREXIA (PPP)

بچہ کی ولادت کے 10-15 دن بعد تک اگر زچہ کے جسم کا درجہ حرارت 100 درجہ فارن ہائیٹ یا 37.5 ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ رہے تو اسے (PPP) کہا جاتا ہے۔

علامات

- پورا جسم درد کرتا ہے۔
- سانس عام طور پر سے تیز اور گہری اور بعض اوقات اکھڑی اکھڑی محسوس ہوتی ہے۔
- نبض تیز اور طاقتور ہوتی ہے۔
- جسم میں سردی محسوس ہوتی ہے۔
- کمزوری اور نقاہت طاری ہو جاتی ہے۔
- سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔
- پیٹ میں بے چینی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔
- کھانسی، بلغم، درد سینہ، پیشاب میں جلن۔
- دودھ میں پیلاہٹ۔
- قے، اسہال اور پیچش وغیرہ۔

یہ بخار عام طور سے گردوں، پیشاب کی نالیوں کی جراثیمی آلودگی، نمونیا یا پستانوں کی سوزش وغیرہ کے سبب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران زچگی آنے والے زخم بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

احتیاط

* زچہ کا اندرونی اور بیرونی معائنہ کرتے وقت نرس یا دائی کو جراثیم سے پاک دستانے استعمال کرنے چاہیں اور اس سے قبل ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو لے۔
* زچگی میں استعمال ہونے والی اشیاء مثلاً تولیہ' روئی اور کپڑے جراثیم سے پاک ہونا ضروری ہیں۔
* زچہ کا کمرہ صاف ستھرا' کپڑے صاف اور دھلے ہوں۔ کمرہ میں نہ ہی گردوغبار اڑے اور نہ کوئی شخص کپڑے جھاڑے۔
* زچہ کی جسمانی صفائی کے لئے گندے کپڑوں کے بجائے نئی روئی استعمال کی جائے۔
* اگر پیشاب کے لئے نالی لگائی گئی ہو تو اسے زمین سے اونچا رکھا جائے۔
* مریضہ کی غذا صاف ستھری' مکھیوں اور گردوغبار سے محفوظ ہو۔

علاج

بخار کی علامات کے ظہور کے ساتھ ہی مریضہ کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے تاکہ وہاں زیادہ سہولتیں اور صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ (جتنے جراثیم ہسپتالوں کی فضا میں ہوتے ہیں اتنے کسی گندے سے گندے گھر کی فضا میں بھی نہیں ہوتے۔ خورد بینی مشاہدہ اس کا گواہ ہے۔ ہسپتالوں میں صرف اوپری صفائی ستھرائی نظر آتی ہے ورنہ وہاں تو ہر آنے والا نئی قسم کے جراثیم لے کر آتا ہے اور کچھ جراثیم چھوڑ جاتا ہے اور کچھ لے جاتا ہے۔ ہسپتالوں کی فضا میں پائے جانے والے جرثومے بھی جراثیم مارنے والی ادویات کھا کر اور متواتر سونگھ کر ان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے جراثیم کش ادویہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتیں بلکہ ان کی افزائش اور صحت کو فزوں کرتی ہیں)

* بخار اور دردکش ادویات کے علاوہ جراثیم کش ادویات کا درست انتخاب کر کے مناسب مقدار میں دی جائیں۔ بہتر ہے کہ جسم کے مختلف مادوں اور خون کا کلچر اور حساسی ٹیسٹ (Culture and Sensitivity Test) بھی کروالیا جائے تاکہ درست دوا کا انتخاب کرنے میں دشواری نہ ہو۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

- زچہ کو پانی وافر مقدار میں پلایا جائے۔
- دوران ولادت اگر شرمگاہ پر زخم آ گئے ہوں تو انہیں صاف رکھا جائے اور متاثر جگہ پر اس وقت تک جراثیم کش دوا لگائی جائے جب تک زخم درست نہ ہو جائیں۔

پستانوں کا پھول جانا
(ENGORGEMENT OF BREASTS)

+ بچہ کی ولادت کے بعد زچہ کے پستان دودھ اور خون جمع ہونے کی وجہ سے قدرے سخت ہو جاتے اور درد کرتے ہیں۔ زچہ کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔
+ انہیں دبایا جائے تو درد کرتے ہیں۔
+ جلد پر خون کی نالیاں نظر آتی ہیں اور جلد سرخی مائل نظر آتی ہے۔
+ جو مائیں بچے کو بروقت دودھ نہیں پلاتیں ان کی تکالیف میں اضافہ ہوجاتا ہے ۔ لہذا پیدائش کے بعد جلد از جلد بچہ کو دودھ پلایا جائے اس کے بعد بھی وقفوں سے (Breast Pump) کی مدد سے دودھ نکال کر بچہ کو پلایا جائے۔

علاج

+ گرم پانی کی پٹیاں کی جائیں۔
+ چھاتیوں کو نرم (فلالین) کپڑے یا روئی کے پیڈ سے سہارا دے کر رکھا جائے۔
+ زیادہ تکلیف کی صورت میں درد کم کرنے والی اور سکون آور ادویات کا استعمال کرائیں۔

کٹی پھٹی بھٹنیاں (CRACKED NIPPLES)

بعض دفعہ عورتوں کی بے احتیاطی ' گندے کپڑوں کے استعمال' پستانوں کی مناسب صفائی اور دیکھ بھال نہ کرنے' بچہ کے بار بار بھنبھوڑنے کی وجہ سے پستانوں کی چوچیاں (Nipple) زخمی ہو کر درد کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بچے کو دودھ پلانے میں دشواری پیش آتی ہے اور دودھ بھر جانے کی وجہ سے پستان وزنی ہو جاتے اور

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

پھول جاتے ہیں۔

+ بچہ کی ولادت کے بعد ابتدائی ایام میں اسے صرف چند منٹ ہی دودھ پلایا جائے۔
+ رات کو بچہ کے منہ میں چوچیاں (Nipple) ڈال کر نہ سوئیں۔
+ اگر دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود بخود بہتا چلا جائے تو دودھ کم کرنے والی ہومیوپیتھک دوا کھائی جائے۔
+ دودھ بہنے سے تر ہونے والے کپڑے (انگیا' قمیض) دھو کر صاف اور خشک کر لیں۔
+ بچہ کو ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے اور بعد پستانوں کو نیم گرم پانی سے ضرور صاف کریں۔
+ جب تک بھٹنیوں کے زخم درست نہ ہو جائیں بچہ کو دودھ نہ پلایا جائے بلکہ (Breast Pump) کی مدد سے نکال کر پلائیں۔
+ بھٹنیوں کے زخموں کو دن میں متعدد بار صاف کر کے جراثیم کش دوا (رسونت) لگائیں۔
+ کھانے والی ادویات میں دردکش اور جراثیم کش دونوں اقسام کی دوائیں استعمال کریں تاکہ زخم جلد مندمل ہو جائیں۔

بچہ کا دودھ چھڑانا (WEANING)

- جب بچے کا دودھ چھڑانا مقصود ہو یا کسی مجبوری کے تحت نہ پلایا جا سکتا ہو تو ماں کو چاہیے کہ یومیہ پینے والے پانی کی مقدار کم کر دے۔
- بریزیر کی طنابیں اوپر کھینچ کر رکھے تاکہ پستانوں کی بھٹنیاں اوپر اٹھی رہیں۔
- اگر بچہ پہلے سے دودھ پی رہا ہو تو بتدریج دودھ پلانا کم کرتی جائیں اور بچے کو متبادل خوراک شروع کروا دیں۔
- ماں کو ڈاکٹر کے مشورہ سے دودھ کم کرنے یا خشک کرنے والی محفوظ ترین دوائیں (ہومیوپیتھک) استعمال کرائیں۔
- ایلوپیتھک دوا (Estrogen) اگرچہ دودھ کی پیداوار کم کرتی ہے مگر انتہائی مضر اثرات عورت پر مرتب کرتی ہے لہذا اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔