
ایل ڈی ایل (LDL) کولیسٹرال کی مقدار:

نارمل کی مقررہ حد: 100 ملی گرام یا اس سے کم تقریباً نارمل: 100 سے 129 ملی گرام

بارڈر لائن: 130 سے 159 ملی گرام

ہائی: 160 سے 189 ملی گرام

بہت ہائی: 190 ملی گرام اور زائد



اگر خدانخواستہ دل کی تکلیف موجود ہو تو پھر
LDL کی مقدار 70 ملی گرام یا اس سے بھی کم ہونی چاہئے۔

ٹرائی گلیسرائیڈز (Triglycrides) کی مقدار:

نارمل کی مقررہ حد: 150 ملی گرام یا اس سے کم

بارڈر لائن: 150 سے 200 ملی گرام

ہائی: 200 سے 499 ملی گرام

بہت ہائی: 500 ملی گرام یا زائد

ٹوٹل کولیسٹرال

کولیسٹرال کی مقدار	نارمل یا ہائی
180 ملی گرام سے کم	نارمل
181 سے 199 ملی گرام	بارڈر لائن ہائی
200 ملی گرام یا زائد	ہائی (High)

LDL کولیسٹرال

LDL کولیسٹرال کی مقدار	نارمل یا ہائی
100 ملی گرام سے کم	نارمل
100 سے 129 ملی گرام	تقریباً نارمل
130 سے 159 ملی گرام	باڈر لائن ہائی
160 سے 189 ملی گرام	ہائی (High)
190 ملی گرام یا زائد	بہت ہائی

HDL کولیسٹرال


HDL کولیسٹرال کی مقدار	نارمل یا ہائی
40 ملی گرام سے کم مردوں میں اور 50 ملی گرام عورتوں میں	لو (low)
40 سے 60 ملی گرام	نارمل
60 ملی گرام یا زائد	ہائی (High)

Triglycrides ٹرائی گلیسرائیڈز

ٹرائی گلیسرائیڈ کی مقدار	نارمل یا ہائی
150 ملی گرام سے کم	نارمل
150 سے 200 ملی گرام	درمیانہ
200 سے 499 ملی گرام	ہائی (High)
500 ملی گرام یا زائد	بہت ہائی

کیا کولیسٹرال کی اہمیت کا کوئی اور پیمانہ بھی ہے؟

کولیسٹرال کی سطح کی اہمیت جاننے کیلئے ایک اور پیمانہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ پیمانہ ہے ٹوٹل کولیسٹرال اور HDL کے تناسب کا۔ اگر یہ تناسب 5:1 سے کم ہو تو ایسا تناسب دل کے امراض سے بچاؤ کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ بہترین تناسب 3.5:1 ہے۔ مثلاً اگر ٹوٹل کولیسٹرال 175 ملی گرام ہو اور HDL، 50 ملی گرام ہو تو یہ تناسب 3.5:1 (175/50) ہوا۔ یہ انتہائی مناسب ہے۔ لیکن اگر ہائی بلڈ پریشر، سگریٹ نوشی اور شوگر جیسے عوامل موجود ہوں تو یہ عوامل دل کے امراض کے خطرہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیتے ہیں۔



خون میں کولیسٹرال کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟

- موروثی اثرات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہائی کولیسٹرال کچھ خاندانوں میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ موروثی اثرات کے تحت بچوں اور نوجوانوں میں بھی کولیسٹرال کی زیادتی پائی جاتی ہے۔
- غذا میں چکنائی کی مقدار کی زیادتی بھی کولیسٹرال کو بڑھا دیتی ہے۔ زردی والا انڈہ، مرغن غذائیں، تلی ہوئی اشیاء، ناریل، مغز، گردہ، کلیجی، نہاری، پائے، گائے کا گوشت چند ایک مثالیں ہیں جن کا مسلسل اور کثرت سے استعمال کولیسٹرال کی مقدار کو خون میں بڑھا دیتا ہے۔ وہ غذائیں جن میں transfat اور saturated زیادہ ہو کولیسٹرال کو بڑھاتی ہیں خصوصی طور پر اُن افراد میں جن کی فیملی میں کولیسٹرال بڑھنے کا رجحان ہے۔ الکوحل کا استعمال بھی کولیسٹرال بڑھاتا ہے۔



- کچھ امراض بھی ایسے ہیں جن میں کولیسٹرال کی مقدار بڑھتی ہے۔ مثلاً تھائی رائیڈ thyroid کا مرض، گردوں کا مرض، شوگر کا مرض وغیرہ
- موٹاپا، کولیسٹرال کو بڑھانے کا ایک اہم عنصر ہے
- ورزش کی کمی اور سگریٹ نوشی


ہائی کولیسٹرال کی کیا علامات ہیں؟

عمومی طور پر ہائی کولیسٹرال کی کوئی علامات نہیں ہوتیں۔ اسکا پتہ صرف خون میں کولیسٹرال کی مقدار کیلئے ٹیسٹ کروا کر ہی ہوسکتا ہے۔ تاہم کچھ افراد میں کولیسٹرال آنکھوں کے گرد، جلد میں اور جوڑوں پر پیلے پیلے نشانات کی شکل میں جمع ہوجاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کولیسٹرال آہستہ آہستہ کئی سالوں پر محیط عرصے میں خون کی نالیوں کی اندرونی تہوں میں جمتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں نالیاں تنگ اور سخت ہوجاتی ہیں۔ خون کی گردش کی مقدار میں کمی واقعہ ہوجاتی ہے اور اس طریقہ سے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔



خون کی نالیوں میں کولیسٹرال جمنے سے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں؟

خون کی نالیاں تنگ ہونے اور خون کی گردش کم ہونے سے مختلف اعضاء پر مندرجہ ذیل منفی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں:



دماغ: دماغ کی رگوں میں خون جم سکتا ہے یا نالیاں پھٹنے سے خون بہہ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں فالج کا اثر ہوجاتا ہے۔ فالج ایک جان لیوا مرض ثابت ہوسکتا ہے۔ خون جمنے کا عمل، دل سے دماغ کی طرف جانے والی نالیوں میں بھی ہوسکتا ہے۔ اس سے یا تو فالج یا وقتی بیہوشی کی علامات ہوسکتی ہیں۔



دل: دل کی شریانیں تنگ ہونے سے:

- دل کا درد (Angina)
- دل کا دورہ (Heart Attack)
- ہارٹ فیلیر (Heart Failure) جیسے موذی اثرات ہو سکتے ہیں۔


ٹانگیں: ٹانگوں کی شریانوں میں تنگی آنے کی صورت میں ٹانگوں میں شدید درد ہو سکتا ہے جو خصوصی طور پر چلنے کے وقت ہوتا ہے۔ خون جم جانے کی صورت میں ٹانگ ناکارہ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔

دوسری شریانیں: دل، دماغ اور ٹانگوں کی شریانوں کی طرح باقی اعضاء مثلاً گردے، آنتیں اور دل سے نکلنے والی بڑی شریانوں میں بھی وہی عمل یعنی تنگی اور خون کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے ان اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔



ہائی کولیسٹرال کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟

کولیسٹرال کی مقدار کو خون میں جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خون کا ٹیسٹ کیا جائے۔ کم از کم 12 گھنٹے کا فاقہ کرنے کے بعد خون کا نمونہ لیبارٹری میں Lipid Profile کے لئے دیا جاتا ہے۔ اس خون کے نمونہ میں ٹوٹل کولیسٹرال، LDL کولیسٹرول، HDL کولیسٹرال اور ٹرائی گلیسیر ائیڈز کو ناپا جاتا ہے۔ کولیسٹرال کی زیادتی کے باعث مختلف اعضاء کو نقصان کا اندازہ ان اعضاء کے متعلق ٹیسٹ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً نبض اور بلڈ پریشر کو ناپا جاتا ہے، دل کیلئے ECG کی جاتی ہے۔ گردوں کے عمل کو جاننے کیلئے خون میں یوریا کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔



دل اور شریانوں کے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟

ہائی کولیسٹرال دل اور شریانوں کے امراض کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس کا پتہ Lipid Profile کے لئے خون چیک کروا کے لگایا جائے۔ اگر یہ زیادہ ہے تو مندرجہ ذیل قدم اٹھائے جا سکتے ہیں:

- **غذا:** مرغن غذائیں اور ایسی غذائیں جن میں سیر شدہ چکنائی (Saturated Fat) موجود ہو مثلاً گھی، مکھن، بالائی، پنیر، زردی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ اسکی جگہ پر سبزیاں، فروٹ، مچھلی کا گوشت اور زیتون کا تیل استعمال کیا جائے۔
- **وزرش:** غذا کی احتیاط اور ورزش کے ذریعے کولیسٹرال میں کمی آجاتی ہے۔
- **موٹاپا:** چونکہ موٹاپا، ہائی کولیسٹرال کا باعث بنتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہئے۔ مندرجہ بالا اقدامات سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
- **سگریٹ اور تمباکو** کا استعمال کم کیا جائے اس سے خصوصی طور پر LDL کولیسٹرال کو کم کرنے اور HDL کولیسٹرال کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔
- **الکوحل:** الکوحل کا حد سے زیادہ استعمال جگر کے فعل میں خلل ڈالتا ہے۔ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور کولیسٹرال میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے پرہیز رکھیں۔
- **خون میں کولیسٹرال کی مقدار** کو گاہے بگاہے (3 سے 6 ماہ میں) چیک کروائیں۔
- **ذیابیطس** ہونے کی صورت میں نہ صرف شوگر باقاعدگی سے چیک ہونی چاہئے بلکہ کولیسٹرال کا چیک ہونا بھی ضروری ہے۔