


ایچ ڈی ایل (HDL) کو کیسے بڑھایا جائے اور ایل ڈی ایل (LDL) کو کیسے کم کیا جائے؟

HDL اگر مقررہ حد سے کم ہو تو وزن کنٹرول کرنے، باقاعدگی سے ورزش کرنے اور سگریٹ نوشی کم کرنے بلکہ ترک کرنے سے اس میں اضافہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ان ہی اقدامات سے LDL کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسکے علاوہ لہسن کا استعمال (درمیانہ سائز) یا ایک کیپسول 800 سے 900 ملی گرام خشک لہسن LDL کولیسٹرول کو 7 سے 9 فیصد کم کرسکتا ہے۔

مچھلی کا استعمال اور تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال LDL کو کم کرنے میں موثر ہے۔ مکھن، گھی، بالائی، پنیر سے ہر ممکن پرہیز بھی بہت مدد دیتی ہے۔ بڑے کا گوشت اور چربی والا بکرے کا گوشت سے پرہیز کرنی چاہئے۔ مریض اکثر دودھ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جن میں 2 فیصد سے کم چکناہٹ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چکنائی کم ہونے کے علاوہ دودھ میں کیلشیم اور پروٹین جسم اور ہڈیوں کی صحت کیلئے بہت مفید ہے۔




غذا میں تبدیلی لانے سے اور وزن کم کرنے سے LDL پر کتنا اثر پڑتا ہے؟

غذا میں مندرجہ ذیل تبدیلیوں سے LDL کم ہونے کا اندازہ کچھ اسطرح سے ہے:

	تبدیلی	LDL میں کمی کا اندازہ
سیر شدہ چکنائی	روزانہ کلوریز کا 7 فیصد تک کمی کرنے سے	8 سے 10 فیصد
غذا میں کولیسٹرال	روزانہ 200 ملی گرام یا اس سے کم استعمال کرنے سے	3 سے 5 فیصد
محلول ہونے والا فائبر	روزانہ 5 سے 10 گرام کا اضافہ	3 سے 5 فیصد
وزن	10 پاؤنڈ (4.5) کلوگرام کمی کرنے سے	5 سے 8 فیصد

ان سب اقدامات کو عمل میں لا کر LDL میں 20 سے 30 فیصد کمی لائی جا سکتی ہے جو انتہائی مفید ہے اور دل کی صحت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔



کیا ادویات سے بھی کولیسٹرال کم کیا جا سکتا ہے؟

اگر مندرجہ بالا احتیاطی تدابیر سے کولیسٹرال مقررہ حد تک نہیں آتا تو پھر کولیسٹرال کم کرنے والی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کولیسٹرال کو کم کرنے والی ادویات کی کئی قسمیں اور گروپ ہیں:

۱) سٹیٹنز (Statins)

۲) فائبریٹس (Fibrates)

۳) نیکوٹنیک ایسڈ (Nicotinic Acid) یا نایاسن (Niacin)

۴) ایزیٹامائب (Ezitamibe)

۵) بائل ایسڈ ریزنز (Bile Acid Resins)

ویسے تو ساری اقسام استعمال ہوتی ہیں لیکن سب سے زیادہ استعمال Statins اور Ezitamibe کا ہوتا ہے۔ اسلئے کہ یہ موثر بھی ہیں اور انکے ذیلی اثرات (Side effects) بھی بہت کم ہیں۔ انکے استعمال سے ٹوٹل کولیسٹرال کو 20 سے 60 فیصد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ LDL میں 15 سے 30 فیصد کمی لائی جاسکتی ہے اور HDL میں 5 سے 15 فیصد اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سے ٹرائی گلیسرائیڈز میں 10 سے 35 فیصد تک کمی کی جاسکتی ہے۔ عمومی طور پر یہ ادویات کافی محفوظ ہیں لیکن لوگوں کی بہت کم تعداد میں جگر پر معمولی اثر ہوسکتا ہے اور پٹھوں کا درد اور کھچاؤ تنگ کرسکتا ہے یہ ذیلی اثرات کا احتمال ان ادویات کی بڑی خوراک والی گولیاں استعمال کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اثرات کو جانچنے کے لئے گاہے بگاہے خون کا ٹیسٹ جگر کے عمل کے بارے میں ہونا چاہئے۔

نئے مشاہدے کے مطابق Statins کا استعمال لمبے عرصے تک تجویز کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر ان افراد میں جن میں دل کا عارضہ لاحق ہو چکا ہو۔ وہ اسلئے کہ ان ادویات سے کولیسٹرال کم ہونے کے علاوہ دل اور دل کی شریانوں پر مثبت اثرات جاری رہتے ہیں۔ ان اثرات کے تحت شریانوں پر جمی ہوئی کولیسٹرال کی تہیں آہستہ آہستہ کم ہوجاتی ہیں اور شریانوں کی سب سے اندر والی تہہ جسے اینڈوتھیلیم (Endothelium) کہتے ہیں، اسکا فعل بہتر ہوتا جاتا ہے۔



کیا بچوں میں بھی کولیسٹرال بڑھ سکتا ہے؟

جی ہاں! وہ بچے جن کے والدین یا گرینڈ والدین میں کولیسٹرال کی زیادتی ہے یا دل کے امراض خصوصی طور پر 55 سال کی عمر سے پہلے موجود رہے ہوں تو ان بچوں میں کولیسٹرال کی مقدار خون میں ضرور چیک کروانی چاہئے۔ اسی طرح سے وہ بچے جو موٹاپے کی طرف مائل ہیں۔ ان میں کولیسٹرال چیک ہونا چاہئے۔ آجکل کا مشاہدہ یہ ہے کہ بچوں میں موٹاپا بڑھ رہا ہے۔ اسکی بنیادی وجہ کھیل کود کا فقدان، برگر اور کولا والی خوراک، ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے زیادہ وقت گذارنا ہیں۔ ان بچوں میں سیر شدہ چکنائی کا استعمال کم کر کے اور کھیل کود کی ترغیب دے کر کولیسٹرال کی سطح کو کم کیا جاسکتا ہے اور انکو صحت مند نوجوان بننے میں مدد دی جاسکتی ہے۔

عام طور پر استعمال کی جانے والی غذاؤں میں چکنائی کی مقدار کیا ہے؟

غذا	سیر شدہ چکنائی (٪) (Saturated Fat)	غیر سیر شدہ چکنائی (Unsaturated Fat)	
		مونو انسیچو رٹیڈ (٪)	پولی انسیچو رٹیڈ (٪)
مکھن، کریم	65	30	5
گائے کا گوشت	46	48	6
مرغی کا گوشت	33	39	28
مچھلی	29	31	40
ناریل کا تیل	92	6	2
پام آئل	86	12	2
زیتون کا تیل	15	76	9
مونگ پھلی کا تیل	20	48	32
سویابین آئیل	16	24	60
کارن آئل	13	26	61
سورج مکھی کا تیل	11	22	67
کنولا کا تیل	10	21	68

تعاون: کولیسٹرال اویرنس سوسائٹی



پاکستانی گھی اور پکانے کے تیل میں چکنائی کی مقدار کیا ہے؟

چند منتخب شدہ گھی اور تیلوں کی تفصیل اس طرح کی ہے:

نمونہ	سیر شدہ چکنائی (%) (Saturated Fat)	غیر سیر شدہ چکنائی (Unsaturated Fat)			
		مونو انسچو ریٹڈ (%)	پولی انسچو ریٹڈ (%)	ٹوٹل چکنائی (%)	ٹرانس فیٹ (%)
کسان سن فلاور آئل	14.9	19.6	61	95.5	3 فیصد سے کم
نیوٹری سویابین آئل	15.2	20.9	58.8	94.9	3 فیصد سے کم
ملک پیک خالص گھی	62.1	22.6	2.3	87	3 فیصد سے کم
ڈالڈا ویجٹیبل گھی	35.2	46.9	8.7	90.8	27
نایاب بناسپتی	47.5	38.9	9.8	92.2	3 فیصد سے کم
پام آئل	49.3	37	9.3	--	--

تعاون: کولیسٹرال اوریرنس سوسائٹی