

## 神経学的検査チャート

年 月 日 時 分

患者氏名

患者ID

患者性別 男 女 年齢


- 1) 意識・精神状態 a) 意識 : 清明、異常 ( )  
 \* Japan Coma Scale ( 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 )  
 \* Glasgow Coma Scale ( E 1, 2, 3, 4, V 1, 2, 3, 4, 5, M 1, 2, 3, 4, 5, 6 total )  
 b) 検査への協力 : 協力的、非協力的  
 c) けいれん : なし、あり ( )  
 d) 見当識 : 正常、障害 ( 時間、場所、人 )  
 e) 記憶 : 正常、障害 ( )  
 f) 数字の逆唱 : 286、3529  
 g) 計算 :  $100 - 7 =$   $93 - 7 =$   $86 - 7 =$   
 h) 失行 ( )、失認 ( )
- 2) 言語 正常、失語 ( )、構音障害 ( )、嚥声、開鼻声
- 3) 利き手 右、左
- 4) 脳神経

	右	左
視力	正、低下	正、低下
視野	正、 	正、 
眼底	正常、動脈硬化 ( ) 度、出血、白斑、うっ血乳頭、視神経萎縮	
眼裂	> = <	
眼瞼下垂	(-) (+)	(-) (+)
眼球位置	正、斜視 ( )、偏視 ( )、突出 ( )	
眼球運動		
眼振		
複視	(-) (+) : 方向 ( )	
瞳孔 大きさ	(正、縮、散) mm > = < mm (正、縮、散)	
形	正円、不正	正円、不正
対光反射	速、鈍、消失	速、鈍、消失
輻湊反射	正常、障害	
角膜反射	正常、障害	正常、障害
顔面感覚	正常、障害	正常、障害
上部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
下部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
聴力	正常、低下	正常、低下
めまい	(-) (+) : 回転性・非回転性 ( )	
耳鳴り	(-) (+)	(-) (+)
軟口蓋	正常、麻痺	正常、麻痺
咽頭反射	(+) (-)	(+) (-)
嚥下	正常、障害 ( )	
胸鎖乳突筋	正常、麻痺	正常、麻痺
上部僧帽筋	正常、麻痺	正常、麻痺
舌偏倚	(-) (+) : 偏倚 ( 右 左 )	
舌萎縮	(-) (+)	(-) (+)
舌線維束性収縮	(-) (+)	

- 5) 運動系
- a) 筋トーンス 上肢（右・左、正常 痙縮 強剛 低下）その他（ ）  
 下肢（右・左、正常 痙縮 強剛 低下）
- b) 筋萎縮 （－）（＋）：部位（ ）
- c) 線維束性収縮 （－）（＋）：部位（ ）
- d) 関節 変形、拘縮：部位（ ）
- e) 不随意運動 （－）（＋）：部位（ ）、性質（ ）
- f) 無動・運動緩慢 （－）（＋）
- g) 筋力 正常、麻痺：部位（ ）、程度（ ）

		右	左		右	左
頸部屈曲	C1～6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	上肢バレー	(-) (+)	(-) (+)
伸展	C1～T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	(下肢バレー)	(-) (+)	(-) (+)
三角筋	C5,6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	Mingazzini	(-) (+)	(-) (+)
上腕二頭筋	C5,6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	握力	kg	kg
上腕三頭筋	C6～8	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
手関節背屈	C6～8	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
掌屈	C6～8,T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
母指対立筋	C8,T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
腸腰筋	L1～4	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
大腿四頭筋	L2～4	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
大腿屈筋群	L4,5,S1,2	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
前脛骨筋	L4,5	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
下腿三頭筋	S1,2	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			

筋萎縮・感覚



- 6) 感覚系
- a) 触覚 正常、障害：部位（ ）
- b) 痛覚 正常、障害：部位（ ）
- c) 温度覚 正常、障害：部位（ ）
- d) 振動覚 正常、障害：部位（ ）
- e) 位置覚 正常、障害：部位（ ）
- f) 異常感覚・神経痛 （－）（＋）：部位（ ）


7) 反射

	右	左		右	左		右	左
ホフマン	(-) (+)	(-) (+)	バビンスキー	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
トレムナー	(-) (+)	(-) (+)	チャドック	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
(腹壁) 上			(膝クロース)	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
下			足クロース	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)

8) 協調運動

	右	左
指一鼻一指	正常、拙劣	正常、拙劣
かかと一膝	正常、拙劣	正常、拙劣
反復拮抗運動	正常、拙劣	正常、拙劣

- 9) 髄膜刺激徴候 項部硬直 （－）（＋）、ケルニツヒ徴候 （－）（＋）
- 10) 脊柱 正常、異常（ ）、ラゼーグ徴候 （－）（＋）
- 11) 姿勢 正常、異常（ ）
- 12) 自律神経 排尿機能 正常、異常（ ）  
 排便機能 正常、異常（ ）  
 起立性低血圧 （－）（＋）
- 13) 起立、歩行 ロンベルク試験 正常、異常、マン試験 正常、異常  
 歩行 正常、異常（ ）  
 つぎ足歩行（可能・不可能）、しゃがみ立ち（可能・不可能）



神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師

署名