

褥瘡対策に関する評価

1 褥瘡の状態（部位毎に記載）

両括弧内は点数（※1）

| 部位（部位名） | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| 1 () 2 () 3 () 4 () | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 褥瘡の状態の評価 (DESIGN-R2020) | 深さ | (0) 皮膚損傷・発赤なし | (1) 持続する発赤 | (2) 真皮までの損傷 | (3) 皮下組織までの損傷 | (4) 皮下組織を超える損傷 | (5) 関節腔、体腔に至る損傷 | (DTI) 深部損傷褥瘡 (DTI) 疑い(※2) | (U) 深さ判定が不能の場合 | | | | |
| | 滲出液 | (0) なし | (1) 少量：毎日の交換を要しない | | (3) 中等量：1日1回の交換 | | (6) 多量：1日2回以上の交換 | | | | | | |
| | 大きさ (cm ²) 長径×長径に直交する最大径（持続する発赤の範囲も含む） | (0) 皮膚損傷なし | (3) 4未満 | (6) 4以上16未満 | (8) 16以上36未満 | (9) 36以上64未満 | (12) 64以上100未満 | (15) 100以上 | | | | | |
| | 炎症・感染 | (0) 局所の炎症徴候なし | (1) 局所の炎症徴候あり（創周辺の発赤、腫瘍、熱感、疼痛） | | (3C) (※3) 臨界的定着疑い（創面にぬめりがあり、浸出液が多い。肉芽があれば、浮腫性で脆弱など） | | (3) (※3) 局所の明らかな感染徴候あり（炎症徴候、膿、悪臭） | | (9) 全身的影響あり（発熱など） | | | | |
| | 肉芽形成 良性肉芽が占める割合 | (0) 治癒あるいは創が浅い場合、深部損傷褥瘡 (DTI) 疑い(※2)の場合 | (1) 創面の90%以上を占める | (3) 創面の50%以上90%未満を占める | (4) 創面の10%以上50%未満を占める | (5) 創面の10%未満を占める | (6) 全く形成されていない | | | | | | |
| | 壊死組織 | (0) なし | (3) 柔らかい壊死組織あり | | | | (6) 硬く厚い密着した壊死組織あり | | | | | | |
| ポケット (cm ²) 潰瘍面も含めたポケット全周（ポケットの長径×長径に直交する最大径） －潰瘍面積 | (0) なし | (6) 4未満 | (9) 4以上16未満 | | (12) 16以上36未満 | | (24) 36以上 | | | | | | |
| DESIGN-R2020 の合計点（深さの点数は加えない） | | | | | | | | | | | | | |

(※1) 該当する状態について、両括弧内の点数を合計し、「合計点」に記載すること。ただし、深さの点数は加えないこと。

(※2) 深部損傷褥瘡 (DTI) 疑いは、視診・触診、補助データ（発生経緯、血液検査、画像診断等）から判断する。

(※3) 「3C」あるいは「3」のいずれかを記載する。いずれの場合も点数は3点とする。

2 褥瘡の状態の変化

| | 評価日 (月 日) | 1月前 (月 日) | 2月前 (月 日) | 3月前 (月 日) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DESIGN-R2020の合計点 | | | | |

1 前月までのDESIGN-R2020の合計点は、暦月内で最も低い合計点を記載する。

2 褥瘡の部位により合計点異なる場合は、最も低い合計点を記載する。