

## 褥瘡対策に関する評価

## 1 褥瘡の状態（部位毎に記載）

| 部位（部位名）                   |   |                      |                                |                       |                              |                  |                   |                |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--|---|---|---|---|
| 1（ ） 2（ ） 3（ ） 4（ ）       |   |                      |                                |                       |                              |                  |                   |                |  |   |   |   |   |
| 褥瘡の状態の評価 (DESIGN-R)       | 深さ  | (0) 皮膚損傷・発赤なし        | (1) 持続する発赤                     | (2) 真皮までの損傷           | (3) 皮下組織までの損傷                | (4) 皮下組織を超える損傷   | (5) 関節腔、体腔に至る損傷   | (U) 深さ判定が不能の場合 |  |   |   |   |   |
|                           | 滲出液   | (0) なし               | (1) 少量：毎日の交換を要しない              |                       | (3) 中等量：1日1回の交換              |                  | (6) 多量：1日2回以上の交換  |                |  |   |   |   |   |
|                           | 大きさ (cm <sup>2</sup> )<br>長径×長径に直交する最大径（持続する発赤の範囲も含む）             | (0) 皮膚損傷なし           | (3) 4未満                        | (6) 4以上16未満           | (8) 16以上36未満                 | (9) 36以上64未満     | (12) 64以上100未満    | (15) 100以上     |  |   |   |   |   |
|                           | 炎症・感染   | (0) 局所の炎症徴候なし        | (1) 局所の炎症徴候あり（創周囲の発赤、腫瘍、熱感、疼痛） |                       | (3) 局所の明らかな感染徴候あり（炎症徴候、膿、悪臭） |                  | (9) 全身的影響あり（発熱など） |                |  |   |   |   |   |
|                           | 肉芽形成<br>良性肉芽が占める割合  | (0) 治癒あるいは創が浅い為評価不可能 | (1) 創面の90%以上を占める               | (3) 創面の50%以上90%未満を占める | (4) 創面の10%以上50%未満を占める        | (5) 創面の10%未満を占める | (6) 全く形成されていない    |                |  |   |   |   |   |
|                           | 壊死組織  | (0) なし               | (3) 柔らかい壊死組織あり                 |                       | (6) 硬く厚い密着した壊死組織あり           |                  |                   |                |  |   |   |   |   |
|                           | ポケット (cm <sup>2</sup> )<br>潰瘍面も含めたポケット全周（ポケットの長径×長径に直交する最大径）－潰瘍面積 | (0) なし               | (6) 4未満                        | (9) 4以上16未満           |                              | (12) 16以上36未満    |                   | (24) 36以上      |  |   |   |   |   |
| DESIGN-R の合計点（深さの点数は加えない） |   |                      |                                |                       |                              |                  |                   |                |  |   |   |   |   |

※該当する状態について、両括弧内の点数を合計し、「合計点」に記載すること。ただし、深さの点数は加えないこと。

## 2 褥瘡の状態の変化

|              | 評価日<br>( 月 日 ) | 1か月前<br>( 月 日 ) | 2月前<br>( 月 日 ) | 3月前<br>( 月 日 ) |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| DESIGN-Rの合計点 |                |                 |                |                |

1 前月までのDESIGN-Rの合計点は、暦月内で最も低い合計点を記載する。

2 褥瘡の部位により合計点が変わる場合は、最も低い合計点を記載する。