

## 強度行動障害児(者)の医療度判定基準

## I 強度行動障害スコア

| 行動障害の内容                            | 行動障害の目安の例示   | 1点    | 3点    | 5点    |
|------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1 ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為          | 肉が見えたり、頭部が変形に至るような叩きをしたり、つめをはぐなど。  | 週1回以上 | 日1回以上 | 1日中   |
| 2 ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為                | 噛みつき、蹴り、なぐり、髪ひき、頭突きなど、相手が怪我をしかねないような行動など。                                  | 月1回以上 | 週1回以上 | 1日に頻回 |
| 3 激しいこだわり                          | 強く指示しても、どうしても服を脱ぐとか、どうしても外出を拒みとおす、何百メートルも離れた場所に戻り取りに行く、などの行為で止めても止めきれないもの。 | 週1回以上 | 日1回以上 | 1日に頻回 |
| 4 激しい器物破損                          | ガラス、家具、ドア、茶碗、椅子、眼鏡などをこわし、その結果危害が本人にもまわりにも大きいもの、服をなんとしてでも破ってしまうなど。          | 月1回以上 | 週1回以上 | 1日に頻回 |
| 5 睡眠障害                             | 昼夜が逆転してしまっている、ベッドについていられず人や物に危害を加えるなど。                                     | 月1回以上 | 週1回以上 | ほぼ毎日  |
| 6 食べられないものを口に入れたり、過食、反すう等の食事に関する行動 | テーブルごとひっくり返す、食器ごと投げるとか、椅子に座っていれず、皆と一緒に食事できない。便や釘・石などを食べ体に異常をきたした偏食など。      | 週1回以上 | ほぼ毎日  | ほぼ毎食  |
| 7 排泄つに関する強度の障害                     | 便を手でこねたり、便を投げたり、便を壁面になすりつける。強迫的に排尿排便行為を繰り返すなど。                             | 月1回以上 | 週1回以上 | ほぼ毎日  |
| 8 著しい多動                            | 身体・生命の危険につながる飛び出しをする。目を離すと一時も座れず走り回る。ベランダの上など高く危険なところに上る。                  | 月1回以上 | 週1回以上 | ほぼ毎日  |
| 9 通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動            | たえられない様な大声を出す。一度泣き始めると大泣きが何時間も続く。  | ほぼ毎日  | 1日中   | 絶えず   |
| 10 パニックへの対応が困難                     | 一度パニックが出ると、体力的にもとてもおさめられずつきあっていられない状態を呈する。                                 |       |       | 困難    |
| 11 他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為があり、対応が困難     | 日常生活のちょっとしたことを注意しても、爆発的な行動を呈し、かかわっている側が恐怖を感じさせられるような状況がある。                 |       |       | 困難    |

## Ⅱ 医療度判定スコア

|   |       |
|---|-------|
| 1 行動障害に対する専門医療の実施の有無  |       |
| ① 向精神薬等による治療  | 5点    |
| ② 行動療法、動作法、TEACCHなどの技法を取り入れた薬物療法以外の専門医療   | 5点    |
| 2 神経・精神疾患の合併状態  |       |
| ① 著しい視聴覚障害（全盲などがあり、かつ何らかの手段で移動する能力をもつ）  | 5点    |
| ② てんかん発作が週1回以上、または6ヶ月以内のてんかん重積発作の既往   | 5点    |
| ③ 自閉症等によりこだわりが著しく対応困難   | 5点    |
| ④ その他の精神疾患や不眠に対し向精神薬等による治療が必要   | 5点    |
| 3 身体疾患の合併状態   |       |
| ① 自傷・他害による外傷、多動・てんかん発作での転倒による外傷の治療（6ヶ月以内に）  | 3点    |
| ② 慢性擦過傷・皮疹などによる外用剤・軟膏処置（6ヶ月以内に1ヶ月以上継続）  | 3点    |
| ③ 便秘のため週2回以上の浣腸、または座薬（下剤は定期内服していること）  | 3点    |
| ④ 呼吸器感染のための検査・処置・治療（6ヶ月以内にあれば）  | 3点    |
| ⑤ その他の身体疾患での検査・治療<br>（定期薬内服による副作用チェックのための検査以外、6ヶ月以内にあれば）  | 3点    |
| 4 自傷・他害・事故による外傷等のリスクを有する行動障害への対応  |       |
| ① 行動障害のため常に1対1の対応が必要  | 3点    |
| ② 行動障害のため個室対応等が必要（1対1の対応でも開放処遇困難）   | 5点    |
| ③ 行動障害のため個室対応でも処遇困難（自傷、多動による転倒・外傷の危険）<br>※） いずれか一つを選択   | 10点   |
| 5 患者自身の死亡に繋がるリスクを有する行動障害への対応  |       |
| ① 食事（異食、他害につながるような盗食、詰め込みによる窒息の危険など）  | 3. 5点 |
| ② 排泄（排泄訓練が必要、糞食やトイレの水飲み、多動による転倒・外傷の危険）  | 3. 5点 |
| ③ 移動（多動のためどこへ行くか分からない、多動による転倒・外傷の危険）  | 3. 5点 |
| ④ 入浴（多動による転倒・外傷・溺水の危険、多飲による水中毒の危険）  | 3. 5点 |
| ⑤ 更衣（破衣・脱衣のための窒息の危険、異食の危険）<br>※） 次により配点<br>・常時1対1で医療的観察が必要な場合及び入院期間中の生命の危機回避のため個室対応や個別の時間での対応を行っている場合（5点）<br>・時に1対1で医療的観察が必要な場合（3点） | 3. 5点 |

注）「強度行動障害児（者）の医療度判定基準 評価の手引き」に基づき評価を行うこと。

「Ⅰ」が10点以上、かつ「Ⅱ」が24点以上。

## 「強度行動障害児(者)の医療度判定基準」評価の手引き

### I 強度行動障害スコア

- 1 行動障害は、過去半年以上その行動が続いている場合を評価する。周期性のある行動障害についても半年を基準に、その行動の出現有無でチェックする。例えば、情緒不安定でパニックを起こしても評価時から6カ月以前の行動であれば該当しない。
- 2 定期薬服用者は服用している状態で評価する（向精神薬・抗てんかん薬など）。
- 3 頓服の不穏時薬・不眠時薬・注射等は使用しない状態で評価する。
- 4 現在身体疾患で一時的にベッド安静などの場合は、半年以内であれば治癒・回復を想定して評価する。半年以上継続していれば現在の状態で評価する。
- 5 評価は年1回以上定期的に行い、複数職種（医師、児童指導員、看護師など）でチェックを行う。
- 6 項目別留意点
  - (1) 「1 ひどい自傷」は、自傷行為を防ぐための装具（ヘッドギアなど）は着用していない状態を想定して評価する。
  - (2) 「4 はげしい物壊し」は、器材や玩具などを自由に使用できる環境を想定して評価する。
  - (3) 「5 睡眠の大きな乱れ」は、問題行動があつて個室使用している場合は大部屋を想定して評価する。
  - (4) 「6 食事関係の強い障害」は、離席や盗食防止のための身体拘束があれば、開放状態を想定して評価する。問題行動のために食事場所を変える・時間をずらすなどの状態であれば本来の場所・時間を想定して評価する。
  - (5) 「7 排泄関係の著しい障害」は、オムツ使用であればその状態で評価する。つなぎなどの予防衣使用者は着用していない状態を想定して評価する。
  - (6) 「8 著しい多動」の項目は、開放病棟・行動制限なしの状況で評価する。

### II 医療度判定スコア

- 1 患者特性に応じた個別の治療をチームとして統一性と一貫性のある計画的な診療を行うため、次を実施することを前提として配点
  - (1) 多面的な治療を計画的に提供するため、医師、看護師、児童指導員、保育士、臨床心理士、作業療法士等から構成されるチームにより、カンファレンスを実施し、患者の治療・観察必要性の評価、治療目標の共有化を図り、各職種の専門性を生かした診療計画を立案。
  - (2) 当該診療計画の実施について、当該チームによる定期的なカンファレンスを実施し、評価を

行い、診療録に記載。

- (3) 患者の状態に応じ、当該診療計画に見直しも行いつつ、評価、計画、実施、再評価のサイクルを重ねる。

## 2 行動障害に対する専門医療の実施有無

- (1) ①の「向精神薬等」とは、抗精神病薬、抗うつ薬、抗躁薬、抗てんかん薬、気分安定薬 (mood stabilizers)、抗不安薬、睡眠導入剤のほか、漢方薬なども含む。
- (2) ②は行動療法・動作法・TEACCHなどの技法を取り入れた薬物療法以外の治療的アプローチによる行動修正を行う専門医療。

## 3 神経・精神疾患の合併状態

- (1) ③の「自閉症等」とは広汎性発達障害全般（自閉症スペクトラム障害全般）を指す。
- (2) ④の「その他の精神疾患」とは、統合失調症、気分障害などを指す。「向精神薬等」は2－(1)と同様。

## 4 身体疾患の合併状態

- (1) ①は抗生剤等の内服・点滴、創部処置、縫合を含む。
- (2) ④は胸部レントゲン検査や抗生剤内服または点滴治療などを含む。
- (3) ⑤の「その他の身体疾患」とは、低体温、GER・反すうを繰り返すことによる嘔吐・誤嚥、眼科・耳鼻科疾患、婦人科的疾患、循環器疾患、骨折やその他の整形外科的疾患、機能悪化・維持・改善のためのリハビリなども含む。

## 5 自傷・他害・事故による外傷等のリスクを有する行動障害への対応

- (1) ①、②、③はいずれか一つをチェックする。
- (2) ②の「個室対応等」とは、個別の環境設定やスケジュール調整などにより、本来は個室使用が必要な患者を個室以外で保護・重点観察している場合も含める。

## 6 患者自身の死亡に繋がるリスクを有する行動障害への対応

現在患者が生活している環境で評価するが、各項目に関連する理由で個室対応や個別の時間での対応を行っている場合は5点とみなす。