

神経学的検査チャート

年 月 日 時 分

患者氏名

患者ID

患者性別 男 女 年齢


- 1) 意識・精神状態 a) 意識 : 清明、異常 ()
 * Japan Coma Scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)
 * Glasgow Coma Scale (E 1, 2, 3, 4, V 1, 2, 3, 4, 5, M 1, 2, 3, 4, 5, 6 total)
 b) 検査への協力 : 協力的、非協力的
 c) けいれん : なし、あり ()
 d) 見当識 : 正常、障害 (時間、場所、人)
 e) 記憶 : 正常、障害 ()
 f) 数字の逆唱 : 286、3529
 g) 計算 : $100 - 7 =$ $93 - 7 =$ $86 - 7 =$
 h) 失行 ()、失認 ()
 2) 言語 正常、失語 ()、構音障害 ()、嚁声、開鼻声
 3) 利き手 右、左
 4) 脳神経

| | 右 | 左 |
|---------|--|--|
| 視力 | 正、低下 | 正、低下 |
| 視野 | 正、  | 正、  |
| 眼底 | 正常、動脈硬化 () 度、出血、白斑、うっ血乳頭、視神経萎縮 | |
| 眼裂 | > = < | |
| 眼瞼下垂 | (-) (+) | (-) (+) |
| 眼球位置 | 正、斜視 ()、偏視 ()、突出 () | |
| 眼球運動 |  |  |
| 眼振 |  |  |
| 複視 | (-) (+) : 方向 () | |
| 瞳孔 大きさ | (正、縮、散) mm > = < mm (正、縮、散) | |
| 形 | 正円、不正 | 正円、不正 |
| 対光反射 | 速、鈍、消失 | 速、鈍、消失 |
| 輻湊反射 | 正常、障害 | |
| 角膜反射 | 正常、障害 | 正常、障害 |
| 顔面感覚 | 正常、障害 | 正常、障害 |
| 上部顔面筋 | 正常、麻痺 | 正常、麻痺 |
| 下部顔面筋 | 正常、麻痺 | 正常、麻痺 |
| 聴力 | 正常、低下 | 正常、低下 |
| めまい | (-) (+) : 回転性・非回転性 () | |
| 耳鳴り | (-) (+) | (-) (+) |
| 軟口蓋 | 正常、麻痺 | 正常、麻痺 |
| 咽頭反射 | (+) (-) | (+) (-) |
| 嚥下 | 正常、障害 () | |
| 胸鎖乳突筋 | 正常、麻痺 | 正常、麻痺 |
| 上部僧帽筋 | 正常、麻痺 | 正常、麻痺 |
| 舌偏倚 | (-) (+) : 偏倚 (右 左) | |
| 舌萎縮 | (-) (+) | (-) (+) |
| 舌線維束性収縮 | (-) (+) | |

- 5) 運動系
- a) 筋トーンス 上肢（右・左、正常 痙縮 強剛 低下）その他（ ）
 下肢（右・左、正常 痙縮 強剛 低下）
- b) 筋萎縮 （-）（+） : 部位（ ）
- c) 線維束性収縮 （-）（+） : 部位（ ）
- d) 関節 変形、拘縮 : 部位（ ）
- e) 不随意運動 （-）（+） : 部位（ ）、性質（ ）
- f) 無動・運動緩慢 （-）（+）
- g) 筋力 正常、麻痺 : 部位（ ）、程度（ ）

| | | 右 | 左 | | 右 | 左 |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| 頸部屈曲 | C1~6 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | 上肢バレー | (-) (+) | (-) (+) |
| 伸展 | C1~T1 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | (下肢バレー) | (-) (+) | (-) (+) |
| 三角筋 | C5,6 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | Mingazzini | (-) (+) | (-) (+) |
| 上腕二頭筋 | C5,6 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | 握力 | kg | kg |
| 上腕三頭筋 | C6~8 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 手関節背屈 | C6~8 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 掌屈 | C6~8,T1 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 母指対立筋 | C8,T1 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 腸腰筋 | L1~4 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 大腿四頭筋 | L2~4 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 大腿屈筋群 | L4,5,S1,2 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 前脛骨筋 | L4,5 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |
| 下腿三頭筋 | S1,2 | 5 4 3 2 1 0 | 5 4 3 2 1 0 | | | |

筋萎縮・感覚



- 6) 感覚系
- a) 触覚 正常、障害 : 部位（ ）
- b) 痛覚 正常、障害 : 部位（ ）
- c) 温度覚 正常、障害 : 部位（ ）
- d) 振動覚 正常、障害 : 部位（ ）
- e) 位置覚 正常、障害 : 部位（ ）
- f) 異常感覚・神経痛 （-）（+） : 部位（ ）


7) 反射

| | 右 | 左 | | 右 | 左 | | 右 | 左 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
| ホフマン | (-) (+) | (-) (+) | バビンスキー | (-) (+) | (-) (+) | | (-) (+) | (-) (+) |
| トレムナー | (-) (+) | (-) (+) | チャドック | (-) (+) | (-) (+) | | (-) (+) | (-) (+) |
| (腹壁) 上 | | | (膝クロース) | (-) (+) | (-) (+) | | (-) (+) | (-) (+) |
| 下 | | | 足クロース | (-) (+) | (-) (+) | | (-) (+) | (-) (+) |

8) 協調運動

| | 右 | 左 |
|--------|-------|-------|
| 指一鼻一指 | 正常、拙劣 | 正常、拙劣 |
| かかと一膝 | 正常、拙劣 | 正常、拙劣 |
| 反復拮抗運動 | 正常、拙劣 | 正常、拙劣 |

- 9) 髄膜刺激徴候 項部硬直 （-）（+）、ケルニツヒ徴候 （-）（+）
- 10) 脊柱 正常、異常（ ）、ラゼーグ徴候 （-）（+）
- 11) 姿勢 正常、異常（ ）
- 12) 自律神経 排尿機能 正常、異常（ ）
 排便機能 正常、異常（ ）
 起立性低血圧 （-）（+）
- 13) 起立、歩行 ロンベルク試験 正常、異常、マン試験 正常、異常
 歩行 正常、異常（ ）
 つぎ足歩行（可能・不可能）、しゃがみ立ち（可能・不可能）



神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師

署名