

```
In [1]: #Experiment No.9
```

```
In [2]: # Aim:To perform and analysis of ANOVA parametric test.

#Name: Sakshi Padmakar Yeole
#Class: 3rd yr(B)
#Subject:ET-II
#Roll no.:69
```

```
In [3]: ages=[10,20,35,50,28,40,55,18,16,55,30,25,43,18,30,28,14,24,16,17,32,35,26,27,65,18,43,23,21,20,19,70,80,81,82,83]
```

```
In [4]: len(ages)
```

```
Out[4]: 56
```

```
In [5]: import numpy as np
```

```
In [6]: sample_size=10
age_sample=np.random.choice(ages,sample_size)
```

```
In [7]: # Python program to implement One-Way f-test
# Importing the required libraries
import scipy.stats
import numpy as np
```

```
In [8]: # Creating sample data
data1 = [0.0842, 0.0368, 0.0847, 0.0935, 0.0376, 0.0963, 0.0684,
0.0758, 0.0854, 0.0855]
data2 = [0.0785, 0.0845, 0.0758, 0.0853, 0.0946, 0.0785, 0.0853,
0.0685]
data3 = [0.0864, 0.2522, 0.0894, 0.2724, 0.0853, 0.1367, 0.853]
```

```
In [9]: # Performing the F-Test
f_test, p_val = scipy.stats.f_oneway(data1, data2, data3)
print("p-value is: ", p_val)
```

```
p-value is: 0.04043792126789144
```

```
In [10]: # taking the threshold value as 0.05 or 5%
if p_val < 0.05:
    print(" We can reject the null hypothesis")
else:
    print("We can accept the null hypothesis")
```

```
We can reject the null hypothesis
```

```
In [11]: variance1 = np.var(data1)
```

```
In [12]: print(variance1)
```

```
0.00040949560000000005
```

```
In [13]: variance2 = np.var(data2)
```

```
In [14]: print(variance2)
```

```
5.3606874999999995e-05
```

```
In [15]: variance3 = np.var(data3)
```

```
variance3 = np.var(data3)  
print(variance3)
```

```
0.06522053346938775
```

In [ ]:

Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata.js