

課後複習筆記 | 體位法到調息法

授課老師：Nandaji

日期：2026/07/25

時間：上午 10:30-12:30；下午 13:30-15:30

地點：新莊禪圓瑜珈工作室

上午 | 後彎中的身體條件與呼吸

Virasana | 英雄坐


在 Virasana | 英雄坐中，小腿肌肉由中間向外撥開，臀部落在兩腳跟之間，膝蓋維持穩定，胸口向上提。

觀察大腿骨是否能向下，以及大腿前側是否限制骨盆的活動。身體向後時，如果大腿前側缺乏延展，骨盆不容易調整，壓力很容易集中到下背。

日常生活中向前彎的動作很多，向後彎相對少。身體前側若缺乏延展，後彎容易由下背先代償。站姿、Virabhadrasana I | 英雄一式、跪姿弓步與俯臥彎腿，都是在準備大腿前側與骨盆的位置。

在 Virabhadrasana I 與弓步中：

- 後腿大腿前側持續延展。
- 骨盆保持穩定，不因腿往後而過度前傾。
- 胸口向上提。
- 手臂上舉時，不讓下背先往前推。



大腿前側僵硬、骨盆活動受限時，後彎容易集中到下背。

單腿 Supta Virasana | 單腿臥英雄式

一側腿維持 Virasana 的方向，另一側腿向前伸直。腿伸直後先檢查骨盆的位置：彎曲腿的膝蓋與髖維持在同一直線上，骨盆保持在中央，不以壓低膝蓋為目標。

如果伸直腿後骨盆一側明顯下降，可在較低的一側加毛毯支持，使骨盆回到較平衡的位置。支撐高度依大腿前側的僵硬程度、膝蓋與關節狀況調整。

停留時感受大腿前側逐漸延展。膝蓋離地仍有距離沒有關係；不要為了讓膝蓋更低，而犧牲膝蓋、髖與骨盆原本的排列。

同時分辨身體的感覺：

- 肌肉伸展可以被觀察與調整。
- 關節疼痛需要立即留意，不能當成伸展感繼續承受。

單腿臥英雄式準備

重點：骨盆在中間，彎曲腿的膝蓋對準同側髖，大腿前側延展。



單腿 Supta Virasana：骨盆在中間；彎曲腿膝蓋對準同側髖，不往內夾，也不往外開。

Dhanurasana | 弓式準備

後側骨盆向下，前側髖部向前、向上，大腿離地。手拉腳的同時，腳也向手的方向推，形成雙向作用。

膝蓋不要散得太開。持續保留大腿前側的延展與骨盆的方向，讓胸腔有空間向前、向上展開，避免力量重新集中到下背。

Ustrasana | 駱駝式

脛骨與小腿向下穩定，大腿前側延展，骨盆向前，薦骨與後側骨盆保持向下的方向。

胸骨向上提，腋窩胸展開，肩膀向下，頭最後才往後。手是否碰到腳不是判斷後彎的標準；腿與骨盆先穩定，胸口持續向上，後彎才不會只集中在腰椎。

如果骨盆只是往前頂、下背出現擠壓，而胸口沒有繼續上提，就需要重新調整腿、骨盆與胸腔的位置。



Ustrasana | 駱駝式：骨盆向前、胸口上提、腋窩胸展開，下背避免擠壓。

姿勢中的呼吸

進入後彎後，留意呼吸是否仍然流動。

如果胸腔被固定、身體過度僵硬或用力，可能在沒有察覺的情況下停止呼吸。呼吸一旦卡住，可先從吐氣開始，再重新調整姿勢，不靠屏息延長停留時間。

有意識的止息，與因身體僵硬而無法呼吸，是不同的狀態。後者不屬於 Pranayama | 調息法中的止息練習。

下午 | 從支持式體位進入呼吸

Supta Virasana | 臥英雄式／Baddha Konasana | 束角式

先從有支撐的仰躺位置開始，可依身體狀況選擇 Supta Virasana | 臥英雄式或 Baddha Konasana | 束角式。

抱枕、毛毯與瑜伽磚的高度依軀幹長度與身體狀況調整，使胸腔能展開，同時減少不必要的緊繃。

在支持式後彎中：

- 雙腿仍然保持工作。
- 內側腳跟延展。
- 大腿向內轉。

- 大腿上端向下穩定。
- 脊椎延長，胸口展開。
- 肩膀調整後，手臂逐漸放鬆。

另一個支撐版本讓薦骨得到支持，頭與肩膀都能休息。下背不應出現壓力；胸口仍保持提起，外側肩膀向下穩定，腹部保持柔軟。

胸腔打開後，觀察呼吸是否改變。呼吸可能變得更容易被感覺，也可能自然延長。



Supta Virasana | 臥英雄式與 Baddha Konasana | 束角式：依身體條件選擇支撐版本。

自然呼吸的觀察

先不改變呼吸，只看現在的狀態：

- 右鼻孔與左鼻孔的氣流是否相同？
- 哪一側比較明顯？
- 是否一直固定在同一側？
- 吸氣與吐氣哪一個比較長？
- 不同時間的呼吸模式是否會改變？

左右鼻孔的氣流會自然交替，一段時間可能右側較明顯，之後換成左側。每個人的呼吸都有自己的模式與條件。



先觀察左右鼻孔自然氣流，不急著改變呼吸。

吸氣與吐氣的長度也先從自然狀態觀察。若自然吐氣約 5 拍，可在能力範圍內稍微增加 2、3 拍，例如延長到 7、8 拍，不需要追求 15、20 拍。

延長只比原來多一點，保持呼吸順暢、可持續。較長、較安靜的吐氣可能讓心念逐漸安定，覺察更清楚。依瑜伽的觀點，Pranayama 更深的方向在於 Prana | 生命能量的調節與平衡。

呼吸之間的短暫間隙

吸氣結束、吐氣開始之前，本來就存在很短的間隙。先認識這個自然的空間，不急著把它變成長時間的屏息；若要延長，也只從原本自然的間隙增加一點點。

止息需要身體與日常生活狀態有足夠的準備。課堂用電器的電壓與容量作比喻：電器只能承受一定範圍的電流，超出容量就可能損壞；身體尚未準備好時，也不適合急著做強烈或長時間的止息。

飲食、睡眠、工作與日常生活狀態，都會影響是否適合進一步發展止息練習。

自由潛水也會訓練屏息，但主要著重身體、生理與肺容量；Pranayama 的目的並不只是延長閉氣時間。

橫隔膜與下方肋骨

坐直，頭稍微低下，手放在下方肋骨與橫隔膜附近，先維持平常的吸氣與吐氣。

觀察下方肋骨與橫隔膜周圍的活動，包含前方、後方與兩側。若只感覺到前後移動，再留意兩側是否也有拓寬。



吸氣時，留意下方肋骨向兩側拓寬與橫隔膜向下的活動。

橫隔膜位在胸腔與腹腔之間，是穹頂狀的肌肉。吸氣時肺部擴張，橫隔膜向下移動，因此腹部與骨盆底周圍也可能出現移動感；吐氣時逐漸回到原來的位置。

腹部向前或向後移動，不表示空氣真的進入腹部；看到的是橫隔膜與周圍組織因呼吸產生的活動。

延長呼吸時避免刻意使用腹部肌肉。腰腹一旦用力收緊，橫隔膜的活動反而更難被感覺。

仰躺觀察橫隔膜

仰躺時以毛毯支持身體，調整薦骨與脊椎，使後腦休息、肩膀向下，軀幹保持延長。

腿先保持適度工作，之後逐漸放鬆；手臂向外轉，掌心朝上。

先讓呼吸回到安靜、自然的狀態，再觀察胸腔、肋骨與橫隔膜的活動，尤其是吸氣時向兩側拓寬的感覺。

坐姿時可以用手確認下方肋骨的移動；仰躺時拿掉手的觸碰，仍然嘗試感覺同樣的變化。

坐姿與胸腔空間

坐姿可利用抱枕、瑜伽磚與毛毯墊高骨盆，減少維持脊椎直立所需的用力，也降低鼠蹊、膝蓋與腳踝的壓力。

膝蓋與髖維持適當排列，關節保持自由。肩膀向後、向下，胸口保持展開；即使手臂放鬆下來，胸口也不要跟著塌陷。

日常坐姿同樣會影響呼吸。如果一天大部分時間都在脊椎塌陷、胸口閉合的位置，只在調息的十幾分鐘裡打開胸腔，原本的姿勢習慣仍會限制呼吸空間。

基本 Pranayama | 調息練習

先從自然呼吸開始，觀察吸氣與吐氣的長度，讓注意力逐漸安定。之後在自己原本的呼吸上稍微延長，做 2-3 次，再回到自然呼吸恢復。

自然呼吸 → 觀察 → 稍微延長 → 2-3 次 → 回到自然呼吸 → 恢復 → 再開始下一輪

延長時同時留意橫隔膜的活動，吸氣與吐氣之間保持可承受的平衡。

如果現在吐氣還沒有比吸氣長，不必強迫改變。避免吸氣很長、吐氣明顯太短，也避免吐氣很長、吸氣只剩很短。

數拍可用心裡大致計數或自己的內在節奏，不需要用碼錶追求精確秒數。

如果開始時能維持某個呼吸長度，幾輪後卻逐漸縮短，或坐姿開始失去支持，表示身體正在疲勞。此時回到自然呼吸或結束練習，比繼續勉強延長更合適。

常規練習

單腿 Supta Virasana | 單腿臥英雄式

接近每天練習，每側至少停留 1 分鐘，持續到大腿前側的延展逐漸改善。練習時維持骨盆在中央、膝蓋與髖在同一直線上，不以把膝蓋壓低為目標。

Pranayama | 調息法

每天約 15-20 分鐘，從自然呼吸觀察與少量延長開始，不需要一次練很多技巧。延長 2-3 次後回到自然呼吸恢復，再視當下狀態進入下一輪。

可嘗試連續練習至少 48 天，不因週末或假日中斷，觀察身體、呼吸與心念的變化。疲累、睡眠不足與當天的身體狀態都會影響練習，因此每天先從觀察當下開始，再決定今天適合做到哪裡。

Śavāsana | 大休息式

最後躺下，讓頸部與肩膀放鬆，手臂向外轉，身體完全放下。

不再調節呼吸，讓呼吸回到自然狀態，安靜休息。