

موضوع الرياضيات لشعبة العلوم التجريبية في بكالوريا 2011

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: جوان 2011

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 ساعات ونصف

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول: (03 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 3u_n + 1$

(v_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + \frac{1}{2}$

في كل حالة من الحالات الثلاث الآتية اقترحت ثلاث إجابات، إجابة واحدة فقط منها صحيحة، حددها مع التعليل.

1. المتتالية (v_n) :

أ - حسابية.

ب - هندسية.

ج - لا حسابية ولا هندسية.

2. نهاية المتتالية (u_n) هي :

أ - $+\infty$

ب - $-\frac{1}{2}$

ج - $-\infty$

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n = -\frac{1}{2} [1 + e^{\ln 3} + e^{2\ln 3} + e^{3\ln 3} + \dots + e^{n\ln 3}]$

أ - $S_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$

ب - $S_n = \frac{1 - 3^n}{4}$

ج - $S_n = \frac{1 - 3^{n+1}}{4}$

التمرين الثاني: (05 نقاط)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، المستوى (\mathcal{P}) الذي يشمل النقطة

$A(1; -2; 1)$ و $\vec{n}(-2; 1; 5)$ شعاع ناظمي له ؛ وليكن (\mathcal{Q}) المستوى ذا المعادلة $x + 2y - 7 = 0$.

1. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (\mathcal{P}) .

2. أ - تحقق أن النقطة $B(-1; 4; -1)$ مشتركة بين المستويين (\mathcal{P}) و (\mathcal{Q}) .

ب - بين أن المستويين (\mathcal{P}) و (\mathcal{Q}) متقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

3. لتكن النقطة $C(5; -2; -1)$

أ - احسب المسافة بين النقطة C والمستوي (\mathcal{P}) ثم المسافة بين النقطة C والمستوي (\mathcal{Q}) .

ب - أثبت أن المستويين (\mathcal{P}) و (\mathcal{Q}) متعامدان.

ج - استنتج المسافة بين النقطة C والمستقيم (Δ) .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A ، B و C التي لاحقاتها على

الترتيب: $z_C = -4 + i$ ، $z_B = 2 + 3i$ ، $z_A = -i$ و

1. أ - اكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

ب - عيّن طولية العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ وعمدة له ؛ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

2. نعتبر التحويل النقطي T في المستوي الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z ، النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث:

$$z' = iz - 1 - i$$

أ - عيّن طبيعة التحويل T محددا عناصره المميزة.

ب - ما هي صورة النقطة B بالتحويل T .

3. لتكن D النقطة ذات اللاحقة $z_D = -6 + 2i$.

أ - بين أن النقط A ، C و D في استقامة.

ب - عيّن نسبة التحاكي h الذي مركزه A ويحول النقطة C إلى النقطة D .

ج - عيّن العناصر المميزة للتشابه S الذي مركزه A ويحول B إلى D

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$: $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$

و (\mathcal{C}_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ (الشكل المقابل) ، بقراءة بيانية:

أ - شكل جدول تغيرات الدالة g .

ب - حل بيانيا المتراجحة $g(x) > 0$.

ج - عيّن بيانيا قيم x التي يكون من أجلها $0 < g(x) < 1$

(II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$: $f(x) = \frac{x-1}{x+1} + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$.

و (\mathcal{C}_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2. أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$ ، $g'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$.

ب - احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

3. أ - باستعمال الجزء (I) السؤال ج - ، عيّن إشارة العبارة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1; +\infty[$.

ب - α عدد حقيقي.

بين أن الدالة $x \mapsto (x - \alpha) \ln(x - \alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x - \alpha)$ على المجال $[\alpha; +\infty[$.

ج - تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$ ، $g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$ ، ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1; +\infty[$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول (04 نقاط)

α عدد حقيقي موجب تماما ويختلف عن 1.

(u_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بـ : $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$ ،

(v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$ ،

1. أ - بَيِّنْ أَنْ (v_n) متتالية هندسية أساسها α .

ب - اكتب بدلالة n و α ، عبارة v_n ثم استنتج بدلالة n و α ، عبارة u_n .

ج - عَيِّنْ قِيَمَ العدد الحقيقي α التي تكون من أجلها المتتالية (u_n) متقاربة .

2. نضع $\alpha = \frac{3}{2}$.

- احسب بدلالة n ، المجموعين T_n و S_n حيث : $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ و $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ($O; \vec{u}, \vec{v}$) ، النقط A ، B و C التي لاحقاتها على الترتيب :

$$z_A = 3 - 2i \quad , \quad z_B = 3 + 2i \quad , \quad z_C = 4i$$

1. أ - عَلمْ النقط A ، B و C .

ب - ما طبيعة الرباعي $OABC$ ؟ عَلمْ إجابتك .

ج - عَيِّنْ لاحقة النقطة Ω مركز الرباعي $OABC$.

2. عَيِّنْ ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق : $\|\vec{MO} + \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 12$.

3. أ - حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} ، المعادلة ذات المجهول z التالية : $z^2 - 6z + 13 = 0$.

نسمي z_0 ، z_1 حلي هذه المعادلة .

ب - لنكن M نقطة من المستوي لاحقتها العدد المركب z .

- عَيِّنْ مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق : $|z - z_0| = |z - z_1|$.

التمرين الثالث : (05 نقاط)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) النقط $A(0;1;5)$ ، $B(2;1;7)$ و $C(3;-3;6)$.

1. أ - اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة B و $\vec{u}(1;-4;-1)$ شعاع توجيه له .

ب - تحقق أن النقطة C تنتمي إلى المستقيم (Δ) .

ج - بَيِّنْ أن الشعاعين \vec{AB} و \vec{BC} متعامدان .

د - استنتج المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ) .

2. نعتبر النقطة $M(2+t; 1-4t; 7-t)$ حيث t عدد حقيقي ؛ ولتكن الدالة h المعرفة على \mathbb{R} بـ : $h(t) = AM$.
 أ - اكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t .

ب - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي t ؛ $h'(t) = \frac{18t}{\sqrt{18t^2 + 8}}$.

ج - استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي تكون من أجلها المسافة AM أصغر ما يمكن .
 - قارن بين القيمة الصغرى للدالة h ، و المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ) .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بـ : $f(x) = e^x - ex - 1$.

(\mathcal{C}_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ - احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب - احسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها .

ج - شكّل جدول تغيرات الدالة f .

2. أ - بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -ex - 1$ مقارب مائل للمنحنى (\mathcal{C}_f) بجوار $(-\infty)$.

ب - اكتب معادلة للمستقيم (T) مماس للمنحنى (\mathcal{C}_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

ج - بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]1,75; 1,76[$ حلا وحيدا α .

د - ارسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحنى (\mathcal{C}_f) على المجال $]-\infty; 2]$.

3. أ - احسب بدلالة α ، المساحة $A(\alpha)$ للحيّز المستوي المحدّد بالمنحنى (\mathcal{C}_f) و حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتيهما : $x = \alpha$ و $x = 0$.

ب - أثبت أن : $A(\alpha) = \left(\frac{1}{2}e\alpha^2 - e\alpha + \alpha \right) ua$ (ua هي وحدة المساحات) .

حل الموضوع الأول

التمرين الأول :

1. المتتالية بد (v_n) هندسية وأساسها 3 لأن من أجل كل عدد طبيعي n ،
 لدينا $v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{2}$ ومنه: $v_{n+1} = 3u_n + 1 + \frac{1}{2}$ ، ومنه $v_{n+1} = 3\left(u_n + \frac{1}{2}\right)$ ،
 أي: $v_{n+1} = 3v_n$.
 2. نهاية المتتالية (u_n) هي : أ. $+\infty$ لأن:
 لدينا $v_n = v_0 \times 3^n$ وبما أن $3 > 1$ و $v_0 = u_0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ ،
 ولكون: $u_n = v_n - \frac{1}{2}$ نستنتج أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 3. ج- $S_n = \frac{1-3^{n+1}}{4}$ لأن:

$$\begin{aligned} S_n &= -\frac{1}{2} \left[1 + e^{\ln 3} + e^{2\ln 3} + e^{3\ln 3} + \dots + e^{n\ln 3} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[1 + e^{\ln 3} + e^{\ln 3^2} + e^{\ln 3^3} + \dots + e^{\ln 3^n} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n \right] \end{aligned}$$

حيث المجموع $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n$ هو مجموع $n+1$ حداً لمتتالية هندسية أساسها 3

$$S_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1-3^{n+1}}{1-3} \right) = \frac{1-3^{n+1}}{4} \text{ ومنه:}$$

التمرين الثاني :

1. المستوي (p) هو مجموعة النقط $M(x; y; z)$ بحيث: $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

لدينا: $\vec{n}(-2; 1; 5)$ و $\overrightarrow{AM}(x-1; y+2; z-1)$ ومنه بعد الحساب والتبسيط نجد:

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \text{ تكافئ } (p): -2x + y + 5z - 1 = 0$$

2. أ- بتعويض إحداثيات B في معادلة (p) نجد $-2(-1) + 4 + 5(-1) - 1 = 0$ محققة

ومنه $B \in (p)$ ، وبتعويض إحداثيات B في معادلة (Q) نجد $-1 + 2(4) - 7 = 0$ محققة

ومنه $B \in (Q)$ ، إذن B مشتركة بين (p) و (Q) .

ب- لدينا $\vec{n}(-2;1;5)$ شعاع ناظم للمستوي (p) و $\vec{n}'(1;2;0)$ شعاع ناظم

للمستوي (Q) غير مرتبطين خطيا لأن: $\frac{1}{-2} \neq \frac{2}{1}$ ومنه (p) و (Q) متقاطعان وفق

$$\begin{cases} -2x + y + 5z - 1 = 0 \\ x + 2y - 7 = 0 \end{cases} \quad \text{مستقيم } (\Delta) \text{ تمثيل ديكارتي له:}$$

$$\text{وبوضع مثلا } z = t \text{ نستنتج من الجملة الأخيرة الجملة } \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t + 3 \\ z = t \end{cases} \text{ وهي تمثيل وسيطي}$$

للمستقيم (Δ) ، حيث t وسيط حقيقي.

3. لتكن النقطة $C(5;-2;-1)$

$$d_1 = d(C; (P)) = \frac{|(-2)5 + (-2) + 5(-1) - 1|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 5^2}} = \frac{18}{\sqrt{30}} \quad \text{أ- لدينا:}$$

$$d_2 = d(C; (Q)) = \frac{|5 + 2(-2) - 7|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} \quad \text{ولدينا:}$$

ب- لدينا بالحساب: $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ ومنه المستويان (p) و (Q) متعامدين.

$$d(C; (\Delta)) = \sqrt{\left(\frac{18}{\sqrt{30}}\right)^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{5}}\right)^2} \quad \text{ج- لدينا: } d(C; (\Delta)) = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} \quad \text{ومنه:}$$

$$d(C; (\Delta)) = \sqrt{18} \quad \text{أي:}$$

التمرين الثالث:

$$1. \text{ أ- لدينا: } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i \quad \text{إذن: } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(-4 + 2i)(2 - 4i)}{(2 + 4i)(2 - 4i)} = \frac{20i}{20} = i$$

$$\text{ب- لدينا: } \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = |i| = 1 \quad \text{و } \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$$

وبما أن: $\frac{AC}{AB} = 1$ و $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{2}$ فإن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في A .

2. النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = iz - 1 - i$.

أ- العبارة المركبة للتحويل T هي من الشكل $z' = az + b$ ، حيث $a = i$ و

$$b = -1 - i$$

بما أن a مركب غير حقيقي و $|a|=1$ فإن T دوران زاويته $\frac{\pi}{2}$ ، ومركزه النقطة

ذات اللاحقة $z_A = -i = \frac{(-1-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = -i$ ، ومنه النقطة A هي مركز الدوران T .

ب- بما أن: $AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$ فإن صورة النقطة B بالتحويل T هي النقطة C .

$$3. \text{ أ- لدينا: } \frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} = \frac{-4+2i}{-6+3i} = \frac{2}{3}$$

بما أن $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A}$ حقيقي فإن النقط A ، C و D في استقامة.

ب- لتكن k نسبة التحاكي h ، لدينا: $z_D - z_A = k (z_C - z_A)$ ومنه:

$$k = \frac{3}{2} \text{ ، إذن: } k = \frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} = \frac{3}{2}$$

ج- لدينا: $T(B) = C$ و $h(C) = D$ ومنه: $(hot)(B) = D$ ، أي: $S(B) = D$

وبالتالي نسبة التشابه S هي نسبة التحاكي h أي $\frac{3}{2}$ ، وزاويته هي زاوية الدوران T أي $\frac{\pi}{2}$.

التمرين الرابع:

I (أ- جدول تغيرات الدالة g :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$		+	+
$g(x)$	1	$+\infty$	1

ب- $g(x) > 0$ تكافئ $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$.

ج- $0 < g(x) < 1$ تكافئ $x \in]1; +\infty[$.

II (لتكن f الدالة المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{x-1}{x+1} + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

1. بما أن $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x+1} = \frac{0^+}{2} = 0^+$ فإن: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$

ومنه: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1$ و $\lim_{X \rightarrow 1} \ln X = \ln 1 = 0$ فإن:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = 0 \text{ ومنه: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

نستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل المستقيم الذي معادلته $x = 1$ كمستقيم مقارب بجوار $-\infty$ ويقبل المستقيم الذي معادلته $y = 1$ كمستقيم مقارب عند $+\infty$.

2. أ- من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$:

$$g'(x) = \frac{1 - (-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

ب- الدالة f تقبل الاشتقاق على المجال $]1; +\infty[$ ولدينا:

$$f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{\frac{2}{x-1}}{x+1}$$

بما أن: $\frac{2}{(x+1)^2} > 0$ و $\frac{x-1}{x+1} > 0$ على المجال $]1; +\infty[$ فإن: $f'(x) > 0$

وبالتالي الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1; +\infty[$.

جدول تغيرات الدالة f :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		$-\infty \rightarrow 1$

ب- $g(x) > 0$ تكافئ $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$

3. أ- جدول إشارة العبارة $\ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$ على المجال $]1; +\infty[$:

x	1	$+\infty$
$\ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$		-

ب- الدالة $x \mapsto (x - \alpha) \ln(x - \alpha) - x$ تقبل الاشتقاق على المجال $]I; +\infty[$ كونها عبارة عن مجموع ومركب وجداء دوال قابلة للاشتقاق على المجال $]I; +\infty[$ ، كما أن

$$x \mapsto I \times \ln(x - \alpha) + \cancel{(x - \alpha)} \times \frac{I}{\cancel{(x - \alpha)}} - I : \text{مشتقتها هي الدالة :}$$

$$x \mapsto \ln(x - \alpha) : \text{أي الدالة :}$$

ومنه الدالة $x \mapsto (x - \alpha) \ln(x - \alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x - \alpha)$ على المجال $]I; +\infty[$.

ج- من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]I; +\infty[$:

$$1 - \frac{2}{x+1} = \frac{x+1-2}{x+1} = \frac{x-1}{x+1} = g(x)$$

من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]I; +\infty[$:

$$f(x) = 1 - \frac{2}{x+1} + \ln(x-1) - \ln(x+1)$$

وبالتالي الدالة F حيث:

$$F(x) = x - 2 \ln(x-1) + [(x-1) \ln(x-1) - x] - [(x+1) \ln(x+1) - x]$$

$$\text{أي: } F(x) = x + [(x-1) \ln(x-1)] - [(x+3) \ln(x+1) - x]$$

هي دالة أصلية للدالة f على المجال $]I; +\infty[$.

حل الموضوع الثاني

التمرين الأول :

1. أ- من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{\alpha - 1}$ ، ومنه:

$$v_{n+1} = \alpha u_n + 1 + \frac{1}{\alpha - 1} \text{ ، ومنه: } v_{n+1} = \alpha u_n + \frac{\alpha}{\alpha - 1}$$

أساسها α . $v_{n+1} = \alpha v_n$ أي: $v_{n+1} = \alpha \left(u_n + \frac{1}{\alpha - 1} \right)$ وهذا معناه أن (v_n) متتالية هندسية

ب- $v_n = v_0 \times \alpha^n$ حيث $v_0 = u_0 + \frac{1}{\alpha - 1} = 6 + \frac{1}{\alpha - 1}$ أي: $v_0 = \frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}$

ومنه: $v_n = \left(\frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1} \right) \alpha^n$

ولدينا: $u_n = v_n - \frac{1}{\alpha - 1}$ ، ومنه: $u_n = \left(\frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1} \right) \alpha^n - \frac{1}{\alpha - 1}$

ج- تكون المتتالية (u_n) متقاربة من أجل $-1 < \alpha < 1$

2. من أجل $\alpha = \frac{3}{2}$ لدينا $u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n + 1$ و $v_n = u_n + \frac{1}{\frac{3}{2} - 1}$

لدينا: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{\alpha^{n+1} - 1}{\alpha - 1}$ ، من أجل $\alpha = \frac{3}{2}$ لدينا $v_0 = \frac{6 \times \frac{3}{2} - 5}{\frac{3}{2} - 1}$

أي: $v_0 = 8$ ، ومنه: $S_n = 8 \times \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{3}{2} - 1}$ ، أي: $S_n = 16 \times \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1 \right]$

لدينا: $u_n = v_n - 2$ ، أي: $u_n = v_n - \frac{1}{\frac{3}{2} - 1} = v_n - \frac{1}{\frac{3}{2} - 1}$


ومنه: $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (v_0 - 2) + (v_1 - 2) + (v_2 - 2) + \dots + (v_n - 2)$

أي: $T_n = (v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + \dots + (-2)$

$$T_n = 16 \times \left[\left(\frac{3}{2} \right)^{n+1} - 1 \right] - 2(n+1) \text{ ، وبالتالي: } T_n = S_n - 2(n+1) \text{ ومنه:}$$

التمرين الثاني :

النقط A ، B و C لواحقها على الترتيب: $z_A = 3 - 2i$ ، $z_B = 3 + 2i$ ، $z_C = 4i$.
1. أ- تعليم النقط $A(3; -2)$ ، $B(3; 2)$ و $C(0; 4)$:



ب- لدينا: $z_{\overline{AB}} = z_B - z_A = 4i$ ، و $z_{\overline{OC}} = z_C - z_O = 4i$ ، ومنه: $z_{\overline{AB}} = z_{\overline{OC}}$

أي: $\overline{AB} = \overline{OC}$ وبالتالي الرباعي $OABC$ متوازي أضلاع.


ج- النقطة Ω مركز الرباعي $OABC$ هي مرجح الجملة:

$$z_{\Omega} = \frac{z_O + z_A + z_B + z_C}{4} \text{ ، ومنه: } \{(O, 1); (A, 1); (B, 1); (C, 1)\}$$

$$\text{بالحساب نجد } z_{\Omega} = \frac{3}{2} + i$$

$$2. \quad \|\overline{MO} + \overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC}\| = 12 \text{ تكافئ } \|4\overline{M\Omega}\| = 12 \text{ ، ومنه: } 4M\Omega = 12$$

أي: $M\Omega = 3$. وبالتالي (E) هي الدائرة ذات المركز Ω ونصف القطر 3



3. أ- ممیز المعادلة $z^2 - 6z + 13 = 0$ هو $\Delta = -16 = (4i)^2$.

ومنه $z_1 = \overline{z_0} = 3 + 2i = z_B$ و $z_0 = \frac{6 - 4i}{2} = 3 - 2i = z_A$.

ب- $|z - z_0| = |z - z_1|$ تكافئ $|z - z_A| = |z - z_B|$ أي $AM = BM$ ومنه مجموعة النقط هي محور القطعة المستقيمة $[AB]$ ولكون A و B متناظرتين بالنسبة إلى محور الفواصل فإن مجموعة النقط هي حامل محور الفواصل.
التمرين الثالث :

1. أ- المستقيم (Δ) هو مجموعة النقط $M(x; y; z)$ بحيث: أي، $\begin{cases} x = 2 + 1 \times t \\ y = 1 + (-4) \times t \\ z = 7 + (-1) \times t \end{cases}$

حيث t وسيط حقيقي. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 4t \\ z = 7 - t \end{cases}$


ب- بتعويض احداثيات النقطة C في التمثيل الوسيط لـ (Δ) نجد: $\begin{cases} 3 = 2 + t \\ -3 = 1 - 4t \\ 6 = 7 - t \end{cases}$

ومنه: $\begin{cases} t = 1 \\ t = 1 \\ t = 1 \end{cases}$. بما أن t وحيد فإن النقطة C تنتمي إلى المستقيم (Δ) .

جـ- لدينا: $\overrightarrow{AB}(2;0;2)$ و $\overrightarrow{BC}(1;-4;-1)$.

بما أن: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2 \times 1 + 0 \times (-4) + 2 \times (-1) = 0$ فإن الشعاعين \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{BC} متعامدان.

$$d(A;(\Delta)) = AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad \text{د -}$$



2. نعتبر النقطة $M(2+t; 1-4t; 7-t)$ حيث t عدد حقيقي، ولتكن الدالة h المعرفة على \mathbb{R} بـ: $h(t) = AM$.

$$\text{أ- لدينا: } h(t) = \sqrt{(2+t)^2 + (-4t)^2 + (2-t)^2} \quad \text{ومنه: } h(t) = \sqrt{18t^2 + 8}$$

$$\text{ب- من أجل كل عدد حقيقي } t \text{ لدينا: } h'(t) = \frac{18 \times 2t}{2\sqrt{18t^2 + 8}}$$

$$\text{ومنه: } h'(t) = \frac{18t}{\sqrt{18t^2 + 8}}$$

جـ- إشارة $h'(t)$ هي من نفس إشارة $18t$ ومنه جدول إشارة $h'(t)$:

t	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(t)$	$-$	0	$+$

تكون المسافة AM أصغر ما يمكن من أجل $t = 0$.

$$\text{من أجل } t = 0 \text{ يكون } h(0) = \sqrt{18 \times 0^2 + 8} \quad \text{أي: } h(0) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{نلاحظ أن: } d(A;(\Delta)) = h(0)$$

التمرين الرابع:

$$1. \text{ أ- لدينا: } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} (-ex - 1) = +\infty \text{ ومنه: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{ولدينا: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - e - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{ولكون: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ نستنتج أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - e - \frac{1}{x} \right) = +\infty$

ومنه: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ب- الدالة f تقبلا الاشتقاق على \mathbb{R} ولدينا: $f'(x) = e^x - e$
إشارة $f'(x)$:

$f'(x) = 0$ تكافئ $e^x = e$ أي $x = 1$.

$f'(x) < 0$ تكافئ $e^x < e$ أي $x < 1$.

$f'(x) > 0$ تكافئ $e^x > e$ أي $x > 1$.

وبالتالي الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 1]$ و متزايدة تماما على المجال $[1; +\infty[$.
ج- جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

حيث: $f(1) = e^1 - e - 1 = -1$

2. أ- بما أن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-ex - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ فإن المستقيم (Δ) ذا

المعادلة $y = -ex - 1$ مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $(-\infty)$.

ب- معادلة المستقيم (T) من الشكل: $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ ،

حيث: $f(0) = e^0 - e \times 0 - 1 = 0$ و $f'(0) = e^0 - e = 1 - e$ ومنه: $y = (1 - e)x$ (T) .


ج- المجال $[1, 75; 1, 76]$ محتوئ في المجال $[1; +\infty[$ وبالتالي الدالة f مستمرة و متزايدة تماما

على المجال $[1, 75; 1, 76]$ ولكون $f(1, 75) \approx -0,002 < 0$ و $f(1, 76) \approx 0,02 > 0$

نستنتج حسب مبرهنة القيم المتوسطة ، المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $[1, 75; 1, 76]$ حلا وحيدا α ، أي يحقق $f(\alpha) = 0$.

د - رسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحنى (C_f) في المجال $]-\infty; 2]$:

$f(2) \approx 0,95$



3. أ- على المجال $[0; \alpha]$ الدالة f سالبة ومنه: $A(\alpha) = -\int_0^{\alpha} f(x) dx$ ، ومنه:

$$A(\alpha) = \left(1 - e^{\alpha} + \frac{1}{2} e \alpha^2 + \alpha \right) (ua) \quad \text{بالحساب نجد: } A(\alpha) = - \left[e^x - \frac{e}{2} x^2 - x \right]_0^{\alpha}$$

بدلنا: $f(\alpha) = 0$ أي $e^{\alpha} - e\alpha - 1 = 0$ ومنه: $e^{\alpha} = e\alpha + 1$ ، بالتعويض في $A(\alpha)$

$$\text{نجد: } A(\alpha) = \left(1 - e\alpha - 1 + \frac{1}{2} e \alpha^2 + \alpha \right) (ua) \text{، أي: } A(\alpha) = \left(\frac{1}{2} e \alpha^2 - e\alpha + \alpha \right) ua$$