

①

$$\text{Volt} = \text{Ampere} * \text{Ohm}$$

$$\text{Ampere} * \text{second} = \text{Coulomb}$$


$$\text{Farad} * \text{Volt} = \text{Coulomb}$$

$$\text{Farad} * \text{Volt/second} = \text{Ampere}$$

$$\text{Farad} * \text{Ohm} = \text{second}$$

1)


①



$$E = \sum |V| \sim k_B T$$

$$|V| = \frac{k_B T}{\sum} = V_T \approx 25 \text{ mV}$$

2)



$$V_1 - V_2 = IR_L$$

$$R_L \sim \frac{L}{A} = \frac{r_L L}{A}$$

$$r_L = 1 \text{ k}\Omega\text{-mm}$$

example

$$L = 100 \mu\text{m} = 0.1 \text{ mm}$$

$$a \approx 2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

$$A = \pi a^2$$

(2)

$$R_L = \frac{(10^3 \Omega \cdot \text{mm})(0.1 \text{ mm})}{\pi \cdot 4 \times 10^{-6} \text{ mm}^2}$$

$$= \frac{10^2 \Omega}{1.2 \times 10^{-5}} = \frac{10}{1.2} \times 10^6 \Omega$$

$$\sim 8 \text{ M}\Omega$$

example 2

$$g_L = \frac{1}{R_L} = \frac{A}{r_L L}$$

channel

$$L = 6 \mu\text{m} = 6 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

$$A = 0.15 \text{ nm}^2 = 15 \times 10^{-14} \text{ mm}^2$$

$$g_L = \frac{15 \times 10^{-14} \text{ mm}^2}{6 \times 10^{-6} \text{ mm} \cdot 10^3 \Omega \cdot \text{mm}} = 2.5 \times 10^{-11} \text{ S}$$

$$= 25 \times 10^{-12} \text{ S} = 25 \text{ pS}$$


$$V_1 - V_2 = 8 \text{ mV}$$

③

$$I = \frac{8 \text{ mV}}{8 \text{ M}\Omega} = 10^{-9} \text{ A} = 1 \text{ nA}$$

3)

a)



$$I_m = g_m (V - E)$$

$E = \text{resting potential} \approx -70 \text{ mV}$

$$\Delta V = V - E \quad I_m = g_m \Delta V$$

$$g_m \sim A_m \quad R_m = \frac{1}{g_m} = \frac{r_m}{A}$$

$$r_m = 1 \text{ M}\Omega \text{ mm}^2$$

$$A_m = 0.1 \text{ mm}^2$$


$$R_m = 10 \text{ M}\Omega$$

for $\Delta V = 10 \text{ mV}$

$$I = \frac{10 \text{ mV}}{10 \text{ M}\Omega} = 1 \text{ nA}$$

b)

(4)



$$R_L = \frac{r_L L}{\pi a^2} \quad R_m = \frac{r_m}{2\pi a L}$$

what L makes

$$R_L = R_m$$


$$\frac{r_L L}{\pi a^2} = \frac{r_m}{2\pi a L}$$

$$L^2 = \frac{r_m}{r_L} \frac{\pi a^2}{2\pi a} = \frac{a r_m}{2 r_L}$$

$$L = \sqrt{\frac{a r_m}{2 r_L}} \approx 1 \text{ mm}$$

4)

5



$$Q = CV$$

$$C = c_m A \quad c_m = 10 \text{ nF/mm}^2$$

$$C = 10 \text{ nF} \times 0.1 = 1 \text{ nF}$$

$$Q = 70 \text{ mV} \cdot 1 \text{ nF} = 7 \times 10^{-11} \text{ C}$$

$$\approx 10^9 \text{ charges}$$

$$= 10^{-5} \text{ of charges in cell}$$

$$Q = 0.7 \text{ nA} \cdot 100 \text{ ns} = 7 \times 10^{-11} \text{ C}$$

$$\frac{dQ}{dt} = I = C \frac{dV}{dt}$$

$$I = \text{positive inward}$$

$$I = g_m (V - E) \text{ is positive outward } \textcircled{6}$$

so

$$C \frac{dV}{dt} = -g_m (V - E) + I_{ext}$$

$$10^{-9} F \times \frac{\text{mV}}{\text{ms}} = 10^{-9} \text{ amps} = 1 \text{ nA}$$


5) E ?

$$I_m = g_K (V - E_K) + g_{Na} (V - E_{Na}) + \dots$$

$$g_m = g_K + g_{Na} + \dots$$

$$E = \frac{g_K E_K + g_{Na} E_{Na} + \dots}{g_K + g_{Na} + \dots}$$

(7)



$$I_{\text{injected}} = [out] p_{\text{cross}}$$

$$I_{\text{outward}} = [in] p_{\text{cross}} e^{-q|V|/k_B T}$$

$$= [in] p_{\text{cross}} e^{\frac{V}{V_T}}$$

$V = E$ at zero net current

$$[out] p_{\text{cross}} = [in] p_{\text{cross}} e^{\frac{E}{V_T}}$$

$$e^{qE/V_T} = \frac{[out]}{[in]}$$

⑧

$$E = V_T \ln \left(\frac{[C_{out}]}{[C_{in}]} \right) \quad \text{Nernst Potential}$$

for multiply charged ions

$$E = \frac{V_T}{z} \ln \left(\frac{[C_{out}]}{[C_{in}]} \right)$$

	ion	E	
outward	K ⁺	-80mV	[in] > [out]
inward	Na ⁺	+50mV	[in] < [out]
inward	Ca ⁺⁺	+200mV	[in] << [out]
~	Cl ⁻	-60mV	
<hr/>			
	exc.	0mV	
	inh.	E _{K⁺} or E _{Cl⁻}	

also ion pumps - Na-K exchanger

6) Passive neuron model

⑨

$$C \frac{dV}{dt} = -g_m (V - E) + I_{ext}$$

$$C = c_m A \quad g_m = \frac{A}{r_m}$$

$$c_m r_m \frac{dV}{dt} = E - V + R_m I_{ext}$$

$$c_m r_m = \tau = 10 \times 10^{-9} \text{ F} \cdot 1 \times 10^6 \Omega \\ = 10 \text{ ms}$$

$$\tau \frac{dV}{dt} = E - V + R_m I_{ext}$$

$$R_m I_{ext} = I$$

$$\tau \frac{dV}{dt} = E + I - V$$

(10)

a) $I = \text{constant}$

$$E + I = V_{\infty}$$

$$\tau \frac{dV}{dt} = V_{\infty} - V$$

$$V = V_{\infty} + X$$

$$\tau \frac{dX}{dt} = -X$$

$$X(t) = X(0)e^{-t/\tau}$$

or

$$X(t_2) = X(t_1)e^{-(t_2-t_1)/\tau}$$

or

$$X(t+\Delta t) = X(t)e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}$$

$$X = V - V_{\infty}$$

so

$$V(t) = V_{\infty} + (V(0) - V_{\infty})e^{-t/\tau}$$

or

$$V(t_2) = V_{\infty} + (V(t_1) - V_{\infty})e^{-(t_2 - t_1)/\tau}$$

or

$$V(t + \Delta t) = V_{\infty} + (V(t) - V_{\infty})e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}$$

$$b) \overline{I}(t)$$

$$V = E + X$$

$$\tau \frac{dx}{dt} = -x + \overline{I}(t)$$

$$x = e^{-t/\tau}$$

$$\tau \frac{dx}{dt} = -x + e^{-t/\tau} \frac{dy}{dt} = -x + I \quad (12)$$

$$\tau \frac{dx}{dt} = e^{t/\tau} I(t)$$

$$y(t) = \frac{1}{\tau} \int_0^t dt' e^{t'/\tau} I(t')$$

$$x(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \int_0^t dt' e^{t'/\tau} I(t')$$

$$= \frac{1}{\tau} \int_0^t dt' e^{-(t-t')/\tau} I(t')$$

$$= \int_0^t dt' K(t-t') I(t')$$

$$K(t-t') = \frac{1}{\tau} e^{-(t-t')/\tau}$$

2) Integrate & Fire Model

$$\gamma \frac{dV}{dt} = E - V + \bar{I}$$

when $V = V_{th}$ spike

and $V \rightarrow V_{reset}$

c) Firing rate for constant \bar{I}

$$E + \bar{I} \geq V_{th}$$

at $t=0$

$$V = V_{reset}$$

when is

$$V(t) = V_{th}$$

$$V_{\infty} = E + \bar{I}$$

$$V_{th} = V_{\infty} + (V_{reset} - V_{\infty}) e^{-t/\tau} \quad (17)$$

$$e^{t/\tau} = \frac{V_{reset} - V_{\infty}}{V_{th} - V_{\infty}} = \frac{V_{\infty} - V_{reset}}{V_{\infty} - V_{th}}$$

$$t = \tau \ln \left(\frac{V_{\infty} - V_{reset}}{V_{\infty} - V_{th}} \right)$$

$$\tau = \frac{1}{t}$$

8) Other conductances

$$C \frac{dV}{dt} = -g_L (V - E_L) - g_I (V - E_I) - \dots - g_S (V - E_S) + \dots$$

$$g \rightarrow g(t)$$