Análisis Real

Salvador Groisman

2026

Índice

I Apunte teórico 3

1. Teoría de la medida 3
1.1. Medida en el plano . . . 3
1.2. Colecciónes de conjuntos . . . 16
1.3. Medidas en semi-anillos . . . 21
1.4. σ-aditividad. El problema general de extender la medida . . . 23
1.5. La extensión de Lebesgue de una medida definida en un semianillo con unidad . . . 26
1.6. Extensión de la medida de Lebesgue en el caso general . . . 30
1.7. Extras de medibilidad . . . 33
1.7.1. Paso de Kolmogorov a Rela . . . 33
1.7.2. Funciones y medibilidad . . . 40
1.7.3. Conjunto de Vitali y de diferencias . . . 42

2. Funciones medibles 45
2.1. Definición y propiedades fundamentales de las funciones medibles 45
2.2. Clases de equivalencia de funciones medibles . . . 47
2.3. Funciones simples . . . 49
2.4. Sucesiones de funciones medibles. Varios tipos de convergencia . 52
2.4.1. Convergencia en casi todas partes . . . 52
2.4.2. Convergencia en medida . . . 54
2.4.3. Cauchy en medida . . . 58
2.5. Versiones para $\mathbb{R}^n$ de los teoremas de Egorov y Lusin . . . 58
2.6. Algunos ejemplos . . . 62

II Solucionario 66

3. Preeliminares 67

4. Medida de Lebesgue 71

5. Funciones medibles: 91

6. Integral de Lebesgue 104

Parte I
Apunte teórico

1. Teoría de la medida

La motivación de este capítulo es definir, en el caso más general que me esposible, el concepto de medida de un conjunto A. Intuitivamente, la medida $\mu(A)$ de un conjunto A es una generalización de conceptos como:

- El largo $l(\Delta)$ de un segmento Δ.
- El área $S(F)$ de una figura F en el plano.
- El volumen $V(G)$ de una figura tridimensional G.
- EL incremento $\phi(b) - \phi(a)$ de ua función ϕ no dereciente definida en un intervalo $[a, b]$.
- La integral de una función no negativa en una región n dimensional.

En un plano histórico, la teoría de la memida se origina en el corazón de la teoría de funciones de variable real y para ella se encontraron varias aplicaciones en teoría de probablidades, sistemas dinámicos, análisis funcional y otras áreas de la matemática.

1.1. Medida en el plano

Consideremos la colección $\mathcal{C}$ de conjuntos de puntos (x, y) en el plano que, se definen por inecuaciones de la forma:

$$a \leq x \leq b, \quad a < x \leq b, \quad a \leq x < b, \quad a < x < b$$

y

$$c \leq y \leq d, \quad c < y \leq d, \quad c \leq y < d, \quad c < y < d$$

Con a, b, c, d números reales arbitrarios. Poedmos entonces llamar a los conjuntos de $\mathcal{C}$ como rectangulos[1]. La medida de un rectángulo se definecomo el área del mismo en el sentido que nos tiene acostumbrados la geometría elemental, es decir:

- La medida del conjunto vacío es 0.

[1] En el sentido usual del término si $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. Si $a = b, c = d$ tenemos un punto, y análogamente podemos tener segmentos o rectángulos abiertos en alguna cara. Más aún, se podría tratar del conjunto vacío.

- La medida de un rectángulo no vacío (ya sea abierto, cerrado o semi-abierto) se define como:

$$(b-a)(d-c)$$

Ahora, si asignamos a cada rectángulo P el número $m(P)$ -su medida- es inmediato que se satisfacen las siguientes condiciones:

1. La medida $m(P)$ de P es real y no negativa (pues $a \leq b, c \leq d$).
2. La medida $m(P)$ es aditiva, es decir si $P = \bigcup_{i=1}^{n} P_i$ con P_i un rectángulo para cada $i \in [\![n]\!]$ y tal que $P_i \cap P_j = \emptyset$ siempre que $i \neq j$. Entonces:

$$m(P) = \sum_{i=1}^{n} m(P_i)$$

Nos encontramos ahora con el problema de extender la noción de medida $m(P)$, definida solo para rectángulos, a la clase de conjuntos en general y tal que cumplan las dos propiedades mencionadas arriba. El primer paso e este sentido constará en extender el concepto de medida a lo que se conoce como cojuntos elementales:

Definición 1.1 (conjuntos elementale)**.** Un conjunto en el plano se dice elemental si puede ser escrito, de al menos una manera, como unión de un número finito de rectángulos disjuntos dos a dos.

Proposición 1.2. La unión, intersección, diferencia y diferencia simetrica de dos conjuntos elementales es un conjunto elemental.

Demostración. Parece claro por un lado que la intersección de dos rectángulos es otro rectángulo. De esa manera, sean:

$$A = \bigcup_{k} P_k, \qquad B = \bigcup_{j} Q_j$$

dos conjuntos elementales, se tiene que:

$$A \cap B = \bigcup_{j,k} (P_k \cap Q_j)$$

Luego como estas intersecciones son vacías o rectángulos, se tiene que $A \cap B$ es un conjunto elemental.

Por otro aldo, es fácil notar que la diferencia de dos rectángulos es un conjunto elemental. En consecuencia, si le sustraemos a un rectángulo un conjunto elemental, obtenemos otro conjunto elemental. Esto pues, si $C = \bigcup_n R_n$ es un conjunto elemental y R un rectángulo es:

$$R \setminus C = R \setminus (\bigcup_n R_n) = R \cap \cap_n R_n^c = \cap_n (R \cap R_n^c) = \cap_n (R \setminus R_n)$$

Y como antes, vimos que la intersección de conjuntos elementales es elemental y cada $R \setminus R_n$ lo es. De esta manera, sean A, B dos conjuntos elementales, es claro que existe P un rectángulo que contiene a ambos conjuntos. Así:

$$A \cup B = P \cap (A \cup B) = P \cap (A^c \cap B^c)^c = P \setminus (A^c \cap B^c) = P \setminus [(P \setminus A) \cap (P \setminus B)]$$

O sea, a P le estamos quitando lo que no está en A ni en B. Como P es un rectangular $P \setminus A$ y $P \setminus B$ son conjuntos elementales, entonces lo es su unión.

Ahora, si A, B y P son como antes, es:

$$A \setminus B = A \cap B^c = A \cap (P \setminus B)$$
$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

□

Ahora, estamos en condiciones de definir la medida de un conjunto elemental A.

Definición 1.3 (medida para conjuntos elementales)**.** Sea A un conjunto elemental, y sea $\bigcup_k P_k = A$ una escritura de A como unión de finitos rectángulos disjuntos dos a dos. Se define la *medida de* A como:

$$m'(A) = \sum_k m(P_k)$$

Proposición 1.4. La medida de A es independiente de la representación. Por otro lado, la medida de A es una función no negativa y aditiva.

Demostración. Sea A elemental y $A = \bigcup_k P_k = \bigcup_j Q_j$ dos escrituras para A como unión finita de rectángulos disjuntos dos ados, entonces:

$$m'(A) = \sum_k m(P_k) = \sum_{j,k} m(P_k \cap Q_j) = \sum_j m(Q_j)$$

Además, como cada $m(P_k) \geq 0$, se tiene que $m'(A) \geq 0$ -pues es su suma-. Para la aditividad, si $A \cap B = \emptyset$, con $A = \bigcup P_k$ y $B = \bigcup R_i$, entonces $A \cup B = (\bigcup P_k) \cup (\bigcup R_i)$ es una unión finita de rectángulos disjuntos, y por definición:

$$m'(A \cup B) = \sum_k m(P_k) + \sum_i m(R_i) = m'(A) + m'(B)$$

□

Proposición 1.5. Si A es un conjunto elemental y $\{A_n\}$ es una colección contable de conjuntos elementales tales que:

$$A \subset \bigcup_n A_n$$

tenemos que:

$$m'(A) \leq \sum_n m'(A_n)$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ arbitraria y A un conjunto elementa como en el enunciado,es claro que existe $\overline{A}$ otro conjunto elemental contienido en a A y tal que:

$$m'(\overline{A}) \geq m'(A) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Si esto no es claro, notar que es suficiente con considerar una escritura de $A = \bigcup_{i=1}^{k} P_i$, y para cada i considerar un rectángulo cerrado contenido en P_i tal que su area sea al menos $m(P_i) - \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$, pues en ese caso:

$$m(A) = \sum_{i=1}^{k} m(P_i) \geq (\sum_{i=1}^{k} m(P_i)) - \frac{k \cdot \varepsilon}{2^{k+1}} \geq m(A) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Más aún, par cada n hay un conjunto abierto $\widetilde{A_n}$ que contiene a A_n y tal que:

$$m'(\widetilde{A_n}) \leq m'(A_n) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Es claro e ese caso que:

$$\overline{A} \subseteq \bigcup_n \widetilde{A_n}$$

Ahora $\overline{A}$ es compacto pues es unión finita de cerrados y acotados de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^2$ es un espacio que cumple la condición de *Heine-Borel*. Por ende, existe un subcubrimiento finito de $\overline{A}$. Es decir, existen $\widetilde{A_{n_1}}, \ldots, \widetilde{A_{n_s}}$ tales que:

$$\overline{A} \subset \bigcup_{i=1}^{s} \widetilde{A_{n_i}}$$

En este caso, es obvio que:

$$m'(\overline{A}) \leq \sum_{i=1}^{s} m'(\widetilde{A_{n_i}})$$

Luego:

$$
\begin{aligned}
m'(A) \leq m'(\overline{A}) + \frac{\varepsilon}{2} &\leq \sum_{i=1}^{s} m'(\widetilde{A_{n_i}}) \\
&\leq \sum_n m'(\widetilde{A_n}) \leq \sum_n m'(A_n) + \varepsilon \sum_n \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&= \sum_n m'(A_n) + \varepsilon
\end{aligned}
$$

Pero esto es sin importar el ε, pues era arbitrario. Así:

$$m'(A) \leq \sum_n m'(A_n)$$

□

Tenemos ahora un problema. la clase de los cnjuntos elementales no comprende el total de los conjuntosde la geometría elemental y el análisis clásico. Parece natural entonces querer dar un paso más y extender el concepto de medida a aquellos conjuntos que no pueden describirse como unión finita de rectángulos con lads paralelos a los ejes de ordenadas.

Resulta necesario el sentado por *Lebesgue* y su teoría de la medida quien considera no solo la unión finita, sino también la infinita de rectángulos disjuntos dos a dos. Para evitar valores infinitos de medida, nos restringiremos a considerar el caso de conjuntos contenidos en el cuadrado $E = [0,1] \times [0,1]$.

Definición 1.6. Definimos la medida exterior de un conjunto A como:

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\{\sum m(P_k) : A \subset UP_k\}$$

Donde toamos ínfimo sobre cubrimientos contables de A.

La medida interior de un conjunto A se define como:

$$\mu_*(A) = 1 - \mu^*(E \setminus A)$$

Decimos que A es medible -en el sentido de Lebesgue- si:

$$\mu_*(A) = \mu^*(A)$$

Y en ese caso, llamamos $\mu(A)$ la medida de Lebesgue, al valor común de las medidas exterior e interior.

Observacion. Es fácil ver que $\mu_*(A) \leq \mu^*(A)$. Supongamso que no, y en ese caso es $\mu^*(A) < \mu_*(A)$ y por ende:

$$\mu^*(A) + \mu_*(E \setminus A) < 1$$

De esta manera, existen conjuntos $\{P_i\}, \{Q_k\}$ de rectángulos tales que cbren A y $E \setminus A$ respectivamente y tales que:

$$\sum_i m(P_i) + \sum_k m(Q_k) < 1$$

Si notamos la unión de estos dos conjuntos como $\{R_j\}$, tenemos que $\{R_j\}$ cubre E y que:

$$m(E) = 1 > \sum_j m(R_j)$$

Y esto no puede ser pues contradice la proposición anterior.

Lema 1.7. *Si $\{A_n\}$ es una colección contable de conjuntos y A es un conjunto tal que:*

$$A \subseteq \bigcup_n A_n$$

entonces es:

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$$

Demostración. De acurdeo a la definición de medida exetrior, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, para cada n existe una colección contable de rectángulos $\{P_{nk}\}$ con $A_n \subseteq \bigcup_k P_{nk}$ tales que:

$$\sum_k m(P_{nk}) \leq \mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

Es claro entonces que:

$$A \subseteq \bigcup_n \bigcup_k P_{nk}$$

Luego, esta es una colección numerable de rectángulos que contiene a A y por ser $\mu * (A)$ ínfimo es:

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \sum_k m(P_{nk}) \leq (\sum_n \mu^*(A_n)) + \varepsilon$$

Pero ε era arbitrario, luego:

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$$

□

Proposición 1.8. Si A es un conjunto elemental, es medible y $\mu(A) = m'(A)$.

Demostración. Sea A un conjunto elemental, y $P_1, \ldots, P_k$ rectángulos tal que su unión es A, tenemos que:

$$m'(A) = \sum_{i=1}^{k} m(P_i)$$

y que, por ser $\mu^*(A)$ ínfimo, es:

$$\mu^*(A) \leq m'(A)$$

Ahora, por la proposición 1,5, tenemos que si $\{Q_j\}$ es un conjunto contable de rectángulos tales que cubren A, entonces:

$$m'(A) \leq \sum_{j} m(Q_j)$$

Luego $m'(A) \leq \mu * (A)$ y por lo anterior son iguales.

Ahora bien, si A es elemental, como E también lo es, lo es $E \setminus A$. Por lo anterior, debe ser $m'(E \setminus A) = \mu^*(E \setminus A)$. Por ende:

$$m'(E \setminus A) = 1 - m'(A) = \mu^*(E \setminus A) = 1 - \mu_*(A)$$

Luego:

$$m'(A) = \mu_*(A), m'(A) = \mu * (A)$$

Por ende A es medible y su medida es $m'(A)$. □

Lema 1.9. *Praa que un conjunto A sea medible, es necesario y suficiente que,para cada $\varepsilon > 0$ exista un conjunto elemental B tal que:*

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

Demostración. Para probar esto, notemos primero que, si A, B son conjuntos arbitraros, entnces:

$$|\mu^*(A) - \mu^*(B)| \leq \mu^*(A \Delta B)$$

Esto pues:

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B) + \mu^*(A \Delta B), \mu^*(B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(A \Delta B)$$

Ya que es claro que $A \subset B \cup (A \Delta B)$ y $B \subset A \cup (A \Delta B)$.

Veamos primero la suficiencia, sea para ello $\varepsilon > 0$ un número arbitrario, y supongamos que existe B un conjunto elemental tal que:

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

y de acuerdo al lema y la proposición anterior es:

$$|\mu^*(A) - m'(B)| < \varepsilon$$

Análogamente, tenemos que:

$$(E\ A)\Delta(E \setminus B) = A \setminus B$$

Luego:

$$|\mu^*(E \setminus A) - m'(E \setminus A)| < \varepsilon$$

Sumando las ecuaciones y usando que:

$$m(E \setminus B) + m(B) = 1$$

Tenemos que:

$$|\mu^*(A) + \mu^*(E \setminus A) - 1| < 2\varepsilon$$

Como ε es arbitrario, esto implica que:

$$\mu * (A) + \mu * (E \setminus A) = 1$$

Y esto es que A sea medible, pues $\mu^*(E \setminus A) = 1 - \mu_*(A)$.

Veamos ahora la necesidad de la condición. Supongamos que A es medible, de manera que:

$$\mu^*(A) + \mu * (E \setminus A) = 1$$

Para $\varepsilon > 0$ arbitrario, existen conjuntos de rectángulos $\{B_n\}, \{C_n\}$ tales que:

$$A \subset \bigcup_n B_n, \quad E \setminus A \subset \bigcup_n C_n$$

Y tales que:

$$\sum_n m(B_n) \leq \mu^*(A) + \frac{\varepsilon}{3}, \sum_n m(C_n) \leq \mu^*(E \setminus A) + \frac{\varepsilon}{3}$$

Esto nos dice que las sucesiones de medidas de los rectángulos convergen y por ende existe un N tal que:

$$\sum_{n>N} m(B_n) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Sea $B = \sum_{n=1}^{N} B_n$, es claro que si consideramos $P = \bigcup_{n>N} B_n$, entonces este conjunto contiene a $A \setminus B$, mientras que el conjunto $Q = \bigcup (B \cap C_n)$ contiene

a $B \setminus A$[2]. En consecuencia $A\Delta B \subset P \cup Q$.

Tenemos por un lado que:

$$\mu * (P) \leq \sum_{n>N} m(B_n) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Estimemos $\mu^*(Q)$. Notemos que:

$$E \subset (\bigcup_n B_n) \cup (\bigcup_n (C_n \setminus B))$$

y en consecuencia:

$$\sum_n m(B_n) + \sum_n m'(C_n \setminus B) \geq 1$$

Pero por hipótesis:

$$\sum_n m(B_n) + \sum_n m(C_n) \leq \mu * (A) + \mu * (E \setminus A) + 2\varepsilon/3 = 1 + 2\varepsilon/3$$

Si restamos las dos ecuaciones, tenemos que:

$$\sum_n m(C_n) - \sum_n m'(C_n \setminus B) < \frac{2\varepsilon}{3}$$

Ahora, como $\bigcup_n C_n = \bigcup_n C_n \cap B \cup \bigcup_n C_n \setminus B$ es:

$$\sum_n m(C_n) - \sum_n m'(C_n \setminus B) = \sum_n (C_n \cap B) < \frac{2\varepsilon}{3}$$

Y por ende que:

$$\mu^*(Q) < \frac{2\varepsilon}{3}$$

Juntando todo:

$$\mu^*(A\Delta B) \leq \mu^*(P) + \mu^*(Q) < \varepsilon$$

Esto prueba la necesidad de la proposición. □

Proposición 1.10. La unión e intersección de un número finito de conjuntos medibles es medible. También la diferencia y la diferencia simétrica de dos conjuntos medibles es medible.

[2] Pues $E \setminus A \subset \bigcup_n C_n$.

Demostración. Notemos que basta probar el resultado para dos conjuntos. Sean A_1, A_2 dos conjuntos medibles, para un $\varepsilon > 0$ arbitrario hay conjuntos elementales B_1, B_2 tales que:

$$\mu * (A_1 \Delta B_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu * (A_2 \Delta B_2) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Notemos que:

$$(A_1 \cup A_2)\Delta(B_1 \cup B_2) \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Y por ende que:

$$\mu * ((A_1 \cup A_2)\Delta(B_1 \cup B_2)) \leq \mu * (A_1 \Delta B_1) + \mu * (A_2 \Delta B_2) < \varepsilon$$

Como ε es arbitrario yen vistas del lemaanterior, tenemos que $A_1 \cup A_2$ es medible.

Para el caso de la intersección, basta notar que:

$$A_1 \cap A_2 = E \setminus [(E \setminus A_1) \cup (E \setminus A_2)]$$

Y como A_1, A_2 son medibles, lo son sus complementos en E. En el mismo sentido, basta notar que:

$$\begin{aligned} A_1 \setminus A_2 &= A_1 \cap (E \setminus A_2) \\ A_1 \Delta A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \end{aligned}$$

□

Proposición 1.11. Si $A_1, \ldots, A_n$ son conjuntos medibles y disjuntos dos a dos, se tiene que:

$$\mu(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{k} \mu(A_k)$$

Demostración. Al igual que en la proposición anterior, notemos que basta considerar el caso $n = 2$. Sea $\varepsilon > 0$, y A_1, A_2 medibles, existen B_1, B_2 conjuntos elementales tales que:

$$\mu^*(A_1 \Delta B_1) < \varepsilon, \quad \mu^*(A_2 \Delta B_2) < \varepsilon$$

Si consideramos $A = A_1 \cup A_2$ y $B = B_1 \cup B_2$, de acuerdo a la proposición anterior, el conjnto A es medible. Por otro lado:

$$B_1 \cap B_2 \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Esto pues si $x \in B_1 \cap B_2$, y si además $x \in B_1 \cap A_1$ tenemos que $x \notin A_2$ pues $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, de manera que $x \in B_2 \setminus A_2$, y vale lo mismo si intercambiamos los unos por dos. Así $x \in A_1 \Delta B_1$ o $x \in A_2 \Delta B_2$. Con esto:

$$m'(B_1 \cap B_2) \leq \mu^*(A_1 \Delta B_1) + \mu^*(A_2 \Delta B_2) < 2\varepsilon$$

Por otro lado, en virtud de lo probado en el lema 1,9 se tiene que:

$$|m'(B_1) - \mu * (A_1)| \leq \mu^*(A_1 \Delta B_1) < \varepsilon, \quad |m'(B_2) - \mu^*(A_2)| \leq \mu^*(A_2 \Delta B_2) < \varepsilon$$

Como la medida es aditiva en la clase de los conjuntos elementales, tenemos que:

$$m'(B) = m'(B_1) + m'(B_2) - m'(B_1 \cap B_2) \geq \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2) - 4\varepsilon$$

En particular, notemos que $A \Delta B = (A_1 \cup A_2) \Delta (B_1 \cup B_2)$ está contenido en $(A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$. Así, tenemos que:

$$\mu^*(A) \geq m'(B) - \mu * (A \Delta B) \geq m'(B) - 2\varepsilon \geq \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2) - 6\varepsilon$$

Pero como ε es arbitrario, tenemos que:

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2)$$

Y como $A = A_1 \cup A_2$, es claro que:

$$\mu * (A) = \mu * (A_1) + \mu * (A_2)$$

Ahora, como A_1, A_2, A son medibles, podemos remplazar μ^* por μ. □

Lema 1.12. *La unión e intersección contable de conjuntos medibles es medible.*

Demostración. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una colección contable de conjuntos medidos y $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ su unión, consideremos $A'_n = A_n \setminus U_{k=1}^{n-1} A_k$, es claro que tambien:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n$$

Y de acuerdo al lema 1,7 y la porposición anterior es:

$$\mu(\bigcup_{k=1}^{n} A'_k) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A'_k) \leq \mu^*(A) \leq 1$$

Para todo n finito. Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A'_n)$ converge pues es no decreciente y actotada. Luego, dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que:

$$\sum_{n>N} \mu(A'_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Además $C = \bigcup_{n=1}^{N} A'_n$ es medibe por ser unión finita de medibles. Necesariamente existe B tal que:

$$\mu(C\Delta B) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Notemos además que:

$$A\Delta B \subset (C\Delta B) \cup (\bigcup_{n>N} A'_n)$$

Esto implica que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

Y esto sin importar el ε. En vistas del lema 1,9, se tiene que A es medible.

Para ver que la intersección numerable de medibles es medbles, basta notar que la diferencia de medibles es medible y:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus A_n)$$

□

Corolario 1.13. *Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de conjntos medibles disjuntos dos a dos y A es su unión. entonces:*

$$\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$$

Demostración. Tenemos, por los lemas 1,11 y 1,12, que para N arbitrario es[3]:

$$\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n) = \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n) \leq \mu(A)$$

Tomando límite sobre $N \to \infty$, tenemos que $\sum_n \mu(A_n) \leq \mu(A)$. Por otro lado, de nuevo por el lema 1,7 es claro que:

$$\mu(A) \leq \sum_n \mu(A_n)$$

Por ende, vale la igualdad. □

Definición 1.14. La propiedadde la medida establecida en el corolario anterior, es conocida como $\sigma-$*aditividad* o aditividad completa. La siguiente propiedad de la medida, llamada *continuidad* continuidad es una consecuencia inmediata de la $\sigma-$*aditividad*.

[3]Digo por el lema 1,12 ya que ahora puedo escribir $\mu(A)$.

Teorema 1.15. *Sea $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ una secuencia monótona y decreciente de conjuntos medibles y cosideremos $A = \bigcap_n A_n$ tenemos que:*

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Veamos que es suficiente considerar el caso donde $A = \emptyset$. El caso general se reduce a reemplazar A_n por $A_n \setminus A$. Supongamos entonces que $A = \emptyset$ y en ese caso:

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots$$

Y[4]

$$A_n = (A_n \setminus A_{n+1}) \cup (A_{n+1} \setminus A_{n+2}) \cup \dots$$

Como A_1 es medible, la siguiente serie converge:

$$\mu(A_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k+1})$$

Y el límite cuando $n \to \infty$ de esta otra es 0:

$$\mu(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k+1})$$

Así $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k+1}) = 0 = \mu(A)$.

Para el caso general, sea $B_n = A_n \setminus A$. Es claro que $B_n \supset B_{n+1}$ y dado que $A \subset A_n$ para cada n, es:

$$\mu(B_n) = \mu(A_n \setminus A) = \mu(A_n) - \mu(A)$$

Ahora bien, la intersección de los B_n es vacía pues:

$$\bigcap_n B_n = \bigcap_n A_n \setminus A = \bigcap_n A_n \setminus \bigcap_n A_n = \emptyset$$

Por ende, al igual que antes es:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = 0 = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) - \mu(A)$$

Luego:

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Como se quería probar. □

[4]Notar que en este caso esta escritura es correcta pues no podemos tomar un x que esté en todos los A_n, ya que suponemos la interseción es vacía. Es decir, debe existir n tal que $x \in A_n$ y $x \notin A_{n+1}$ par cada x que consideremos en A_1.

Corolario 1.16. *Sean $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$ una serie monótona creciente de conjuntos medibles y $A = \bigcup_n A_n$ su unión, entonces:*

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Para probar el corolario es suficiente con reemplazar los A_n por sus complementos y usar el teorema anterior. □

Ejemplo 1.17. Veamos un ejemplo de conjunto no medible conocido como el conjunto de Vitali. Sea C una circunferencia de radio 1 en el plano α un irracional. Decimos que dos punto x, y pertenecen a la misma clase dentro de C si uno se consigue a partir del otro mediante una rotación en un ángulo de $n\alpha$ con n un entero.

Esta partición divide a la circunferencia en clases disjuntas y por axioma de elección podemos construir Φ un conjunto tal que posea exactamente un punto por clase.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideremos Φ_n el conjunto que se obtiene aplicando la rotación $n\alpha$ a Φ. Obtenemos así una familia de conjuntos $\{\Phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que son disjuntos dos a dos, pues si $n \neq m$ y $\Phi_n \cap \Phi_m$ fuese no vacía, entonces el punto en la intersección pertenecería a la misma clase. Esto es absurdo.

Dado además que elegimos un representante de cada clase, entonces tenemos que $C = \bigcup_n \Phi_n$, pues aplicamos todas las rotaciones posibles sobre un elemento de cada clase.

Si suponemos que Φ es medible, entonces cada Φ_n es medible y es $\mu(\Phi_n) = \mu(\Phi)$ pues un conjunto se obtiene de otro mediante rotación y no es dificil probar que la medida es invariabte por traslaciones de este tipo. Ahora bien, por a $\sigma-$*aditividad* de la medida, como $C = \bigcup_n \Phi_n$ y estos son disjuntos, debe ser:

$$1 = \mu(C) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \mu(\Phi_n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c$$

Pues todas las medidas son iguales a $\mu(\Phi) = c$. Si $c > 0$ tenemos que la suma de la derecha es infinita, por lo que no puede ser igual a 1. Pero si $c = 0$, la suma es 0 y estamos igualmente ante un absurdo. Este absurdo viene de suponer que Φ es medible.s

1.2. Colecciónes de conjuntos

En esta sección ampliaremos nuestra noción de medida a colecciones de conjntos de manera algo más general. Una colección de cojuntos es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Como regla consideraremos conjuntos cuyos elementos son subconjuntos de un conjunto fijo X. En general denotaremos a las

coleccciones de conjuntos con letras estilo *Frakfurt*. Más aún, nos interesará el caso de colecciones de conjuntos cerradas bajo algunas -o todas- las operaciones ed la sección anterior.

Definición 1.18. Un *Anillo* es una colección no vacía $\mathfrak{R}$de conjuntos con la propiedad de que para todo par de conjuntos $A, B \in \mathfrak{R}$ es $A\Delta B, A \cap B \in \mathfrak{R}$.

Observacion. Si se cumple esto, entonces también el anillo es cerrado por diferencia y diferencias simétricas, pues:

$$A \cup B = (A\Delta B)\Delta(A \cap B), \quad A \setminus B = A\Delta(A \cap B)$$

Además, por esto último es claro que el vacío $\emptyset$ está en todo anillo pues $A \setminus A = \emptyset$ y aue el anillo es cerrado para uniones e intersecciones finitas.

El anillo trivial es aquel que solo contiene al conjunto vacío.

Definición 1.19. Un conjunto E se llama *unidad* de una coleción de conjuntos $\mathfrak{C}$ si es un elemento de $\mathfrak{C}$ y si para todo $A \in \mathfrak{C}$ es:

$$A \cap E = A$$

Sea X un conjunto y $\mathfrak{C}$ una colecccón de subconjuntos de X, la colección se dice *álgebra* si $\mathfrak{C}$ es un anill con unidad $E = X$.

Observacion. Es fácil ver que si $\mathfrak{C}$ tiene unidad es única, pues si E', E son dos unidades es:

$$E' = E' \cap E = E \cap E' = E$$

Teorema 1.20. *La intersección de una cantidad arbitraria de anillos es un anillo. Además, si $\mathfrak{C}$ es una colección de conjuntos, existe exactamente un anillo $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ tal que contene a $\mathfrak{C}$ y está contenido en todo anillo $\mathfrak{R}$ que contiene a $\mathfrak{C}$.*

Demostración. Sea $\mathfrak{R} = \bigcap_a \mathfrak{R}_a$ intersección de una cantidad arbitraria de anillos y sean $A, B \in \mathfrak{R}$. Es claro que, por ser $\mathfrak{R}_a$ anillos para cada a, se tiene que $A \cap B, A\Delta B \in \mathfrak{R}_a$. Luego, ambos conjuntos están en la intersección de todos los $\mathfrak{R}_a$, es decir en $\mathfrak{R}$.

Sea ahora $\mathfrak{C}$ una familia de conjuntos, podemos considerar $mathfrakM(X)$ el anillo de todos los subconjuntos de X y Σ la colección de los anillos contenidos en $\mathfrak{M}(X)$. Sea:

$$\mathfrak{B} = \bigcap_{\mathfrak{R} \in \Sigma} \mathfrak{R}$$

Este es claramente el anillo requerido, pues si $\mathfrak{R}'$ es un anillo que contiene a $\mathfrak{C}$ entonces $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}' \cap \mathfrak{M}(X)$ es un anillo de Σ, por lo tanto:

$$\mathfrak{C} \subset \mathfrak{B} \subset \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}'$$

Es decir, este es minimal y por ende el $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ que buscabamos. $\square$

Llamamos a este el *anillo generado por* $\mathfrak{C}$. Encontrarlo es en general bastante complicado, pero su construcción se vuelve explícita cuando el conjunto $\mathfrak{C}$ es lo que se dice un semi-anillo.

Definición 1.21 (semi-anillo)**.** Una colección de conjuntos $\mathfrak{C}$ se dice *semi-anillo* si satisface que:

- Contiene al vacío.
- Es cerrado por intersecciones finitas.
- Si A y $A_1 \subset A$ son dos elementos de la colección entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que:

$$A = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$$

  Donde cada A_i es un elemento de la colección y todos son disjuntos dos a dos. Es decir, el conjunto de los A_i es una partición de A.

Lema 1.22. *Supngamos que $A_1, \ldots, A_n$ y A son elementos de un semi-anillo $\mathfrak{C}$. Supongamos además que los A_i son subconjuntos de A disjuntos dos a dos. Entonces existe una partición finita de A tal que:*

$$A = \bigcup_{i=1}^{s} A_i, \quad s \geq n, A_i \in \mathfrak{C}$$

Demostración. La prueba se hace mediante inducción. Es claro que el lema se satisface para $n = 1$ por definición de semi-anillo. Supongamos que se satisface para $n = m$ y veamos que lo hace para $m + 1$.

Sean $A_1, \ldots, A_{m+1}$ subconjuntos disjuntos de A tal que también son parte del anillo. En vistas dela hipótesis induciva, existen $B_1, \ldots, B_p$ tal que:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup B_1 \cup \cdots \cup B_p$$

Es claro que $A_{m+1} \subseteq B_1 \cup \cdots \cup B_p$. Para cada $q \in [\![p]\!]$ además se tiene que:

$$A_{m+1} \cap B_q = B_{q_1} \subseteq B_q$$

Y por ser $\mathfrak{C}$ anillo, esto nos dice que existe r_q y conjuntos $B_{q_1}, \ldots, B_{q_{r_q}}$ de la colección tal que:

$$B_q = \bigcup_{i=1}^{r_q} B_{q_i}$$

De esta manera, omitiendo los B_{q_1} para cada q es:

$$A = \bigcup_{i=1}^{m+1} A_i \cup \bigcup_{q=1}^{p} \bigcup_{j=2}^{r_q} B_{q_i}$$

Como el lema es verdadero para $n = 1$ y es verdadero para $n = m+1$ cuando lo es para n, tenemos que el lema es verdadero para todo n. $\square$

Lema 1.23. *Sean $A_1, \ldots, A_n$ elementos de un semianillo $\mathfrak{S}$, entonces existen en $\mathfrak{S}$ una cantidad finita s de conjuntos disjuntos dos a dos $B_1, \ldots, B_l$ tal que para cada $k \in [\![n]\!]$ es:*

$$A_k = \bigcup_{s \in M_k} B_s$$

Demostración. La prueba es clara cuando $n = 1$, pues basta tomar $l = 1$ y $B_1 = A_1$. Supongamos nuevamente que vale para $n = m$ y veamos que valepara $m + 1$. Sean $A_1, \ldots, A_{m+1}$ elementos del semi anillo. Sean $B_1, \ldots, B_l$ los que satisfacen la hipótesis para $A_1, \ldots, A_m$. Sea para cada $s \in [\![l]\!]$:

$$B_{s1} = A_{m+1} \cap B_s$$

Por el lema anterior, como los $B_{11}, \ldots, B_{t1} \subset A_{m+1}$ y son disjuntos dos a dos, existe una partición:

$$A_{m+1} = \bigcup_{s=1}^{t} B_{s1} \cup \bigcup_{p=1}^{q} B'_p, \quad (B'_p \in \mathfrak{C})$$

Y en vistas de la definición de semianillo existe además una partición:

$$B_s = \bigcup_{i=1}^{f_s} B_i$$

Pues $B_{s1} \subset B_s$. Como se trata de particiones, es claro que si consideramos:

$$\{B_{s_i} : s \in [\![l]\!], i \in [\![f_s]\!]\} \cup \{B'_p : p \in [\![q]\!]\}$$

Es una colección finita donde los conjuntos son disjuntos dos a dos y además, para cada $k \in [\![m]\!]$ es:

$$A_k = \bigcup_{s \in M_k} \bigcup_{j=1}^{f_s} B_{s_j}$$

Y A_{m+1} se escribe al igual que antes. Esto prueba el lema por principio de inducción. $\square$

Lema 1.24. *Sea $\mathfrak{C}$ un semi-anillo, se tiene que $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ coindide con la colección $\mathfrak{B}$ de todos los conjuntos A tal que admiten una partición finita:*

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k, \quad (A_k \in \mathfrak{C})$$

Demostración. Veamos primero que $\mathfrak{B}$ es un anillo. Basta ver entonces que es cerrado para intersecciónes y diferencias simétricas. Sean $A, B \in \mathfrak{B}$m de manera que existen n, m y elementos de la colección tal que:

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k, B = \bigcup_{k=1}^{m} B_k$$

Luego, como $\mathfrak{C}$ es semianillo, podemos considerar $C_{i,j} = A_i \cap B_j$ y este es parte del anillo. Entonces:

$$A \cap B = \bigcup_{i,j \in [\![n]\!],[\![m]\!]} C_{i,j}$$

Por otro lado, por le lema 1,22 para cada $i \in [\![n]\!]$ y cada $j \in [\![m]\!]$ podemos escribir:

$$A_i = \bigcup_{j} C_{i,j} \cup \bigcup_{k=1}^{r_i} D_{ik}, \quad B_i = \bigcup_{i} C_{i,j} \cup \bigcup_{k=1}^{r_j} E_{jk}$$

Donde $D_{ik}, E_{jk} \in \mathfrak{C}$. De esta manera, es claro que:

$$A \Delta B = \bigcup_{k=1}^{r_i} D_{ik} \cup \bigcup_{k=1}^{r_j} E_{jk}$$

Luego, $\mathfrak{B}$ es un anillo.

Para concluir la prueba, es clar que el anillo $\mathfrak{B}$ contiene a $\mathfrak{C}$ pues cada elemento puede verse como la unión de un elemento -en particular si mismo-. Además, como todo anillo es cerrado por uniones fnitas según lo establecido en la observación debajo de la definción 1,18, tenemo que en particular debe contener a $\mathfrak{B}$. Luego, este es minimal. □

En varios problemas de teoría de la medida debemos considerar, además de la definición de anillo, definiciones algo más restrictivas.

Definición 1.25 (σ, δ anillos)**.** Llamamos *σ-anillo* a un anillo que además es cerrado para uniones numerables de sus elementos y *δ-anillo* a un anillo que es cerrado para intersecciones numerables.

Análogamente, si poseen elemento unitario llamamos a las *σálgebras* y *δ-álgebras*, aunque en estos casos la presencia de unidad hace que ambas definiciones sean equivalenes gracias a las leyes de *de Morgan*:

$$\bigcup_n A_n = E \setminus \bigcap_n (E \setminus A_n)$$
$$\bigcap_n A_n = E \setminus \bigcup_n (E \setminus A_n)$$

Por lo tanto las llamaremos *B-álgebras* o *álgebras de Borel*.

Existe para las álgebras de Borel un resultado análogo al probado para anillos y del cual no realizaremos la prueba, pues es análoga.

Teorema 1.26. *Si $\mathfrak{C}$ es una colección de conjuntos no vacías, existe un B-álgebra que contiene a $\mathfrak{C}$ y a toda otra B-álgebra que contenga a $\mathfrak{C}$. Notamos $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$.*

1.3. Medidas en semi-anillos

La idea de esta sección es extender aún más el concepto de medida. Todos los resultados de la sección 1,1 se pueden exetnder -con cambios significativos- a nociones de medidas en general.

Definición 1.27 (medida)**.** Decimos que una función $\mu(A)$ es una medida si:

- Su dominio -digámosles S_μ es un semi-anillo.
- Toma valores reales y no negativos.
- Es aditiva, esto es que si A es un elemento de S_μ y tenemos una partición de A de la forma:

  $$A = \cup_k A_k, \quad A_k \in S_\mu$$

  Tenemos que:

  $$\mu(A) = \sum_k \mu(A_k)$$

Teorema 1.28. *Sea μ una medida definida en un semi-anillo S_μ. Si $A_1, \ldots, A_k \in S_\mu$ son subconjuntos disjuntos dos a dos de $A \in S_\mu$ entonces:*

$$\sum_{i=1}^{k} \mu(A_i) \leq \mu(A)$$

Demostración. Por ser S_μ anillo y gracias al lema 1,22, tenemos que existe una partición de A de la forma:

$$A = \bigcup_{i=1}^{s} A_i, \quad (s \geq n, A_i \in S_\mu)$$

Con los primeros n A_i los del enunciado. Ahora, por ser μ una métrica es:

$$\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) = \mu(A)$$

□

Teorema 1.29. *Sean $A_1, \ldots, A_n, A \in S_\mu$ tales que:*

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

Entonces:

$$\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$$

Demostración. En vistas del lema 1,23, existen $B_1, \ldots, B_t \in S_\mu$ disjuntos dos a dos y tales que cualquier conjunto $A, A_1, \ldots, A_n$ se puede escribir como unión de algunos de ellos. De este modo:

$$A = \bigcup_{s \in M_0} B_s; \quad A_k = \bigcup_{s \in M_k} B_s \quad (1 \leq k \leq n)$$

Por la aditividad de la medida es:

$$\sum_{k=1}^{n} \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{s \in M_k} \mu(B_s)$$

Como $A \subset \bigcup_{k=1}^{n} A_k$, todo $s \in M_0$ aparece como índice de algún M_k en la suma de arriba. Luego:

$$\mu(A) = \sum_{s \in M_0} \mu(B_s) \leq \sum_{k=1}^{n} \sum_{s \in M_k} \mu(B_s) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$$

□

Corolario 1.30. *Si $A \subset A'$ es $\mu(A) \leq \mu(A')$.*

Demostración. Es el caso $n = 1$ del teorema anterior. □

Teorema 1.31. *Toda medida m tiene una extensón única μ cuyo dominio de definición es el anillo $\mathfrak{R}(S_m)$.*

Demostración. Recordemos que $\mathfrak{R}(S_m)$ es el anillo minimal que contiene al semianillo S_m y que este coincide con la colección de conjuntos $\mathfrak{B}$ de todos los conjuntos tal que admiten una partición finita en elementos del semi-anillo.

Sea entonces $A \in \mathfrak{R}(S_m)$, definimos:

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^{n} m(B_k), \qquad (B_i \in S_m)$$

Es fácil ver además que el valor de μ es independiente de la partición que se elije, pues recordemos que un semi-anillo es cerrado por intersecciones y además:

$$\sum_i B_i = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} m(B_i \cap C_j) = \sum_j m(C_j)$$

Como m es no negativa y aditiva, μ claramente lo es. Veamos además que μ es única. Sea μ' otra medida que extiende a m, tenemos que:

$$\mu'(A) = \sum_k \mu'(B_k) = \sum_k m(B_k) = \mu(A)$$

Pero esto es sin importar el A, de manera que μ' es en realidad μ. □

Observacion. Para cerrar este capítulo notemos que esto generaliza la sección 1,1, pues en el plano la coleccion de rectángulos forman un semi-anillo y los conjuntos elementales son el anillo minimal que los contiene -pues son los conjuntos que se forman como uniones finitas de estos-.

1.4. σ-aditividad. El problema general de extender la medida

Suele ser necesario, para ciertos fines, considerar la unión contable de conjuntos. Por esa razón la condición de aditividad que impusimos a la medida es insuficiente. Resulta natural entonces reemplazar esta condición por una más fuerte, la ya vista *σ-aditividad* o *aditividad completa*.

Definición 1.32. Sea μ una medida, decimos que es *completamente aditiva* si siempre que $\{A\}_n$ es una colección numerable de conjuntos disjuntos dos a dos en S_μ -la colección de conjunos donde se define μ- y $A \in S_\mu$ es tal que:

$$A = \bigcup_n A_n$$

Entonces:

$$\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$$

Ejemplo 1.33. La medida construida en la sección 1,1 es σ-aditiva. Otro ejemplo de medida σ-aditiva se puede construir de la siguiente manera. Consideremo $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto arbitrario y numerable. Sea además $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de reales positivos tal que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$$

Podemos tomar $S_\mu = \mathbb{P}(X)$ y para cada A subconjunto de X definimos:

$$\mu(A) = \sum_{x_n \in A} p_n$$

Es fácil verficar que μ es una medida σ-aditiva y que $\mu(X) = 1$. Pues si $A_1, A_2, \ldots$ generan una partición numerablede A, sumar sobre ls índices existentes en A es lo mismo que hacerlo sobre cada una de las partes. Esta medida suele utilizarse mucho en problemas de teoría de probabilidad.

Un ejemplo de una medida que no es σ-aditiva es el siguiente. Sea X el conjunto de puntos racionales en $[0, 1]$ y S_μ el conjunto de intersecciones de X con intervalos arbitrario, es fácil ver que S_μ es un semi-anillo. Para cada conjunto A en S_μ sea:

$$\mu(A) = b - a$$

con a, b los extremos de A, entonces μ es aditiva pero no σ-aditiva. Por ejemplo $\mu(X)$ es 1 pero X es unión de todos los racionales entre 0 y 1 -la cual es numerable-. Estos puntos tienen medida 0, por lo tanto la serie de las medidas no es igual a la medida del conjnto que forman.

Teorema 1.34. *Sea m una medida definida en un semi-anillo S_m. Si esta es completamente aditva, su extensión al anillo $\Re(S_m)$ también lo es.*

Demostración. Sean A y $\{B_n\}$ en el anillo $\Re(S_m)$ tal que:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

Pidamos además que los B_n sean disjuntos dos a dos. Por ser $\Re(S_m)$ el anillo generado por S_m, existen colecciones finitas de conjuntos A_j, B_{ni} disjuntas dos a dos y tales que:

$$A = \bigcup_j A_j, \quad B_n = \bigcup_i B_{ni}$$

Y esto para cada n. Si consideramos $C_{nij} = A_j \cap B_{ni}$, tenemos que:

$$A_j = \bigcup_n \bigcup_i C_{nij}, \quad B_{ni} = \bigcup_j C_{nij}$$

Por la completa aditividad de m en S_m, se tiene que:

$$m(A_j) = \sum_n \sum_i m(C_{nij})$$
$$m(B_{ni}) = \sum_j m(C_{nij})$$

Y por la definición de μ -la extensión- en $\Re(S_m)$, tenemos que:

$$\mu(A) = \sum_j m(A_j) = \sum_j \sum_n \sum_i m(C_{nij})$$
$$\mu(B_n) = \sum_i m(B_{ni}) = \sum_i \sum_j m(C_{nij})$$

Notemos que si hacemos la suma sobre todos los B_n obtenemos que:

$$\mu(A) = \sum_n \mu(B_n)$$

Y esto es lo que se quería probar. □

Teorema 1.35. *Si una medida μ es σ-aditiva y $A, A_1, A_2, \ldots, \in S_\mu$ son tales que:*

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Entonces:

$$\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Para probar este teorema y en vistas del anterior, es suficiente hacerlo sobre un anillo. Si logramos probar la propiedad en el anillo, esta valdrá automáticamente para el semi-anillo (ya que el semi-anillo está contenido en el anillo).

Sea S_μ un anillo, entonces los conjuntos:

$$B_n = (A \cap A_n) \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$$

Son también elementos del anillos. Tenemos entonces que:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

Y los conjntos B_n son disjuntos de a pares. Como además es $B_n \subset A_n$ para cada uno y por la σ-aditividad del anillo es:

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

□

Para terminar con este capítulo notaremos lo siguiente. Llamamos a A un conjunto de unicidad para una medida m si:

- Existe una extensión de m definida en A.
- Para dos de estas extenciones μ_1, μ_2 es:

$$\mu_1(A) = \mu_2(A)$$

La colección de conjuntos de unicidad para una medida m coincide con la colección de conjuntos medibles en el sentido de *Jordan* relativos a m. Esto es, los conjuntos A tales que, para todo $\varepsilon > 0$ existen A', A'' que cumplen que[5]:

- Ambos son medibles para m.
- Es $A' \subset A \subset A''$.
- Es $m(A'' \setminus A') < \varepsilon$

Sin embargo, si consideramos solo medida σ-aditivas y sus extensones σ-aditivas, la coleccion de conjuntos será en general más grande. Dado que en lo que sigue nos ocuparemos exclusivamente de este tipo de medidas introducimos la sigiente definición:

Definición 1.36. Un conjunto A se dice que es un conjunto de σ-unicida para una medida σ-aditiva μ si:

- Existe una extensión λ de μ definida en A (es decir, $A \in S_\lambda$).
- Si λ_1, λ_2 son dos extensiones σ-aditivas entonces $\lambda_1(A) = \lambda_2(A)$.

1.5. La extensión de Lebesgue de una medida definida en un semianillo con unidad

La motivació de esta sección está dada debido a las limitaciones de la medida de Jordan. Por ejemplo, un conjunto como el dado en el ejemplo al final de la sección 1,1 es decir el conjunto de puntos con coordenadas racionales que cumplen $x^2 + y^2 = 1$ no es medible en el sentido de Jordan si partimos de los rectángulos en el plano. La extensión de una medida σ-aditiva en un semi-anillo puede efectuarse a igual que al principio. En este sentido, esta sección será una gran repetición en términos abstractos de la sección 1,1.

Definición 1.37 (medidas interior, exterior y de Lebesgue.)**.** Sea $\mathfrak{S}$ un semi-anillo con unidad E, la medida exterior de un conjunto $A \subset E$ se define como:

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\{\sum_{n=1}^{\infty} m(B_n) : A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n, B_n \in S_m\}$$

[5] El Kolmogorov tiene una sección corta dedicada a esto la cual omití en este apunte.

Siendo la unión contable. Análogamente, la medida interior es:

$$\mu_*(A) = m(E) - \mu^*(E \setminus A)$$

Otra forma de enunciar esto es decir que:

Es claro en base $\mu_*(A) \leq \mu^*(A)$. Por otro lado se dice que A es medible si $\mu_*(A) = \mu^*(A)$ y en ese caso escribimos $\mu(A)$ la *medida de Lebesgue* del conjunto A. Otra forma de enunciar esto es decir que:

$$\mu^*(A) + \mu^*(E \setminus A) = m(E)$$

Observacion. Notemos primero que si tenemos que λ es una extensión σ-aditiva de la medida m[6], se tiene que:

$$\mu_*(A) \leq \lambda(A) \leq \mu^*(A)$$

Esto pues, gracias a la definición de σ-aditividad, ínifimo y supremo se tiene que esta desigualdad debe cumplirse. Esto nos dice por un lado que la medida μ de *Lebesgue* es esencialmente la única medida σ-aditiva que surge de extender la medida m del semi-anillo S_m. Por otro lado y aún más importante, nospermite definir las medidas interiores exteriores sobre el anillo en lugar del semianillo y trabajar con este es más sencillo. Esto pues, si definimos:

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\{\sum_{n=1}^{\infty} m'(B'_n) : A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B'_n, B'_n \in \Re(S_m)\}$$

Como $B'_n \in \Re(S_m)$ para cada n, existen $\{B_{nk}\}_k$ finitos y disjuntos tales que:

$$B'_n = \bigcup_k B_{nk}$$

Y en ese caso podemos reemplazar $m'(B'_n)$ por $\sum_k m(B_{nk})$ para cada n obteniendo así una suma igualmente numerable y recuperando la definición original[7].

A continuación se dejarán una serie de teoremas cuyas pruebas fueron prácticamente realizadas en las secciones anteriores y por ende no se repetirán:

Teorema 1.38. *Si $A \subset \bigcup_n A_n$ con $\{A_n\}$ una colección contable de conjuntos, entnces:*

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$$

[6]Acá hay una sutileza lógica. Si puedo extender m a una medida λ σ-aditiva, entonces m también lo es porque el semi-anillo está contenido en el anillo y $\lambda|_{S_m} = m$. Luego si pude extender m a una medida semi-aditiva es porque m ya lo era.

[7]Recordemos que m' es la medida de los conjuntos elementales. En este caso sería la suma de las medidas de los conjuntos que particionan al nuestro, esta es la medida del anillo, pues según lo visto en la sección 1,3 este anillo $\Re(S_m)$ es la colección de conjuntos que se pueden particionar en elementos del semi-anillo S_m.

Si $A \in \Re$ un anillo, entonces $\mu_*(A) = m'(A) = \mu^*(A)$. Entonces todos los conjuntos de $\Re(S_m)$ son medibles y sus medidas interiores y exteriores coinciden con m'.

Un conjunto A es medible si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $B \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

Teorema 1.39. *La colección $\mathfrak{M}$ de todos los conjuntos medibles es un anillo.*

Demostración. Dado que:

$$A_1 \cap A_2 = A_1 \setminus (A_1 \setminus A_2), \quad A_1 \cup A_2 = E \setminus [E \setminus A_1 \cap E \setminus A_2]$$

Es suficiente probar que si $A_1, A_2 \in \mathfrak{M}$ entonces su diferencia lo está. Sean entonces A_1, A_2 medibles, entonces existen $B_1, B_2 \in \Re(S_m)$ tales que:

$$\mu^*(A_1\Delta B_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu^*(A_2\Delta B_2) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Si tomamos $B = B_1 \setminus B_2$ el cual es un elemento de $\Re(S_m)$ y usando que:

$$(A_1 \setminus A_2)\Delta(B_1 \setminus B_2) \subset (A_1\Delta B_1) \cup (A_2\Delta B_2)$$

Tenemos que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

y por ende que A es medible. □

Teorema 1.40. *La función $\mu(A)$ es aditiva en $\mathfrak{M}$. Esto es que si $A_1, \ldots, A_n$ son elementos disjuntos del anillo, es:*

$$\mu(\sum_{k=1}^{n} A_k) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$$

Más aún, la función es σ-aditiva en el conjunto de conjuntos medibles $\mathfrak{M}$.

Demostración. La prueba de la aditividad es la misma que la hecha en la proposición 1,11. Para la σ-aditividad si $A \in \mathfrak{M}$ y $\{A_n\} \subset \mathfrak{M}$ son una colección de conjuntos disjuntos dos a dos y tales que:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

tenemos que, por los teoremas anteriores:

$$\mu(A) = \mu^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$
$$\sum_{n=1}^{N} \mu(A_n) \leq \mu^*(A) = \mu(A), \quad \forall N$$

De esta manera se prueba la igualdad y por ende la σ-aditividad. □

Definición 1.41. La extensión de Lebesgue $\mu = L(m)$ de una medida $m(A)$ es la función $\mu(A)$ definida en la colección $S_\mu = \mathfrak{M}$ de conjuntos medibles y que coincide con la medida exterior en esta colección.

Al considerar la medida de Lebesgue en el plano, mostramos que la intersecciones y uniones contables ed conjuntos medibles son conjuntos medibles. Esto también es cierto en el caso general y por ende $\mathfrak{M}$ es un álgebra de Borel con unidad E. Probemos esto:

Teorema 1.42. *La colección $\mathfrak{M}$ de conjuntos medidos en el sentido de Lebesgue es un álgebra de Borel con unidad E.*

Además, la σ-aditividad de la medida es continua, esto es que si μ es σ-aditiva y está definida en un B-Álgebra entonces:

- *Si $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ es una colección decreciente de conjuntos medibles y $A = \bigcap_n A_n$ o*
- *Si $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ es una secuencia creciente de conjuntos medibles y $A = \bigcup_n A_n$*

Tenemos que:

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Dado que el complemento de un conjunto medible es medible y:

$$\bigcap_n A_n = E \setminus \bigcup_n A_n$$

Basta probar la afirmación para uniones contables. Esto y las otras dos afirmaciones se prueban de la misma manera que se probaron en los puntos 1,12 a 1,16. □

Hagamos unas observaciones finales. En primer lugar, si A es un conjunto medible tenemos que este es de unicidad -es decir, es medible para una extensión μ de m y esta es única-. Sea $\varepsilon > 0$, como A es medible, existe $B \in \Re(S_m)$ -es decir B es unión de finitos elementos del semi-anillo- tal que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

Si tenemos que λ_1 es una extensión de la medida m, debe ser $\lambda(B) = m'(B)$, pues m' es la única extensión de la medida m en $\Re(S_m)$. Además, tenemos que:

$$\lambda_1(A\Delta B) \leq \mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

En consecuencia $|\lambda_1(A) - m'(B)| \leq \lambda_1(A\Delta B) < \varepsilon$. Si ahora λ_2 es otra extensión de la medida m, tenemos que vale exactamente lo mismo. Luego:

$$|\lambda_1(A) - \lambda_2(A)| \leq |\lambda_1(A) - m'(B)| + |\lambda_2(A) - m'(B)| < 2\varepsilon$$

Pero como esto es sin importar el ε tenemos que la extensión de la medida m es única sobre el conjunto $\mathfrak{M}$ de todos los conjuntos medibles en el sentido de Lebesgue.

La segunda observación, es que si m es una medida σ-aditiva definida en S y tenemos que $\mathfrak{M} = L(S)$ -el conjunto de todos los subconjuntos que resultaron ser medibles partiendo desde el semi-anillo S-, y si S_1 es un semi-anillo tal que:

$$S \subset S_1 \subset \mathfrak{M}$$

Entonces:

$$L(S_1) = L(S)$$

1.6. Extensión de la medida de Lebesgue en el caso general

Si partimos ahora de un semi-anillo S_m en el que la medida inicial m no tiene definida una unidad -es decir no hay un conjunto que esté en el anillo y contenga todos los otros conjuntos-, tenemos que modificar nuestra discusión. Por un lado, la medida exterior debe restringirse a los conjuntos que admiten una partición $\bigcup_n B_n$ tal que la serie $\sum_n m(B_n)$ es finita.

Además, como no hay unidad -puede pensarse como un conjunto de medida finita el cual funciona como universo-, la definición de medida interior pierde todo el sentido. Por ende, cambiamos la definición de ser medibles por la siguiente:

Definición 1.43. Un conjunto A se dice medible, si para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto $B \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

En este caso sigue valiendo que la clase $\mathfrak{M}$ de tods los conjuntos medibles sigue siendo medible y que la medida es aditiva, más aún σ-aditiva.

Para probar que es un anillo debemos volver a probar que si $A_1, A_2 \in \mathfrak{M}$ entonces $A_1 \cup A_2 \in \mathfrak{M}$, pues antes usamos que el conjunto es cerrado por diferencias y la siguiente igualdad:

$$A_1 \cup A_2 = E \setminus (E \setminus A_1 \cap E \setminus A_2)$$

Sin embargo esto es fácil de hacer y simplemente hay que notar que, por ser medibles existen B_1, B_2 buenos y que:

$$(A_1 \cup A_2)\Delta(B_1 \cup B_2) \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Notemos además que deja de ser equivalente ser δ-anillo y σ-anillo. Esto será importante para el siguiente teorema.

Teorema 1.44. *Para una medida inicial arbitraria m en la colección $\mathfrak{M} = S_{L(m)}$ de conjunts medibles es un δ-anillo. Un conjunto $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ donde cada A_n es medible, es a su vez medible si y solo si la medida de las uniones parciales $\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n)$ está acotada por una constante K que no depende de N.*

Demostración. Ya sabemos que $\mathfrak{M}$ es un anillo. Veamos que es un δ-anillo lo dejaremos para despues. Sea $\varepsilon > 0$ y $\{A_n\}$ un conjunto numerable de $\mathfrak{M}$, entonces si:

$$A = \bigcap_n A_n$$

Queremos ver que también es medible. Sea $C_N = \bigcap_{n=1}^{N} A_n$, estos son medibles por ser intersección finita de medibles y ser $\mathfrak{M}$ anillo. Es claro que $C_1 \supset C_2 \supset C_3 \supset \dots$. Tenemos entonces que $C_k \setminus C_{k+1}$ también es un elemento de $\mathfrak{M}$ para cada k, y estos conjuntos son disjuntos dos a dos -por estar encajados quitar el anterior es lo mismo que quitar todos los anteriores-. Podemos poner:

$$C_1 = A \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \setminus C_{n+1})$$

Esto nos dice que $A \subset C_1$ y por ende que $\mu^*(A) < \infty$. Además sabemos que μ^* es σ-aditiva en los conjuntos medibles pues es igual a μ y esta lo es, luego podemos poner:

$$\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \setminus C_{n+1})) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(C_n \setminus C_{n+1}) \leq \mu^*(C_1) = \mu(C_1)$$

Como C_1 es medible, esta suma es finita y por ende la serie debe converger, de manera que existe N_0 tal que:

$$\mu^*(\bigcup_{n=N_0}^{\infty} C_n \setminus C_{n+1}) = \sum_{n=N_0}^{\infty} \mu^*(C_n \setminus C_{n+1}) < \varepsilon/2$$

Pero $\bigcup_{n=N_0}^{\infty} C_n \setminus C_{n+1} = C_{N_0} \setminus A$. Entonces:

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} \mu^*(C_n \setminus C_{n+1}) = \mu^*(C_{N_0} \setminus A) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Luego, por ser C_{N_0} medible existe $B \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(C_{N_0} \Delta B) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Ahora, como:

$$A\Delta B \subset (A\Delta C_{N_0}) \cup (C_{N_0}\Delta B) = (C_{N_0} \setminus A) \cup (C_{N_0}\Delta B)$$

pues $A \subset C_{N_0}$ es. Tenemos así que:

$$\mu^*(A\Delta B) \leq \mu^*(C_{N_0}\Delta A) + \mu^*(C_{N_0}\Delta B) < \varepsilon$$

Como A y ε son arbitrarios, tenemos que $\mathfrak{M}$ es un δ-anillo.

Ahora veamos la segunda afirmación del teorema. Si A es medible, es claro que:

$$\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n) \leq \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(A) < \infty$$

Por otro lado, si se cumple que $\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n) < K$ para todo N y con $K > 0$. Sea $S_N = \bigcup_{n=1}^{N} A_n$ y sean $B_1 = S_1$ y $B_N = S_N \setminus S_{N-1}$ para cada $N > 1$, tenemos que por ser $\mathfrak{M}$ anillo es $S_n, B_n \in \mathfrak{M}$ para todo n. Además, los B_n son disjunts dos a dos y $S_N = \bigcup_{n=1}^{N} B_n$ y por ende:

$$\mu(S_N) = \sum_{n=1}^{N} \mu(B_n) < K$$

Por ende la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$ converge pues es no decreciente y acotada. Luego, tenemos que dado $\varepsilon > 0$ existe N_0 tal que:

$$\sum_{n=N_0+1}^{\infty} \mu(B_n) < \varepsilon$$

Y como $A\Delta S_{N_0} = A \setminus S_{N_0} = \bigcup_{n=N_0+1}^{\infty} B_n$ es:

$$\mu^*(A\Delta S_{N_0}) = \sum_{n=N_0+1}^{\infty} \mu(B_n) < \varepsilon$$

Y como S_{N_0} es medible, existe $C \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(S_{N_0}\Delta C) < \varepsilon$$

Y como $A\Delta C \subset (A\Delta S_{N_0}) \cup (C\Delta S_{N_0})$ es:

$$\mu^*(A\Delta C) \leq \mu^*(A\Delta S_{N_0}) + \mu^*(S_{N_0}\Delta C) < 2\varepsilon$$

Pero como esto es sin importar ε, tenemos que A es medible. □

Definición 1.45 (medida completa)**.** Una medida μ se dice completa si $\mu(A) = 0$ y $B \subset A$ implican que $B \in \Re_\mu$.

Observacion. Es claro que en este caso es $\mu(B) = 0$. Además, es fácil ver que la medida de extensión de Lebesgue de una medida arbitraria es completa, pues si $\mu(A) = \mu^*(A) = 0$ entonces $\mu^*(B) \leq \mu^*(A) = 0$ y como es no negativa debe ser 0 y un conjunto el cual su medida exterior es 0 es medible pues:

$$\mu^*(B\Delta\emptyset) = 0 < \varepsilon, \forall\varepsilon > 0$$

Otra curiosidad es que si pensamos a los conjuntos como puntos de un espacio métrico, es decir $A, B \in \Re(S_m)$ son puntos del anillo, $m'(A\Delta B)$ puede pensarse como la distancia entre estos puntos. Así, $\Re(S_m)$ se convierte en un espacio métrico en general no completo y su completación consiste justamente en todos los conjuntos medibles. En este caso sin embargo los conjuntos A, B no son necesariamente distintos si $\mu(A\Delta B) = 0$. Pensemos en este sentido que si la diferencia simétrica de dos conjuntos nos da por ejemplo un conjunto de un elemento -o inclusive un conjunto numerable-, este tendrá medida 0 pero los conjuntos no serán iguales. Aquí, al igual que en cálculo avanzado, podemos cocientar por la relación de eqivalencia $A \sim B \iff \mu(A\Delta B) = 0$.

1.7. Extras de medibilidad

Esta sección *no* aparece en el *Kolmogorov y Formin*, es un agregado del apunte teórico que hizo para la materia *Ezequiel Rela*. Lo agregamos aquí pues lo tratado aquí será importante para el *Solucionario*.

Considerese además lo dicho al principio del *Solucionario* (II) sobre la diferencia en la definición de medida en ambas secciones. Además en esta sección se tratarán conjuntos *Lebesgue medibles* y no medidas abstractas.

1.7.1. Paso de Kolmogorov a Rela

En esta sección probaremos varias cosas de medibilidad que aparecen en el apunte de Ezequiel Rela y no en el Kolmogorov. En este sentido empezaremos por mostrar que ambas definiciones de medibilidad son equivalentes.

Lema 1.46. *Todo abierto puede escribirse como unión numerable de rectángulos.*

Demostración. Para cada $k \in \mathbb{N}_0$, definimos la familia de cubos diádicos de orden k como:

$$\mathcal{Q}_k = \left\{ \prod_{i=1}^{n} \left[\frac{j_i}{2^k}, \frac{j_i+1}{2^k} \right] : j_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

Notemos que para un k fijo, los cubos de $\mathcal{Q}_k$ tienen interiores disjuntos -pues difieren en al menos una coordeada- y su unión es todo $\mathbb{R}^n$. Además, si $Q' \in \mathcal{Q}_{k+1}$, entonces existe un único $Q \in \mathcal{Q}_k$ tal que $Q' \subset Q$.

Definimos la colección $\mathcal{S}$ de cubos contenidos en G de forma inductiva para evitar solapamientos:

- **Paso 0:** Sea $\mathcal{S}_0 = \{Q \in \mathcal{Q}_0 : Q \subset G\}$.
- **Paso** k**:** Sea $\mathcal{S}_k = \{Q \in \mathcal{Q}_k : Q \subset G \text{ y } Q \not\subset \bigcup_{j=0}^{k-1} \bigcup_{Q' \in \mathcal{S}_j} Q'\}$.

Sea $\mathcal{S} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{S}_k$ la familia total de cubos seleccionados.

1. **($\supset$):** Por construcción, cada $Q \in \mathcal{S}$ cumple $Q \subset G$, por lo tanto $\bigcup_{Q \in \mathcal{S}} Q \subset G$.
2. **($\subset$):** Sea $x \in G$. Como G es abierto, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset G$. Elegimos $k \in \mathbb{N}$ tal que el diámetro de los cubos de la malla $\mathcal{Q}_k$ sea menor que r (es decir, $\frac{\sqrt{n}}{2^k} < r$). Sea $Q \in \mathcal{Q}_k$ el cubo que contiene a x. Por la elección de k, se tiene que $x \in Q \subset B(x, r) \subset G$. Si Q (o algún ancestro de Q de orden menor) no fue seleccionado en un paso previo, entonces Q o el cubo que lo contiene será seleccionado en el paso k, garantizando que $x \in \bigcup_{Q \in \mathcal{S}} Q$.

Cada familia $\mathcal{Q}_k$ es numerable (pues está en biyección con $\mathbb{Z}^n$). Al ser $\mathcal{S}$ una unión numerable de conjuntos numerables, $\mathcal{S}$ es numerable. Podemos entonces indexar $\mathcal{S} = \{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Si $Q, Q' \in \mathcal{S}$ con $Q \neq Q'$, entonces:

- Si son del mismo orden, sus interiores son disjuntos por definición de la malla $\mathcal{Q}_k$.
- Si son de distinto orden (supongamos $k < k'$), el proceso de selección en el paso k' excluye explícitamente cualquier cubo que ya esté contenido en un cubo previamente seleccionado.

De esta manera:

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} R_k \quad \text{con } \operatorname{int}(R_i) \cap \operatorname{int}(R_j) = \emptyset \text{ para } i \neq j.$$

$\square$

Probaremos qu las definiciones dadas al principio del *Solucionario* de medibilidad son equivalentes. En el medio usaremos la definición de *Caratheodory* pues esta nos servirá de puente entre ambas.

Teorema 1.47. *Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces para todo A existe B elemental tal que $\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$ si y solo si para todo E es $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $G \supset$ abierto tal que $\mu^*(G \setminus A) < \varepsilon$*

Demostración. Supongamos que para todo $\varepsilon > 0$ existe B elemental tal que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

es claro por un lado que para todo conjunto E es:

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(Es \setminus A)$$

por subaditividad de la medida exterior.

Sea E un conjunto, de manera que existe $(Q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una cubierta de rectángulos tales que:

$$\mu^*(E) \leq \sum_k m(Q_k) < \mu^*(E) + \delta$$

Sea R un rectángulo cualquiera, podemos definir un refinamiento de los rectángulos $\{Q_k\}$ y partirlos en $\{Q_{k,j}\}$ que cubren $E \cap R$ y $\{Q_{k,i}\}$ cubren $E \setminus R$, y además pedir que estos sean disjuntos. De esta manera:

$$\sum_k m(Q_k) = \sum_{k,j} m(Q_{k,j}) + \sum_{k,i} (Q_{k,i}) \geq \mu^*(E \cap R) + \mu^*(E \setminus R)$$

De esta manera, como δ puede ser arbitrariamente pequeño:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap R) + \mu^*(E \setminus R)$$

Inductivamente se puede probar que esto vale para cualquier conjunto elemental pues se puede repetir para cada rectángulo $R_1, \ldots, R_n$ tal que su unión forman el conjunto elemental llamemosle B. De esta manera si B es elemental, tenemos que:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \setminus B)$$

Ahora bien, dado el B del principio es:

$$E \cap A \subset (E \cap B) \cup (A\Delta B)$$
$$E \setminus A \subset (E \setminus B) \cup (A\Delta B)$$

Entonces:

$$\mu^*(E \cap A) \leq \mu^*(E \cap B) + \mu^*(A \Delta B) < \mu^*(E \cap B) + \varepsilon$$
$$\mu^*(E \setminus A) \leq \mu^*(E \setminus B) + \mu^*(A \Delta B) < \mu^*(E \setminus B) + \varepsilon$$

Por ende:

$$\mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) < \underbrace{\mu^*(E \setminus B) + \mu^*(E \cap B)}_{=\mu^*(E)} + 2\varepsilon$$

y como ε es arbitrario, tenemos que:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

Supongamos que para todo conjunto E es:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

Por definición de medida exterior existe $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una colección de rectángulos tales que $A \subset \bigcup_k R_k$ y:

$$\mu^*(A) \leq \sum_k m(R_k) < \mu^*(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Sea $R'_k \supset R_k$ un rectángulo abierto tal que para cada k es:

$$m(R'_k) < m(R_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

Entonces como cada R'_k es abierto, su unión también lo es y por ende:

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} R'_k$$

Es abierto y claramente $A \subset G$ y por ende $\mu^*(G) \geq \mu * (A)$. En ese caso además es:

$$\mu^*(G) \leq \bigcup_{k=1}^{\infty} m(R'_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(R_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} < \mu^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

Notemos que $\mu^*(G) = \mu^*(G \setminus A) + \mu^*(G \cap A) = \mu^*(G \setminus A) + \mu^*(A)$, de esta manera:

$$\mu^*(G \setminus A) = \mu^*(G) - \mu^*(A) < \mu^*(A) + \varepsilon - \mu^*(A) = \varepsilon$$

Por ende G es el abierto que buscábamos.

Si ahora vale que hay un G abierto tal que $\mu * (G \setminus A) < \varepsilon$, este G se puede escribir como unión contable de intervalo casi disjuntos dos a dos. Como además $G \supset A$ tenemos que:

$$\mu * (G \setminus A) = \mu^*(G \Delta A) < \varepsilon$$

Por ende G es el B que buscabamos. □

Esto que acabamos de probar nos dice que cualesquiera de las tres propiedades dadas son equivalentes a que un conjunto sea medible. Además, nos dice que todo abierto es medible pues el mismo es un abierto que aproxima su medida exterior. A partir de ahora usaremos cualesquiera de estas tres propiedades sin distinción.

Proposición 1.48.

- Si E es abierto es medible.
- Todo conjunto de medida exterior 0 es medible.
- La unión contable de medibles es medible.

Demostración. Si E es abierto el mismo se aproxima bien y por ende es medible.

Si $\mu^*(E) = 0$ para todo $\varepsilon > 0$ existe $G \supset E$ abierto tal que:

$$\mu^*(G \setminus E) \leq \mu^*(G) < \mu^*(E) + \varepsilon = \varepsilon$$

Si ahora $E = \bigcup_k E_k$ con cada E_k medible, entonces para cada k existe $G_k \supset E_k$ abierto tal que $\mu^*(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$. Si $G = \bigcup_k G_k$ entonces:

$$\mu^*(G \setminus E) \leq \sum_k \mu^*(G_k \setminus E_k) < \sum_k \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

y claramente G es abierto. □

Proposición 1.49. Todo cerrado es medible.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$, empecemos suponindo que F es además compacto. De manera que por estar en $\mathbb{R}^n$ es acotado y por ende tiene medida exterior finita. Sea $\varepsilon > 0$ y consideremos G abierto tal que $G \supset F$ y:

$$\mu(G) < \mu^*(F) + \varepsilon$$

Tenemos que $G \setminus F$ es abierto, de eta manera existe $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una colección de interavalos cerrados casi disjuntos tales que:

$$G \setminus F = \bigcup_n I_n$$

Ahora para cualquier N es:

$$G = F \cup \bigcup_n I_n \supset F \cup \bigcup_{n=1}^{N} I_n$$

Luego, como la colección de intervalos y F son disjuntos, y ambas son compactas, la medida exterior cumple que:

$$\mu^*(F) + \mu^*(\bigcup_{n=1}^{N} I_n) \leq \mu(G)$$

Pues son conjuntos disjuntos. Luego:

$$\mu^*(\bigcup_{n=1}^{N} I_n) \leq \mu(G) - \mu^*(F) < \varepsilon$$

Y como la desigualdad vale para todo N,tenemos que:

$$\mu^*(G \setminus F) = \mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n) \leq \mu(G) - \mu^*(F) < \varepsilon$$

Así F es medible. Si F no es compacto, para cada k definimos:

$$F_k := F \cap \overline{B(0,k)}$$

Para todo $k \geq 1$ F_k es compacto y por lo probado anteriormente es medible. Como además:

$$F = \bigcup_k F_k$$

tenemos que F es medible. □

Proposición 1.50. El complemento de todo medible es medible.

Demostración. Sea E medible, para cada $k \geq 1$ existe G_k abierto tal que:

$$\mu^*(G \setminus E) < \frac{1}{k}$$

Ahora sea $F_k = G_k^c$ son cerrados para cada k y por ende medibles. Sea $H = \bigcup_k F_k$ es también medible y $H \subset E^c$. Luego:

$$E^c = H \cup Z$$

Tenemos entonces que:

$$Z \subset E^c \cap H^c = E^c \cap \bigcap_k G_k \subset E^c \cap G_k = G_k \setminus E$$

Luego:

$$\mu^*(Z) \leq \mu^*(G_k \setminus E) < \frac{1}{k}$$

Por ende $\mu^*(Z) = 0$. Nuestro conjunto E^c es entonecs medible por ser unión de dos medibles. □

Corolario 1.51. *Un conjunto E es medible si y solo si para cada $\varepsilon > 0$ existe $F \subset E$ cerrado tal que $|E \setminus F|_e < \varepsilon$.*

Demostración. Sea E medible, entonces E^c es medible y por ende existe $G \supset E^c$ abierto tal que $\mu^*(G \setminus E^c) < \varepsilon$. De esta manera $G^c \subset E$ y es además cerrado. Tenemos que $\mu^*(E \setminus G^c) < \varepsilon$ pues $E \setminus G^c = E \cap G = G \setminus E^c$.

Si ahora vale que, dado $\varepsilon > 0$ existe $F \subset E$ cerrado tal que $\mu^*(E \setminus F)$ entonces por la misma igualdad que antes $F^c \supset E^c$ es abierto y $\mu^*(F^c \setminus E^c) < \varepsilon$. De esta manera E^c es medible y por lo tanto lo es E. □

Esto nos permite volver a demostrar un resultado sobre la medida usando las nuevas definiciones.

Proposición 1.52. La medida es σ-aditiva.

Demostración. Sea $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una familia de conjuntos medibles y disjuntos dos a dos, y $E = \bigcup_n E_n$, es claro que:

$$\mu(E) \leq \sum_n \mu(E_n)$$

Supongamos que los E_n son acotados, de manera que por ser medibles existe para cada n un F_n cerrado tal que $F_n \subset E_n$ y $\mu(E_n \setminus F_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$. Tenemos en este caso que:

$$\mu(E_n) \leq \mu(E_n \cap F_n) + \mu(E_n \setminus E_n) \leq \mu(F_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

Por ser subconjunto de E_n cada F_n será además compacto y por ser los E_n disjuntos estarán separados positivamente, de esta manera, para cada N es:

$$\sum_{n\leq N} \mu(F_n) = \mu(\bigcup_{n\leq N} F_n) \leq \mu(\bigcup_{n\leq N} E_n) \leq \mu(\bigcup_n E_n)$$

De esta manera, tenemos que:

$$\sum_{n\leq N} \mu(E_n) \leq \sum_{n\leq N} \mu(F_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} < \mu(\bigcup_n E_n) + \varepsilon$$

Pero esto es sin importar el N ni ε, luego:

$$\sum_{n\leq N} \mu(E_n) \leq \mu(\bigcup_n E_n)$$

Si los E_n no son acotados, consideremos $E_{n,j} = E_n \cap \overline{B(0,j)}$ con $j \in \mathbb{N}$. Esto nos da otra familia numerable de conjuntos medibles y tales que $E = \bigcup_{n,j} E_{n,j}$. Por lo anterior es:

$$\mu(E) = \sum_{n,j} \mu(E_{n,j}) = \sum_n \mu(E_n)$$

□

Proposición 1.53. Todo G_δ y todo F_σ es medible.

Demostración. Para ello basta notar que un F_σ es unión numerable de cerrados y por ende de medibles y que un G_δ es complemento de un F_σ. $\square$

Definición 1.54. Llamaremos $\mathfrak{M}$ a la σ-álgebra que contiene todos los conjuntos medibles Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.

Proposición 1.55. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto:

- $E \in \mathfrak{M}$ si y solo si $E = H \setminus Z$ con H un G_δ y Z de medida 0.
- $E \in \mathfrak{M}$ si y solo si $E = H \cup Z$ con H un F_σ y Z de medida 0.

Demostración. Notemos que la implicación $\Longleftarrow$ es inmediata en ambos puntos por tratarse de operaciones de conjuntos medbles. Para la otra, sea E medible y G_k abierto tal que $E \subset G_k$ y $\mu^*(G_k \setminus E) < \frac{1}{k}$, si $H = \bigcap_k G_k$ es un G_δ y además:

$$E = H \setminus (H \setminus E)$$

y si $Z = H \setminus E$ entonces como $Z \subset G_k \setminus E$ para todo k este tiene medida 0.

Para la otra basta notar que si $E = H \setminus Z$ con Z de medida 0 y $H \in G_\delta$, entonces:

$$E^c = H^c \cup Z$$

con Z de medida 0 y $H \in F_\sigma$ pero esto sin importar $E \in \mathfrak{M}$, de manera que todo conjunto medible se escribe de esta forma. $\square$

Hay muchos más resultados de este tipo, todos importantes que pueden encontrar en la parte del *Solucionario*.

1.7.2. Funciones y medibilidad

Proposición 1.56. Para cada $v \in \mathbb{R}^n$ fijo definimos la traslación por v como:

$$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad T(x) = x + h$$

Para cada $E \in \mathfrak{M}$ se tiene que $T(E) = E + h \in \mathfrak{M}$ y que $|T(E)| = |E + h| = |E|$.

De manera análoga, una dilatación es una función $D : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que:

$$D(x) = (\delta_1 x_1, \ldots, \delta_n x_n)$$

Y si E e medible, entonces $D(E)$ es medible y

$$|D(E)| = |\delta_1 \ldots \delta_n||E|$$

Demostración. Ver los ejercicios $6, 7$ de la práctica sobre medida de Lebesgue (4). $\square$

Teorema 1.57. *Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una función Lipschitz, entonces si $E \in \mathfrak{M}$ es $f(E) \in \mathfrak{M}$.*

Demostración. Notemos primero que toda función Lipschitz es en particular continua, por ende envía compactos en compactos. Sea H un F_σ, entonces H se puede escribir como unión numerable de compactos. Sea $H = \bigcup_k F_k$ esta unión, entonces:

$$f(H) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f(F_k)$$

y por ende $f(H)$ es también un F_σ.

Sea Z de medida 0, veamos que $f(Z)$ es de medida 0. Sea Q un cubo y $x, y \in Q$, si L es el lado del cubo, tenemos que la distancia entre x, y es a lo sumo $\sqrt{n}L$, pues esta se corresponde a la diagonal, luego:

$$d(x, y) \leq diam(Q) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} L^2} = \sqrt{n}L$$

Por ser f Lipschitz digamos de constante M, entonces el máximo de las distancias entre elementos de la imagen es $M\sqrt{n}L$.

Sea Z de medida 0 y $\varepsilon > 0$, entonces existen $\{Q_k\}$ cubos tales que $Z \subset \bigcup_k Q_k$ y:

$$\sum_k m(Q_k) < \varepsilon$$

De esta manera, tenemos que:

$$f(Z) \subset \bigcup_k f(Q_k) \subset \bigcup_k Q'_k$$

Con Q'_k un cubo que contiene a $f(Q_k)$ y tiene lado $M\sqrt{n}L_k$. Notemos que el volumen de $m(Q_k) = (M\sqrt{n}L_k)^n$. Si ponemos $C = (M\sqrt{n})^n$ una constante es:

$$\mu^*(f(Z)) \leq \sum_k m(Q'_k) = C \sum_k m(Q_k) < C \cdot \varepsilon$$

Como C es una constante fija pues depende de la dimensión y de la constante de f, y ε es arbitrario, tenemos que $\mu^*(f(Z)) = 0$ y por ende que $f(Z)$ es medible y su medida es 0.

Sea entonces $E \in \mathfrak{M}$, tenemos por la proposición 1,53 que existen H un F_σ y Z un conjunto de medida 0 tal que:

$$E = H \cup Z$$

Como $f(E) = f(H) \cup f(Z)$ y f preserva F_σ y conjuntos de medida 0, tenemos que $f(E)$ es medible. $\square$

1.7.3. Conjunto de Vitali y de diferencias

Ejemplo 1.58. Construyamos el *conjunto de Vitali* en el $(0,1)$. Considereos en el conjunto $(0,1)$ la relación de equivalencia $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Esto nos da no numerables clases de equivalencia.

Sea V un conjunto tal que posee un elemento de cada clase de equivalencia. Sea $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una numeración de todos los racionales en $(-1,1)$ y sea $V_k = V + r_k$. Notemos que $V_k \cap V_j = \emptyset$ si $k \neq j$, pues si z está en la intersección entonces:

$$z = z_x + r_k = z_y + r_j \implies z_x - z_y = r_j - r_k \in \mathbb{Q}$$

de manera que, como $z_x, z_y \in V$ deben ser iguales y lo mismo para $r_j = r_k$.

Supongamos que V es medible. Para todo r_k debe ser V_k medible y además $\mu(V_k) = \mu(V)$ para todo k. Podemos ver que:

$$(0,1) \subset \bigcup_k V_K \subset (-1,2)$$

Luego:

$$1 = \mu(0,1) \leq \mu(\bigcup_k V_k) \leq \mu(-1,2) = 3$$

y como los V_k son disjuntos es:

$$1 \leq \sum_k \mu(V) \leq 3$$

Si $\mu(V) = 0$ esto no puede ser y si es > 0 esta suma debe diverger pues es $\mu(V) \sum_k 1$.

Definición 1.59. Definimos el *conjunto de diferencias* de un cojunto $E \subset \mathbb{R}$ como:

$$D(E) := \{x - y : x, y \in E\} \tag{1}$$

Proposición 1.60. Sea E medible con medida positiva, existe $\delta > 0$ tal que $(-\delta, \delta) \subset D(E)$.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado y $\varepsilon > 0$, consideremos $G \supset E$ abierto tal que:

$$\mu(G) < (1+\varepsilon)\mu(E)$$

Notar que si E tiene medida 0 esto no podriamos hacerlo. Ahora bien podemos descomponer a G en intervalos casi disjuntos:

$$G = \bigcup_k I_k$$

Sea $E_k = E \cap I_k$ entonces tenemos también una descomposición de E en conjuntos medibles y con a lo sumo un punto en común. Por ende:

$$\mu(G) = \sum_k \mu(I_k) \leq (1+\varepsilon)\mu(E) = (1+\varepsilon)\sum_k \mu(E_k)$$

Necesariamente debe existir algún k_0 tal que:

$$\mu(I_{k_0}) \leq (1+\varepsilon)\mu(E_{k_0})$$

Si $\varepsilon = \frac{1}{3}$ esto nos da que:

$$\frac{3}{4}\mu(I_{k_0}) \leq \mu(E_{k_0})$$

Bajo esats condiciones, tomando $0 \leq \theta < \frac{1}{2}\mu(I_{k_0})$. En ese caso:

$$E_{k_0} \cap E_{k_0} + \theta \neq \emptyset$$

Si no fuera el caso, estosconjuntos serían disjuntos y por ende:

$$\mu(E_{k_0} \cup (E_{k_0} + \theta)) = \mu(E_{k_0} + \mu((E_{k_0} + \theta)) = 2\mu(E_{k_0})$$

Además, esta unión está contenida en un intervalo de longitud $\mu(I_{k_0}) + \theta$ pues como $\theta < \frac{1}{2}\mu(I_{k_0})$ tenemos que $I_{k_0} \cap I_{k_0} + \theta \neq \emptyset$. Finalmente, estas dos últimas observacones implican que:

$$\frac{3}{2}\mu(I_{k_0}) \leq 2\mu(E_{k_0}) \leq \mu(I_{k_0}) + \theta$$

y por ende que $\frac{1}{2}\mu(I_{k_0}) = \theta$ lo cual es absurdo. Por ende debe ser $E_{k_0} \cap E_{k_0} + \theta \neq \emptyset$.

Lo último es lo mismo que decir que para todo $0 \leq \theta < \frac{1}{2}|I_{k_0}|$ existen $x, y \in E$ tal que $x = y + \theta$ que a su vez es lo mismo que decir que $x - y = \theta$. Esto prueba la proposición con $\delta = \frac{1}{2}\mu(I_{k_0})$. $\square$

Ejemplo 1.61. Con lo anterior podemos dar una prueba algo distinta de la existencia de un conjuntos no medibles. Consideremos la misma clase de equivalecia que antes pero ahora en $\mathbb{R}$. Sea V un conjunto con exactamente un elemento de cada clase, para todo par de elementos en V su diferenciano está

en $\mathbb{Q}$. Por ende $D(V)$ no puede contener ningún entorno del origen.

Por el resultado anterior, esto puede pasar si el conjunto es no medible o posee medida 0, pero como:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} V + r$$

tenmos que V no debe ser medible.

Proposición 1.62. Sea E medible con medida positiva, entonces existe $W \subset E$ no medible.

Demostración. Si V es el conjunto de Vitali anteriormente construido, podemos usar que $\{V + r : r \in \mathbb{Q}\}$ nos da una partición de $\mathbb{R}$ y:

$$0 < \mu(E) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} \mu^*(E \cap V_r)$$

Ahora bien, para cada r tenemos que si $E \cap V_r$ fuera mdible entonces debe tener medida 0. Si no fuera el caso $D(E \cap V_r)$ tendría un entorno en el origen y por ende lo tendría V_r. Luego existirían $x, y \in V_r$ tal que $x - y \in \mathbb{Q}$, lo cual es absurdo.

Finalmente es claro que alguno de los términos de la suma debe ser positivo, digamos $\mu^*(E \cap V_{r_0})$. La única opción es que este conjunto no sea medible. $\square$

2. Funciones medibles

2.1. Definición y propiedades fundamentales de las funciones medibles

Definición 2.1. Sean X, Y dos conjuntos y supongamos que $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ son clases de subconjuntos de X e Y respectivamente. Unafunción $y = f(x)$ definida en X con valores en Y se dice $(\mathfrak{S}, \mathfrak{S}')$-*medible* si siempre que $A \in \mathfrak{S}'$ es $f^{-1}(A) \in \mathfrak{S}$.

Ejemplo 2.2. Supongaos que $X = Y = \mathbb{R}$. De esta manera nuestra f es una función real. Si tomamos $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ las clases de todos los conjuntos abiertos -o cerrados- de $\mathbb{R}$, tenemos que ser medible equivale a ser una función continua. Si por otro lado nuestras colecciones fueran las de los conjuntos de Borel, entonecs la definición es que estas sean funciones B-medibles.

En lo que sigue, nos interesarán las funciones medibles desde el punto de vista de la integración.Resulta fundamental para ello el concepto de μ-medibilidad de funciones reales definidas en un conjunto X con $\mathfrak{S}'$ la clase de todos los B-conjunts en la recta real. Por simplicidad, podemos asumir que X es la unidad del dominio de definición S_μ de la medida μ. Dado que, como vimos, toda medida σ-aditiva se puede extender a un álgebra de Borel, podemos asumir que S_μ es un álgebra de Borel. Recordemos primero cual es la clase de los conjuntos de Borel.

Definición 2.3. Definimos la *Clase de los conjuntos de Borel* o el *σ-álgebra de Borel* de un espacio métrico (X, τ) al σ-álgebra generado por τ, estoe es:

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau) = \bigcap \{S : S \text{ es } \sigma - Algebra \text{ en } X \text{ y } \tau \subset S\}$$

Si un conjunto pertenece a este álgebra decimos que es un conjunto de Borel.

Definición 2.4 (función medible en $\overline{\mathbb{R}}$)**.** Sea $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función que toma valores en la recta real extendida definida en un conjunto X. Decimos que f es μ-medible si:

$$f^{-1}(A) \in S_\mu$$

Para todo conjunto de Borel A en la recta real.

Lema 2.5. *Para que una función f sea μ-medible, es suficiente y necesario que para todo real c, el conjunto:*

$$\{x \in X : f(x) < c\} = \{f < c\}$$

sea μ-medible, esto es que sea un elemento de S_μ.

Demostración. La necesidad de la condición es obvia, pues si f es μ-medible se tiene que en particular estos conjuntos son las preimágenes de $(-\infty, c)$, el cual es de *Borel*.

Para ver la suficiencia, notemos que el cierre de Borel de todos los conjuntos de esta forma -en la definición anterior, en vez de tomar toda la topología tomas estos conjuntos- genera todos los conjuntos de Borel de la recta real. Si llamamos $B(\Sigma)$ a este cierre, notar:

$$f^{-1}(B(\Sigma)) = B(f^{-1}(\Sigma)) \subset B(S_\mu) = S_\mu$$

Pues S_μ es un B-Álgebra por hipótesis. Esto pues $\square$

Corolario 2.6. *Equivalen:*

1. *f es medible.*
2. *$\{f \geq a\} \in S_\mu$ para todo a.*
3. *$\{f > a\} \in S_\mu$ para todo a.*
4. *$\{f \leq a\} \in S_\mu$ para todo a.*

Demostración. Si f es medible, por el lema anterior es para cada c:

$$\{f < c\} \in S_\mu$$

como S_μ es un σ-álgebra:

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \{f < a + \frac{1}{k}\}$$

Luego $\{f \leq a\}$ es medible por ser intersección numerable de medibles. Por otro lado, es $\{f > a\} = \{f \leq a\}^c$ y por ende es medible. Como este es medible, la prueba para $\{f \geq a\}$ es análoga a la anterior. $\square$

Lema 2.7. *Sea $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función tal que $\{a < f < +\infty\}$ es medible para todo $a \in \mathbb{R}$ y alguno de los conjuntos $\{f = +\infty\}, \{f = -\infty\}$ es medible, entonces f lo es.*

Demostración. Por el lema y corolario anterior, sabemos que basta ver que $\{f > a\}$ es medible para cada a, si suponemos que cada $\{a < f < \infty\}$ es medible, y $\{f = +\infty\}$ es medible, entonces basta notar que:

$$\{f > a\} = \{a < f < +\infty\} \cup \{f = +\infty\}$$

Si en cambio es $\{f = -\infty\}$ entonces podemos considerar el conjunto:

$$\{f > -\infty\} = X \setminus \{f = -\infty\}$$

que por hipótesis es medible pues suponemos que X nuestro dominio es unidad para μ. Luego:

$$\{f = +\infty\} = \{f > -\infty\} \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{n < f < \infty\}$$

Que es medible por ser diferencia de medibles y obtenemos la igualdad anterior. $\square$

Proposición 2.8. El límite puntual de una sucesión de funciones μ-medibles es μ-medible.

Demostración. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles y f la función que a cada x le asigna el límite puntual de la sucesión. Notemos:

$$\{x : f(x) < c\} = \bigcup_k \bigcup_n \bigcap_{m>n} \{x : f_m(x) < c - \frac{1}{k}\}$$

Pues si $f(x) < c$ existe un k tal que $f(x) < c - \frac{2}{k}$; además, para este k hay un n lo suficientemente grande tal que:

$$f_m(x) < c - \frac{1}{k}, \quad (\forall m \geq n)$$

Esto significa que x está en a intersección de todos los conjuntos de la derecha. Recíprocamente, si x está en el conjunto de la derecha, existe un k y un n tal que:

$$f_m(x) < c - \frac{1}{k}, \quad (\forall m \geq n)$$

Por ser $f(x)$ el límite puntual, es $f(x) < c$, es decir $x$está también en el conjunto de la izquierda.

Si las funciones f_m son medible, los conjuntos de la derecha están en S_μ por ser la preimágen de $(-\infty, c - \frac{1}{k})$ para cada f_m. Luego, como S_μ es un álgebra de Borel, el conjunto:

$$\{x : f(x) < c\}$$

también está en S_μ y como esto es sin importar el c, tenemos que f es medible. □

2.2. Clases de equivalencia de funciones medibles

Teorema 2.9. *Una función B-medible de una función μ-medible es μ-medible*

Demostración. Sea $f(x) = \phi[\psi(x)]$ donde ϕ es Borel medible y ψ μ-medible. Sea A un conjunto de Borel arbitrario, entonces $\phi^{-1}(A) = A'$ es B-medible y $A'' = \psi^{-1}(A')$ es μ-medible. Entonces $f^{-1}(A) = A''$ es μ-medible para A Borel arbitrario. □

En particular el teorema anterior vale cuando ϕ es continua -pues en este caso siempre es B-medible-.

Corolario 2.10. *Resultan medibles:*

$$|f|, |f|^p (p > 0), \lambda \cdot f, f^+, f^-, f + \lambda$$

En el estudio de las funciones medibles a veces es posible ignorar los valores de las funciones en conjuntos de medida 0. En este contexto, introducimos lo siguiente.

Definición 2.11. Dos funciones f, g definidas en el mismo conjunto medible E se dicen equivalentes si:

$$\mu\{x \in E : f(x) \neq g(x)\} = 0$$

En este sentido, decimos que una propiedad se satisface en casi todas las partes (abreviado *c.t.p.* o *a.e.* en inglés) si se cumple para todos los puntos de E salvo un conjunto de medida 0. En este sentido dos funciones son equivalentes si son iguales en c.t.p.

Teorema 2.12. *Si dos funciones f, g continuas en un intervalo cerrado E son equivalentes, entonces son iguales.*

Demostración. Supongamos que existe x_0 tal que $f(x_0) \neq g(x_0)$, de manera que la diferencia es no nula. Como $f - g$ es continua, entonces no se anula en algún entorno de x_0. Este entorno tiene medida positiva -pues en particular es un intervalo- y por ende $f \not\sim g$. Por ende si f, g difieren en un solo punto no son equivalentes. □

Obviamente en general, si dos funciones medibles son equivalentes no son iguales. Por ejemplo la funció que es 1 en los racionales y 0 en los iracionales es equivalente a la función constantemente 0 en la recta real.

Por otro lado, será de utilidad el siguiente lema:

Lema 2.13. *Si $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$ son funciones medibles, entonces el conjunto $\{f > g\}$ es medible.*

Demostración. Basta notar:

$$\begin{aligned}\{x \in E : f(x) > g(x)\} &= \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{x \in E : f(x) > r > g(x)\} \\ &= \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{x \in E : f(x) > r\} \cap \{x \in E : r > g(x)\}\end{aligned}$$

□

Teorema 2.14. *Una función $f(x)$ definida en un conjunto medible E y equivalente a $g(x)$ medible es medible.*

Demostración. Se sigue de la definición de equivalencia que los conjuntos:

$$A = \{x : f(x) < a\}, \quad B = \{x : g(x) < a\}$$

pueden diferir solo en un conjunto de medida 0. Por ende si el segundo conjunto es medible, lo es el primero y en vistas del lema 2,5 tenemos ue f es medible.

Recordemos queal principio del capítulo asumimos que S_μ era un álgebra de Borel y esto implica que la medida μ del dominio sea completa. Si no fuera el caso deberiamos agregar esta condición y notar que $D = A\Delta B$ está contenido en $D \subset \{x : f(x) \neq g(x)\}$ y por completitud de la medida este tiene medida 0 pues suponemos $f \sim g$.

La prueba termina notando que B es medible y $A = (B \setminus (B \setminus A)) \cup A \setminus B$ y cada piezae es medible. La primera por estar contenida en B y la segunda por estar contenida en D. □

Lema 2.15. *Sea $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ una función medible, entonces $f^{-1}(G)$ es medible para todo abierto $G \subset \mathbb{R}$. Análogamente si $f^{-1}(G)$ es medible para todo abierto y los conjuntos $\{f = +\infty\}$ o $\{f = -\infty\}$ es medible, entonces f es medible.*

Demostración. Sea f medible, entonces si G es abierto en $\mathbb{R}$, este es unión de contables intervalos disjuntos, de este modo:

$$f^{-1}(G) = \bigcup_k f^{-1}(a_k, b_k)$$

Si ahora $f^{-1}(G)$ es medible, entonces cada conjunto $\{a < f < \infty\}$ es medible y por el lema 2,7 esto basta para que f sea medible dado que $\{f = +\infty\}$ o $\{f = -\infty\}$ son medibles. □

2.3. Funciones simples

Para el resto de la discusión es conveniente representar cada función medible como el límite de una sucesión de funciones simples.

Definición 2.16. Dado un conjunto $A \subset E$ un conjunto, definimos la caracterpistica de A como:

$$\chi_A(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Definición 2.17. Una función $f(x)$ se dice *simple* si asume solo una cantidad finita de valores distintos. Es decir, existen conjuntos $E_1, \ldots, E_n \subset E$ tales que:

$$E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i, \quad f(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{E_i}(x)$$

Teorema 2.18. *Una función $f(x)$ que asume no más que un conjunto numerable de valores distintos $y_1, \ldots, y_n, \ldots$ es μ-medible si y solo si todos los conjuntos:*

$$A_n = \{x : f(x) = y_n\}$$

son μ-medibles, esto es que están en S_μ.

Demostración. Nuevamente, la necesidad de la condción es clara, pues cada A_n es la preimagen de un punto y los puntos son conjuntos de Borel. La suficiencia se sigue del hecho de que la imagen inversa de cualquier conjunto B de Borel será en definitiva la imagen inversa de un conjunto contable de puntos, es decir unión contable de imágenes inversas y estamos suponiendo que estas -los A_n- son medibles, por ende pertenecen a S_μ. □

A partir de este punto asumiremos que todas las funciones que siguen tienen por codominio a $\mathbb{R}$.

Teorema 2.19 (de aproximación monótona)**.** *Sea $f : E \to [0, +\infty]$ una función no negativa, existe entonces una sucesión de funciones simples medibles $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que:*

1. *$0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ para todo $x \in E$.*
2. *$f_n(x) \to f(x)$ puntualmente*

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$ partamos el intervalo $[0, n)$ en escalones de $\frac{1}{2^n}$. Consideremos la función $f_n(x)$ tal que:

1. si $f(x) \geq n$ entonces $f_n(x) = n$.
2. Si $0 \leq f(x) < n$ buscamos el único k tal que:

$$\frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n}$$

   y definimos $f_n(x) = \frac{k-1}{2^n}$.

Es claro que f_n es simple,pues toma valores en el conjunto $\{0, \frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}, \ldots, n\}$. Para ver monotonía:

1. Si $f(x) \geq n+1$ entonces es claro que $f_n(x) = n < n+1 = f_{n+1}(x)$.
2. Si $n \leq f(x) < n+1$ entonces $f_n(x) = n$ y como $f_{n+1}(x)$ se define para este caso en el intervalo $[n, n+1)$ es claro que debe ser mayor.
3. Si $0 \leq f(x) < n$ sea $f_n(x) = \frac{k-1}{2^n}$ entonces $f(x)$ cae en el intervalo:

$$\frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n}$$

Al pasar al nivel $n+1$, dividimos este intervalo exactamente en dos mitades:

$$\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k-1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \cup \left[\frac{k-1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{k}{2^n}\right)$$

Si $f(x)$ cae en la primer mitad, entonces $f_{n+1}(x) = \frac{k-1}{2^n} = f_n(x)$. Si cae en la segunda mitad, entonces $f_{n+1}(x) = \frac{k-1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} > f_n(x)$.

Es claro por último que $f_n(x) \to f(x)$ para cada x. Si $f(x) = +\infty$ entonces para todo n es $f(x) \geq n$ y por ende $f_n(x) = n \to \infty$.

Si $f(x) < \infty$ existe un N tal que para todo $n > N$ es $n > f(x)$ en ee caso, por la construcción:

$$0 \leq f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n} \tag{2}$$

□

Es claro además que si f es medible cada f_n resulta medible. Por otro lado

Corolario 2.20. *Sea $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ existe entonces una sucesión de funciones simples f_k tales que son crecientes en módulo y convergen puntualmente a f.*

Demostración. Sea f una función, tenemos que f^+ y f^- son funciones no negativas. De esta manera existen por el teorema anterior g_k, h_k familias de funciones simples monótonas tales que $\lim_k g_k(x) = f^+(x), \lim_k h_k(x) = f^-(x)$.

Sea $f_k(x) = g_k(x) - h_k(x)$ esta función es simple y como $f = f^+ - f^-$ entonces $\lim_k f_k(x) = f(x)$ para todo x.

Para ver que $|f_k| \leq |f_{k+1}|$ basta notar que si $f(x) > 0$ entonces $f^+(x) = f(x)$ y $f^-(x) = 0$ y si $f(x) < 0$ vale lo contrario. Luego cuando $f^+(x) = 0$ es $g_k(x) = 0$ y vale lo análogo para h_k. Por ende,fijado x el módulo de $f_k(x)$ es igual al de $g_k(x)$ o al de $h_k(x)$ en caday lo mismo vale para $f_{k+1}(x)$. Como g_k y h_k son crecientes, lo es f_k. □

Corolario 2.21. *La suma $f + g$ y el producto $f \cdot g$ de dos funciones medibles es medible y si $g \neq 0$ para todo $x \in E$ entonces $\frac{f}{g}$ también.*

Demostración. Para la suma, notemos que si f, g son medibles, entonces $a - g$ es medible para cada a y el conjunto:

$$\{f + g > a\} = \{f > a - g\}$$

El cual es también medible, pues como vimos si h, h' son medibles entonces el conjunto:

$$\{h > h'\}$$

también lo es.

Para el producto, notemos que $f \cdot g = \frac{(f+g)^2-(f-g)^2}{4}$. Como la suma de medibles es medile y la composición de una medible con una continua es medible, eto es claro.

Por otro f/g es medible pues cuando $g \neq 0$ la funcion $\frac{1}{g}$ resulta composición de una medible con una continua y luego f/g es producto de dos medibles. $\square$

2.4. Sucesiones de funciones medibles. Varios tipos de convergencia

En la sección anterior vimos que las operaciones aritméticas sobre funciones medibles generan funcionesmedibles. Además, vimos que la clase de las funciones medibles, son cerradas bajo el paso al límite. Sumada a la convergencia puntual, resulta convenientes definir otros tpos de convergencias para funcines medibles. En esta sección consideraremos estas definiciones, sus propiedas y las relaciones entre ellas.

2.4.1. Convergencia en casi todas partes

Definición 2.22. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesón de funciones definidas en un espacio de medida X -es decir un espacio con una medida definida en él-, se dice que *converge a $F(x)$ en casi todas partes* si:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = F(x)$$

para casi todos los $x \in X$ -es decir salvo por un conjunto de medida-.

Ejemplo 2.23. Un ejemplo de esto es las sucesiones de funciones $f_n(x) = (-x)^n$ converge a la función $F(x) \equiv 0$ en el interval $[0, 1]$.

La proposición 2,8 admite una generalización.

Teorema 2.24. *Si una sucesión de funciones $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ μ-medibles, converge a una función F en casi todas partes, entonces F es medible.*

Demostración. Sea A El conjunto en el cual:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = F(x)$$

Por hipótesi, $\mu(E \setminus A) = 0$. La función $F(x)$ es medible en A pues el límite puntual de funciones medibles es medible. Dado que toda función es obviamente medible en un conjunto de medida cero, $F(x)$ es medible en $(E \setminus A)$. En consecuencia es medible en E. $\square$

El siguiente teorema se conoce como el *teorema de Egorov*, relaciona las nociones de convergencia *a.e.* y convergencia uniforme. Este es el caso general para conjuntos medibles

Teorema 2.25 (Egorov general)**.** *Suponga que una sucesión de funciones medibles f_n converge a f en casi todas partes. Si el espacio de origen E tiene medida finita, entonces para todo $\delta > 0$ existe un conjunto medible $E_\delta \subset E$ tal que:*

- $\mu(E_\delta) > \mu(E) - \delta$.
- *La sucesón f_n converge uniformemente a f en E_δ.*

Demostración. Según el teorema anterior f es medible. Sea:

$$E_n^m = \bigcap_{i \geq n} \{x : |f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}\}$$

Por lo tanto E_n^m para m y n fijos es el conjunto de todos los x para los cuales:

$$|f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}, \quad (i \geq n)$$

Notemos además:

$$E^m = \bigcup_n E_n^m$$

Es claro además que:

$$E_1^m \subset E_2^m \subset E_3^m \subset \dots$$

Para m fijo. Como una medida σ-aditiva es continua, tenemos que para m arbitrario y $\delta > 0$ existe $n(m)$ tal que:

$$\mu(E^m \setminus E_{n(m)}^m) < \frac{\delta}{2^m}$$

Definimos:

$$E_\delta = \bigcap_m E_{n(m)}^m$$

y probaremos que E_δ es el conunto requerido.

Primero probaremos que la sucesión $\{f_i(x)\}$ converge uniformemente a $f(x)$ en E_δ. Esto se sigue inmediatamente del hecho de que si $x \in E_\delta$ es:

$$|f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}, \quad (i \geq n(m))$$

para m arbitrario. Ahora, para estimar la medida del conjunto $E \setminus E_\delta$. Notemos que $\mu(E \setminus E^m) = 0$ para todo m. De hecho, si $x_0 \in E \setminus E^m$, entonces:

$$|f_i(x_0) - f(x_0)| \geq \frac{1}{m}$$

Para infinitos valores de i, es decir, la sucesión $\{f_n(x)\}$ no converge a $f(x)$ en $x = x_0$. Como por otro lado $\{f_n(x)\}$ converge a $f(x)$ en a.e., por hipótesis:

$$\mu(E \setminus E^m) = 0$$

Por lo tanto:

$$\mu(E \setminus E^m_{n(m)}) = \mu(E \setminus E^m) + \mu(E^m \setminus E^m_{n(m)}) = \mu(E^m \setminus E^m_{n(m)}) < \frac{\delta}{2^m}$$

Así:

$$\begin{aligned}\mu(E \setminus E_\delta) &= \mu(E \setminus \bigcap_n E^m_n) = \mu(E \setminus \bigcap_n E^m_{n(m)}) \\ &= \mu(\bigcup_n (E \setminus E^m_n)) = \mu(\bigcup_n (E^m \setminus E^m_{n(m)})) \\ &\leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E^m \setminus E^m_{n(m)}) < \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^m} = \delta\end{aligned}$$

□

2.4.2. Convergencia en medida

Definición 2.26. Una sucesión de funciones medibles $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge en medida* a una función si para todos $\varepsilon > 0$ es:

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} = 0$$

o equivalentemente, para todo $\varepsilon, \eta > 0$ existe n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ es:

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} < \eta$$

A veces notaremos $f_n \xrightarrow{m} f$.

Los teoremas que siguen relaciona los conceptos de convergencias en casitodas partes y convergencia en medida.

Teorema 2.27. *Si una secuencia de funciones medibles $f_n(x)$ converge en casi todas partes a una función $f(x)$, y el espacio de origen E tiene medida finita, entonces converge en medida.*

Demostración. Por el teorema 2,19 tenemos que F es medible. Sea A el conjunto -de medida 0- dode $f_n(x)$ no converge a $F(x)$ y sean además:

$$E_k(\sigma) = \{x : |f_k(x) - F(x)| \geq \sigma\}$$
$$R_n(\sigma) = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k(\sigma)$$
$$M = \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n(\sigma)$$

Cada conjunto es medible por ser unión e intersección de funciones medibles. Además:

$$R_1(\sigma) \supset R_2(\sigma) \supset \dots$$

y como el espacio total es de medida finita, cada conjunto debe sr de medida finita. Por la cotinuidad de la medida es:

$$\mu(R_n(\sigma)) \to \mu(M), \quad (n \to \infty)$$

Veamos además que $M \subset A$. Si $x_0 \notin A$ es:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_0) = F(x_0)$$

entonces para todo $\sigma > 0$ existe un N tal que para todo $n \geq N$ es:

$$|f_n(x_0) - F(x_0)| < \sigma$$

es decir $x_0 \notin E_n(\sigma)$ para todo $n \geq N$ y por ende $x_0 \notin R_N(\sigma)$ Luego $x_0 \notin M$. Esto es el contrarrecíproco de lo que se queria probar. Dado que $\mu(A) = 0$, es $\mu(M) = 0$. Por ende:

$$\mu(R_n(\sigma)) \to 0, \quad (n \to \infty)$$

Dado que $E_n(\sigma) \subset R_n(\sigma)$, esto prueba el teorema. □

Un prueba alternativa de este Teorema es usando Egorov.

Demostración. Tenemos una sucesión de funcines medibles f_n que converge en casi todas partes a f. Sea $\varepsilon, \eta > 0$, por Egorov existeun conjunto E_η tal que:

- $\mu(E) - \eta < \mu(E_\eta) \leq \mu(E)$.
- $f_n \rightrightarrows f$ en E_η.

Queremos ver que existe un n_0 tal que:

$$\mu\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} < \eta \quad (\forall n \geq n_0)$$

Entonces, si $x \in E_\eta$ tenemos que esto vale pues hay convergencia uniforme, más aún, tomando un n_1 suficientemente grande en E_η el conjunto

$\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon, n \geq n_1\}$ es vacío.

Si $x \in E \setminus E_\eta$ entonces el conjunto $\{x \in E \setminus E_\eta : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ está contenido en $E \setminus E_\eta$ y por ende tiene medida menor que η pues:

$$0 \leq \mu(E \setminus E_\eta) = \mu(E) - \mu(E_\eta) < \eta$$

Y alcanza con tomar $n = 1$, pues esto depende del $E \setminus E_\eta$ y no del n. $\square$

Ejemplo 2.28. Es fácil ver qe no vale la recíproca, pensemos en las funciones:

$$f_1^{(k)}, \ldots, f_k^{(k)}$$

en el $(0, 1]$ tales que:

$$f_i^{(k)} = \begin{cases} 1, \frac{(i-1)}{k} < x \leq \frac{i}{k} \\ 0 \end{cases}$$

Es decir la función $f_1^{(k)}$ vale 1 en $(0, \frac{1}{k}]$ y 0 en el resto del intervalo y así. Notemos que si ponemos:

$$f_1^1, f_1^2, f_2^2, f_3^1, f_3^2, f_3^3, \ldots$$

Si avanzamos sobre esta serie y elegimos $0 < \varepsilon < 1$, notemos que:

$$\mu\{x : |f_j^k(x) - 0| \geq \varepsilon\} = \frac{1}{k} \to_{k \to \infty} 0$$

Pero no coverge en casi cualquier punto a 0, pues si tomamos $x_0 \in (0, 1]$ para cada k siempre existe un i tal que $x_0 \in (\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}]$.

Aunque el ejemplo anterior muestra que no vale la recíproca, tenemos lo siguiente:

Teorema 2.29. *Supongamos que tenemos una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de funciones medibles que converge en medida a f. Entonces existe una subsucesión $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ que converge en casi todas partes a f.*

Demostración. Sea $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \ldots$ tal que:

$$\lim_{n \to \infty} \varepsilon_n = 0$$

y supongamos que los números positivos $\nu_1, \ldots, \nu_n, \ldots$ tal que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \nu_n$ converge. Consideremos una secuencia de índices:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$$

como sigue: n_1 es un natural tal que:

$$\mu\{x : |f_{n_1}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_1\} < \nu_1$$

-ese tal n_1 necesariamente existe, pues suponemos que la sucesión converge en medida-, elegimos $n_2 > n_1$ tal que:

$$\mu\{x : |f_{n_2}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_2\} < \nu_2$$

y en general, tomamos $n_k > n_{k-1}$ tal que:

$$\mu\{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\} < \nu_k$$

Veamos que esta subsucesión $(f_{n_k})_[k \in \mathbb{N}]$ converge a f en casi todas partes. De hecho, sean:

$$R_i = \bigcup_{k=i}^{\infty} \{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\}$$
$$Q = \bigcap_{i=1}^{\infty} R_i$$

Es claro que:

$$R_1 \supset R_2 \supset R_3 \supset \ldots$$

y por continuidad de la medida es $\mu(R_i) \to_{i\to\infty} \mu(Q)$.

Además, por aditividad, se tiene que:

$$\mu(R_i) < \sum_{k=i}^{\infty} \nu_k$$

De manera que $\mu(R_i) \to 0$ cuando $i \to \infty$. Por ende:

$$\mu(Q) = 0$$

Queda verifica que $f_{n_k}(x) \to f(x)$ en $E \setminus Q$. Sea x_0 en $E \setminus Q$ tenemos que existe un i_0 tal que $x_0 \notin R_{i_0}$, y por ende:

$$x_0 \notin \{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\}$$

paratodo $k \geq i_0$, y entonces:

$$|f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon_k$$

Para todo $k \geq i_0$ y como $\varepsilon_k \to 0$ por hipótesis es:

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x_0) = f(x_0)$$

esto prueba el teorema. $\square$

2.4.3. Cauchy en medida

2.5. Versiones para $\mathbb{R}^n$ de los teoremas de Egorov y Lusin

En esta sección enunciaremos el caso real de dos teoremas generales. Uno es el de Egorov que probaremos el caso generan en la sección anterior. El segundo teorema se trata de conocido como *Teorema de Luzin*. La definición que tenemos de función medible es algo formal. En 1913 Luzin demostró, que de alguna maneram una función medible es una función que se puede aproximar por una continua. Es decir, una función medible puede hacerse continua cambiando sus valores en un conjunto de medida arbitrariamente pequeña. Esta proiedad llamada por Luzin C-propiedad puede tomarse como la definición de función medible.

Probemos primero un lema preeliminar.

Lema 2.30. *Sea E medible y de medida finita y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que convergen en casi todo punto a una función f medible. Si además $|f| < +\infty$ en casi todas partes entonces para todos $\eta, \rho > 0$ existen conjuntos $C \subset E$ cerrado y $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|E \setminus C| < \eta$ y*

$$|f(x) - f_k(x)| < \rho, \quad \forall k \geq k_0, \forall x \in C$$

Demostración. Para probar esto, definamos para cada m el conjunto:

$$E_m = \bigcap_{k\geq m} \{x \in E : |f(x) - f_k(x)| < \rho\} = \{x \in E : |f(x) - f_k(x)| < \rho, \forall k \geq m\}$$

Es claro que $E_m \subset E_{m+1}$ para cada $m \in \mathbb{N}$. Notemos que E_m es medible pues en particular es:

$$E_m = \bigcap_{k\geq m} \{|f_k - f| < \rho\}$$

Y como $|-|$ es continua y la diferencia de medibles es medible, esto nos da un conjunto medible. Consideremos además el conjunto Z tal que:

$$Z = \{x \in E : f_k(x) \not\to f(x) \text{ o } |f| = +\infty\}$$

Entonces por hipótesis $|Z| = 0$ pues teneos que f_k converge en casi todas partes a f.

Por otro lad notemos que $E \setminus Z \subset \bigcup_m E_m \subset E$ pues si $x \in E \setminus Z$ entonces $|f_k(x) - f(x)| \to_{k\to\infty} 0$. Como Z es de medida 0 entonces:

$$|E| = |E \setminus Z| \leq |\bigcup_m E_m| \leq |E|$$

Por otro lado como cada E_m es medible y tenemos una sucesión creciente, esto nos dice que:

$$\lim_{m\to\infty} |E_m| = |\bigcup_m E_m| = |E|$$

por continuidad de la medida. Así, como para cada m es

$$|E| = |E \setminus E_m| + |E_m|$$

y como $\lim_{m\to\infty} |E_m| = |E|$ entonces $|E \setminus E_m| \to_{m\to\infty} 0$. Así, existe k_0 tal que:

$$|E \setminus E_{k_0}| < \frac{\eta}{2}$$

Como E_{k_0} es medible existe un cerrado $C \subset E_{k_0}$ tal que $|E_{k_0} \setminus C| < \frac{\eta}{2}$. Entonces:

$$|E \setminus C| = |E \setminus E_{k_0}| + |E_{k_0} \setminus C| < \eta$$

Y por otro lado si $k \geq k_0$ y $x \in C \subset E_{k_0}$ entonces:

$$|f(x) - f_k(x)| < \rho$$

Esto completa la prueba. □

Teorema 2.31 (Egorov versión real.)**.** *Sea E medible y de medida finita y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que convergen en casi todo punto a una función f medible. Si además $|f| < +\infty$ en casi todas partes, dado $\varepsilon > 0$ existe F cerado tal que $|E \setminus F| < \varepsilon$ y $f_k \rightrightarrows f$ en F.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$, para cada $m \in \mathbb{N}$ consideremos $\rho_m = \frac{1}{m}$ y $\eta_m = \frac{\varepsilon}{2^m}$ el F_m cerado y k_m el natural que conseguimos en el lema para esos ρ_m, η_m.

Tenemos así que

$$|E \setminus F_m| < \frac{\varepsilon}{2^m}$$
$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{m}, \quad \forall k \geq k_m, \forall x \in F_m$$

Sea $F = \bigcap_m F_m$ es cerrado por ser intersección de cerrados y además es no vacío pues:

$$|E \setminus F| = |\bigcup_m (E \setminus F_m)| < \sum_m \frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon$$

Luego F no solo no es vacío, sino que es casi todo E. Por otro lado para ver que $f_k \rightrightarrows f$ basta notar que si $\delta > 0$ existe m_0 tal que $\frac{1}{m_0} < \delta$. Luego, como $x \in F$ es $x \in F_{m_0}$ y por ende:

$$|f(x) - f_k(x)| < \frac{1}{m_0} < \delta, \quad \forall x \in F_{m_0}, \forall k \geq k_{m_0}$$

Como $F \subset F_{m_0}$ esto es en particular para todos los $x \in F$. Así $f_k \rightrightarrows f$ en F, este es cerrado y $|E \setminus F| < \varepsilon$. $\square$

Teorema 2.32 (de Luzin)**.** *Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ medible y $f : E \to \mathbb{R}$ equivalen:*

1. *f es medible.*
2. *Para cada $\varepsilon > 0$ existe $F \subset E$ cerrado tal que $|E \setminus F| < \varepsilon$ y tal que $f|_F$ es continua.*

Demostración. Supongamos primero que vale la segunda condición. De esta manera, dado $k \in \mathbb{N}$ existe $F_k \subset E$ cerrado tal qu $|E \setminus F_k| < \frac{1}{k}$ y $f|_{F_k}$ es continua.

Sea $H = \bigcup_k F_k$, es medible por ser un F_σ. Además $|E \setminus H| \leq |E \setminus F_k| < \frac{1}{k}$ para todo k de manera que H tiene la misma medida que E y su diferencia tiene medida 0.

Sea $a \in \mathbb{R}$ entonces:

$$\{f > a\} = (\{f > a\} \cap H) \cup \underbrace{(\{f > a\} \cap (E \setminus H))}_{\text{es de medida 0}}$$

Por otro lado es

$$\begin{aligned} \{f > a\} \cap H &= \bigcup_k \{f > a\} \cap F_k \\ &= \bigcup_k \{x \in F_k : f|_{F_k}(x) > a\} \end{aligned}$$

Como restringida a F_k la función f es continua tenemos que su preimagen por F_k es medible. Luego $\{f > a\}$ es medible por ser unión de medibles.

Para ver que si f es medible entonces cumple la otra condición haremos pasos intermedios.

Paso 1: Consideremos f simple medible y $f = \sum_{k=1}^N \chi_{E_k}$ una escritura de f tal que los E_k son disjuntos dos a dos y tal que $E = \bigcup_{k=1}^N E_k$[8].

Para cada $k \in [\![N]\!]$ sea $F_k \subset E_k$ cerrado con $|E_k \setminus F_k| < \frac{\varepsilon}{N}$. Sea $F = \bigcup_{k=1}^N F_k$ esta unión es disjunta y como los E_k son disjuntos y cada E_k contiene al F_k es:

$$|E \setminus F| = \sum_{k=1}^N |E_k \setminus F_k| < \varepsilon$$

[8]Notar que en este caso los E_k son medibles.

Por otro lado, cada F_k es cerrado relativo a F y por ende si consideramos f restringida a F es:

$$f|_F = \sum_{k=1}^{N} a_k \chi_{F_k}$$

Esto nos dice que f es continua, pues dado cualquier cerrado de $\mathbb{R}$ su preimagen por f es vacía si no contiene a ningún a_k o una unión finita de los F_k si contiene a alguno. Como la unión finita de cerrados es cerrada esto nos dice que la preimagen de cualquier cerrado es cerrada.

Paso 2: Supongamos ahora que f es medible y $|E|$ es de mdida finita. Por el *Teorema de aproximación monótona* existe $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funcione simples y medibles tales que convergen puntualmente a f en todo E.

Por el **Paso 1**, para cada k existe $F_k \subset E$ un cerrado tal que $|E \setminus F_k| < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$ y tal que $f_k|_{F_k}$ es continua.

Porotro lado, por Egorov aplicado a f -que podemos hacerlo pues $|E| < +\infty$ existe $F_0 \subset E$ cerrado tal que

$$|E \setminus F_0| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad f_k \rightrightarrows f \text{ en } F_0$$

Sea $F = \bigcap_{k=0}^{\infty}$, tenemos que F es cerrado por ser intersección de cerrados, cada f_k es continua en F -pues lo es en F_k para su mismo k- y $f_k \rightrightarrows f$ en F -pues $F \subset F_0$-. Esto nos dice que f es continua en F pues es límite uniforma de funciones continuas allí.

Porotro lado F es no vacío pues:

$$|E \setminus F| \leq |E \setminus F_0| + |\bigcup_{k=1}^{\infty} E \setminus F_k| < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \varepsilon$$

Paso 3: Sea f medible y E arbitrario. Consideremos para cada $n \in \mathbb{N}$ el conjunto:

$$E_n = E \cap \{x \in \mathbb{R}^n : n-1 \leq |x| < n\}$$

Por el **Paso 2** cada E_n contiene un F_n cerrado tal que $|E_n \setminus F_n| < \frac{\varepsilon}{2^n}$ y $f|_{F_n}$ es continua.

Notemos que cada F_n es cerrado y acotado, por ende es compacto. Como además son disjuntos entonces la distancia de dos F_n es positiva. Consideremos $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ entonces es por un lado:

$$|E \setminus F| \leq \sum n = 1^{\infty} |E \setminus F_n| < \sum n = 1^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$$

Además F es cerrado pues si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en F entonces es acotada. Sea N una cota para la sucesión entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \bigcup_{n=1}^{N+1} F_n$. Como esto es una unión finita de cerrados es cerrado y por ende el límite de la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ está contenido en esta unión y por ende está en F. Así, F es cerrado pues esto es sin importar que sucesión tomemos.

Por otro lado f es continua en F. Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy e y su límite en F entonces basta ver que $f(y_n) \to f(y)$.

Como antes existe N tal que $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \bigcup_{n=1}^{N} F_n$. Como las distancias son positivas, sea

$$\varepsilon = \frac{\text{mín}_{1\leq i<j\leq N}\, d(F_i, F_j)}{2}$$

existe n_0 tal que $|y_n - y_m| < \varepsilon$ para todos $n, m \geq n_0$ por ser $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy. Luego tenemos que la cola de la sucesión a partir de este término está en un solo F_n. En ese caso es $y \in F_n$ y solo en ese F_n y además como f es continua en F_n tenemos que $f(y_n) \to f(y)$.

Esto concluye la prueba, pues en el caso general existe F cerrado tal que cumple las condiciones del enunciado. $\square$

2.6. Algunos ejemplos

Ejemplo 2.33. Construiremos la función de Cantor-Lebesgue como límiet de una sucesión de funciones continuas en el $[0, 1]$. Recordemos que construirmos el conjunto de cantor C como la intersección de los niveles F_k donde:

$$F_k = \bigcup_{j=1}^{2^k} I_j^k$$

Para cada $k \geq 1$ podemos considerar:

$$[0, 1] \setminus F_k = \bigcup_{j=1}^{2^{k-1}} D_j^k$$

Donde D_j^k son los intervalos abiertos que quedan al remover los I_j^k. Enumerando j de izquierda a derecha, pongamos:

$$D^k = \bigcup_{j=1}^{2^{k-1}} D_j^k$$

y sea para cada $k \in \mathbb{N}$ la función f_k que satisface:

- $f_k(0) = 0, f_k(1) = 1$.

- para cada $x \in D_j^k$ con $j \in [\![2^{k-1}]\!]$ es $f_k(x) = \frac{j}{2^k}$.
- $f_k(x)$ es lineal en I_j^k tal que une D_j^k y D_{j+1}^k.

Notar que para cada intervalo D_j^k abierto en el nivel k donde f_k es constantemente $\frac{h}{2^k}$, tenemos a la izquierda $j-1$ intervalos abiertos en D^k y j intervalos cerrados en F_k.

En el paso siguiente de la construcción de Cantor, el intervalo abierto D_j^k -el cual ya quedó fuera del conjunto, es decir no tocamos nunca más- tendrá los mismos $j-1$ intervalos abiertos que ya fueron removidos en etapas anteriores y se agrega un abierto por cada uno de los j cerrados que había a su izquierda -pues recordemos que quitaos los centros de los F_k al pasar al nivel $k+1$-.

Con ello, en el nivel D^{k+1} tenemos que nuestro intervalo D_j^k ahora ocupa la posición $2j$. Luego, la función f_{k+1} toma el valor $\frac{2j}{2^{k+1}} = \frac{j}{2^k} = f_k(x)$ en ese espacio.

Así, para todo $k \geq 1$ es:

$$f_{k+1}(x) = f_k(x), \quad (x \in D_j^k)$$

Por otro lado, fuera de los D_j^k, se tiene que:

$$|f_{k+1}(x) - f_k(x)| < \frac{1}{2^k}$$

pues la imagen de ambas funciones en cualquier intervalo de la forma I_j^k está contenida en el intervalo $[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k}]$.

Con todo lo anterior tenemos que la serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{k+1} - f_k$$

converge uniformemente. Esto último implica que $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente. Sea f su límite uniforme, entonces es continua.

Por construcción, obtenemos la *función de Cantor-Lebesgue* la cual es una función $f : [0,1] \to [0,1]$ continua, monótona creciente, tal que $f(0) = 0, f(1) = 1$ y que es constante sobre cada abierto en el complemento de Cantor. Así, se tiene que la derivada de la función existe y es nula para casi todo punto excepto para un conjunto de medida 0 -el complemento del conjunto de cantor en el $[0,1]$-.

Observemos además que sobre el complemento del conjunto de Cantor la función toma solo una cantidad numerable de valores. Así:

$$|f([0,1] \setminus C)| = |\{\frac{j}{2^k} : k \in \mathbb{N}, j \in [\![2^{k-1}]\!]\}| = 0$$

Como además f es sobreyectiva tenemos que:

$$[0,1] \setminus f([0,1] \setminus C) \subset f(C)$$

En otras palabras si x **no** es imagen del complemento del conjunto de Cantor entonces es imagen de alguien del conjunto de Cantor. Como $|f([0,1] \setminus C)| = 0$ entonces $|f(C)| > 0$.

Teorema 2.34. *Sea $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in E$ entonces existe una sucesión de funciones **step** $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tales que:*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$$

en casi todas partes de E.

*Llamamos una función **step** o **escalón** a una función simple en donde cada cojunto $E_1, \ldots, E_n$ donde la función es constante, se trata de un intervalo.*

Demostración. Sea E medible de medida finita y $\varepsilon > 0$, existen entonces intervalos cerrados casi disjuntos $I_1, \ldots, I_n$ tales que si $F = \bigcup_{k=1}^{n} I_k$ se tiene que:

$$|\{x; \chi_E \neq \chi_F\}| < \varepsilon$$

Para ver eto, notemos que podemos encontrar una coleción numerable de intervalos tales que:

$$|E| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < |E| + \frac{\varepsilon}{2}$$

En particular la serie converge y por ende existe N tal que la cola de la serie a partir del $N+1$-ésimo término es menor que $\varepsilon/2$.

Si ponemos $F = \bigcup_{k=1}^{N} I_k$ entonces:

$$|\{x : \chi_E \neq \chi_F\}| = |E \Delta F| = |E \setminus F| + |F \setminus E| \leq \sum_{k\geq N+1} |I_k| + \sum_{k\geq 1} |I_k| - |E| < \varepsilon$$

Sea ϕ una función simple medible y:

$$\phi = \sum_{k=1}^{M} a_k \chi_{E_k}$$

una escritura para ϕ con los E_k medibls de medida finita. Sea $\varepsilon > 0$ y para cada $k = 1, \ldots, M$ existe un conjunto Δ_k y $F_k = \bigcup_{j=1}^{N_k} I_j^k$ una unión de intervalos casi disjuntos tales que:

$$|\Delta_k| < \frac{\varepsilon}{M} \text{ y } \chi_{E_k} = \chi_{F_k} \forall x \in \Delta_k^c$$

Es decir que la diferencia simétrica de E_k y F_k tiene medida a lo sumo ε/M. Definimos la función **step**

$$\Phi = \sum_{k=1}^{M} a_k \chi_{F_k}$$

y poedmos poner $\Delta = \bigcup_{k=1}^{M} \Delta_k$ de modo que:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : \phi(x) \neq \varphi(x)\}| \leq |\Delta| = \sum_{k=1}^{M} |\Delta_k| < \varepsilon$$

Esto último pues si $x \notin \Delta$ entonces está en la intersección de los complementos, es decir:

$$x \in \bigcap_{k=1}^{M} \Delta_k^c \implies x \in \Delta_k^c \forall k \implies \chi_{E_k} = \chi_{F_k} \forall k \implies \phi(x) = \varphi(x)$$

Con esto acabamos de demostrar que toda función **simple medible** es aproximable por funciones **escalones**.

Por el *Teorema de aproximación monótona* dada f no negativa, existe $(\phi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones simples medibles tales que $\phi_n \to f$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ por el paso anterior tenemos una función **step** ϕ_k y un conjunto Δ_k tales que:

$$x \notin \Delta_k \implies \phi_k(x) = \varphi(x) \text{ y } |\Delta_k| < \frac{1}{k2^k}$$

Afirmamos entonces que $\varphi_k \to f$ en casi todo punto de x. Sea Q el conjunt donde $\varphi_k \not\to f$. Como las ϕ_k convergen a f en todo punto, tiene que ser si $x \in Q$ entonces $\phi_k(x) \neq \varphi_k(x)$ para infinitos k.

Luego $x \in Q \implies x \in \Delta_k$ para infiitos k, es decir:

$$x \in \bigcap_{k\geq 1} \bigcup_{j\geq k} \Delta_j = \limsup \Delta_k$$

Tomando medida es:

$$|Q| \leq |\limsup \Delta_k| \leq |\bigcup_{j\geq k} \Delta_j| \leq \sum_{j\geq k} |\Delta_j| \leq \sum_{j\geq k} \frac{1}{j2^j} \leq \frac{1}{k}$$

y esto para todo $k \geq 1$. Por ende $|Q| = 0$ y esto completa la prueba. $\square$

Parte II
Solucionario

Aclaración

En esta sección cambiaremos la notación usada a lo largo del Kolmogorov, pues seguiremos las clases y el apunte de Ezequiel Rela. Por otro lado, es importante notar que en es apunte se define la medida en $\mathbb{R}^n$ de manera distinta, esta nueva definición es:

Definición 2.35. Un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ se dice medible si para cada $\varepsilon > 0$ existe un G abierto tal que $A \subset G$ y:

$$|G \setminus A|_e < \varepsilon$$

Y si recordamos la de Kolmogorov:

Definición 2.36. Un conjunto A se dice medible si para cada $\varepsilon > 0$ existe un conjunto elemental B tal que:

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

Donde $| - |_e$ es igual a μ^* de la primer parte. Además $v = m$ el volumen de un intervalo de $\mathbb{R}^n$ y $\sigma = m'$. La ventaja de la definición de Rela es que no posee problemas formales con tomar una colección donde dos a dos no son disjuntos, pero para el caso de Kolmogorov esto es solucionable y termina siendo lo mismo al definir la medida exterior como el ínfimo de estos tamaños en ambos casos.

La otra diferencia sustancial es respecto a la definición de medida. Notemos que Rela usa abiertos y Kolmogorov usa conjuntos elementales para aproximar la medida exterior. Esto tiene una solución sencilla y la da el mismo Rela, ya que en su apunte se prueba que todo conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ se puede aproximar por uniones numerables de rectángulos disjuntos -en el sentido que Kolmogorov define rectángulo-. Esto permite pasar de la definición de Rela a la de Kolmogorov sin problemas. Sin embargo, si esto no es claro la equivalencia y relación entre ambas formas de definir la medida se aclararon en la sección 1.7.1.

3. Preeliminares

En esta sección omití los primeros 6 ejercicios correspondientes a teoría de conjuntos pues son cosas que ya hice en otros apuntes -como el solucionario de *Cálculo Avanzado*.

Ejercicio 3.1. 1. Sean $A_{n,k}$ $(n, k \in \mathbb{N})$ conjuntos. Probar que:

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_{n,k} \subseteq \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_{n,k}$$

2. Encontrar conjuntos $A_{n,k}$ $(n, k \in \mathbb{N})$ tales que:

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_{n,k} \neq \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_{n,k}$$

Demostración. Sea $A_{n,k}$ una familia de conjuntos, sea $x \in \bigcup_k \bigcap_n A_{n,k}$ entonecs $x \in \bigcap_n A_{n,k}$ para algún k y para todo n. De este modo $x \in \bigcup_k A_{n,k}$ para todo n y se tiene la contención buscada.

Un ejemplo donde esto no funcione es en $A_{n,k}$ el conjnto tal que es $\{1\}$ si $n = k$ y $\emptyset$ si no. En este caso es $\bigcap_n A_{n,k} = \emptyset$ pues para k fijo hay un solo n tal que $n = k$ y por ende lo de la izquierda es $\emptyset$.

Ahora bien, para n fijo es $\bigcup_k A_{n,k} = \{1\}$ y la intersección sobre todos los n es por ende $\{1\}$. $\square$

Ejercicio 3.2. Dada una sucesión $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de subconjuntos de E, se define:

- $\liminf_{n\to\infty} E_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} E_k$
- $\limsup_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} E_k$

Probar que:

1. $E - \liminf_{n\to\infty} E_n = \limsup_{n\to\infty}(E - E_n)$.
2. $E - \limsup_{n\to\infty} E_n = \liminf_{n\to\infty}(E - E_n)$.
3. $\liminf_{n\to\infty} E_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} E_n$.

Demostración.

$$\begin{aligned} E - \liminf E_n &= E \cap (\bigcup_n \bigcap_{k\geq n\geq n} E_k)^c = E \cap \bigcap_n (\bigcap_{k\geq n} E_k)^c \\ &= \bigcap_n E \cap \bigcup_{k\geq n} E_k^c = \bigcap_n E \bigcup_{k\geq n} E \setminus E_k^c \\ &= \limsup(E - E_n) \end{aligned}$$

Para la otra

$$\begin{aligned} E - \limsup E_n &= E \cap (\bigcap_n \bigcup_{k \geq n \geq n} E_k)^c = E \cap \bigcup_n (\bigcup_{k \geq n} E_k)^c \\ &= \bigcup_n E \cap \bigcap_{k \geq n} E_k^c = \bigcup_n E \bigcap_{k \geq n} E \setminus E_k^c \\ &= \liminf (E - E_n) \end{aligned}$$

□

Ejercicio 3.3. Dada una sucesión $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de E, si $\liminf_{n \to \infty} E_n = \limsup_{n \to \infty} E_n$, se dice que existe el límite de la sucesión y se lo denota por $\lim_{n \to \infty} E_n$. Probar que:

1. Si $E_{n+1} \subseteq E_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \to \infty} E_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.
2. Si $E_n \subseteq E_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \to \infty} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

Demostración. Supongamos que $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente, de esta manera es:

$$\begin{aligned} \liminf E_n &= \bigcup_n \bigcap_{n \geq k} E_k \\ &= \bigcup_n \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcap_k E_k \\ \limsup E_n &= \bigcap_n \bigcup_{k \geq n} E_k = \bigcap_n \end{aligned}$$

Luego, los límites superiores e inferiores son iguales y ambos valen $\bigcap_n E_n$.

Si ahora la sucesión es creciente:

$$\begin{aligned} \liminf E_n &= \bigcup_n \bigcap_{n \geq k} E_k = \bigcup_n E_n \\ \limsup E_n &= \bigcap_n \bigcup_{k \geq n} E_k \\ &= \bigcap_n \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_n E_n \end{aligned}$$

de manera que los límites son iguales y valen $\bigcup_n E_n$. □

Ejercicio 3.4. Dada una sucesión $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de un conjunto E se define:

$$D_1 = \emptyset, \quad D_{n+1} = D_n \triangle E_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Probar que existe $\lim_{n \to \infty} D_n$ si y sólo si $\lim_{n \to \infty} E_n = \emptyset$.

Demostración. Notemos que $x \in \lim\inf E_n$ si existe un n_0 tal que para todo $k \geq n_0$ es $x \in E_k$.

Y que $x \in \lim\sup E_n$ si para todo n existe un $k \geq n$ tal que $x \in E_k$.

Notemos además que $D_1 = \emptyset, D_1 = E_1 \Delta \emptyset E_1, D_2 = E_1 \Delta E_2, \ldots, D_{n+1} = E_1 \Delta \ldots \Delta E_n$. Sigamos las sugerencias del docente, hay dos sugerencias de como hacer este ejercicio, la primera es demostrar que:

$$D_{k+1} = \{x \in E : x \in E_j \text{ para una cantidad impar de valores } j \in [\![k]\!]\}$$

La otra sugerencia es demostrar que:

$$\lim\sup E_n = \lim\sup D_n \setminus \lim\inf D_n$$

Ataquemos primero por la segunda sugerencia y luego pasemos a la primera. Si $x \in \lim\sup E_n$ entonces x pertenece a infintos E_n, pues como se dijo al principio, para todo n hay un k_n tal que $x \in E_{k_n}$. Cada vez que $x \in E_n$ el conjunto $D_{n+1} = D_n \Delta E_n$ cambia de estado, si $x \in D_n$ entonces $x \notin D_{n+1}$ y si $x \notin D_n$ entonces $x \in D_{n+1}$. Como esto ocurre infinitas veces dado n_0, existe un k_{n_0} tal que $x \notin D_{k_{n_0}}$ y por ende $x \notin \lim\inf D_n$. Ahora bien para cada n existe un k tal que $x \in E_k$ y por ende $x \in D_k$ o $x \in D_{k+1}$ de modo que para todo n existe un k' tal que $x \in D_{k'}$. Así $x \in \lim\sup D_n \setminus \lim\inf D_n$.

Si $x \in \lim\sup D_n \setminus \lim\inf D_n$, entonces x pertenece a infinitos D_n y x no pertenece a infinitos D_n. Es decir, dado n existe k tal que $x \in D_{k+1} = E_1 \Delta \ldots \Delta E_k$ y por ende $x \in E_j$ para algún $j \in [\![k]\!]$ y análogamente un i tal que $x \notin E_i$. De esta manera $x \in \lim\sup E_n$, pues para todo n existe un $k \geq n$ tal que $x \in E_k$.

Así concluimos que:

$$\lim\sup E_n = \lim\sup D_n \setminus \lim\inf D_n$$

y por ende si existe $\lim D_n$ es $\lim\sup D_n = \lim\inf D_n$ y por ende $\emptyset \subset \lim\inf E_n \subset \lim\sup E_n = \emptyset$, por ende $\lim E_n = \emptyset$. Si ahora es $\lim E_n = \lim\sup E_n = \emptyset$ entonces $\lim\sup D_n = \lim\inf D_n$ y por ende existe $\lim D_n$.

□

Ejercicio 3.5. Sea X un conjunto. Para cada subconjunto $A \subseteq X$ se define $1_A : X \to \{0, 1\}$ por:

$$1_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

Probar que:

1. $A \subseteq B \iff 1_A(x) \leq 1_B(x) \quad \forall x \in X$.
2. $1_{A \cap B}(x) = 1_A(x) \cdot 1_B(x) \quad \forall x \in X$.

3. $1_{A\cup B}(x) = 1_A(x) + 1_B(x) - 1_{A\cap B}(x) \quad \forall x \in X$.

Demostración. Creo que esto es claro. No lo probaré □

Ejercicio 3.6. Sea $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de subconjuntos de X y $f : X \to Y$ una función. Probar que:

1. $f(\liminf_{n\to\infty} E_n) \subseteq \liminf_{n\to\infty} f(E_n)$.
2. $f(\limsup_{n\to\infty} E_n) \subseteq \limsup_{n\to\infty} f(E_n)$.
3. Si f es inyectiva, en (a) y (b) vale la igualdad.

Demostración.

$$f(\lim\inf E_n) = f(\bigcup_n \bigcap_k E_k) = \bigcup_n f(\bigcap_k E_k) \subset \bigcup_n \bigcap_k f(E_k) = \lim\inf f(E_n)$$
$$f(\lim\sup E_n) = f(\bigcap_n \bigcup_k E_k) \subset \bigcap_n f(\bigcup_k E_k) = \bigcap_n \bigcup_k f(E_k) = \lim\sup f(E_k)$$

En el caso de inyectividad, en lugr de ser contenciones en los pasos de las intersecciones tenemos igualdades. □

Ejercicio 3.7. Sean E un conjunto y $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ tal que $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$. Sean $R = \{Z \subseteq E : f(Z) \subseteq Z\}$ y $S = \{Z \subseteq E : f(Z) \supseteq Z\}$. Sean también:

$$V = \bigcap_{Z\in R} Z \quad \text{y} \quad W = \bigcup_{Z\in S} Z$$

Probar que:

1. $f(V) = V$ y $f(W) = W$.
2. Si $A \subseteq E$ es tal que $f(A) = A$, entonces $V \subseteq A \subseteq W$.

Demostración. Veamos que $f(V) = V$, como $V = \bigcap_{Z\in R} Z$ entonces para cualquier $Z \in R$ tenemos que $V \subset Z$. Por monotonía de f es $f(V) \subset f(Z)$ como $Z \subset R$ entonces $f(Z) \subset Z$ y por ende $f(V) \subset f(Z) \subset Z$. Luego $f(V) \subset V$.

Ahora, para cada $f(f(V)) \subset f(V)$ pues $f(V) \subset V$ y f es monótona. Así $f(V) \in R$, luego $V \subset f(V)$.

Ahora $W = \bigcup_{Z\in S} Z$ así que $Z \subset W$ para todo $Z \in S$. Luego $f(Z) \subset f(W)$ y como $Z \in S$ es $Z \subset f(Z) \subset f(W)$ luego $W \subset f(W)$ por ser unión de ellos.

Por otro lado $f(W) \subset f(f(W))$ de manera que $f(W) \in S$ y por ende $W \supset f(W)$.

Si ahora A es punto fijo de f, entonces $A \subset f(A)$ y $f(A) \subset A$, de manera que $A \in R, A \in S$. Por ende $V \subset A \subset W$. □

4. Medida de Lebesgue

Ejercicio 4.1. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ probar que existe $H \supset A$ de tipo G_δ tal que $|A|_e = |H|$.

Demostración. Sea A un conjunto de $\mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$, por ser la medida exterior un ínfimo existe $S = (I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una colección de intervalos tal que $A \subset \bigcup_n I_n$ y tales que:

$$\sigma(S) = \sum_{n=1}^{\infty} v(I_n) \leq |A|_e + \frac{\varepsilon}{2}$$

Ahora, para cada I_k podemos considerar I'_k un intervalo abierto que contiene a I_n y tal que $v(I'_k) < v(I) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$. Para ello, para cada $j \in [\![n]\!]$ si $I_k = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, podemos considerar $I'_k = (a_1 - \delta(b_1 - a_1), b_1 + \delta(b_1 - a_1)) \times \cdots \times (a_n - \delta(b_n - a_n), b_n + \delta(b_n - a_n))$, en ese caso el volumen de este intervalo es:

$$v(I'_k) = \prod_{i=1}^{n} |(1 + 2\delta)(b_1 - a_1)| = v(I) \cdot |1 + 2\delta|^n$$

Tomando δ tal que $|1 + 2\delta|^n < 1 + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}v(I_k)}$ tenemos que:

$$v(I'_k) < v(I_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

De esta manera, tenemos que:

$$A \subset \bigcup_k I_k \subset \bigcup_k I'_k$$

Y además:

$$\begin{aligned} |A|_e &\leq \sum_k v(I_k) \leq \sum_k v(I_k)' \\ &< \sum_k v(I_k) + \sum_k \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} < |A|_e + \varepsilon \end{aligned}$$

Pero como ε es arbitrario, y $\bigcup_k I'_k$ es abierto pues cada I'_k lo es, tenemos que para cada ε existe un abierto G_ε tal que $|G_\varepsilon| < |A|_e + \varepsilon$.

Probemos ahora si la propsición. Por lo anterior, para cada $k \in \mathbb{N}$ sea $G_k \supset A$ un abierto tal que:

$$|G_k| < |A|_e + \frac{1}{k}$$

Consideremos $H = \bigcap_k G_k$ es claramente un G_δ y es claro que $A \subset H$ pues está contenido en cada G_δ. Como además para cada k es:

$$|A|_e \leq |H|_e \leq |G_k|_e < |A|_e + \frac{1}{k}$$

Tenemos que $|H|_e = |A|_e$, basta ver que H es medible y obtendremos la igualdad deseada. Notemos que cada G_k es medible ya que es abierto, por otro lado, sabemos que el complemento de un medible es medible, entonces:

$$H = \bigcap_k G_k = (\bigcup_k G_k^c)^c$$

Como G_k es medible, entonces G_k^c es medible para todo $k \geq 1$ y como la unión numerable de medibles es medible tenemos que $\bigcup_k G_k^c$ y H es medible por ser su complemento. □

Ejercicio 4.2. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $d(A, B) > 0$ probar que:

$$|A \cup B|_e = |A|_e + |B|_e$$

Demostración. Sean las condiciones del enunciado, por aditividad de la medida exterior es claro que vale la desigualdad $|A \cup B|_e \leq |A|_e + |B|_e$. Veamos la otra, sea $\varepsilon > 0$ y $S = (I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un cubrimiento de $A \cup B$ tal que:

$$\sigma(S) < |A \cup B|_e + \varepsilon$$

El cuál existe pues la medida inferior es un ínfimo. Podemos suponer entonces que para cada k es $diam(I_k) < \frac{d(A,B)}{2}$, pues de no ser el caso basta tomar un refinamiento -es decir, partimos el intervalo I_k en finitos intervalos de la medida deseada-.

En este caso sean:

$$J_1 = \{k \in \mathbb{N} : I_k \cap A \neq \emptyset\}, \quad J_2 = \{k \in \mathbb{N} : I_k \cap B \neq \emptyset\}$$

Entonces como $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cubre $A \cup B$, tenemos que $(I_n)_{n\in J_1}$ cubre A y $(I_n)_{n\in J_2}$ cubre B y por ser intervalos y definición de ínfimo es:

$$|A|_e + |B|_e \leq \sum_{k\in J_1} v(I_k) + \sum_{k\in J_2} v(I_k)$$

Además $J_1 \cap J_2 = \emptyset$, pues $diam(I_k) < \frac{d(A,B)}{2}$ para todo k -si no fuera el caso, un I_k que tenga elementos en ambos conjuntos tendría diametro al menos la distancia lo cual es absurdo-. De esta manera, como $J_1 \cap J_2 = \emptyset$ y ambos son subconjuntos de $\mathbb{N}$, su unión también lo es y por ende:

$$|A|_e + |B|_e \leq \sum_{k\in J_1} v(I_k) + \sum_{k\in J_2} v(I_k) \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} v(I_k) = \sigma(S) < |A \cup B|_e + \varepsilon$$

Como ε es arbitrario, tenemos que $|A|_e + |B|_e \leq |A \cup B|_e$. Por ende son iguales como se quería probar. □

Ejercicio 4.3. Sea $E = \{x \in (0,1) :$ en el desarrollo decimal de x no aparece el $7\}$. Probar que E tiene medida 0.

Demostración. Notemos que podemos escribir:

$$E = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$$

con C_n el conjunto de los x que no tienen un 7 en ninguna coordenada hasta la n-ésima en su desarrollo decimal, este conjunto tiene longitud $(\frac{9}{10})^n$.

Inductivamente, en el paso 1 quitamos el intervalo $[0{,}7, 0{,}8)$, en el paso 2 quitamos a un conjunto de medida 0,9 9 intervalos de medid.a 1/100 pues quitamos todos los de la forma $[0.i7, 0.i8)$ con $i \in [\![0,9]\!] \setminus \{7\}$, por ende el espacio resultante tiene medida $\frac{90}{100} - \frac{9}{100} = \frac{81}{100} = \frac{9^2}{10^2}$. En genral, si pensamos que la proposición es cierta para n entonces en el caso n quitamos nuevamente 9 intervalos de $\frac{1}{10^{n+1}}$, de esta manera la medida del conjunto C_{n+1} va a ser $C_n - \frac{9}{10^{n+1}} = \frac{10 \cdot 9^n - 9}{10^{n+1}} = \frac{9^{n+1}}{10^{n+1}}$.

Notemos además que el conjunto C_n es unión de finitos intervalos, y como $E \subset C_n$ tenemos que C_n es una aproximación por intervalos de E, por ende:

$$|E|_e \leq |C_n|_e = (\frac{9}{10})^n$$

Pero como esto es sin importar el n tenemos que $|E|_e = 0$. Que E es medible es inmediato pues □

Ejercicio 4.4. Sea A un conjunto de $\mathbb{R}^n$ con medida 0, probar que si $E \subset A$:

- E es medible y $|E| = 0$.
- El cardinal de los conjuntos medibles es 2^c.

Demostración. Sea $E \subset A$, tenemos que para cada $\varepsilon > 0$, por ser A medible existe G abierto tal que $E \subset A \subset G$ y:

$$|E|_e \leq |A|_e \leq |G| < |A|_e + \varepsilon = \varepsilon$$

Luego, E es medible y su medida es 0.

Para ver que el cardinal de los conjuntos medibles es 2^c, tenemos que el conjunto del inciso anterior -o inclusive el de Cantor- tiene cardinal c y por la propiedad del primer inciso, cualquier subconjunto de este es medible y tiene medida 0. Así, hay 2^c conjuntos medibles correspondiente y no más pues $\mathbb{R}^n$ tiene 2^c subconjuntos. □

Ejercicio 4.5. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ medible y A, B conjuntos tales que $E = A \cup B$ y $|B| = 0$, probar que A es medible.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado, tenemos por un lado que, como E es medible, dado $\varepsilon > 0$ existe un $G \supset E$ abierto tal que:

$$|G \setminus E|_e = |G \setminus (A \cup B)|_e < \varepsilon$$

Ahora bien, es claro que como $E = A \cup B$ entonces $E \setminus A \subset B$ y por monotonía de la medida es:

$$|E \setminus A|_e \leq |B|_e = 0$$

Por otro lado $G \setminus A = G \setminus E \sqcup E \setminus A$ y como estos conjuntos son disjuntos:

$$|G \setminus A|_e \leq |G \setminus E|_e + |E \setminus A|_e < \varepsilon + |B|_e = \varepsilon$$

pero esto sin importar el ε, y como $A \subset G$ y este es abierto, tenemos que A es medible. $\square$

Ejercicio 4.6. Sea $v \in \mathbb{R}^n$ y $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $T(x) = x + v$ probar que:

- $|T(E)|_e = |E|_e, E \subset \mathbb{R}^n$.
- Si además E es medible entonces $|T(E)| = |E|$.

Demostración. Para probar esto, notemos primero que si $I = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ entonces $|T(I)| = |I|$ pues $T(I) = \prod_{i=1}^n [a_i + v_i, b_i + v_i]$. De esta manera, si G es un conjunto y $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una colección de intervalos tales que:

$$G = \bigcup_k I_k$$

tenemos que:

$$T(G) = \bigcup_k T(I_k)$$

y por lo anterior:

$$|T(G)| = \sum_k |T(I_k)| = \sum_k |I_k| = |G|$$

Luego, si G es unión numerable de intervalos, tenemos que $|T(G)| = |G|$, de esta manera si E es un subconjunto cualesquiera de $\mathbb{R}^n$, y G es unión numerable de intervalos que lo contiene es $T(E) \subset T(G)$ y:

$$|T(E)|_e \leq |T(G)|_e = |T(G)| = |G| = \sum_k |I_k|$$

Ahora, tomando ínfimo sobre $G \supset E$ tal que G es unión numerable de intervalos es:

$$|T(E)|_e \leq |E|_e$$

Por otro lado, si consideramos $T^{-1}(x) = x - v$ tenemos que vale lo simétrico para $E = T^{-1}(T(E))$. De esta manera $|E|_e = |T(E)|_e$.

Ahora, si E es medible, existe para cada $\varepsilon > 0$ un G abierto tal que:

$$|G \setminus E|_e < \varepsilon$$

Por lo anterior es $T(G)$ abierto y:

$$|T(G \setminus E)|_e = |T(G) \setminus T(E)|_e = |G \setminus E|_e < \varepsilon$$

Notemos que $T(G \setminus E) = T(G) \setminus T(E)$ pues T es biyectiva. De esta manera $T(E)$ es medible y más aún:

$$|T(E)| = |T(E)|_e = |E|_e = |E|$$

□

Ejercicio 4.7. Sea $r \in \mathbb{R}^{>0}$ definimos $rA = \{ra : a \in A\}$. Probar que:

- $|rA|_e = r^n |A|_e$.
- Probar que si A es medible entonces lo es rA y más aún $|rA| = r^n |A|$.

Demostración. Sea A un conjunto de $\mathbb{R}^n$ y consideremos rA el conjunto del enunciado. Al igual que antes, si pensamos esto como una función biyectiva $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $T(a) = ra$ entonces $rA = T(A)$ y tenemos que:

$$v(T(I)) = \prod i = 1^n [ra_i, rb_i] = r^n \prod_{i=1}^{n} = r^n v(I)$$

Luego, sea $\varepsilon > 0$ y $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una coleción de intervalos tales que:

$$A \subset G = \bigcup_k I_k$$

y tal que :

$$|A|_e \leq |G|_e = \sum_k v(I_k) < |A|_e + \frac{\varepsilon}{r^n}$$

Aplicando T a todo, se respetan las contenciones y:

$$|rA|_e = |T(A)|_e \leq |T(G)|_e = \sum_k v(T(I_k)) = r^n \sum_k v(I_k) < r^n |A|_e + \varepsilon$$

Por ende $|rA|_e = |T(A)|_e \leq r^n |A|_e$. Análogamente, si consideramos $A = T^{-1}(T(A))$ con $T^{-1}(x) = \frac{1}{r}x$ entonces haciendo el mimsmo análisis tenemos que:

$$|A|_e \leq \frac{1}{r^n}|T(A)|_e = \frac{1}{r^n}|rA|_e$$

Por ende $|rA|_e = r^n|A|_e$.

Supongamos ahora que A es medible, de manera que dado $\varepsilon > 0$ existe G un abierto tal que:

$$|G \setminus A| < \frac{\varepsilon}{r^n}$$

Por ser T un homeomorfismo es $T(G)$ abierto y además:

$$T(G \setminus A) = T(G) \setminus T(A) = rG \setminus rA$$

En ese caso además, por lo probado en el inciso anterior es:

$$|rG \setminus rA|_e = |r(G \setminus A)|_e = r^n|G \setminus A|_e < \varepsilon$$

Luego rA es medible y su medida es igual a su medida exterior, es decir:

$$|rA| = |rA|_e = r^n|A|_e = r^n|A|$$

□

Ejercicio 4.8. Sea $B(0,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < r\}$.

1. Suponiendo conocida $|B(0,1)|$ calcular $|B(0,r)|$.
2. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ medible, probar que $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$ dada por $f(r) = |A \cap B(0,r)|$ es continua.
3. Si A es medble, para cada $0 \leq s \leq |A|$ existe $B \subset A$ medible tal que $|B| = s$.
4. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ de medida finita y no nula. Probar que dado $n \in \mathbb{N}$ existen n conjuntos disjuntos de A de la forma $(A_j)_{1 \leq j \leq n}$ tales que $|A_j| = \frac{|A|}{n}$ para cada j.

Demostración. Para el inciso 1, por el ejercicio anterior es $B(0,r) = rB(0,1)$ y por ende $|B(0,r)| = r^n|B(0,1)|$.

Para el inciso 2 sea A medible y consideremos la función f como en el enunciado. Dado $\varepsilon > 0$ queremos ver que existe δ tal que si $|r_1, r_2| < \delta$ entonces:

$$|f(r_1) - f(r_2)| = ||A \cap B(0,r_1)| - |A \cap B(0,r_2)|| < \varepsilon$$

Notemos que si $r_1 \geq r_2$ entonces $A \cap B(0,r_2) \subset A \cap B(0,r_1)$, de manera que:

$$||A \cap B(0,r_1)| - |A \cap B(0,r_2)|| = |A \cap B(0,r_1)| - |A \cap B(0,r_2)| = |A \cap B(0,r_1) \setminus A \cap B(0,r_2)|$$

Ahora bien:

$$A \cap B(0,r_1) \setminus A \cap B(0,r_2) = A \cap (B(0,r_1) \setminus B(0,r_2)) \subset B(0,r_1) \setminus B(0,r_2)$$

De esta manera, por monotonía de la medida es:

$$|f(r_1) - f(r_2)| = ||A \cap B(0,r_1)| - |A \cap B(0,r_2)|| < |B(0,1)|(r_1^n - r_2^n)$$

tomando $r_1 - r_2$ suficientemente pequeño, tenemos que esto puede ser menor que ε.

Para el inciso 3, sea s tal que $0 \leq s \leq |A|$, notemos que la función f es creciente y su límite superior es $|A|$ y su límite inferior es 0. Por teorema de los valores intermedios f toma cada valor entre estos dos y por ende para cada s podemos encontrar un r tal que:

$$f(r) = s = |A \cap B(0,r)| = |B|, \quad B = A \cap B(0,r) \subset A$$

Y B es medible por ser intersección de medibles.

Por último, para el último inciso podemos considerar para cada $j \in [\![0,n]\!]$ un r_j tal que:

$$|A \cap B(0,r_j)| = \frac{j}{n}$$

y tomamos $A_1 = A \cap B(0,r_1)$ y $A_j = A \cap (B(0,r_j) \setminus B(0,r_{j-1}))$ el cual tendrá medida $\frac{1}{n}$, pues la medida es $\frac{j}{n} - \frac{j-1}{n} = \frac{1}{n}$. Además como $r_i < r_j$ para todos $1 \leq i < j \leq n$ tenemos que:

$$B(0,r_i) \subset B(0,r_{j-1})$$

De modo que se deduce que $A_j \cap A_i = \emptyset$ por como se eligieron, pues $B(0,r_i) \cap (A \cap (B(0,r_j) \setminus B(0,r_{j-1}))) = \emptyset$ y por ende $A_i \cap A_j = \emptyset$. □

Ejercicio 4.9. Sea $Z \subset \mathbb{R}$ tal que tiene medida 0, probar que $E = \{x^2 : x \in Z\}$ tiene medida nula.

Demostración. Recordemos que por el *Teorema* 1,57 si tenemos f una función *Lipschitz* entonces $|f(Z)| = 0$ si Z tiene medida 0.

Notemos que E es la imagen por Z de la función $f(x) = x^2$, esta *no* es *Lipschitz* en $\mathbb{R}$ pero si lo es en intervalos acotados como $[-n,n]$ donde:

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = |x+y||x-y| \leq 2n|x-y|$$

De esta manera $f(Z \cap B(0,n))$ tiene medida 0 para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$|f(Z)| = |E| = |\bigcup_n f(Z \cap B(0,n))| = \sum_n |f(Z \cap B(0,n))| = 0$$

Notar que podemos poner $|E|$ pues es unión numerable de conjuntos medibles. $\square$

Ejercicio 4.10. Sea $T : [0,1) \to [0,1)$ definida por:

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2x-1, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases}$$

Probar que si $E \subset [0,1)$ es medible entonces $T^{-1}(E)$.

Demostración. Sea $E \subset [0,1)$ queremos ver quien es $T^{-1}(E)$. Sea $y \in E$, entonces existe $x \in T^{-1}(E)$ tal que $T(x) = y$ si y solamente si $y = 2x$ o $y = 2x - 1$. Esto es que:

$$x = \frac{y}{2} \text{ o } x = \frac{y+1}{2}$$

Por lo tanto, la preimágen de E es:

$$T^{-1}(E) = \{\frac{y}{2} : y \in E\} \cup \{\frac{y+1}{2} : y \in E\} = E_1 \cup E_2$$

Notemos que $E_1 = \{\frac{y}{2} : y \in E\} = D_{\frac{1}{2}}(E)$ con $D_{\frac{1}{2}} : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{x}{2} \in \mathbb{R}$ y análogamente $E_2 = \{\frac{y+1}{2} : y \in E\} = (D_{\frac{1}{2}} \circ T_1)(E)$ con $T_1 : x \in \mathbb{R} \mapsto x + 1 \in \mathbb{R}$.

Estas dos son traslaciones y dilataciones y la dilatación y traslación de conjuntos medibles dan conjuntos medible, de esta manera:

$$T^{-1}(E) = E_1 \cup E_2$$

Es medible por ser unió de dos medibles. Más aún en ese caso es:

$$|T^{-1}(E)| = |E_1| + |E_2| = \frac{1}{2}|E| + \frac{1}{2}|E| = |E|$$

Pues las traslaciones conservan la medida y las dilataciones sacan escalares fuera de ella según lo proado en los ejercicios 6 y 7. $\square$

Ejercicio 4.11. Para cada sucesión de conjuntos medibles $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definimos:

$$\lim_{n\to\infty} \inf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_n \qquad \lim_{n\to\infty} \sup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_n$$

Probar que:

1. Ambos límites son medibles.
2. Es $|\lim\inf A_n| \leq \lim\inf |A_n|$.
3. Si para algún $n \in \mathbb{N}$ es $|\bigcup_{k=n} A_n| < \infty$ entonces $|\lim\sup A_n| \geq \lim\sup |A_n|$.
4. Si $\sum_{n=1}^{\infty} |A_n| < \infty$ entonces $|\lim\sup A_n| = 0$.

Demostración. Para probar esto basta considerar que la familia de los conjuntos medibles es un σ-álgebra. Luego, es cerrada para uniones e intersecciones numerables. De esta manera tenemos que los límites así definidos son siempre elementos del álgebra y por ende medibles.

Probemos que $|\lim\inf A_n| \leq \lim\inf |A_n|$. Para cada n sea:

$$B_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

Esto nos da una sucesión creciente de conjuntos $B_n \subset B_{n+1}$. Por continuidad de la medida:

$$|\lim\inf A_n| = |\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n| = \lim_{n\to\infty} |B_n|$$

Ahora, para cada n es $B_n \subset A_k$ para todo $k \geq n$, y por ende $|B_n| \leq \inf_{k\geq n} |A_k|$ de esta manera:

$$|\lim\inf A_n| = \lim_{n\to\infty} |B_n| \leq \lim_{n\to\infty} \inf_{n\geq k} |A_k|$$

Ahora, supongamos que existe un n_0 tal que $|\bigcup_{k=n_0}^{\infty} A_k| < \infty$ y consideremos:

$$C_n = \bigcup_{k\geq n} A_n$$

esto nos da una sucesión decreciente -$C_n \supset C_{n+1}$- y existe un n_0 tal que $|C_{n_0}| < \infty$ entonces:

$$|\lim\sup A_n| = |\bigcap_{n\geq 1} C_n| = \lim_{n\to\infty} |C_n|$$

Ahora bien, para cada n y cada $k \geq n$ es $A_k \subset C_n$ y por ende $|A_k| \leq |C_n|$. Así:

$$\sup_{k\geq n} |A_k| \leq |C_n|$$

Tomando límite a ambos lados es:

$$\lim\sup |A_n| \leq \lim |C_n| = |\lim\sup A_n|$$

Nota: Notar que no vale la continuidad de la medida y menos aún la cota si no existe un C_n de medida finita. En general, supongamos $A_n = [n, \infty)$, entonces $\bigcap_n A_n = \emptyset$ y por ende $|\lim\sup A_n| = 0$ pero $\lim\sup |A_n| = \infty$ y nos quedaría que $0 \geq \infty$ lo cual es absurdo.

Para probar lo último, sea $C_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_n$ entonces:

$$|C_n| \leq \sum_{k=n}^{\infty} |A_n|$$

Dado que $\limsup A_n \subset C_n$ para todo n, por monotonía:

$$|\limsup A_n| \leq |C_n| \leq \sum_{k=n}^{\infty} |A_k| \xrightarrow[n\to\infty]{0}$$

Por lo tanto, $|\limsup A_n| = 0$. □

Ejercicio 4.12. Construir un subconjunto de $[0,1]$ como el de Cantor excepto que en el k-ésimo paso, cada intervalo que se extrae tiene longtud $\delta 3^k$ con $0 < \delta < 1$. Probar que el conjunto obtenido es perfecto, tiene medida $1-\delta$ y no contiene intervalos.

Demostración. Para construir este conjunto a $E_0 = [0,1]$ le quitamos el intervalo central de longitud $\frac{\delta}{3}$, obtenemos E_1 que consta de dos intervalos cerrados, quitamos a cada uno de estos intervalos el intervalo central de longitud $\frac{\delta}{3^2}$ y obtenemos 4 intervalos. En el paso k a los 2^{k-1} intervalos del paso anterior le quitamos intervalos centrales de longitud $\frac{\delta}{3^k}$.

Definimos $C_\delta = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$. Veamos que el conjunto es *perfecto* recordemos que esto es que sea cerrado y no tenga puntos aislados. Es cerrado por ser intersección de cerrados. Para ver que no hay puntos aislados, notemos primero que si un punto es borde de un intervalo I_k en el conjunto E_k entonces este punto se mantendrá en C_δ, pues por construcción al quitar intervalos centrales en cada paso si en algún paso un punto es extremo de un intervalo entonces perdurará en el conjunto. Sea entonces $x \in C_\delta$, para cada k existe un I_k tal que $x \in I_k$, como la longitud de estos intervalos I_k tiende a 0, dado $\varepsilon > 0$ existe un k tal que la distancia de x a los extremos del intervalo es menor a ε, luego x no es aislado, pues es diferente a al menos uno de estos extremos.

Para calcular la longitud de C_δ, notemos que la longitud de $G = [0,1] \setminus C_\delta$ es igual a la suma de las longitudes de los intervalos que saca en cada paso. Entonces:

$$|G| = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k-1} \frac{\delta}{3^k} = \frac{\delta}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{2}{3})^k = \frac{\delta}{2} (\frac{2/3}{1-2/3}) = \delta$$

Ahora bien, tenemos que C_δ es el complemento de G en $[0,1]$, de esta manera:

$$|C_\delta| = |[0,1] \setminus G| = 1 - |G| = 1 - \delta$$

Vemos ahora qe no contiene intervalos. Notemos que si I es un intervalo, entonces tiene medida positiva, digamos α. Si $I \subset C_\delta$, entonces en cada E_k debe existir un intervalo I_k tal que $I \subset I_k$.

Por otro lado, sabemos que E_k es unión de intervalos disjuntos, la medida de cada intervalo I_k que conforma el nivel E_k es:

$$|I_k| = \frac{1 - \sum_{j=1}^{k} 2^{j-1} \frac{\delta}{3^j}}{2^k}$$

Si tomamos límite sobre k es fácil ver que la longitud de los I_k tiende a 0, pues lo de arriba converge a $1 - \delta$ y lo de abajo a infinito. Luego, existe un k tal que $|I_k| < \alpha$ y en ese caso es absurdo que $I \subset I_k$. □

Ejercicio 4.13. Probar que equivalen:

1. E es medible.
2. Para cada $\varepsilon > 0$ existe $F \subset E$ cerrado tal que $|E \setminus F|_e < \varepsilon$.
3. Existe $H \in F_\sigma$ y N de medida 0 tales que $E = H \cup N$.

Demostración. Sea E medible y $\varepsilon > 0$, su complemento E^c es medible, de modo que existe G abierto tal que $E^c \subset G$ y $|G \setminus E^c|_e < \varepsilon$. Luego $G \setminus E^c = E \cap G = E \setminus G^c$ y como G es abierto $F = G^c$ es cerrado, y como $E^c \subset G$ es $F \subset E$. Por ende:

$$|E \setminus F|_e < \varepsilon$$

Si suponemos ahora que ara cada ε existe este F, consideremos para cada $k \in \mathbb{N}$ $F_k \supset E$ un cerrado tal que:

$$|E \setminus F_k|_e < \varepsilon$$

Evidentemente si $H = \bigcup_k F_k$ es $H \in F_\sigma$, y es claro que $H \subset E$. De esta manera, si $E = H \cup E \setminus H$ basta ver que $E \setminus H$ tiene medida 0.

Sea $\varepsilon > 0$, existe k tal que $\frac{1}{k} < \varepsilon$. Sea ese k, entonces como $H \supset F_k$ tenemos que $H^c \subset F_k^c$ y por ende:

$$E \setminus H = E \cap H^c \subset E \cap F_k^c = E \setminus F_k$$

Por ende, es $|E \setminus H|_e \leq |E \setminus F_k|_e < \frac{1}{k} < \varepsilon$ pero ε es arbitrario, de modo que $E \setminus H$ es de medida 0.

Si ahora $E = H \cup N$ con $H \in F_\sigma$ y $|N| = 0$ tenemos que E es medible por ser unión numerable de medibles -H es medible por ser unión numerable de medibles y N es medible-. □

Ejercicio 4.14. Mostrar qu existe un subconjunto H de $[0, 1]$ de clase F_σ y de medida uno forado solo por irracionales.

Demostración. Sabemos que el intervalo $[0,1]$ es medible y tiene medida 1. Por otro lado el conjunto de los racionales tiene medida 0 en $[0,1]$, por subaditividad de la medida exetrior:

$$|\mathbb{Q}|_e \leq \sum_k |q_k|_e = 0$$

Luego, $I = [0,1] \setminus \mathbb{Q}$ es medible y tiene medida 1. Por la proposición anterior, podemos escribir a I como $H \cup Z$ con $H \in F_\sigma$ y Z de medida 0. De esta manera $I \setminus Z = H$ y por ende H tiene medida 1. Luego H es el conjunto buscado, pues es un F_σ, su medida es 1 y no posee racionales pues está contenido en $[0,1] \setminus \mathbb{Q}$. $\square$

Ejercicio 4.15. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ decimos que satisface la condición de Carathéodory si para todo $A \subset \mathbb{R}^n$ verifica:

$$|A|_e = |A \cap E|_e + |A \cap E^c|_e$$

Probar que:

1. Todo medible satisface esta condición.
2. Si E es acotado y satisface eta condición entonces es medible.
3. E es medible si y solo si satisface esta condición.

Demostración. Sea E medible, por un lado vale que $|A|_e \leq |A \cap E|_e + |A \cap E^c|_e$ para todo A. Veamos la otra. Sabemos que existe $H \supset A$ un G_δ tal que $|H| = |A|_e$, de esta manera, por aditividad de la medida es:

$$|A|_e = |H| = |H \cap E| + |H \cap E^c| \geq |A \cap E|_e + |A \cap E^c|_e$$

Sea ahora E acotado, de manera que $|E|_e < \infty$ y consideremos H un G_δ tal que $|H| = |E|_e$, en ese caso:

$$|H| = |H \cap E|_e + |H \setminus E|_e = |E|_e + |H \setminus E|_e$$

De esta manera $|H \setminus E|_e = 0$ y por ende es medible. Como además $E = H \setminus H \setminus E$ entonces E es medible por ser diferencia de medibles.

Ya vimos que todo medible satisface esta condición y que si un conjunto es acotado y satisface la condición es medible. Sea E un conjunto cualquiera que satisface la condición, veamos que $E_k = E \cap B(0,k)$ también satisface la condición, sea $H_k \supset E_k$ un G_δ tal que $|H_k| = |E_k|_e$ entonces:

$$|E_k \cap A|_e + |E_k \cap A^c|_e \geq |E_k|_e = |H_k| = |H \cap A| + |H \cap A^c| \geq |E_k \cap A|_e + |E_k \cap A^c|_e$$

Como cada E_k es acotado, y cumple Caratheodory, entonces es medible. Luego $E = \bigcup_k E_k$ es también medible. $\square$

Ejercicio 4.16. 1. Probar que si $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de conjuntos, entonces $|\bigcup_n E_n|_e = \lim |E_n|_e$.

2. Dar un ejemplo de una sucesión decreciente $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $|E_k|_e < \infty$ para todo k y $|\bigcap_n E_n|_e < \lim |E_k|_e$

Demostración. Es claro por un lado que vale la desigualdad:

$$|\bigcup_n E_n|_e \geq \lim |E_n|_e$$

por monotonía de la medida exterior. Por otro lado, para cada E_n podemos tomar $H_n \supset E_n$ un G_δ tal que $|E_n|_e = |H_n|$. Sea ahora $V_m = \bigcap_{n\geq m} H_n$ entonces V_m es medible y para cada m es:

$$E_m \subset V_m \subset H_m \implies |E_m|_e \leq |V_m| \leq |H_m| = |E_m|_e$$

Pues $E_m \subset E_k \subset H_k$ para cada $k \geq m$. Esto nos dice que para cada m es $|V_m| = |E_m|_e$. Como la sucesión $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es claramente creciente -pues en cada paso intersecamos por menos cosas-, por continuidad de la medida es:

$$\lim |E_n|_e = \lim |V_n| = |\bigcup_n V_n| \geq |\bigcup_n E_n|$$

Esto comleta la prueba.

Para econtrar el contraejemplo, sea V el conjunto de Vitali y $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una numeración de los racionales en $(-1,1)$, consideremos $(V_n)_{n\in\mathbb{N}} = (V + r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ el conjunto de traslaciones del conjunto de Vitali todas restringidas al $(0,1)$. Sea $E_n = \bigcup_{k\geq n} V_k$, esto no sda una sucesión decreciente.

Es claro que la intersección de los E_n es vacía pues los V_k son disjuntos dos a dos. Por otro lado, la medida exterior de los E_n no puede ser 0. Si $|E_n|_e = 0$ entonces por monotonía para cada $k \geq n$ es $|V_k|_e = 0$. Pero todos los V_k tienen la misma medida exterior -pues esta es invariante por traslaciones-. Luego cada V_k sería medible y por ende:

$$|(0,1)| = |\bigcup_n V_n| = \sum_n |V_n| = \sum_n 0 = 0$$

y esto es claramente absurdo. Luego $|E_k|_e > 0$ para cada k y por ende $\lim |E_k|_e > |\bigcap_k E_k|_e$. □

Ejercicio 4.17. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible con medida positiva.

1. Mostrar que para todo $\alpha > 1$ existe un intervalo $I \subset \mathbb{R}^n$ ta que $|I| < \alpha|E \cap I|$.

2. Probar que existe $r_0 > 0$ tal que $E \cap (E + v) \neq 0$ para todo $v \in B(0, r_0)$.

3. Concluir que el conjunto de diferencias de E contiene un entorno del origen.

Demostración. Para el primer ítem, supongamos que la afirmación es falsa, de manera que existe un $\alpha > 0$ tal que para todo intervalo I es:

$$|I| \geq \alpha |E \cap I|$$

Por ser E medible, su medida es igual a su medida exterio. Dado $\varepsilon > 0$ consideremos $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un conjunto de intervalos casi disjuntos tales que:

$$|E| \leq \sum_n |I_n| < |E| + \varepsilon$$

Con $E \subset \bigcup_n I_n$. De esta manera es:

$$E = \bigcup_n (E \cap I_n)$$

Y por ser la medida sub-aditiva:

$$|E| \leq \sum_n |E \cap I_n| \leq \frac{1}{\alpha} \sum_n |I_n| < \frac{1}{\alpha}(|E| + \varepsilon)$$

Como esto es sin importar ε tenemos que:

$$|E| \leq \frac{1}{\alpha}|E| < |E|$$

Pues $\alpha > 1$. Esto resulta absurdo y proviene de suponer la existencia de ese α.

Sea $\alpha = \frac{4}{3}$ por el inciso anterior existe I un intervalo tal que:

$$\frac{3}{4}|I| < |E \cap I|$$

Supongamos que no existe un radio como en el enunciado, de manera que siempre existe un v tal que $E \cap E + v = \emptyset$ sin importar que tan cerca del origen esté v.

Por otro lado, es $E \cap I \subset I$, consideremos v de longitud pequeña -en seguida precisaremos que tanto- tal que la intersección sea disjunta entonces en particular es:

$$(E \cap I) \cap (E \cap I) + v = \emptyset$$

pues es $E \cap E + v = \emptyset$. Esto nos dice que:

$$|(E \cap I) \cup (E \cap I) + v| = |(E \cap I)| + |(E \cap I) + v| = 2|E \cap I| > \frac{3}{2}|I|$$

Por otro lado es $E \cap I \subset I$ de manera que:

$$|(E \cap I) \cup (E \cap I) + v| \leq |I \cup I + v|$$

Podemos suponer que I es en realidad un cubo de lado L, pues si no es el caso tomamos un cubo dentro del intervalo I y va a cumplir la propiedad, en ese caso será $|I| = L^n$. Luego tenemos que:

$$|I \cup (I + v)| \leq \prod_{i=1}^{n} (L + |v_i|)$$

Si cada v_i es suficientemente pequeño, entonces:

$$|I \cup (I + v)| = \prod_{i=1}^{n} (L + |v_i|) \leq L^n + L^{n-1} \sum |v_i| + L^{n-2} \sum |v_i||v_j| + \cdots + \prod |v_i|$$

Ahora, cada término es a lo sumo la norma infinito de v, luego:

$$|I \cup (I + v)| \leq L^n + nL^{n-1} + \binom{n}{2} L^{n-2} \|v\|_\infty^2 + \cdots + L\|v\|_\infty^{n-1}$$

Si tomamos $\|v\|_\infty < L$ tenemos que $\|v\|_\infty^k < L^{k-1}\|v\|_\infty$:

$$|I \cup (I + v)| \leq L^n + (n + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}) L^{n-1} \|v\|_\infty$$

Ahora, lo del paréntesis es el binomio $(1+1)^n$ menos el término $\binom{n}{0}$, es decir es $(2^n - 1)$, tenemos que:

$$|I \cup (I + v)| \leq L^n + (2^n - 1)L^{n-1}\|v\|_\infty = |I| + (2^n - 1)L^{n-1}\|v\|_\infty$$

Eligiendo que $\|v\|_\infty < \frac{|I|}{2(2^n-1)L^{n-1}}$ tenemos que:

$$\frac{3}{2}|I| < 2|E \cap I| \leq |I \cup (I + v)| \leq |I| + (2^n - 1)L^{n-1}\|v\|_\infty$$

Por ende:

$$\frac{1}{2}|I| < (2^n - 1)L^{n-1}\|v\|_\infty \implies \|v\|_\infty > \frac{|I|}{2(2^n - 1)L^{n-1}}$$

Pero esto es absurdo. Luego si $r_0 = \text{mín}(L, \frac{|I|}{2(2^n-1)L^{n-1}})$ tenemos que para todo $v \in B_\infty(0, r_0)$ es $E \cap (E + v) \neq \emptyset$.

Para el último ítem, tenemos que si consderamos la bola $B(0, r_0)$ de antes, entonces $E \cap (E+v) \neq \emptyset$ para todo v en esta bola. Esto significa que para cada v en esta bola existe un $x \in E$ y un $x \in E + v$, de esta manera existe un $y \in E$ tal que $x = y + v$ y por ende $v = x - y$. Como esto es sin importar el $v \in B_\infty(0, r_0)$, tenemos que

$$B_\infty(0, r_0) \subset E - E = D(E)$$

□

Ejercicio 4.18. Probar que cualquier conjunto con medida positiva tiene cardinal del continuo.

Demostración. Por el ejercicio anterior es $\#D(E) = c$ pues contiene un entorno del 0. Por otro lado, como $\#D(E) \leq \#E \times E$ tenemos que $E \times E$ también posee el cardinal del continuo y por ende debe poseerlo E.

Otra forma de ver esto es que si E es contable entonces podemos poner $E = \{e_i : i \in I \subset \mathbb{N}\}$:

$$|E| = \sum_{n \in I} |e_i| = 0$$

Luego, un conjunto contable no tiene medida positiva. Si un conjunto tiene medida positiva debe poseer por ende el cardinal del continuo. □

Ejercicio 4.19. Para cada $E \subset \mathbb{R}^n$ definimos la medida interior como:

$$|E|_i = \sup\{|F| : F \subset E, F \text{ cerrado}\}$$

Probar que:

1. $|E|_i \leq |E|_e$.
2. Si E es medible, entonces $|E|_i = |E|_e$.
3. Si $|E|_e < \infty$ y $|E|_i = |E|_e$ entonces E es medible.
4. Existe E no medible tal que $|E|_i = |E|_e$.
5. Es una función monótona.
6. Si $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son disjuntos, entonces:

$$|\bigcup_n E_n|_i \geq \sum_n |E_n|_i$$

Demostración. Para el primer ítem, tenemos que si F es cerrado y está contenido en E entoces para toda familia de intervalos casi disjuntos $\{I\}$ tal que:

$$F \subset E \subset \bigcup_n I_n$$

entonces es:

$$|F| = |F|_e \leq \sum_n |I_n|$$

Por ende es:

$$|F| \leq |E|_e$$

y tomando supremo sobre los F es $|E|_i \leq |E|_e$ como se quería probar.

Si E es medible, entonces tenemos que para cada $\varepsilon > 0$ sabemos que existe $F \subset E$ cerrado tal que $|E \setminus F| < \varepsilon$. Además E cumple la condición de Carathe-rody, de manera que:

$$|E|_e = |F| + |E \setminus F| < |F| + \varepsilon$$

Luego, tomando supremo sobre los F, tenemos que:

$$|E|_e \leq |E|_i$$

Como la otra desigualdad siempre vale, entonces obtenemos que $|E|_e = |E|_i$.

Supongamos ahora que la medida exterior de E es finita y que es igual a la interior. Sabemos que E es medible si es unión de un F_δ y un conjunto de medida 0. Para cada n existe F_n tal que $|E|_i - \frac{1}{n} < |F_n| \leq |E|_i$ por definición de ínfimo.

Sea $H = \bigcup_n F_n$ entonces H es medible pues es un F_δ y además:

$$|H| \geq |F_n| > |E|_i - \frac{1}{n}$$

Pero como esto es para todo n es $|E|_e = |E|_i \leq |H|$ y por monotonía de la medida exterior como $H \subset E$ es $|E|_e = |E|_i \geq |H|$. Luego $|H| = |E|_e$.

Por otro lado, existe $G \supset E$ un G_δ tal que $|G| = |E|_e = |E|_i$, en este caso es $G \setminus H \supset E \setminus H$ y en ese caso, como $|E|_e$ es finita:

$$|H \setminus E|_e \leq |G \setminus H| = |G| - |H| = |E|_e - |E|_e = 0$$

Por ende $H \setminus E$ es medible, y más aún su media es 0.

Luego como $E = H \setminus (E \setminus H)$ entonces E es unión de un F_σ y un conjunto de medida 0. Así E es medible.

Un conjunto no medible con medida exterior e interior iguales es el $E = V \cup (1, \infty)$ con V el conjunto de vitali en el $0, 1$. Si E fuera medible debería serlo V pues $V = E \cap [0, 1]$, y esto es falso. Ahora bien, la medida interior y la exterior dan ∞ pues ambas contienen al $(1, \infty)$.

Para ver que la medida interior es monótona basta notar que si $E \subset F$ entonces tomar supremo sobre los cerrados contenidos en F es tomar supremo

sobre un conjunto más grande.

Sea ahora $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos disjuntos y sea $\varepsilon > 0$. Para cada n consideremos $F_n \subset E_n$ cerrado tal que $|F_n| > |E_n|_i - \frac{\varepsilon}{2^n}$. Entonces:

$$\sum_n |E_n|_i \leq \sum_n |F_n| + \frac{\varepsilon}{2^n} = |\bigcup_n F_n| + \varepsilon \leq |\bigcup_n E_n|_i + \varepsilon$$

Esto pues los F_n son disjuntos, medbles y la medida es σ-aditiva. Como esto es sin importar el ε, tenemos que vale la desigualdad del enunciado. □

Ejercicio 4.20. Sea E medible en $\mathbb{R}^n$ y $A \subset E$, probar que $|E| = |A|_i + |E \setminus A|_e$.

Demostración. Sabemos por un lado que si E es medible cumple Carathéodory. Sea $A \subset E$ y consideremos $F \subset A$ cerrado tal que $|F| + \varepsilon > |A|$. Por un lado es $E \setminus A \subset E \setminus F$ y como F, E son medibles es:

$$|E| = |F| + |E \setminus F| \geq |F| + |E \setminus A|_e$$

pero esto es sin importar el F, luego tomando supremo sobre F es:

$$|E| \geq |A|_i + |E \setminus A|_e$$

Veamos ahora la otra desigualdad. Para ello notemos, recordemos que probamos existe un G_δ G tal que $E \setminus A \subset G$ y $|G| = |E \setminus A|_e$. Por otro lado, como E y G medibles por Caratheodory para G es:

$$|E| = |E \setminus G| + |E \cap G| \leq |G| + |E \setminus G| = |E \setminus A|_e + |E \setminus G|$$

Ahora bien, como $E \setminus A \subset G$ tenemos que $E \setminus G \subset A$ por lo tanto la medida interior de $E \setminus G$ -que es igual a su medida- es menor o igual a la de A. Así:

$$|E| \leq |A|_i + |E \setminus A|_e$$

Se concluye así la prueba. □

Ejercicio 4.21. Sea V un conjunto de Vitali, probar que si E es medible y $E \subset V$ entonces $|E| = 0$. Concluir que $|V|_i = 0$.

Demostración. La prueba es la de siempre, sea $V \subset [0, 1]$ el conjunto de vitali, sea $E \subset V$ medible, consideremos el conjunt de traslaciones racionales de E en el $[-1, 1]$. Sea $E_k = E + q_k$ entonces todos poseen la misma medida y son disjuntos pues como $E \subset V$ entonces tiene a lo sumo un representante de cada clase de equivalencia cocientando por $\mathbb{Q}$.

Los E_k están todos contenidos en $[-1, 2]$, y son disjuntos. Por σ-aditividad de la medida es:

$$|S| = |\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k| = \sum_{k\in\mathbb{N}} |E_k| = \sum_{k\in\mathbb{N}} |E| \leq |[-1, 2]| = 3$$

Si $|E| > 0$ esta serie divergería y por ende esto sería absurdo. Es inmediato que $|V|_i = 0$ pues todo cerrado es medible y en particular todo cerrado contenido en V tendrá medida 0, luego estamos tomando supremo al conjunto $\{0\}$. $\square$

Ejercicio 4.22. 1. Construir una sucesión de conjuntos $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ disjuntos dos a dos tales que:

$$|\bigcup_k E_k|_e < \sum_k |E_k|_e$$

2. Construir una sucesión de conjuntos tales que $|\bigcup_k E_k|_i > \sum_k |E_k|_i$.
3. Construir E tal que $|E|_i < \infty$ y $|E|_e = \infty$.

Demostración. Para el primer ítem, si ponemos $E_k = V + q_k$ con V el conjunto de vitali y $\{q\}$ una numeración para los racionales es:

$$[0,1] \subset \bigcup_k E_k \subset [-1,2]$$

Por lo tanto la medida exterior de la unión es a lo sumo 3. Por otro lado es $|E_k|_e = |V|_e$ y como $|V|_e > 0$ entonces:

$$\sum_k |E_k|_e = \sum_k |V|_e = \infty$$

Para el segunco ítem ponemos $E_1 = V$ y $E_2 = [0,1] \setminus V$. Tenemos que, por el ejercicio anterior:

$$1 = |[0,1]| = |[0,1] \setminus V|_i + |V|_e$$

Luego $1 = |[0,1]\setminus V|_i + |V|_e$. Como $|V|_e > 0$ entonces $|[0,1]\setminus V|_i = 1 - |V|_e < 1$. Luego:

$$|E_1|_i + |E_2|_i = 0 + (1 - |V|_e) = 1 - |V|_e < 1 = |[0,1]| = |V \cup [0,1] \setminus V|_i$$

pues antes probamos que la medida interor de V es 0.

Para el último ítem sea $V_n = V + 2n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y sea $E = \bigcup_n V_n$ entonces tenemos que:

$$|E|_i = 0$$

pues por lo que vimos antes podemos pensarlo como conjuntos de vitali trasladados, como además son disjuntos cada cerrado en la unión tiene medida 0. Por otro lado, como estos conjunto están separados es:

$$|E|_e \geq \sum_{n=1}^{N} |V + 2n|_e = N|V|_e \to_{N\to\infty} \infty$$

Esto pues cuando los conjuntos tienen distancia positiva, según el ejercico 2 de esta sección, es legal hacer esta operación. $\square$

5. Funciones medibles:

Ejercicio 5.1. Sea $\mathcal{B}$ la σ-álgebra de Borel de $\mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$. Probar que:

(a) Si f es medible entonces $f^{-1}(B)$ es medible para todo $B \in \mathcal{B}$.

(b) Si $\overline{\mathcal{B}} = \{E = B \cup A : B \in \mathcal{B} \text{ y } A \subset \{-\infty, \infty\}\}$, entonces f es medible si y sólo si $f^{-1}(E)$ es medible para todo $E \in \overline{\mathcal{B}}$.

Demostración. Recordemos que la condición de medibilidad es que f es medible si $f^{-1}([-\infty, a))$ es medible para todo $a \in \mathbb{R}$. Para ver que $f^{-1}(B)$ es medible para todo B Borel basta ver que todo conjunto de Borel -en particular toda intersección y unión contable de abiertos- se puede escribir con uniones e intersecciones contables de estos conjuntos.

Para ver que toda unión e intersección de abiertos se puede escribir como unión e intersección de estos conjuntos, basta ver que podemos formarnos cualquier intervalo abierto considerando operaciones de estos conjuntos.

Para conseguir el conjunto $[a, +\infty]$ tomamos complemento a $[-\infty, a)$. Para obtener $(a, +\infty]$ consideramos $(a, +\infty) = \bigcup_n [a + \frac{1}{n}, +\infty]$. Y para obtener cualquier intervalo genérico $(a, b) = (b, +\infty] \cap [-\infty, a)$.

Esto nos da el σ-álgebra de Borel pues podemos conseguirnos cualquier abierto como unión de intervalos y sobre estos abiertos considerar uniones e intersecciones contables para construir nuestra álgebra.

Entonces si B es Borel tenemos que:

- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ es medible.
- Si B es medible entonces $f^{-1}(B^c) = f^{-1}(B)^c$ y por ende su complemento es medible.
- Si $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos con preimágenes medibles entonces $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n)$ es medible por ser unión contable de medibles.

Como cada B en el álgebra se construye por uniones e intersecciones contables de conjuntos con preimágenes medibles -según lo dicho arriba- entonces todo B Borel tiene preimagen medible.

Sea $\overline{\mathcal{B}}$ como en el enunciado, supongamos que $f^{-1}(E)$ es medible para todo $E \in \overline{\mathcal{B}}$ entonces f es medible pues lo es para todo intervalo $(-\infty, a)$.

Supongamos ahora que f es medible. Entonces $f^{-1}(E) = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(A)$. Sabemos que $f^{-1}(B)$ es medible por el inciso anterior. Por otro lado tenemos que:

$$f^{-1}(\{+\infty\}) = \bigcap_n f^{-1}(n, +\infty]$$

y

$$f^{-1}(\{-\infty\}) = \bigcap_n f^{-1}[-\infty, n)$$

Por ende $f^{-1}(\{+\infty\}), f^{-1}(\{-\infty\}), f^{-1}(\{+\infty, -\infty\})$ son medibles y luego $f^{-1}(E)$ es medible por ser unión de medibles. □

Ejercicio 5.2. Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ medibles. Mostrar que los conjuntos $\{f > g\}$ y $\{f = g\}$ son medibles.

Demostración. Sean f, g dos funciones como en el enunciado, tenemos que si $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una numeració de los racionales, entonces:

$$\{f > g\} = \bigcup_n \{f > q_n\} \cap \{q_n > g\}$$

Como esto es una unión contable de medibles entonces $\{f > g\}$ lo es.

Por otro lado notemos que:

$$\{f \neq g\} = \{f > g\} \cup \{g > f\}$$

Como ambos son medibles tenemos que $\{f \neq g\}$ lo es y por tanto su complemento $\{f = g\}$ también. □

Ejercicio 5.3. (a) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = \alpha\}$ es medible. ¿Es f medible?

(b) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $|f|$ es medible. ¿Es f medible?

Demostración. Ninguna de ambas condciones alcanza para que f sea medible. Para el primer ítem podemos considerar $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ inyectiva tal que envíe a V el conjunto de Vitali a los positivos y su complemento en $[0, 1]$ a los negativos ambos de manera inyectiva.

Luego para todo $\alpha \neq 0$ real es $f^{-1}(\alpha)$ igual a un punto y por tanto medible y si α es 0 entonces nos da el conjunto vacío.

Por otro lado el conjunto $\{f < 0\}$ es no medible pues es el complemento de Vitali y si fuera medible entonces el conjunto de Vitali lo sería.

Si ahora consideramos f tal que vale -1 en V y 1 en su complemento, entonces $|f|$ es medible pues solo toma el valor 1 y un conjunto de la forma $\{f < a\}$ es vacío si $a \leq 1$ o el $[0, 1]$ si $a > 1$. En ambos casos $|f|$ es medible pero f no, pues $\{f < 1\} = f^{-1}(-1) = V$. □

Ejercicio 5.4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Probar que si f es monótona, entonces f es medible Borel.

(b) Probar que si f es derivable, entonces f' es medible Borel.

Demostración. Sea f monótona, entonces si $a \in \mathbb{R}$ tenemos que:

$$\{f < a\}$$

es siempre un intervalo -abierto o cerrado- el cual es claramente medible Borel -en particular podemos pensarlo como unión numerable de los intervalos racionales que contiene y esto es siempre un conjunto de Borel-.

Sea f derivable, queremos ver que $\{f' < a\}$ es un conjunto de Borel sin importar a. Para ello notemos primero que f' es límite de funciones continuas, pues podemos considerar:

$$g_n(x) = \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{1/n} = n(f(x + \frac{1}{n} - f(x)))$$

Entonces cada g_n es medible por ser continua. Por otro lado:

$$\{f' < a\} = \bigcup_k \bigcup_m \bigcap_{n \geq m} \{g_n < a - \frac{1}{k}\}$$

Luego f es medible.

Una pequeña observación para quien lea esto. La idea de pasar del límite a los conjuntos es la siguiente: Fijado x podemos pensar el límite por partes como:

- Si $f'(x) < a$ entonces debe existir un k tal que a la larga $g_n(x) < a - \frac{1}{k}$.
- Como $g_n(x) \to f'(x) < a - \frac{1}{k}$ entonces existe un m tal que cada $g_n(x) < a - \frac{1}{k}$ para todo $n \geq m$. Esto se expresa como la unión sobre todos los m de la interseción sobre los $n \geq m$.

Entonces si $x \in \{g_n < a - \frac{1}{k}\}$ para todo $n \geq m$ con m algún natural es $\lim_n g_n(x) = f'(x) \leq a - \frac{1}{k} < a$. □

Ejercicio 5.5. Probar que si $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ es medible, entonces existe $g : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ medible Borel tal que $f = g$ a.e.

Demostración. Sea f medible, sabemos por el corolario del *Teorema de aproximación monótona* que existe $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones simples medibles tales que convergen a f puntualmente.

Cada función simple y medible toma finitos valores en conjuntos medibles, es decir:

$$f_n = \sum_{i=1}^{n_k} a_i^n \chi_{E_i^n}$$

Con E_i medible. Para cada E_i^n por ser medible, existe un G_δ llamemoslo B_i^n y un Z_i^n de medida 0 tal que:

$$E_i^n = B_i^n \setminus Z_i^n$$

y $|B_i^n| = |E_i^n|$. Además B_i^n es un conjunto de Borel pues es unión numerable de abiertos.

Sea para cada n la función:

$$g_n(x) = \begin{cases} f_n(x) & \text{si } x \in \bigcup_{i=1}^{n_k} B_i^n \\ 0 & \text{si } x \notin \bigcup_{i=1}^{n_k} B_i^n \end{cases}$$

Y por ende tenemos que:

$$g_n = \sum_{i=1}^{n_k} a_i^n \chi_{B_i^n}$$

Entonces g_n es Borel medible, pues $\{g_n < a\}$ es unión finita de conjuntos Borel.

Por otro lado si ponemos $N_n = \{g_n \neq f_n\}$ tenemos que $|N_n| = 0$ pues f_n y g_n difieren a lo sumo en los Z_i^n y luego N_n está contenido en su unión.

Sea $g(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x)$ y $N = \bigcup_n N_n$ tenemos que $|N| = 0$. Veamos que $g = f$ en casi todas partes. Si $x \in N$ entonces no necesariamente $g(x) = f(x)$. Pero si $x \notin N$ tenemos que:

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$$

Luego $\{g \neq f\} \subset N$ y entonces:

$$|\{g \neq f\}| = 0$$

□

Ejercicio 5.6. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ continua en casi todo punto. Probar que f es medible.

Demostración. Sea f como en el enunciado y Z el conjunto donde es discontinua, entonces si a es real:

$$\{f < a\} = \mathbb{R}^n \setminus Z \cap \{f < a\} \cup Z \cap \{f < a\}$$

El segundo conjunto es medible por estar contenido en uno de medida 0. El primer conjunto es un abierto relativo a $\mathbb{R}^n \setminus Z$, por ende existe un abierto V en $\mathbb{R}^n$ tal que $\{f < a\} \cap \mathbb{R}^n \setminus Z = V \cap \mathbb{R}^n \setminus Z$. Luego V es medible y por lo tanto lo es $\{f < a\} \cap \mathbb{R}^n \setminus Z$ por ser intersección de medibles. Así $\{f < a\}$ es medible. Como esto es sin importar el a tenemos que f es medible. $\square$

Ejercicio 5.7. (a) Hallar $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua a.e. tal que no exista $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua que verifique $f = g$ a.e.

(b) Hallar $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que g sea continua, $f = g$ a.e. y f sea discontinua en todo punto.

Demostración. Para encontrar una función f de esta forma podemos considerar $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

f es discontinua en un solo punto y no podemos conseguir una función continua que sea equivalente a f.

Para hallar tal f podemos considerar $\chi_{\mathbb{Q}}$. Es discontinua en todo punto pero podemos considerar $g \equiv 1$ que es igual a f salvo un conjunto de medida 0. $\square$

Ejercicio 5.8. Sea I un intervalo de $\mathbb{R}^n$.

(a) Sea $E \subseteq I$ medible. Probar que para cada $\epsilon > 0$ existe $g : I \to \mathbb{R}$ continua tal que $|\{x \in I : g(x) \neq \chi_E(x)\}| < \epsilon$.

(b) Sea φ una función simple definida sobre I. Probar que para cada $\epsilon > 0$ existe $g : I \to \mathbb{R}$ continua tal que $|\{x \in I : g(x) \neq \varphi(x)\}| < \epsilon$.

(c) Sea $f : I \to \overline{\mathbb{R}}$ medible y finita en c.t.p. Probar que dados $\epsilon > 0$ y $\delta > 0$ existe φ simple tal que $|\{x \in I : |\varphi(x) - f(x)| \geq \epsilon\}| < \delta$.

(d) Sea f como en (c). Probar que dados $\epsilon > 0$ y $\delta > 0$ existe g continua tal que $|\{x \in I : |g(x) - f(x)| \geq \epsilon\}| < \delta$.

Demostración. Sea $E \subset I$ medible entonces existe F cerrado -y en este caso compacto- y V abierto tales que $F \subset E \subset G$ y tales que:

$$|E \setminus F|, |G \setminus E| < \frac{\varepsilon}{2}$$

De esta manera tenemos que $|G \setminus F| \leq |G \setminus E| + |E \setminus F| < \varepsilon$.

Podemos definir entonces $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$. Y considerar la *función de Uryshon* dada por:

$$g(x) = \frac{d(x, V^c)}{d(x, F) + d(x, V^c)}$$

Esta función es continua pues cada medida lo es. Vale 1 en E y vale 0 en V^c. Así, difiere de χ_E en $V \setminus F$ que tiene medida ε.

Para el inciso b sea $\phi = \sum_{i=1}^{n} a_i E_i$ podemos seguir el paso anterior y hacer una combinación lineal. Para cada $i \in [\![n]\!]$ existe g_i continua tal que $|\{g_i \neq \chi_{E_i}\}| < \frac{\epsilon}{n}$. Sea:

$$g(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i g_i(x)$$

Entonces:

$$|\{g \neq \phi\}| \leq |\bigcup_{i=1}^{n} \{g_i \neq \chi_{E_i}\}| \leq \sum_{i=1}^{n} |\{g_i \neq \chi_{E_i}\}| < \varepsilon$$

Para el inciso c, sea $f : I \to \overline{\mathbb{R}}$ finita en casi todas partes y $\varepsilon, \delta > 0$. Consideremos $(\phi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión monótona de funciones simples que convergen a f.

Por Egorov, como $|f| < \infty$ en casi todas partes y I es de medida finita -pues es un intervalo- existe C cerrado en I tal que $\phi_n \rightrightarrows f$ en C y además:

$$|I \setminus C| < \delta$$

Como $\phi_n \rightrightarrows f$ en C existe un N suficientemente grande tal que $|\phi_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$ y todo $x \in C$.

Luego:

$$\{x \in I : |\phi_N(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset I \setminus C$$

Y por endesu medida es menor a δ.

Si queremos ahora que la función por la que aproximamos sea continua, por c existe ϕ simple tal que:

$$|\{x \in I : |\phi(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| < \delta/2$$

Y existe por b g continua tal que:

$$|\{x \in I : g(x) \neq \phi(x)\}| < \delta/2$$

En este caso:

$$\{x \in I : |g(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x \in I : |f(x) - \phi(x)| \geq \varepsilon\} \cup \{x \in I : g(x) \neq \phi(x)\}$$

Si x no está en la derecha, entonces $|f(x) - \phi(x)| < \varepsilon$ y $\phi(x) = g(x)$ por ende $|f(x) - \phi(x)| = |f(x) - g(x)| < \varepsilon$. Luego:

$$
\begin{aligned}
&|\{x \in I : |g(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| \\
&\leq |\{x \in I : |f(x) - \phi(x)| \geq \varepsilon\}| + |\{x \in I : g(x) \neq \phi(x)\}| < \delta
\end{aligned}
$$

□

Ejercicio 5.9. Sea E medible y $(f_k)_{k\geq 1} : E \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones medibles tal que para todo $x \in E$ existe $M_x \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f_k(x)| \leq M_x \ \forall k \in \mathbb{N}$. Probar que si para todo $\alpha > 0$ existe $k_0 = k_0(\alpha) \in \mathbb{N}$ tal que

$$k \geq k_0 \Rightarrow |\{x \in E : |f_k(x)| < \alpha\}| \leq \alpha/k,$$

entonces $|E| = 0$.

Demostración. Sea E medible, y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : E \to \mathbb{R}$ medibles tales que cumple las condiciones del enunciado. Para cada n consideremos:

$$E_n = \{x \in E : |f_k(x)| < n, \quad \forall k \in \mathbb{N}\}$$

La condición de los M_x nos dice que esto cubre todo E, pues para cada x existe una cota M_x y para ella un natural más grande por arquimedaneidad. Así:

$$E = \bigcup_n E_n$$

Bastará ver entonces que los E_n tienen medida 0 para lograr nuestro objetivo. Sea n fijo y sea $\alpha = n$ entonces:

$$E_n = \{x \in E : |f_k(x)| < \alpha, \quad \forall k \in \mathbb{N}\}$$

En particular sabemos por hipótesis que existe un k_0 tal que para todo $k \geq k_0$ es:

$$|\{x \in E : |f_k(x)| < \alpha, \forall k \geq k_0\}| \leq \alpha/k_0$$

Este conjunto notemos que contiene a nuestro E_n, pues si $|f_k(x)| < \alpha$ para todo k en particular lo es para todo $k \geq k_0$.

Dado un $\varepsilon > 0$ podemos tomar k_0 tal que cumple la condición anterior y tal que $\alpha/k_0 < \varepsilon$. En ese caso E_n estará contenido en nuestro conjunto y más aún tendrá medida menor que ε.

Como lo anterior es sin importar el ε tenemos que E_n es de medida 0 y como es sin importar el n tenemos que E tiene medida 0.

Notar: Deberiamos haber usado medida exterior pues nunca probamos que los E_n son medibles. Como tienen medida exterior 0 esto es indistnto. □

Ejercicio 5.10. Sea E de medida finita y $(f_k)_{k\geq 1} : E \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones medibles tal que para todo $x \in E$ existe $M_x \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f_k(x)| \leq M_x$ $\forall k \in \mathbb{N}$. Probar que para todo $\epsilon > 0$ existen $F \subseteq E$ cerrado y $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tales que $|E \setminus F| < \epsilon$ y $|f_k(x)| \leq M$ $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in F$.

Demostración. Consideremos E de medida finita y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como en el enunciado. Sea además $\varepsilon > 0$, al igual que en el ejercicio anterior, la condición sobre los M_x nos dice que podemos considerar $E = \bigcup_n E_n$ con:

$$E_n = \{x \in E : |f_k(x)| < n, \forall k\}$$

Estos conjuntos están además encajados, es decir $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente.

En este caso los E_n son medibles pues si $A_{n,k} = f_k^{-1}([-n, n])$ entonces $E_n = \bigcap_k A_{n,k}$. Como las f_k son medibles por hipótesis cada $A_{n,k}$ es medible y por ende lo es el E_n.

Por continuidad de la medida -ahora que sabemos que los E_n son medibles- es:

$$\lim_{nto\infty} |E_n| = |E|$$

De este modo, existe n_0 tal que $|E \setminus E_{n_0}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Además para E_{n_0} existe F un cerrado tal que $F \subset E_{n_0}$ y $|E_{n_0} \setminus F| < \frac{\varepsilon}{2}$. Como este cerrado está contenido en E_{n_0} entonces para todo $x \in F$ y todo $k \in \mathbb{N}$ es:

$$|f_k(x)| \leq n_0$$

Tomando $M = n_0$ ya tenemos nuestra cota y además:

$$|E \setminus F| = |E \setminus E_{n_0}| + |E_{n_0} \setminus F| < \varepsilon$$

□

Ejercicio 5.11. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = n \cdot \chi_{[1/n,2/n]}(x)$. Probar que:

(a) $(f_n)_{n\geq 1}$ converge puntualmente.

(b) Para cada $\delta > 0$, $(f_n)_{n\geq 1}$ converge uniformemente en $[\delta, \infty)$.

(c) No existe $E \subset [0, \infty)$ tal que $|E| = 0$ y $(f_n)_{n\geq 1}$ converge uniformemente en E^c.

Demostración. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como en el enunciado y $x \in (0, \infty)$ tenemos que existe N tal que $\frac{2}{N} < x$. En este caso paratodo $n \geq N$ es $f_n(x) = 0$. Si ahora $x = 0$ tenemos que $f_n(x) = 0$ para todo n pues $\frac{1}{n} > x$ para todo n. Así, la sucesión converge puntualmente a la función 0.

Sea $\delta > 0$ entonces, al igual que antes, existe un N tal que $\frac{2}{N} < \delta$. Para todo $n \geq N$ la función $n \cdot \chi_{[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]} \equiv 0$ en $[\delta, +\infty)$. Luego $f_n \rightrightarrows 0$ en $[\delta, +\infty)$ para todo $\delta > 0$.

Sea $E \subset [0, \infty)$ de medida 0. Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en E^c. De converger, lo haría a la función 0.

Sea $\varepsilon = \frac{1}{2}$ existe n_0 tal que $|f_n(x)| < \frac{1}{2}$ para todo $x \in E^c$ y todo $n \geq n_0$.

Por otro lado es $f_n(x) \in [1, 2]$ si $x \in [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]$ para todo n y en particular para todo $n \geq n_0$. Luego como $|f_n(x)| < \frac{1}{2}$ para todo $n \geq n_0$ tenemos que $E^c \cap [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]$ debe ser vacía para todo $n \geq n_0$. Si no fuera el caso no tendriamos convergencia uniforme.

Luego $[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \subset E$. Por ende:

$$|[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]| = \frac{1}{n} \leq |E|$$

Así $|E| > 0$ lo cual es absurdo, pues supusimos que E era de medida nula. $\square$

Ejercicio 5.12. (a) Sea E de medida finita y sean $(f_n)_{n\geq 1}, f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ funciones medibles, finitas en casi todo punto de E y tales que $f_n \xrightarrow{n\to\infty} f$ a.e. en E. Probar que existe una sucesión $(E_i)_{i\geq 1}$ de conjuntos medibles de E tales que:

(i) $|E \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i| = 0$.

(ii) Para cada $i \geq 1$, $f_n \rightrightarrows f$ (converge uniformemente) en E_i.

(b) Probar que el mismo resultado vale si $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ donde cada A_k es de medida finita.

Demostración. Supongamos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de medida finita y f su límite puntual en casi todas partes. Como f_n son finitas en casi todas partes y existe su límite puntual en casi todas partes, necesariamente el valor de este límite es finito.

Luego f no solo es medible sino que además f es finita en casi todas partes.

Por el *Teorema de Egorov* dado $\delta > 0$ existe F cerrado tal que $|E \setminus F| < \delta$. Además $F \subset E$ y $f_n \rightrightarrows f$ en F y por ser cerrado F cerrado resultará medible.

Si consideramos $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de reales positivos tales que su límite es 0, entonces para cada n podemos elegir un E_n que cumla las consecencias de Egorov para ε_n. Luego, para cada n es $f_k \rightrightarrows f$ en E_n para cada n. Además la unión de los E_n es medible por ser un F_σ y:

$$|E \setminus \bigcup_n E_n| \leq |E \setminus E_n| < \varepsilon_n$$

Como esto es para cada n y $\varepsilon_n \to_{n\to\infty} 0$ tenemos que:

$$|E \setminus \bigcup_n E_n| = 0$$

Si ahora tenemos que E es unión numerable de conjuntos de medida finita, tenemos que para cada A_k existe $(E_{k,i})_{i\in\mathbb{N}}$ como en el punto anterior. Luego:

$$|E \setminus \bigcup_{k,i} E_{k,i}| \leq |\bigcup_k A_k \setminus \bigcup_k \bigcup_i E_{k,i}| = |\bigcup_k (A_k \setminus \bigcup_i E_{k,i})|$$

Ahora bien por monotonía de la medida:

$$|\bigcup_k (A_k \setminus \bigcup_i E_{k,i})| \leq \sum_k |A_k \setminus \bigcup_i E_{k,i}| = \sum_k 0 = 0$$

Y como usamos bien Egorov sobre cada $E_{k,i}$ tenemos que $f_n \rightrightarrows f$ sobre $E_{k,i}$. □

Ejercicio 5.13. Sean $(f_n)_{n\geq 1}$ y f funciones medibles definidas sobre un conjunto A y finitas en casi todo punto. Sea $(A_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de subconjuntos de A medibles, tales que $|A \setminus A_n| \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Probar que si $f_n\chi_{A_n} \xrightarrow{m} f$ (en medida), entonces $f_n \xrightarrow{m} f$.

Demostración. Supongamos que $f_n\chi_{A_n} \xrightarrow{m} f$, de manera que dados $\varepsilon, \eta > 0$ existe n_1 tal que:

$$|\{x \in A : |f_n\chi_{A_n}(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| < \frac{\eta}{2}$$

Para todo $n \geq n_2$. Luego existe n_2 tal que:

$$|A \setminus A_n| < \frac{\eta}{2}$$

para todo $n \geq n_2$. Tomando $n_0 \geq \text{máx}\{n_1, n_2\}$, tenemos que:

$$\begin{aligned}&\{x \in A : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset \\ &\{x \in A_n : |f_n\chi_{A_n}(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \cup \{x \in A \setminus A_n : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\end{aligned}$$

Para todo $n \geq n_0$. Por subaditividad de la medida es:

$$\begin{aligned}&|\{x \in A : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| \leq \\ &|\{x \in A_n : |f_n\chi_{A_n}(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| + |\{x \in A \setminus A_n : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}| \\ &< \eta\end{aligned}$$

Para todo $n \geq n_0$. Esto nos dice que $f_n \xrightarrow{m} f$ en A como se qería probar. □

Ejercicio 5.14 (Consultar)**.** Supongamos que $f_k \xrightarrow{m} f$ y $g_k \xrightarrow{m} g$ sobre E.

(a) Probar que $f_k + g_k \xrightarrow{m} f + g$ sobre E.

(b) Probar que si $|E| < +\infty$ entonces $f_k g_k \xrightarrow{m} fg$ sobre E. Mostrar que la hipótesis $|E| < +\infty$ no puede quitarse.

(c) Sea $(f_k/g_k)_{k\geq 1}$ una sucesión de funciones definidas en casi todo punto de E. Probar que si $|E| < +\infty$, $f_k \xrightarrow{m} f$, $g_k \xrightarrow{m} g$ sobre E y $g \neq 0$ a.e., entonces $f_k/g_k \xrightarrow{m} f/g$.

Demostración. Supongamos las condiciones del enunciado, sean $\eta, \varepsilon > 0$, existe un k_0 suficientemente grande tal que:

$$\{|f_k - f| \geq \varepsilon/2\}, \{|g_k - g| \geq \varepsilon/2\} < \frac{\eta}{2}$$

Por otro lado es:

$$\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\} \subset \{|f_k - f| \geq \varepsilon/2\} \cup \{|g_k - g| \geq \varepsilon/2\}$$

Luego es fácil ver por subaditividad que para todo $k \geq k_0$ es:

$$|\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\}| < \eta, \quad \forall k \geq k_0$$

Esto es que $f_k + g_k \xrightarrow{m} f + g$.

□

Ejercicio 5.15. Sea $f_1 : [0,1] \to [0,1]$ la función de Cantor-Lebesgue y $f : [0,1] \to [0,2]$ definida por $f(x) = f_1(x) + x$.

(a) Probar que f es continua y biyectiva y que f^{-1} es continua.

(b) Probar que si C es el Ternario de Cantor, $|f(C)| = 1$.

(c) Sea $g = f^{-1}$. Mostrar que existe A medible tal que $g^{-1}(A)$ es no medible.

(d) Mostrar que existe un conjunto medible que no es boreliano.

(e) Hallar $h_1 : [a,b] \to \mathbb{R}$ medible Borel y $h_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ medible tal que $h_2 \circ h_1$ no es medible.

Demostración. Sabemos que f_1 es continua y x es continua. Luego f es continua por suma de continuas.

Para ver que es biyectiva, tenemos que $f_1(x) + x$ es creciente y continua y $f_1(0) + 0 = 0$ y $f_1(1) + 1 = 2$. Luego f es continua, creciente y por teorema de valores intermedios debe alcanzar todo los valores en $[0,2]$. De este modo es sobreyectiva.

Ahora si $x < y$ entonces $f_1(x) \leq f_2(y)$ luego:

$$f_1(x) + x < f_2(y) + y$$

Esto alcanza para ver que f es inyectiva y por ende biyectiva. Por otro lado como f está definida sobre un compacto es automáticamente homeomorfismo y entonces $g = f^{-1}$ es continua.

Para ver que $|f(C)| = 1$ basta notar que $2 = |f[0,1]| = |f(C^c)| + |f(C)|$ por lo que si $f(C^c)$ mide 1 esto terminará la prueba.

Para ver que $f(C^c)$ mide 1, notemos que $C^c = \sum_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i)$ intervalos disjuntos -los que quitamos en cada paso- y estos son numerables pues cualquier colección de intervalos disjuntos de $\mathbb{R}$ lo es -pensar que podemos agarrar exactamente un racional distinto por intervalo de manera inyectiva-.

Luego, como la función en el complemento de Cantor es constante para cada para (a_i, b_i) existe c_i una constante tal que:

$$f((a_i, b_i)) = (a_i + c_i, b_i + c_i)$$

Pues $f(x) = c_i + x$ cuando $x \in (a_i, b_i)$. Luego:

$$|f(C^c)| = |\bigcup_i (a_i + c_i, b_i + c_i)|$$

Como además vimos que f es estrictamente creciente -cuando probamos que es inyectiva- tenemos que la imágen de estos intervalos es disjunta pues si suponemos que los numeramos de manera creciente tenemos que $b_i < a_{i+1}$ para todo $i \in \mathbb{N}$ y por ende $f(b_i) < f(a_{i+1})$. Esto nos dice que los intervalos de la imágen son disjunts y por σ-aditividad de la medida es:

$$|f(C^c)| = \sum_i |(a_i + c_i, b_i + c_i)| = \sum_i |(a_i, b_i)| = |C^c| = 1$$

Esto completa la prueba.

Tenemos que $|f(C)| = 1$, por ende contiene un conjunto de Vitali V. Si consideramos $A = f^{-1}(V)$ entonces A es medible pues está contenido en C que es de medida 0 pero $g^{-1}(A) = f(A) = ff^{-1}(V) = V$ es no medible pues es un conjunto de Vitali.

Para probar esto podemos considerar A el cual es medible pero no Borel, pues sino $f(A)$ sería Borel, es decir V, lo cual es absurdo.

Si tomamos ahor $h_1 = f^{-1}$ y $h_2 = \xi_A$, entonces f^{-1} es ontinua y por ende Bore medible y h_2 es una función simple y A medible entonces es medible.

Tenemos que $h_2 \circ h_1 = \xi_V$, que claramente no es medible pues $\{h_2 \circ h_1 > \frac{1}{2}\} = V$. $\square$

Ejercicio 5.16 (Consultar)**.** Probar que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es s.c.s. (resp. s.c.i., resp. continua) entonces f es medible Borel.

Ejercicio 5.17. Sean E un conjunto medible y $\{E_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{R}}$ una colección de subconjuntos medibles de E con las siguientes propiedades:

(i) $E_\lambda \subseteq E_\kappa$ para todo $\lambda \leq \kappa$.

(ii) $\bigcup_{\lambda\in\mathbb{R}} E_\lambda = E$ y $\bigcap_{\lambda\in\mathbb{R}} E_\lambda = \emptyset$.

(iii) $\bigcap_{\kappa>\lambda} E_\kappa = E_\lambda$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

Consideramos la función $f : E \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \text{ínf}\{\lambda \in \mathbb{R} : x \in E_\lambda\}$. Probar que f es medible y caracterizar los conjuntos $\{x \in E : f(x) \leq \lambda\}$.

Demostración. Notemes primero que f está bien definida pues como E es la unión de los E_λ para todo x existe λ tal que $x \in E_\lambda$ y por ende podemos tomar ínfimo. Además un mismo punto no puede estar en todos los E_λ pues la intersección de todos es vacía, de modo que este ínfimo es siempre un número real.

Para ver que f es medible queremos ver que $\{x \in E : f(x) \leq \delta\}$ es medible para cada δ real. El segundo inciso nos pide probar que:

$$\{x \in E : f(x) \leq \lambda\} = E_\lambda$$

Luego,como cada E_λ es medible basta probar esto último para probar lo primero.

Sea $x \in \{x \in E : f(x) \leq \lambda\}$ entonces $\text{ínf}\{\mu \in \mathbb{R} : x \in E_\mu\}$ debe ser menor o igual que λ pues si no fuera el caso $f(x) \geq \lambda$.

Sea s es ínfimo, entonces:

- Si $s \leq \lambda$, entonces existe $s \leq \mu < \lambda$ tal que $x \in E_\mu \subset E_\lambda$ y no hay nada más que probar.
- Si $s = \lambda$ entonces $f(x) = \lambda$ y por ende $x \in E_{\lambda+\varepsilon}$ para todo $\varepsilon > 0$. Por la propiedad (iii) tenemos que $x \in \bigcap_{\kappa>\lambda} E_\kappa = E_\lambda$.

Esto nos dice que $\{f \leq \lambda\} \subset E_\lambda$.

Sea ahora $x \in E_\lambda$ seguro que el ínfimo κ tal que $x \in E_\kappa$ es menor o igual que λ, pues este último es una cota superior para el conjunto de los κ. Por ende $f(x) \leq \lambda$. Así:

$$E_\lambda \subset \{f \leq \lambda\}$$

Luego ambos conjuntos son iguales y por ende f es medible. $\square$

6. Integral de Lebesgue