
Matemáticas Discretas, 922, clase 1, Agosto 29



Ejemplos de no proposiciones: 1). ¿Qué hora es? No es una proposición, es una pregunta.

2). Cierra la puerta. Es una orden.

3). ¡Hola! Es una exclamación.

4). Cocine pollo con papas. Es una orden.

5). Cociné pollo con papas. Sí es una proposición.

Ejemplos de proposiciones compuestas:

Def. Una proposición compuesta está conformada por dos o más proposiciones simples conectadas por conectores lógicos.

Conectores lógicos

Conectivo	Nombre	Símbolo
No	negación	$\sim$
y	Conjunción	$\wedge$
O	Disyunción	$\vee$
si... entonces	condicional	$\longrightarrow$
si y solo si	Bicondicional	$\longleftrightarrow$

Ej: p: El número natural 45 es impar y es divisible por 5.

las proposiciones simples que lo conforman son:

q: 45 es un número natural.

r: 45 es un número impar.

s: 45 es divisible por 5.

$p \overset{?}{:=} q \wedge r \wedge s$

" El 45 es un número natural y el 45 es un número impar y el 45 es divisible por 5 "

Ej: Dados: p: Me desperté temprano

q: Llegué tarde al trabajo

r: Me hicieron un llamado de atención.

traducir: $r \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$ al lenguaje natural.

" Me hicieron un llamado de atención si y solo si; llegué tarde al trabajo y no me desperté temprano ".
me desperté tarde.

La expresión " Si me desperté temprano y no llegué tarde al trabajo, entonces no me hicieron un llamado de atención " se simboliza:

$$(p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim r$$

Actividad 1

1. Determina cuáles de los siguientes enunciados representan una proposición y cuáles no. Justifica tus respuestas.

   a) ¿Cuál es tu nombre?
   b) La gallina no es un mamífero.
   c) ¡Buenas noches!
   d) Lave su carro.
   e) El perro es un ave.
   f) ¿Cuándo naciste?
   g) Estudie para el examen.
   h) Feliz día
   i) El 9 es un número compuesto.
   j) Argentina es un país de Suramérica
   k) Francia es de Norteamérica.
   l) Organicé mi cuarto.

2. Determina el valor de verdad de las proposiciones simples.

   a) Bogotá es la capital de Colombia.
   b) $1 + 1 = 2$.
   c) $10 + 5 = 20$.
   d) $21245 < 31001$
   e) La gallina no es un mamífero.
   f) El perro es un ave.
   g) El 9 es un número compuesto.
   h) Argentina es un país de Suramérica
   i) Francia es de Norteamérica.
   j) Simón Bolivar nació en 1883.
   k) La Tierra gira alrededor del Sol.
   l) Roma es la capital de Italia.

3. Traduzca cada proposición a lenguaje natural empleando las siguientes proposiciones simples:

   p: Pablo atiende en clase
   q: Pablo estudia en casa
   r: Pablo fracasa en los exámenes
   s: Pablo es felicitado por sus papás

a) $\sim p \vee q$	**b)** $p \wedge \sim q$	**c)** $\sim[(p \vee q) \rightarrow \sim r]$	**d)** $(\sim p \wedge \sim q) \leftrightarrow (r \wedge \sim s)$
e) $\sim (p \rightarrow \sim r)$	**f)** $\sim (\sim r \leftrightarrow \sim s)$	**g)** $p \leftrightarrow q$	**h)** $q \longrightarrow (\sim r \wedge s)$

4. Expresa de manera simbólica las proposiciones compuestas: determina las proposiciones simples y asígneles letras proposicionales.

a) Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy loca y dejaría que me internaran en un psiquiátrico.
b) No es cierto que, Pablo fue al banco y retiró todo el dinero.
c) No me gusta trasnochar ni madrugar.
d) Si no hay ruidos y no estás sordo, entonces debes oírme.
e) Iré al cine o al teatro, si me invitas.
f) Si aumenta el empleo, no habrá paros ni crecerá la inflación.
g) Si Pérez recibió el telegrama, entonces tomo el avión o prefirió ignorar nuestro pedido.
h) Si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia.
i) Si se presentan los síntomas ordinarios de un resfrío y el paciente tiene alta temperatura, entonces, tiene pequeñas manchas en la piel y está con sarampión.
j) No es cierto que: si llueve y me mojo, entonces, no me agripo ni me da fiebre.

Resumen importante:

Tablas de Verdad y algunos ejemplos.

Leyes del álgebra proposicional.

Leyes conmutativas: $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$.

$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$.

Leyes asociativas: $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$.

$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$.

Leyes distributivas: $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

Doble negación. $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$.

Ley del tercer excluido $p \vee \sim p \Leftrightarrow V$

Ley de contradicción $p \wedge \sim q \Leftrightarrow F$

Leyes de D'Morgan $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$.

Ley condicional disyunción: $(p \to q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$.

ley Bicondicional $(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$.

ley del contrarecíproco $(p \to q) \Leftrightarrow (\sim q \to \sim p)$.

Si llueve entonces hace frío $\Leftrightarrow$ si no hace frío entonces no llueve.

Reglas de inferencia:

Modus Ponendo Ponens.

$$\frac{p \to q \quad p}{q}$$

p	q	$p \to q$
V	F	F
F	F	V
F	V	V
V	V	V

Modus Tollendo Tollens:

$$\frac{p \to q \quad \sim p}{\sim q}$$

Modus Tollendo Ponens:

$$\frac{p \vee q \quad \sim q}{p}$$

Ejemplo de inferencias lógicas:

Dudus:

1). $p \to q$.
2). $r \to \sim q$. } premisas dudus simplificar.
3). r.

4). $\sim q$ de 3). en 2). y Modus Ponens.

5). $\sim q \to \sim p$. por contrarecíproco en 1).

6). $\sim p$ de 4) en 5). y Modus ponens.

7). $r \to \sim p$ de 3). y deducción con 6).

$$\theta = \sim [\sim (p \vee q) \to \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

Problema 4 del taller.

p: hoy llueve q: hace frío.

$$\sim [\sim (p \vee q) \to \sim p] \vee (p \wedge \sim q) = \sim [\sim (\sim (p \vee q)) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q)$$

Por condicional disyunción.

$$= \sim [(p \vee q) \vee \sim p] \vee (p \wedge \sim q).$$

Por doble negación.

$$= \sim [p \vee (q \vee \sim p)] \vee (p \wedge \sim q)$$

Por asociativa.

$$= \sim [(p \vee (\sim p \vee q)] \vee (p \wedge \sim q)$$

Por conmutativa.

$$= \sim [(p \vee \sim p) \vee q] \vee (p \wedge \sim q), \text{ Por asociativa}$$

$$= \sim [V \vee q] \vee (p \wedge \sim q)$$

$$= \sim [V] \vee (p \wedge \sim q).$$

$$= F \vee (p \wedge \sim q)$$

↑ disyunción.

$$= p \wedge \sim q.$$

Regla de Reducción al absurdo: Esta regla se usa para hacer demostraciones complicadas y consiste en agregar a nuestro razonamiento una nueva hipótesis que es la negación de lo que esperamos que sea verdadero y tratar de


encontrar una contradicción.

Algoritmo:

1). Introducir la negación de la conclusión.

2). De esta nueva premisa junto con las demás, deducir una contradicción.

3). Establecer la conclusión deseada como una inferencia lógica deducida de las premisas originales.



Problema 1. Demostrar $\sim P$ A partir:

1). $\sim q \vee r$ F

2). $p \rightarrow \sim r$.

3). q.

Dem.: Usando reducción al absurdo.

4). $\sim(\sim p) = p$. Premisa adicional para R.A.

5). $\sim r$ de 4). en 2). y Modus Ponens.

6). $\sim q$ de 5). en 1). y Modus Tollendo Ponens.

7) $q \wedge \sim q$ de 6). y 3). Contradicción.

Por lo tanto se prueba $\sim p$.

Problema 2. Demostrar $\sim D$ desde:

1). $D \rightarrow W$

2). $A \vee \sim W$. F

3). $\sim(D \wedge A)$.

Dem: Por reducción al absurdo.

4). $\sim(\sim D) = D$ premisa adicional RA.

5). W de 4). en 1). y Modus Ponens.

6). A de 5). en 2). y Modus Tollendo Ponens.

7). $\sim D \vee \underbrace{\sim A}$ de 3). y Leyes de D'Morgan.

8). $\sim D$ F de 6). en 7). y Modus Tollendo Ponens.

9). $D \wedge \sim D$ de 4) y 8). contradicción.

Por tanto, se prueba $\sim D$.

Problema 3. Demostrar p desde.

1). $p \vee q$
F

2). $p \wedge \sim q$
F

Dem: Por reducción al absurdo.

3). $\sim p$ premisa adicional de RA.

4). q de 3). en 1). y Modus Tollendo Ponens.

5). p de 4). en 2). y Modus Tollendo Ponens.

6). $p \wedge \sim q$ de 5). y 3). Contradicción.

Por RA se prueba p.

Métodos de Demostración

Método de Demostración directa: Sabemos que un demostración es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición.

$P \longrightarrow T.$

premisas o hipótesis — conclusión o tesis.

P ——— T.

Método directo.

Ejemplo: Demostrar por el método directo que la suma de dos números impares es par.

a, b números impares $\longrightarrow$ $a+b$ es par.

hipótesis — tesis.

Def 1. Un número $x \in \mathbb{Z}$ es par si existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x = 2t.$$

2. Un número $y \in \mathbb{Z}$ es impar si existe $w \in \mathbb{Z}$ tal que

$$y = 2w + 1.$$

Dem:

	Afirmación	Razón.
1).	a y b son números impares	1). hipótesis.
2).	$a = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$ $b = 2l+1$, $l \in \mathbb{Z}$	2). def de número impar.
3).	$a+b = (2k+1)+(2l+1)$ $= 2k+2l+2$ $= 2(\underbrace{k+l+1}_{w})$	3). Reemplazando 2). y propiedades de $\mathbb{Z}$.
4).	$w = k+l+1$, $w \in \mathbb{Z}$	4). Suma de enteros es entero.
5).	$a+b = 2w$, $w \in \mathbb{Z}$	5). de 4) en 3).
6).	$a+b$ es par	6). de 5). y def de par.

Subejemplo: tomemos $a = 5$ entonces $a = 2(\underset{k}{2}) + 1 = 5$.

$b = 11$ entonces $b = 2(\underset{l}{5}) + 1 = 11$.

$$5+11 = a+b = (2(2)+1) + (2(5)+1)$$

$$= (2(2) + 2(5) + 2)$$

$$= 2(\underbrace{2+5+1}_{w}) = 2(8) = 16.$$

Método de contrarecíproco: Se quiere demostrar $P \to T$ pero, obtenemos una equivalencia Tautológica $\sim T \longrightarrow \sim P$. Es decir, aplicamos el método directo a $\sim T \longrightarrow \sim P$.

Ejemplo: Demostrar por contrarecíproco que si a^2 es impar entonces a es impar.

P: a^2 es impar T: a es impar.

$$(P \longrightarrow T) \iff (\sim T \longrightarrow \sim P)$$

"si a es par entonces a^2 es par"

hip. tesis.

$(x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2$. propiedad de potencias.

Dem:

	Afirmación	Razón
1).	a es par.	1). por hipótesis.
2).	$a = 2K$, $K \in \mathbb{Z}$	2). def de número par.
3).	$a^2 = (2K)^2$ $= 2^2 K^2$ $= 2(2K^2)$	3). Usando 2) y propiedades de potencias.
4).	$W = 2K^2$, $W \in \mathbb{Z}$	4). multiplicación de enteros es entero.
5).	$a^2 = 2W$, $W \in \mathbb{Z}$	5). de 4) en 3)
6).	a^2 es par	6). por 5) y def de número par.

Problema: Demostrar $P \longrightarrow (\sim Q \longrightarrow R)$ por contrarecíproco. A partir:

1). $S \wedge (\sim P \vee M)$
2). $M \longrightarrow (Q \vee R)$ } hipótesis.

$Q \vee R$: F

contrarecíproco.

$$P \longrightarrow (\sim Q \to R) \iff \underbrace{\sim(\sim Q \to R)}_{\text{Nueva hipótesis}} \longrightarrow \underbrace{\sim P}_{\text{tesis}}$$

P	q	$P \to q$
V	V	V
F	F	V
F	V	V
V	F	F

Dem: Usando contrarecíproco.

3). $\sim(\sim Q \rightarrow R)$ ---------- Hipótesis del contrarecíproco.

4). $\sim(\sim(\sim Q) \vee R)$ ---------- por ley del condicional disyunción y doble negación.

$= \sim(\underbrace{Q \vee R}_{V})$

5). $\sim M$ ---------- Por regla Modus Tollendo Tolens en 4) y 2).

$\sim M$: V

6). $\sim P \vee M$ ---------- de 1). y simplificación "$\wedge$".

M: F

7). $\sim P$ ---------- de 5). y 6). con Modus Ponens.

y esto demuestra la validez de la afirmación ∎

Método de Inducción Matemática: Este método se usa cuando queremos establecer la veracidad de proposiciones que dependen de los números naturales.

Principio de Inducción Matemática: Supongamos que tenemos una afirmación $P(n)$ que se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.


$P(1), P(2), P(3), \ldots, P(k)$.

Paso base: Verificar que cuando $n=1$, $P(1)$ es verdadero.

Paso inductivo: Suponer que se cumple para $P(k)$.

Demostración de inducción: Demostrar que

$$\underbrace{P(k)}_{\text{hip}} \longrightarrow \underbrace{P(k+1)}_{\text{Tesis}}.$$



en este arreglo caben todos los conejos que quieras.

Ejemplo: Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dem: **Paso base:** $(n=1)$:

$$p(1): \quad 1 \overset{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \checkmark$$

Paso inductivo: Suponemos que $P(k)$ es verdadero $(n=k)$. es decir.

$$1+2+3+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2} \qquad (\star).$$

Demostración de inducción:

Quiero ver que

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Note que:

$$1+2+3+\cdots+k+k+1 = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{(k+1)}{1} \qquad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$


$$= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Lo que prueba la afirmación para $n = k+1$. Por principio de inducción matemática para todo $n \in \mathbb{N}$

$$1+2+3+\cdots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

En el caso de Gauss cuando $n=100$.



$$= 50(101) = \frac{100}{2}(101) = \frac{100(100+1)}{2}$$