

1. Sea X una variable aleatoria con densidad de probabilidad simétrica alrededor de cero. Muestre que X e $Y=X^2$ tienen correlación nula a pesar de no ser independientes.
2. La suma de dos distribuciones uniformes es una distribución triangular:
 - (a) Si X e Y son variables independientes con distribución uniforme en $[0,1]$, halle la distribución conjunta $g(U, V)$ de $U \equiv X + Y$ y $V \equiv X - Y$.
 - (b) Tomando la correspondiente distribución marginal, muestre que U es una variable aleatoria con distribución triangular:

$$f_U(t) = \begin{cases} t & 0 < t < 1 \\ 2 - t & 1 < t < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (c) Encuentre la distribución de V y determine si U y V son independientes.
 - (d) Calcule la varianza de U via $\int_0^2 (t-1)^2 f_U(t) dt$.
 - (e) Confirme que se obtiene el mismo resultado usando la propiedad $\text{Var}(a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_N X_N) = \sum_{i=1}^N a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$.
3. La suma de gaussianas es gaussiana:
 - (a) Probar que si X e Y son variables independientes con distribución normal de parámetros (μ_1, σ_1) y (μ_2, σ_2) , entonces $Z = X + Y$ es una gaussiana de parámetros $(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$.
 - (b) Ahora bien, si la suma de gaussianas es gaussiana, ¿cómo es que en el problema 9b de la guía 3 mostró que con la suma de dos gaussianas consigue aproximar una distribución de Cauchy, que claramente no es gaussiana?
 4. Muestre que el cociente $Z \equiv X/Y$ de dos variables independientes con distribución normal canónica tiene distribución de Cauchy, $f_Z(t) = 1/[\pi(1+t^2)]$.
 5. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional donde $\Omega_X = \{x_1, x_2\}$ e $\Omega_Y = \{y_1, y_2\}$, y considere la siguiente asignación de probabilidades: $P(x_1, y_1) = P(x_2, y_2) = p$ y $P(x_1, y_2) = P(x_2, y_1) = q$. Indique qué condiciones deben satisfacer p y q para que:
 - (a) P sea una medida de probabilidad.
 - (b) X e Y sean independientes.
 6. Sean X e Y dos variables independientes con distribución uniforme en $[0,1]$, a partir de las cuales se definen $U = \sqrt{-2a \ln X} \cos(2\pi Y)$ y $V = \sqrt{-2a \ln X} \sin(2\pi Y)$. Encuentre la distribución conjunta $g(U, V)$, identifique qué distribución es, indique el significado del parámetro a y determine si U y V son independientes. Nota: este mapeo de $X, Y \rightarrow U, V$ se llama transformación de Box-Muller.

7. La *Distribución Multinormal* es la generalización a n dimensiones de la normal (la gaussiana) y, al igual que ésta, juega un rol preponderante en probabilidades y estadística. Dadas n variables aleatorias correlacionadas $\{X_i\}$, con esperanza $E(X_i) = \mu_i$ y matriz de covarianza \mathbb{V} , ésto es $\text{Cov}(X_i, X_j) = V_{ij}$, se dice que su densidad de probabilidad conjunta $f(\underline{x})$ es multinormal si todas las distribuciones marginales $f(x_i)$ y todas las distribuciones condicionales unidimensionales $f(x_i | x_j, j \neq i)$ son gaussianas. La densidad de probabilidad conjunta $f(\underline{x})$ viene dada por

$$f(\underline{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\mathbb{V}|}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\underline{x} - \underline{\mu})^T \mathbb{V}^{-1} (\underline{x} - \underline{\mu}) \right]$$

donde \underline{x} y $\underline{\mu}$ son vectores columna de tamaño n , \underline{x}^T y $\underline{\mu}^T$ los respectivos vectores traspuestos (vectores fila) y \mathbb{V} es cuadrada (de $n \times n$), simétrica y definida positiva, con $|\mathbb{V}| \equiv \det(\mathbb{V})$.

- (a) Verifique que para $n = 1$, $f(\underline{x})$ es una gaussiana.
- (b) Considere m variables aleatorias \underline{y} , obtenidas como función lineal $\underline{y} = \mathbb{C}\underline{x}$ a partir de n variables \underline{x} con distribución conjunta multinormal, siendo \mathbb{C} de $m \times n$, con $m < n$. Muestre que \underline{y} tiene también distribución multinormal con covarianza $\mathbb{V}' = \mathbb{C}\mathbb{V}\mathbb{C}^T$.

- (c) Sea \mathbb{S} la matriz ortogonal que diagonaliza \mathbb{V} para n arbitrario. Muestre que la distribución de $\underline{z} = \mathbb{S}\underline{x}$ corresponde a n variables gaussianas independientes. A partir de esto encuentre la distribución de la variable aleatoria $Q = (\underline{x} - \underline{\mu})^T \mathbb{V}^{-1} (\underline{x} - \underline{\mu})$ que aparece en el exponente de la multinormal.

8. *Multinormal bivariada, elipses de covarianza.*

- (a) En el caso $n = 2$ la matriz de covarianza de una multinormal depende de 3 parámetros (¿por qué?). Elijamos σ_1 , σ_2 y el coeficiente de correlación ρ , esto es, $V_{11} = \sigma_1^2$, $V_{22} = \sigma_2^2$ y $V_{12} = \rho \sigma_1 \sigma_2$. Muestre entonces que

$$f(x_1, x_2) = \left(2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\right)^{-1} \exp\left(-\frac{Q}{2}\right)$$

con

$$Q = \frac{1}{1-\rho^2} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2 - 2\rho \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right) \right]$$

- (b) Compruebe que cuando $\rho = 0$, $f(x_1, x_2) = N(\mu_1, \sigma_1)N(\mu_2, \sigma_2)$. Esto es, para la multinormal, correlación nula implica que las variables son independientes.
- (c) Muestre que la distribución marginal $f(x_2)$ es la gaussiana $N(\mu_2, \sigma_2)$, independientemente del valor del nivel de correlación ρ .
- (d) Muestre que $f(x_2|x_1)$ es gaussiana, con $N(\mu_2 + \rho(\sigma_2/\sigma_1)(x_1 - \mu_1), \sigma_2\sqrt{1-\rho^2})$. Discuta cómo varía la esperanza de x_2 en función de x_1 según el signo de ρ , y analice cómo varía el ancho de la distribución condicional con el grado de correlación. Interprete estos resultados cortando con líneas $x_1 = \text{cte}$ las elipses dibujadas a mano alzada en el ítem anterior. ¿Qué ocurre en el caso límite $\rho = 1$?
- (e) Una manera de visualizar la forma de una multinormal con $n = 2$ es dibujar curvas de nivel de f en el plano x_1, x_2 . Considere las correspondientes a $Q = 1$, y muestre que son elipses centradas en (μ_1, μ_2) , denominadas *elipses de covarianza*. Para $\mu_1 = \mu_2 = 0$, verifique que éstas están contenidas en el rectángulo $(\pm\sigma_1, \pm\sigma_2)$, que son tangentes a dicho rectángulo en los puntos $(\sigma_1, \rho\sigma_2)$ y $(\rho\sigma_1, \sigma_2)$ y que su eje principal forma un ángulo ϕ con el eje x_1 dado por $\tan 2\phi = 2\rho\sigma_1\sigma_2/(\sigma_1^2 - \sigma_2^2)$.

9. Aplicando los resultados del ejercicio anterior para el caso de \underline{x} bidimensional,

- (a) Dibuje a mano alzada elipses de covarianza con distintos ρ para el caso $\sigma_1 = \sigma_2$. Discuta la diferencia entre tomar como error para X_1 el rango máximo cubierto por la elipse sobre el eje x_1 , o el segmento entre los puntos de intersección de la elipse con el eje x_1 .
- (b) ¿Por qué tiene más sentido considerar la elipse como rango de confianza, que el propio rectángulo $(\pm k\sigma_1, \pm k\sigma_2)$?
- (c) Considere las elipses de covarianza encerradas dentro del rectángulo $(\pm k\sigma_1, \pm k\sigma_2)$ alrededor de (μ_1, μ_2) . Muestre que la probabilidad conjunta de que (x_1, x_2) se encuentre dentro de una de estas elipses con $k=1$ es 39.3%, independientemente del valor de la correlación ρ (este resultado es el equivalente al 68.3% obtenido para el caso $n=1$).
(sugerencia: pensar en otro suceso que tenga la *misma* probabilidad que el suceso “ (x_1, x_2) se encuentra dentro de una de estas elipses” y que involucre a la variable aleatoria Q)
- (d) ¿Cuánto debería ser k para que la elipse corresponda a un nivel de confianza de 95%? Verifique que este resultado puede obtenerse también analíticamente (para el caso bidimensional), además de usando las tablas. [Rta: $k=2.448$]

Problemas computacionales

10. Para cada uno de los cuatro pares de datos de la tabla:

- (a) Calcular la media muestral de X y de Y ,
- (b) Calcular la varianza muestral de X y de Y ,
- (c) Calcular la correlación entre X e Y : $\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$;
- (d) Graficar cada par de puntos.

I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Nota: estos son cuatro conjuntos de datos que F.J. Anscombe generó para mostrar que hacer buenos gráficos de los datos son una parte esencial del análisis de regresión lineal. F. J, Anscombe, (1973). "Graphs in Statistical Analysis". Am Stat, Vol. 27, No. 1, 17-21

11. *Método de Monte Carlo*. Para generar números pseudoaleatorios con una distribución arbitraria $f(t)$, en un dominio $[a, b]$ en el que f está acotada (siendo f_m su valor máximo) se puede proceder de la siguiente manera:

- I. Se generan dos números al azar y y z con distribución uniforme en $[0, 1]$.
- II. A partir de y y z se determinan $u = a + (b - a)y$ y $v = f_m z$.
- III. Si $v \leq f(u)$, se incluye $x = u$ en la muestra de números generados, en otro caso se descarta.
- IV. Se repiten los pasos I-III hasta obtener la cantidad deseada de números aceptados.

Utilice este método para generar las condiciones iniciales de una simulación numérica que se realiza para estudiar el comportamiento de una esfera de fluido (inicialmente en reposo) con una densidad

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \left(\frac{r}{r_e}\right)^2} \quad (0 < r < r_e)$$

donde ρ_0 es la densidad central y r_e el radio de la esfera.

Para ello genere las posiciones iniciales en coordenadas esféricas (considere $r_e = 1$) \vec{r} de 10000 elementos de fluido con una distribución proporcional a la masa (i.e., la probabilidad de encontrar un elemento de fluido en un determinado dV alrededor de \vec{r} es proporcional a ρdV).

- (a) Escriba la densidad de probabilidad conjunta de r , θ y φ (las coordenadas esféricas usuales).
- (b) Calcule las distribuciones de probabilidad marginales de cada una de las coordenadas por separado. ¿Son estas independientes?
- (c) Genere 10000 valores al azar de cada variable, usando el método de Monte Carlo. Grafique los histogramas de las distintas variables, y superponga las distribuciones correspondientes.

Nota: este método propuesto por von Neumann se llama *acceptance-rejection* o también *rejection sampling*. Ver por ejemplo <http://pdg.lbl.gov/2014/reviews/rpp2014-rev-monte-carlo-techniques.pdf>.