

# ยาช่วยย่อย

อาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดท้องส่วนบน ท้องอืด จุกเสียด แน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว คลื่นไส้ เรอ อาเจียน บางคนอาจมีอาการแสบร้อนกลางอกหลังรับประทานอาหาร พบได้บ่อยในผู้ที่รับประทานอาหารแล้วนอนทันที หรือกินอาหารไม่เป็นเวลา น้ำย่อยจึงหลังไม่เหมาะสม และผู้ที่มีระบบย่อยอาหารผิดปกติ



## ยามาเจสโต-เอฟ (MAGESTO-F)

มาเจสโต-เอฟ (Magesto-F) เป็นชื่อทางการค้าของกลุ่มยาที่นำมารักษาอาการปวดท้อง ปวดเสียดท้องหลังรับประทานอาหารมากเกินไป รวมถึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดเนื่องจากอาหารไม่ย่อย



### 1. ตัวยาสำคัญ

- เอนไซม์มามายเลส
- เอนไซม์ไดเอสเทส
- น้ำมันอบเชย
- น้ำมันกานพลู
- น้ำมันเมล็ดยี่หระ
- น้ำมันขิง

### 2. ข้อบ่งใช้

เหมาะที่จะใช้รักษาอาการผิดปกติ อันเนื่องมาจากการย่อยอาหาร เช่น ท้องอืด ปวดท้อง จุกเสียด แน่นท้อง, อาหารไม่ย่อย เรอเหม็นเปรี้ยว รับประทานอาหารมากเกินไป ลดกรดในกระเพาะอาหาร



### 3. วิธีใช้

วันละ 3 เวลา หลังอาหาร

สำหรับผู้ใหญ่: ครั้งละ 2 - 4 เม็ด


สำหรับเด็ก: อายุ 12 ถึง 14 ปี ครั้งละ 1 - 3 เม็ด

อายุ 7 ถึง 11 ปี ครั้งละ 1 - 2 เม็ด

อายุ 4 ถึง 6 ปี ครั้งละ 1/2 - 1 เม็ด

**\*อายุต่ำกว่า 4 ปี ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการใช้ยานี้ที่รวมถึงขนาดยาที่แน่ชัดการใช้ยาในเด็กกลุ่มอายุนี้จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา**

**\*ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ**



### 4. อาการไม่พึงประสงค์

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยามาเจสโต-เอฟมักจะเกิดจากตัวยาที่เป็นส่วนประกอบ อาจก่อให้เกิดภาวะท้องผูกกับผู้ป่วยบางราย หรือผู้ป่วยบางคนอาจไม่ชอบรสชาติของยาที่รับประทาน



### 5. ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้กับผู้ที่มีแผลในกระเพาะหรือแผลส่วนประกอบในตัวยานี้
- ห้ามรับประทานยานี้เกินขนาดที่กำหนดตามเกณฑ์อายุ
- การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ยังไม่พบฐานข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ควรต้องขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
- ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยโรคต้อหิน (Narrow-angle glaucoma)
- ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ห้ามใช้ยาหมดอายุ

**\*ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ "ยา" ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน,ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน**



### 7. เหตุผลที่สนใจยานี้

ปกติเป็นคนชอบรับประทานอาหารแล้วนอนทันที กับกินอาหารไม่ตรงเวลา และมีพฤติกรรมกินที่ไม่ดี ทำให้มีปัญหาอาหารไม่ย่อยบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้แต่แค่กินๆไม่ได้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับตัวยานี้เลย แต่พอได้เรียนวิชานี้จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นประจำ จะได้ใช้ยาอย่างถูกวิธี

