

Questions de l'entretien IA et des QCM de compétences

Document de validation par des spécialistes – classé par poste · 8 octobre 2026

180

questions d'entretien
IA

48

compétences

961

questions de QCM

28

postes

Consignes aux relecteurs

Pour chaque question, cochez « **Validée** » ou « **À corriger** » et indiquez votre remarque (formulation, exactitude médicale, bonne réponse, distracteurs trop faciles ou ambigus, adaptation au contexte tunisien). Dans les QCM, la bonne réponse est signalée en **vert** ✓ ; les trois autres choix sont des distracteurs qui doivent être clairement faux. Une compétence partagée entre plusieurs métiers n'est détaillée qu'une seule fois (un renvoi est indiqué).

Point de vigilance : la position et la longueur de la bonne réponse ont été équilibrées (elle n'est ni toujours en A ni toujours la plus longue). Lors de vos corrections, veillez à conserver cet équilibre : une bonne réponse nettement plus détaillée que les autres aide le candidat à deviner.

1. Partie 1 – Entretien IA (communication), par famille de postes
2. Partie 2 – QCM de compétences : tronc commun puis familles de métiers
3. Annexe – Correspondance poste → questions

Nom du relecteur	Spécialité / fonction	Date et signature

Partie 1 – Entretien IA (communication)

Chaque entretien comporte 5 questions orales : 3 questions générales tirées au hasard et 2 questions propres au métier. La question est lue par une voix féminine puis le candidat répond à l'oral (2 minutes maximum), sans temps de préparation. L'IA évalue la clarté, la structure, l'empathie, le vocabulaire professionnel et l'adaptation à l'interlocuteur.

Questions générales tous les postes

1	Présentez-vous en quelques phrases et expliquez pourquoi vous avez choisi ce métier.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient anxieux refuse un soin. Que lui dites-vous pour le rassurer ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment annonceriez-vous un retard ou une mauvaise nouvelle à la famille d'un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Racontez une situation où vous avez dû gérer un désaccord avec un collègue. Comment l'avez-vous résolu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Comment transmettez-vous les informations importantes à l'équipe lors d'un changement de garde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un médecin vous donne une consigne qui vous semble incorrecte. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliqueriez-vous un traitement à une personne âgée qui entend mal et comprend difficilement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Décrivez une situation stressante vécue au travail et la façon dont vous avez communiqué pendant cette situation.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre un bon et un excellent soignant ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Racontez un moment de votre parcours dont vous êtes particulièrement fier ou fière.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment gérez-vous une situation où vous avez commis une erreur au travail ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un collègue est débordé et vous êtes vous-même très occupé. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment réagissez-vous lorsqu'un patient ou une famille vous parle de manière agressive ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment vous organisez-vous lorsque plusieurs patients ont besoin de vous en même temps ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Pourquoi souhaitez-vous travailler dans notre établissement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment expliquez-vous une information importante à un patient qui ne parle que l'arabe dialectal ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Un patient vous demande de garder un secret qui concerne sa santé. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment faites-vous pour rester bienveillant après une longue garde fatigante ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Décrivez une situation où vous avez dû vous adapter rapidement à un changement imprévu.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Quelles sont vos qualités et le point que vous cherchez à améliorer dans votre pratique ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins infirmiers

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) de bloc opératoire · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences · Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie · Panseur(se)

1	Expliquez à un patient, avec des mots simples, comment va se dérouler la pose de sa perfusion.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient se plaint que personne ne répond à sa sonnette. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rédigez-vous et présentez-vous une transmission ciblée à l'équipe de nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un patient vous demande pourquoi il doit prendre autant de médicaments. Que lui expliquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient diabétique refuse son injection d'insuline. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment annoncez-vous au médecin de garde l'aggravation de l'état d'un patient pendant la nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La famille d'un patient vous demande des informations sur son diagnostic. Que leur répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un patient âgé confus veut quitter le service en pleine nuit. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient les signes qui doivent l'alerter après sa sortie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment présentez-vous les soins de la journée à un patient qui vient d'arriver dans le service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Un patient se plaint d'une douleur que vous trouvez exagérée. Comment communiquez-vous avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Vous remarquez qu'un collègue n'a pas respecté le protocole d'hygiène. Comment lui en parlez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment expliquez-vous la préparation d'une intervention chirurgicale à un patient inquiet ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un enfant hospitalisé a peur de la prise de sang. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	Comment réagissez-vous lorsqu'un patient vous remercie ou vous offre un cadeau ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Aux urgences, une famille réclame d'être prise en charge avant les autres. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment accompagnez-vous un patient qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment éduquez-vous un patient à surveiller lui-même sa tension ou sa glycémie à domicile ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient refuse de rester allongé après son examen. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment travaillez-vous en équipe avec l'aide-soignante pendant une garde chargée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

1	Une future maman très inquiète vous demande si son accouchement va bien se passer. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliqueriez-vous les premiers gestes de l'allaitement à une jeune mère fatiguée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le conjoint s'énerve en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous à une patiente les signes qui doivent la faire venir à la maternité ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une femme enceinte refuse une échographie de contrôle. Comment abordez-vous ses réticences ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment annoncez-vous à un couple qu'une césarienne en urgence est nécessaire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une jeune mère pleure souvent depuis la naissance. Comment l'accompagnez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment expliquez-vous les différentes méthodes de soulagement de la douleur pendant le travail ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une patiente souhaite accoucher sans péridurale. Comment l'accompagnez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment donnez-vous les conseils de sortie à une maman qui rentre à domicile avec son bébé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Une famille insiste pour être nombreuse en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment expliquez-vous à une adolescente enceinte le suivi de sa grossesse ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13	Une maman ne parvient pas à allaiter et se sent coupable. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment présentez-vous les vaccins du nouveau-né aux parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment parlez-vous de contraception après l'accouchement avec une patiente ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Une patiente présente des signes de prééclampsie. Comment l'informez-vous sans l'affoler ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment transmettez-vous les informations sur une naissance difficile à l'équipe de suites de couches ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une patiente vous confie des violences de la part de son conjoint. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment accompagnez-vous des parents dont le bébé doit être transféré en néonatalogie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment expliquez-vous à un couple l'importance du peau-à-peau après la naissance ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

1	Un patient a peur de l'anesthésie générale. Comment le rassurez-vous avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment communiquez-vous avec le médecin anesthésiste lors d'une complication au bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Expliquez au patient ce qu'il va ressentir au réveil de l'anesthésie.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous à un patient pourquoi il doit être à jeun avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient vous dit qu'il a mangé ce matin alors qu'il est au bloc. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment présentez-vous la rachianesthésie à un patient qui a peur de la piqûre dans le dos ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment rassurez-vous un enfant et ses parents avant une anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment réalisez-vous la check-list de sécurité avec l'équipe du bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Un chirurgien vous presse de commencer alors qu'une vérification n'est pas faite. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment transmettez-vous les informations sur un patient à l'équipe de la salle de réveil ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Un patient se réveille agité et désorienté. Comment lui parlez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment expliquez-vous l'utilisation de la pompe à morphine à un patient opéré ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment signalez-vous un incident survenu pendant l'anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient vous demande s'il risque de se réveiller pendant l'opération. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment communiquez-vous avec un patient sourd ou malentendant avant l'induction ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment réagissez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec le choix d'un médecin anesthésiste ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	En réanimation, comment informez-vous la famille sur l'état d'un patient intubé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment accueillez-vous un patient qui arrive au bloc en urgence et très angoissé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment formez-vous un nouveau collègue à la préparation du poste d'anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Un patient âgé ne comprend pas bien les consignes de la salle de réveil. Comment vous adaptez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie) · Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale · Technicien(ne) de laboratoire PMA · Préparateur(trice) en pharmacie · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation · Agent(e) de stérilisation

1	Un patient demande le résultat de son examen avant que le médecin ne l'ait vu. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous la préparation nécessaire avant un examen à un patient qui ne parle pas bien français ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Vous constatez une erreur d'étiquetage sur un prélèvement. Comment le signalez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous le déroulement d'une IRM à un patient claustrophobe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient refuse de retirer ses bijoux avant l'examen. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment présentez-vous les risques d'une injection de produit de contraste au patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un patient se plaint du temps d'attente au laboratoire. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8	Comment informez-vous un médecin d'un résultat d'analyse très anormal ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient la façon de recueillir correctement ses urines ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une mère inquiète accompagne son enfant pour une radiographie. Comment la rassurez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment réagissez-vous si un collègue ne respecte pas les règles de radioprotection ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient pense que la radiographie est dangereuse et refuse l'examen. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment expliquez-vous la préparation de la stérilisation à un nouvel agent de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Au bloc, un chirurgien vous reproche qu'un instrument manque dans la boîte. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment donnez-vous les consignes de prise d'un médicament à un patient au comptoir de la pharmacie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un patient demande si son médicament générique est aussi efficace. Que lui expliquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment informez-vous un couple sur le déroulement d'une ponction ovocytaire ou d'un transfert d'embryon ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment signalez-vous une panne d'appareil qui retarde les examens de la journée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient vous demande de lui interpréter ses résultats. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment travaillez-vous avec les services de soins pour éviter les prélèvements non conformes ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Rééducation et nutrition

Postes concernés : Kinésithérapeute · Diététicien(ne) / Nutritionniste

1	Un patient découragé ne veut plus faire ses exercices de rééducation. Comment le motivez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous les objectifs d'une séance à un enfant et à ses parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rendez-vous compte de l'évolution d'un patient au médecin prescripteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous l'intérêt des exercices à faire à domicile entre les séances ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient âgé a peur de tomber et refuse de marcher. Comment l'encouragez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

6	Comment adaptez-vous vos explications pour un patient qui a des troubles de la mémoire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un patient vous demande quand il pourra reprendre le sport. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment fixez-vous des objectifs réalistes avec un patient très ambitieux ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient diabétique les changements à apporter à son alimentation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient ne suit pas les conseils nutritionnels que vous lui avez donnés. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment présentez-vous un régime alimentaire à une famille qui cuisine pour le patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient a mal pendant la séance. Comment communiquez-vous avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment travaillez-vous avec l'équipe soignante pour la mobilisation d'un patient hospitalisé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment expliquez-vous les techniques de respiration à un patient essoufflé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Un patient se compare à un autre qui progresse plus vite. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment annoncez-vous à un patient que ses progrès seront plus lents que prévu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment expliquez-vous à un enfant pourquoi il doit porter son attelle ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Un patient arrive systématiquement en retard à ses séances. Comment abordez-vous le sujet ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment rendez-vous la séance motivante pour un patient déprimé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment présentez-vous votre bilan de fin de prise en charge au patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide-soignant(e) et auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

1	Une personne âgée refuse sa toilette ce matin. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment signalez-vous à l'infirmière un changement inquiétant chez un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un patient vous confie qu'il se sent seul. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Comment aidez-vous un patient à manger sans lui faire perdre son autonomie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient vous demande de l'aider à se lever alors que le médecin a prescrit le repos au lit. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment réagissez-vous si un patient vous fait des remarques déplacées pendant un soin ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment préservez-vous la pudeur d'un patient pendant sa toilette ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La famille d'un patient se plaint que son proche n'a pas été changé. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment accompagnez-vous un patient en fin de vie et sa famille ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient refuse de boire alors qu'il fait très chaud. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment expliquez-vous à un patient la nécessité de changer de position régulièrement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un enfant hospitalisé pleure et réclame ses parents. Comment le reconfortez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment travaillez-vous avec l'infirmière pour organiser les soins du matin ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient tombe dans sa chambre. Que faites-vous et comment l'expliquez-vous à l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment accueillez-vous un nouveau patient qui arrive dans le service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un patient âgé ne vous reconnaît pas et devient agité. Comment le calmez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment réagissez-vous lorsqu'un collègue manque de respect envers un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment expliquez-vous à une maman les gestes de soin de son nouveau-né ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient vous confie qu'il a peur de mourir. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment transmettez-vous vos observations de la journée à l'équipe suivante ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Encadrement (surveillant·e·s)

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit · Surveillant(e) de bloc opératoire · Surveillant(e) de radiologie

1	Un membre de votre équipe arrive régulièrement en retard. Comment abordez-vous la situation avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--	--

2	Comment annoncez-vous à votre équipe un changement d'organisation qui ne plaît pas à tout le monde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une famille se plaint de la qualité des soins dans le service. Comment la recevez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment accueillez-vous et intégrez-vous un nouveau soignant dans votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Deux membres de votre équipe sont en conflit. Comment intervenez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment organisez-vous le planning lorsqu'un soignant est absent au dernier moment ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un soignant commet une erreur de médicament. Comment réagissez-vous avec lui et avec l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment présentez-vous un nouveau protocole à une équipe réticente au changement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment repérez-vous et accompagnez-vous un soignant qui montre des signes d'épuisement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment menez-vous l'entretien annuel d'évaluation d'un membre de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La direction vous demande de réduire les heures supplémentaires. Comment l'annoncez-vous à l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment valorisez-vous le travail de votre équipe auprès de la direction ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un médecin se plaint régulièrement de votre équipe. Comment gérez-vous cette relation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment organisez-vous la continuité des soins pendant la nuit dans plusieurs services ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment animez-vous une réunion de service pour qu'elle soit utile et courte ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment réagissez-vous lorsqu'un événement indésirable grave survient dans votre service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un soignant expérimenté refuse d'encadrer les stagiaires. Comment abordez-vous la question ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment gérez-vous une plainte écrite d'un patient contre un soignant de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment préparez-vous votre service à une visite de certification ou à un audit qualité ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment répartissez-vous les patients entre les soignants lors d'une journée très chargée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e) · Ambulancier(ère)

1	Un patient attend depuis longtemps et s'énerve à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous à un patient les documents à fournir pour son dossier ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un appel urgent arrive pendant que vous renseignez une famille. Comment gérez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment accueillez-vous un patient qui arrive pour la première fois dans l'établissement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient demande à voir le médecin immédiatement sans rendez-vous. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment répondez-vous au téléphone lorsqu'un appelant demande des informations sur un patient hospitalisé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliquez-vous à un patient les tarifs et les modalités de paiement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un patient ne comprend pas pourquoi sa prise en charge par l'assurance est refusée. Comment l'aidez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment gérez-vous un agenda de rendez-vous lorsque le médecin a un empêchement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une personne âgée ne retrouve pas son rendez-vous. Comment l'aidez-vous avec patience ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment réagissez-vous si un patient vous demande de modifier une date sur un document ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Au cabinet dentaire, un enfant a peur et refuse d'entrer. Comment aidez-vous les parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Pendant un transport sanitaire, comment rassurez-vous un patient angoissé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	En ambulance, comment transmettez-vous les informations sur le patient à l'équipe des urgences ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Une famille veut monter dans l'ambulance alors qu'il n'y a pas de place. Que leur dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment présentez-vous l'établissement et ses services à un visiteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un patient mécontent publie un avis négatif et vient en parler à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment protégez-vous la confidentialité des patients dans une salle d'attente pleine ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Comment travaillez-vous avec les soignants pour réduire le temps d'attente des patients ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient arrive très en retard à son rendez-vous. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Partie 2 – QCM de compétences

Chaque QCM tire au hasard 5 compétences (celles du métier et du tronc commun) et 3 questions par compétence, soit 15 questions de 30 secondes. Une compétence est validée avec 3 bonnes réponses sur 3. Sur le site, l'ordre des 4 choix est tiré au hasard à chaque QCM : la bonne réponse n'est jamais à une place fixe. Dans ce document, les choix sont également mélangés et la **bonne réponse** est indiquée en vert ✓.

Tronc commun tous les postes

Hygiène et prévention des infections 20 questions

- | | | |
|----------|--|---|
| 1 | Quelle est la mesure la plus efficace pour prévenir les infections associées aux soins ?
A. Le changement quotidien de blouse
B. L'hygiène des mains ✓ bonne réponse
C. Le port permanent de gants
D. L'antibiothérapie préventive systématique | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 2 | Combien de temps dure une friction hydro-alcoolique des mains correctement réalisée ?
A. Environ 2 minutes, avant chaque soin
B. 5 minutes au moins, avec une brosse
C. Environ 20 à 30 secondes ✓ bonne réponse
D. Environ 5 secondes, juste le temps de mouiller les paumes et les doigts | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 3 | Dans quel cas la friction hydro-alcoolique ne suffit pas et un lavage des mains au savon est nécessaire ?
A. Avant tout contact avec un patient
B. Avant une injection intramusculaire
C. Mains visiblement sales ou patient porteur de Clostridioides difficile ✓ bonne réponse
D. Après avoir retiré des gants propres utilisés pour un soin sans contact avec du sang | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 4 | Après utilisation, une aiguille doit être :
A. Recapuchonnée soigneusement à deux mains pour éviter toute piqûre, puis jetée à la fin du soin
B. Jetée immédiatement, sans la recapuchonner, dans un collecteur pour objets piquants-coupants ✓ bonne réponse
C. Posée sur le plateau jusqu'à la fin du soin
D. Jetée dans le sac à déchets ménagers | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 5 | Que faire en premier après une piqûre accidentelle avec une aiguille souillée ?
A. Ne pas faire saigner, nettoyer à l'eau et au savon, rincer puis désinfecter (au moins 5 minutes), puis déclarer l'accident ✓ bonne réponse
B. Appliquer de l'alcool à 70° pendant 5 secondes et reprendre le travail
C. Attendre la fin de la garde pour consulter
D. Faire saigner fortement la plaie en pressant autour pendant plusieurs minutes, puis désinfecter et déclarer | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |

6 Les précautions « standard » s'appliquent : A. Uniquement au bloc opératoire B. Uniquement en réanimation, aux urgences et dans les services infectieux C. Uniquement aux patients dont le statut infectieux est connu et documenté dans le dossier D. À tous les patients, quel que soit leur statut infectieux ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Quelle tenue est recommandée pour les mains d'un soignant ? A. Faux ongles autorisés s'ils sont courts B. Ongles courts, sans vernis ni bijoux aux mains et aux poignets ✓ bonne réponse C. Montre autorisée si elle est propre D. Alliance et bracelet tolérés en permanence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les gants à usage unique doivent être : A. Portés en permanence dans le couloir B. Lavés à la solution hydro-alcoolique entre deux patients C. Gardés pour toute la tournée D. Changés entre deux patients et entre deux soins chez le même patient si nécessaire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Dans quelle poubelle jette-t-on des compresses souillées de sang ? A. Le collecteur à verre B. Les ordures ménagères, dans un sac fermé, si la quantité de sang est faible C. Le circuit des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) ✓ bonne réponse D. Le tri sélectif du papier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les précautions « contact » (patient porteur de bactérie multirésistante) comprennent notamment : A. L'interdiction de toute visite B. Hygiène des mains renforcée et tablier ou surblouse pour les soins rapprochés ✓ bonne réponse C. Aucune mesure particulière D. Le port d'un masque FFP2 par le soignant et par le patient pendant toute la durée de l'hospitalisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Les précautions « gouttelettes » (grippe par exemple) imposent surtout : A. Le port d'un masque chirurgical par le soignant à proximité du patient ✓ bonne réponse B. Un tablier plombé et des lunettes, pour se protéger des rayonnements du patient C. Des gants stériles et une surblouse imperméable pour tout contact avec le patient D. Le port de bottes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 La tuberculose pulmonaire contagieuse relève des précautions : A. « Air », avec un masque FFP2 pour le soignant et une chambre porte fermée ✓ bonne réponse B. Aucune, elle n'est pas transmissible C. Standard seulement D. « Contact » uniquement, avec gants et surblouse, la porte de la chambre pouvant rester ouverte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Avant d'entrer dans la chambre d'un patient en précautions complémentaires, il faut : A. Attendre que le patient sorte B. Lire la signalétique et appliquer les mesures indiquées ✓ bonne réponse C. Porter systématiquement une tenue stérile D. Demander au patient quelles mesures appliquer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les surfaces proches du patient (barrières de lit, adaptable) doivent être : A. Nettoyées et désinfectées régulièrement selon le protocole ✓ bonne réponse B. Désinfectées uniquement à la sortie du patient, lors du bionettoyage complet de la chambre C. Nettoyées une fois par mois D. Laissées en l'état pour ne pas déranger	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le masque chirurgical est efficace pendant environ : A. Environ 4 heures, moins s'il est humide ou souillé ✓ bonne réponse B. Une semaine C. Il n'a pas de durée limite D. Toute la garde de 12 ou 24 heures, à condition de ne pas le toucher avec les mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un soignant qui a de la fièvre et une toux doit : A. Retirer son masque pour mieux respirer B. Prendre un antibiotique de lui-même et continuer à travailler sans masque si la fièvre baisse C. Le signaler et suivre la procédure de l'établissement ✓ bonne réponse D. Venir travailler sans rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 L'antiseptique doit être appliqué : A. Puis essuyé immédiatement B. Mélangé à un autre antiseptique pour plus d'efficacité C. Sur une peau propre, en respectant le temps de séchage ✓ bonne réponse D. Sur une peau souillée, sans nettoyage préalable	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le collecteur à objets piquants-coupants doit être fermé : A. Lorsqu'il atteint la limite de remplissage indiquée ✓ bonne réponse B. Jamais C. Uniquement lorsqu'il est complètement plein, pour éviter de gaspiller des collecteurs D. Chaque heure, même vide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 La vaccination recommandée en priorité pour les soignants exposés au sang est celle contre :

- A. La rage
- B. L'hépatite B ✓ bonne réponse
- C. Le choléra
- D. La fièvre jaune

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Quel est le rôle principal de la tenue professionnelle (blouse, pyjama) ?

- A. Protéger le patient et le soignant ; elle ne se porte pas en dehors de l'établissement ✓ bonne réponse
- B. Être portée aussi dans les transports en commun
- C. Être lavée par le soignant à domicile une fois par semaine pour faire des économies
- D. Remplacer l'hygiène des mains et le port de gants lors des soins

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Gestes d'urgence 20 questions

1 Face à un adulte inconscient qui ne respire pas normalement, quel est le rythme des compressions thoraciques ?

- A. 150 à 180 compressions par minute
- B. 60 compressions par minute
- C. 100 à 120 compressions par minute ✓ bonne réponse
- D. 30 compressions par minute

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Chez l'adulte, quel est le rapport compressions / insufflations lors de la réanimation cardio-pulmonaire ?

- A. 15 pour 2
- B. 5 pour 1
- C. 10 pour 1
- D. 30 compressions pour 2 insufflations ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quelle est la profondeur recommandée des compressions thoraciques chez l'adulte ?

- A. Environ 5 cm (sans dépasser 6 cm) ✓ bonne réponse
- B. Environ 1 à 2 cm, pour ne pas fracturer de côtes
- C. Environ 8 à 10 cm, avec un relâchement partiel
- D. Aussi profond que possible, au moins 8 cm, pour être sûr que le cœur soit comprimé

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une victime inconsciente qui respire normalement doit être placée :

- A. Sur le ventre
- B. Sur le dos, jambes surélevées, sans surveillance
- C. En position latérale de sécurité ✓ bonne réponse
- D. Assise

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Face à une hémorragie externe importante, le premier geste est :

- A. La surélévation du membre uniquement
- B. La compression directe de la plaie ✓ bonne réponse
- C. La pose immédiate d'un garrot sur toute plaie
- D. L'application de glace

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Un adulte conscient s'étouffe et ne peut plus parler ni tousser. Que faire en premier ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le faire boire de l'eau par petites gorgées, puis attendre qu'il reprenne son souffle B. L'allonger sur le dos et commencer immédiatement le bouche-à-bouche pour lui apporter de l'air C. 5 claques dans le dos, puis 5 compressions abdominales si besoin ✓ bonne réponse D. Le coucher sur le dos et attendre	
7	Quel est le numéro de la Protection civile en Tunisie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 197 B. 190 C. 198 ✓ bonne réponse D. 193	
8	Dans la chaîne de survie, que faire dès qu'on constate un arrêt cardiaque ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Mettre la victime en position assise B. Alerter, commencer le massage cardiaque et faire chercher un défibrillateur ✓ bonne réponse C. Rechercher le pouls pendant au moins une minute et attendre l'arrivée du médecin avant tout geste D. Donner à boire à la victime	
9	Le défibrillateur automatisé externe (DAE) :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Remplace le massage cardiaque B. Peut être utilisé par toute personne, en suivant les instructions vocales ✓ bonne réponse C. Est réservé aux médecins et aux infirmiers formés, car il nécessite d'interpréter l'électrocardiogramme D. Ne doit jamais être utilisé sur une personne inconsciente	
10	Pendant l'analyse du rythme par le défibrillateur, il faut :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Continuer le massage pour ne pas interrompre la circulation sanguine pendant l'analyse B. Ne pas toucher la victime ✓ bonne réponse C. Retirer les électrodes pour vérifier le pouls D. Ventiler la victime	
11	Où place-t-on les mains pour le massage cardiaque chez l'adulte ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Sur le cou B. Sur le ventre C. Au milieu du thorax, sur la moitié inférieure du sternum ✓ bonne réponse D. Sur le côté gauche de la poitrine	
12	Pour libérer les voies aériennes d'une victime inconsciente, on :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Penche la tête en avant B. Fait boire la victime pour vérifier qu'elle respire bien C. Glisse un oreiller sous la tête et la penche en avant pour dégager la langue D. Bascule prudemment la tête en arrière et élève le menton ✓ bonne réponse	

13 Signes évocateurs d'un accident vasculaire cérébral : A. Fièvre élevée et maux de tête apparus progressivement depuis plusieurs jours B. Démangeaisons des jambes C. Déformation de la bouche, faiblesse d'un bras, trouble de la parole ✓ bonne réponse D. Toux grasse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Devant des signes d'AVC, la conduite à tenir est : A. Faire marcher la personne B. Attendre le lendemain C. Alerter immédiatement les secours en notant l'heure de début des signes ✓ bonne réponse D. Donner un comprimé d'aspirine pour fluidifier le sang, puis attendre l'évolution des signes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une douleur thoracique serrant la poitrine et irradiant dans le bras gauche doit faire évoquer : A. Une entorse B. Un infarctus du myocarde ✓ bonne réponse C. Une indigestion banale sans gravité D. Une crise d'angoisse uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Choc anaphylactique : quel médicament est le traitement d'urgence de référence ? A. Un corticoïde par voie orale, puis une surveillance simple pendant une heure B. L'adrénaline (selon prescription / protocole) ✓ bonne réponse C. Le paracétamol injectable à fortes doses D. L'insuline rapide par voie sous-cutanée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une victime de brûlure thermique étendue récente : premier geste ? A. Percer les cloques B. Mettre de la glace directement sur la peau pour refroidir plus vite, puis couvrir d'un linge C. Refroidir à l'eau tempérée (environ 15 à 25 °C) pendant une vingtaine de minutes, puis alerter ✓ bonne réponse D. Appliquer du beurre ou de l'huile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une personne fait une crise convulsive. Il faut : A. Lui donner à boire pendant la crise B. Écarter les objets dangereux, ne pas la maintenir de force, puis la mettre en PLS ✓ bonne réponse C. La maintenir fermement au sol et lui tenir la tête pour éviter qu'elle ne se blesse pendant la crise D. Lui mettre une cuillère dans la bouche et la maintenir fermement au sol	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Hypoglycémie chez une personne inconsciente : que ne faut-il PAS faire ?

- A. Surveiller sa respiration
- B. La mettre en position latérale de sécurité
- C. Alerter les secours
- D. Lui donner du sucre par la bouche ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Pour un nourrisson en arrêt cardiaque, les compressions thoraciques se font :

- A. Avec deux doigts (ou les deux pouces) sur le sternum ✓ bonne réponse
- B. Avec le poing
- C. Avec les deux mains superposées comme chez l'adulte
- D. Sur le ventre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Sécurité du patient 20 questions

1 Avant tout soin ou administration d'un traitement, l'identité du patient se vérifie :

- A. En lui demandant simplement « Vous êtes bien M. X ? » et en vérifiant le numéro de chambre
- B. En lui demandant de décliner ses nom, prénom et date de naissance et en contrôlant le bracelet ✓ bonne réponse
- C. En lisant le numéro de la chambre
- D. En se fiant au lit occupé

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La règle des « 5 B » de l'administration médicamenteuse vise à donner :

- A. Le bon médicament au bon service
- B. Le bon traitement donné uniquement le matin, au moment de la tournée médicale
- C. Le bon médicament, au bon moment, dans le bon service, avec la bonne ordonnance et le bon prix
- D. Bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment, bon patient ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quelle mesure réduit le risque de chute d'un patient hospitalisé ?

- A. Contention systématique de tous les patients âgés
- B. Lit en position basse, sonnette et objets usuels à portée de main ✓ bonne réponse
- C. Éclairage éteint la nuit dans toute la chambre
- D. Barrières de lit relevées pour tous les patients et contention la nuit pour les personnes âgées

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Vous découvrez une erreur d'administration d'un médicament. Que faites-vous ?

- A. Ne rien dire si le patient va bien
- B. Attendre la visite du lendemain pour en parler
- C. Corriger le dossier sans informer personne
- D. Surveiller le patient, prévenir le médecin et déclarer l'événement ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5	Lors d'une transmission orale d'une prescription urgente, la bonne pratique est : A. Attendre la fin de la garde pour la noter B. La répéter à voix haute pour confirmation, puis la faire tracer par écrit ✓ bonne réponse C. La mémoriser sans la répéter D. La noter sur un papier libre et l'administrer, la traçabilité pouvant être faite le lendemain	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le bracelet d'identification d'un patient hospitalisé doit être posé : A. À la demande du patient B. Dès l'admission et vérifié avant chaque acte ✓ bonne réponse C. Uniquement avant un passage au bloc D. Uniquement si le patient est confus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Que signifie le mot « identitovigilance » ? A. La surveillance et la prévention des erreurs d'identification des patients ✓ bonne réponse B. La vérification des badges du personnel C. Le contrôle des visiteurs D. La sécurité informatique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Deux patients ont le même nom dans le service. Que faire ? A. Les mettre dans la même chambre pour faciliter la surveillance par une seule équipe B. Ne rien faire de particulier C. Signaler le risque (alerte homonymie) et renforcer les vérifications d'identité ✓ bonne réponse D. Les identifier uniquement par leur numéro de chambre pour éviter toute confusion de nom	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Avant une transfusion sanguine, le contrôle ultime au lit du patient vérifie : A. Rien de plus : le laboratoire et l'établissement de transfusion ont déjà fait tous les contrôles B. Uniquement la date de péremption C. Uniquement le groupe du soignant D. L'identité du patient, la concordance avec la poche et la compatibilité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les médicaments « à haut risque » (insuline, potassium injectable, anticoagulants...) nécessitent : A. Une vigilance renforcée et un double contrôle selon le protocole ✓ bonne réponse B. Une préparation par le patient lui-même C. Un stockage avec les autres médicaments sans distinction D. Aucune précaution particulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Une prescription médicale illisible doit être : A. Clarifiée avec le prescripteur avant toute administration ✓ bonne réponse B. Interprétée au mieux C. Lue par un collègue qui devine D. Ignorée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Quel facteur augmente le risque de chute d'un patient âgé ? A. La prise de somnifères ou de sédatifs ✓ bonne réponse B. Une sonnette à portée de main C. Un éclairage suffisant la nuit dans la chambre D. Des chaussures fermées et adaptées associées à un lit en position basse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient tombe de son lit. Que faire en premier ? A. Le remettre au lit sans rien dire B. Évaluer son état et le sécuriser, prévenir le médecin, puis déclarer l'événement ✓ bonne réponse C. Le relever immédiatement et ne rien signaler s'il ne se plaint pas D. Le laisser au sol jusqu'à la relève	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La contention physique d'un patient : A. Peut être décidée par n'importe quel soignant sans traçabilité B. Est toujours la première solution contre les chutes C. Nécessite une prescription, une surveillance et une réévaluation ✓ bonne réponse D. Ne demande aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Pourquoi déclarer un événement indésirable même sans conséquence (« presque accident ») ? A. Ce n'est pas utile B. Pour remplir des statistiques sans suite C. Pour en analyser les causes et éviter qu'il se reproduise ✓ bonne réponse D. Pour identifier la personne responsable et adapter son évaluation annuelle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Avant de préparer un médicament injectable, il faut vérifier : A. Uniquement le nom du patient et le numéro de chambre B. Uniquement le nom du médicament et la dose, l'identité étant vérifiée au moment de l'injection C. Uniquement la couleur du produit D. Patient, médicament, dose, voie, heure et péremption ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient signale une allergie à la pénicilline. Le soignant doit : A. Attendre une réaction pour la noter B. La noter dans le dossier et la signaler ✓ bonne réponse C. La transmettre oralement à l'équipe de jour et de nuit, sans l'écrire tant qu'elle n'est pas prouvée D. L'ignorer si le patient ne se souvient pas de la réaction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Les escarres, les chutes et les erreurs médicamenteuses sont des exemples de :

- A. Événements inévitables liés à l'âge et à la gravité des pathologies des patients
- B. Maladies infectieuses contractées hors de l'hôpital
- C. Problèmes administratifs liés à l'admission
- D. Risques liés aux soins que l'on peut prévenir ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 La méthode de communication SAED (ou SBAR) sert à :

- A. Transmettre une information structurée sur un patient ✓ bonne réponse
- B. Classer les déchets
- C. Évaluer la douleur et le niveau de sédation des patients en salle de réveil
- D. Calculer une dose

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Lors d'un transfert entre services, la sécurité du patient repose surtout sur :

- A. La rapidité du brancardage et la présence d'un soignant pendant tout le trajet
- B. Le transfert rapide du patient, le dossier suivant plus tard par courrier
- C. Le bavardage avec le patient
- D. Une transmission complète des informations et des documents ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Éthique et secret professionnel 20 questions

1 Le secret professionnel s'applique :

- A. Uniquement pendant les heures de service
- B. Uniquement aux médecins
- C. À tout ce que l'on apprend, voit ou comprend en exerçant ✓ bonne réponse
- D. Uniquement au diagnostic et aux traitements inscrits dans le dossier médical du patient

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Un voisin du patient vous téléphone pour connaître son diagnostic. Que répondez-vous ?

- A. Vous donnez seulement le nom du service
- B. Vous ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse
- C. Vous donnez le diagnostic s'il connaît bien le patient
- D. Vous lui lisez le compte rendu

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Avant un soin, le consentement du patient doit être :

- A. Libre et éclairé, après une information claire ✓ bonne réponse
- B. Obtenu uniquement pour les interventions chirurgicales
- C. Présumé pour tous les soins courants, sans information
- D. Donné par la famille dans tous les cas

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Publier sur un réseau social la photo d'un patient, même sans son nom :

- A. Est autorisé si le visage est flouté et que le nom de l'établissement n'apparaît pas
- B. Est autorisé après sa sortie
- C. Est autorisé si le compte est privé
- D. Est interdit sans son accord ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Un patient majeur et lucide refuse un soin après avoir été informé. Que faire ? A. Le sortir immédiatement du service B. Demander à la famille de signer à sa place C. Respecter son refus, le réinformer, prévenir le médecin et tracer ✓ bonne réponse D. Réaliser le soin malgré tout	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le secret professionnel s'impose : A. À tous les professionnels de santé et au personnel de l'établissement ✓ bonne réponse B. Uniquement aux médecins et aux infirmiers diplômés d'État C. Uniquement pendant l'hospitalisation D. Uniquement au service de psychiatrie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le secret professionnel cesse-t-il après la mort du patient ? A. Oui, immédiatement B. Oui, si la famille le demande oralement C. Oui, après un an D. Non, il continue après le décès ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un employeur appelle pour savoir pourquoi son salarié est hospitalisé. Vous : A. Confirmez seulement la maladie B. Ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse C. Lisez le dossier D. Donnez le diagnostic	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Dans un ascenseur avec des visiteurs, deux collègues parlent d'un patient par son nom. C'est : A. Recommandé pour gagner du temps B. Acceptable si le ton est bas C. Une atteinte au secret professionnel ✓ bonne réponse D. Sans importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le dossier médical d'un patient peut être consulté : A. Par tout professionnel de l'établissement, même s'il ne participe pas aux soins du patient B. Par les collègues du service, même s'ils ne s'occupent pas du patient C. Par tout le personnel de l'établissement D. Par les professionnels qui participent à sa prise en charge ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La bientraitance consiste notamment à : A. Respecter la dignité, l'intimité et les choix du patient ✓ bonne réponse B. Faire les soins le plus vite possible, pour réduire le temps pendant lequel le patient est dérangé C. Décider à la place du patient de ce qui est le mieux pour lui, sans l'informer D. Faire les soins le plus vite possible sans expliquer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Un soignant constate qu'un collègue maltraite un patient âgé. Il doit : A. Protéger le patient et signaler les faits à sa hiérarchie ✓ bonne réponse B. Ne rien dire par solidarité C. Attendre que cela se reproduise D. En parler sur les réseaux sociaux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Quand un patient mineur est hospitalisé, l'information et le consentement concernent : A. Uniquement l'enfant B. Ses représentants légaux, tout en associant l'enfant selon sa maturité ✓ bonne réponse C. Aucune personne D. Uniquement le médecin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le respect de la pudeur pendant un soin passe par : A. Le fait de ne pas prévenir le patient B. La présence de tous les étudiants C. Une porte ouverte pour faciliter la surveillance et la présence d'un collègue pour aider D. Une porte fermée, un paravent et le fait de ne découvrir que la zone nécessaire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient demande à lire son dossier. En principe : A. C'est toujours interdit B. Il doit passer par un avocat ou par une décision du tribunal pour obtenir une copie C. Il a le droit d'accéder aux informations le concernant, selon la procédure de l'établissement ✓ bonne réponse D. Seule sa famille peut le lire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Accepter un cadeau important (argent) d'un patient : A. Est recommandé B. Est sans conséquence C. Est à éviter : cela peut créer une dépendance ou un conflit d'intérêts ✓ bonne réponse D. Est obligatoire par politesse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le principe de non-discrimination impose de soigner : A. En priorité les patients qui paient plus B. Uniquement les patients de sa région, en priorité les plus connus du service C. Tous les patients avec la même qualité, sans distinction ✓ bonne réponse D. En priorité les patients les plus gravement atteints, puis les autres selon l'ordre d'arrivée et leur situation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Annoncer un diagnostic grave au patient relève : A. De l'infirmier responsable du patient, qui le connaît mieux que le médecin de garde B. De l'aide-soignant de nuit C. Du secrétariat D. Du médecin ; le soignant accompagne et soutient le patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Le droit à l'information du patient signifie qu'il doit recevoir :

- A. Une information claire, loyale et adaptée sur son état et ses soins ✓ **bonne réponse**
- B. Une information seulement à sa sortie
- C. Aucune information pour ne pas l'inquiéter
- D. Une information uniquement écrite en latin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Photographier une plaie pour le dossier de soins nécessite :

- A. Une publication sur internet
- B. Un téléphone personnel et un partage dans un groupe de discussion
- C. Aucune précaution
- D. L'accord du patient et un appareil autorisé par l'établissement ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Infirmier(ère)

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences

Préparation et administration des médicaments 21 questions

1 Prescription : 500 mg d'un antibiotique. Le flacon contient 1 g à diluer dans 10 mL. Quel volume prélever ?

- A. 2 mL
- B. 10 mL
- C. 0,5 mL
- D. 5 mL ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Prescription : 1 000 mL de sérum en 8 heures avec un perfuseur standard (20 gouttes/mL). Quel débit régler ?

- A. Environ 21 gouttes/min
- B. Environ 125 gouttes/min
- C. Environ 42 gouttes/min ✓ **bonne réponse**
- D. Environ 8 gouttes/min

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une seringue électrique doit délivrer 48 mL en 24 heures. Quel débit programmer ?

- A. 24 mL/h
- B. 4 mL/h
- C. 2 mL/h ✓ **bonne réponse**
- D. 0,5 mL/h

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Combien de microgrammes y a-t-il dans 1 milligramme ?

- A. 10 µg
- B. 100 µg
- C. 1 000 µg ✓ **bonne réponse**
- D. 1 000 000 µg

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le chlorure de potassium (KCl) concentré : A. S'administre uniquement en sous-cutané B. Peut être injecté pur dans la tubulure C. Jamais en IV directe : toujours dilué et perfusé lentement ✓ bonne réponse D. S'injecte en IV directe rapide en cas d'hypokaliémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un médicament prescrit « per os » s'administre : A. Par voie sous-cutanée B. Par voie rectale C. Par voie intraveineuse D. Par la bouche ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Prescription : 1 g de paracétamol. Les comprimés sont dosés à 500 mg. Combien en donner ? A. 2 comprimés ✓ bonne réponse B. 1 comprimé C. 4 comprimés D. Un demi-comprimé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Une ampoule de 10 mL contient 20 mg de produit. Quelle est la concentration ? A. 2 mg/mL ✓ bonne réponse B. 200 mg/mL C. 20 mg/mL D. 0,5 mg/mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Prescription : 250 mL en 2 heures à la seringue ou à la pompe. Quel débit programmer ? A. 250 mL/h B. 50 mL/h C. 500 mL/h D. 125 mL/h ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Combien de milligrammes y a-t-il dans 1 gramme ? A. 10 000 mg B. 10 mg C. 1 000 mg ✓ bonne réponse D. 100 mg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La voie sous-cutanée (SC) correspond à une injection : A. Dans le tissu sous la peau (ventre, cuisse, bras) ✓ bonne réponse B. Dans un muscle profond C. Dans une veine superficielle de l'avant-bras ou de la main D. Dans l'épaisseur de la peau superficielle, en formant une petite papule	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 L'injection intramusculaire chez l'adulte se fait de préférence : A. Dans la face interne du poignet B. Quadrant supéro-externe de la fesse ou face latérale de la cuisse ✓ bonne réponse C. Dans le pli du coude, au niveau de la veine D. Dans le quadrant inféro-interne de la fesse, plus charnu et moins douloureux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Un médicament reconstitué doit être : A. Conservé sans étiquette jusqu'à la fin du flacon B. Étiqueté et utilisé dans le délai prévu ✓ bonne réponse C. Utilisé quelle que soit la date D. Conservé à température ambiante sans étiquette s'il est administré dans la journée par la même personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les héparines de bas poids moléculaire s'injectent : A. En sous-cutané, sans purger la bulle d'air ✓ bonne réponse B. Par voie intramusculaire, dans le muscle deltoïde C. En sous-cutané, après avoir soigneusement purgé la bulle d'air de la seringue D. En intraveineuse lente, après avoir purgé la bulle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient sous anticoagulant présente des saignements de gencives et des hématomes. Vous : A. Arrêtez tous les traitements sans avis B. Appliquez une compresse froide et attendez le prochain bilan prévu dans un mois C. Prévenez le médecin, car il peut s'agir d'un surdosage ✓ bonne réponse D. Augmentez la dose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'insuline rapide doit être administrée : A. À heure fixe chaque matin, quelle que soit la glycémie ou la prise du repas B. Uniquement la nuit C. Selon la prescription, en tenant compte de la glycémie et des repas ✓ bonne réponse D. Toujours en intramusculaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Écraser un comprimé à libération prolongée est : A. Sans conséquence si le comprimé est ensuite mélangé à de la compote B. Recommandé pour tous les comprimés C. Obligatoire chez la personne âgée D. Déconseillé : cela modifie la libération du médicament ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La traçabilité de l'administration d'un médicament se fait : A. Elle n'est pas nécessaire pour les médicaments per os B. Immédiatement après l'administration, par la personne qui l'a administré ✓ bonne réponse C. En fin de garde, de mémoire D. Par un collègue qui n'a pas vu le soin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un patient refuse son traitement. Le soignant : A. Cherche la raison, informe, prévient le médecin, trace ✓ bonne réponse B. Ne le note pas C. Le force à le prendre D. Le mélange discrètement à son repas pour qu'il le prenne sans s'en rendre compte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Morphine : quel effet indésirable surveiller en priorité ?

- A. L'hypertension artérielle
- B. La toux sèche
- C. La dépression respiratoire ✓ bonne réponse
- D. La chute de cheveux

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

21 La règle d'or face à une prescription orale non urgente est :

- A. Obtenir une prescription écrite avant d'administrer ✓ bonne réponse
- B. Faire confiance à sa mémoire
- C. Demander à la famille de confirmer
- D. Administrer et oublier

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Pose de perfusion 20 questions

1 Combien de temps peut-on laisser en place un garrot lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique ?

- A. 15 minutes
- B. Au moins 5 minutes, pour bien gonfler la veine avant de piquer
- C. Moins d'une minute environ ✓ bonne réponse
- D. Jusqu'à la fin de la perfusion

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel site privilégier pour un cathéter veineux périphérique chez l'adulte ?

- A. L'avant-bras, côté non dominant ✓ bonne réponse
- B. Le bras porteur d'une fistule artério-veineuse
- C. Le pli du coude en première intention, car la veine y est plus grosse et plus facile à piquer
- D. Une veine du membre inférieur

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quel signe doit faire suspecter une extravasation (diffusion) au point de perfusion ?

- A. Gonflement, peau froide et pâle, douleur ✓ bonne réponse
- B. Débit de perfusion qui augmente brusquement
- C. Reflux de sang dans la tubulure
- D. Peau chaude et rouge le long du trajet de la veine, sans gonflement autour du point de ponction

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Rougeur, chaleur et cordon induré le long de la veine perfusée évoquent :

- A. Un fonctionnement normal
- B. Une réaction allergique généralisée
- C. Une hypoglycémie
- D. Une phlébite ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Avant de brancher une perfusion, la tubulure doit être :

- A. Rincée à l'alcool
- B. Laisser vide, l'air étant sans danger
- C. Purgée afin d'en chasser tout l'air ✓ bonne réponse
- D. Remplie à moitié

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Quel est le premier geste avant de préparer le matériel de pose de cathéter ? A. Piquer la veine B. Mettre des gants stériles sans hygiène des mains C. Poser le garrot D. Une friction hydro-alcoolique des mains ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le cathéter veineux périphérique doit être réévalué : A. Une fois par mois B. Une fois par semaine C. Uniquement s'il tombe D. Chaque jour ; retiré dès qu'il n'est plus utile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le pansement d'un cathéter veineux périphérique doit être : A. Retiré pour la toilette B. Remplacé par un sparadrap simple non stérile C. Stérile, transparent, refait s'il est décollé ✓ bonne réponse D. Recouvert de coton	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Quel signe impose de retirer un cathéter veineux périphérique ? A. Un patient qui dort B. Un pansement propre C. Douleur, rougeur ou écoulement au point de ponction ✓ bonne réponse D. Un débit régulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Où éviter de poser un cathéter veineux ? A. Sur l'avant-bras où est posée la perfusion, pour gagner du temps B. Membre paralysé, fistule de dialyse, côté d'un curage axillaire ✓ bonne réponse C. Sur le membre non dominant, car il est moins mobile et le cathéter risque de se boucher plus vite D. Sur le dos de la main	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le calibre « 18 G » par rapport au « 22 G » est : A. Identique B. Plus fin C. Plus gros ✓ bonne réponse D. Réservé aux nourrissons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Pour un remplissage rapide en urgence, on choisit un cathéter : A. Sous-cutané B. De très petit calibre (26 G) C. Intramusculaire D. De gros calibre (14 à 18 G) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Avant de raccorder une perfusion, on vérifie : A. Uniquement le nom du médecin prescripteur et le service B. Uniquement le nom du soluté et le débit, l'identité ayant été vérifiée à l'admission C. Prescription, soluté, limpidité, péremption, identité ✓ bonne réponse D. Uniquement le nom du médecin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Le reflux de sang dans le cathéter lors de la pose indique : A. Une perforation de l'artère obligatoirement B. Que le cathéter est bien dans la veine ✓ bonne réponse C. Une infection D. Un problème de pompe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une bulle d'air importante dans la tubulure doit être : A. Ignorée B. Évacuée avant qu'elle n'atteigne le patient ✓ bonne réponse C. Poussée rapidement dans la veine D. Lâissée passer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La ligne de perfusion (tubulure) d'un soluté standard se change en général : A. Uniquement si elle est visiblement souillée ou coudée B. Selon le protocole de l'établissement (souvent tous les 4 jours) et après les produits sanguins ou lipidiques ✓ bonne réponse C. Uniquement lors du changement du cathéter, quel que soit le produit perfusé entre-temps D. Toutes les heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une perfusion ne coule plus. Que vérifier en premier ? A. Changer immédiatement de veine sans vérifier B. Rincer le cathéter en poussant fortement 10 mL de sérum physiologique pour le déboucher C. Secouer la poche D. Clamp, position du membre, tubulure, point de ponction ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'antisepsie de la peau avant la pose d'un cathéter se fait : A. Avec un antiseptique alcoolique, en respectant le temps de séchage ✓ bonne réponse B. Avec de l'éther C. Avec de l'eau du robinet D. Sans antisepsie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Après la pose, on note dans le dossier : A. Uniquement l'heure de pose, les autres informations figurant sur le cathéter lui-même B. Rien C. La date, le site, le calibre et le nom du soignant ✓ bonne réponse D. Uniquement l'heure du repas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient perfusé présente frissons et fièvre brutale. Il faut suspecter : A. Une simple fatigue B. Un effet de la météo C. Une infection liée au cathéter et prévenir le médecin ✓ bonne réponse D. Un débit trop lent	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Pour une hémoculture, la désinfection de la peau doit être : A. Soigneuse, antiseptique, séchage respecté ✓ bonne réponse B. Rapide, avec un coton imbibé d'alcool, la ponction pouvant se faire sur la peau encore humide C. Inutile si le patient est propre D. Faite à l'eau uniquement, sans antiseptique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Le tube à bouchon violet (EDTA) est principalement utilisé pour : A. Les hémocultures B. La numération formule sanguine (NFS) ✓ bonne réponse C. Le bilan d'hémostase (TP, TCA) et la vitesse de sédimentation D. La glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le tube citraté (bouchon bleu) pour le bilan d'hémostase doit être : A. Agité vigoureusement pendant une minute B. Prélevé en dernier impérativement après plusieurs tubes secs C. Rempli à moitié D. Rempli jusqu'au trait de remplissage ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pour éviter une hémolyse lors d'un prélèvement, il faut : A. Agiter énergiquement les tubes B. Laisser le garrot en place plusieurs minutes C. Utiliser une aiguille la plus fine possible et aspirer fort D. Éviter un garrot trop long et ne pas secouer les tubes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Où réaliser un prélèvement sanguin chez un patient perfusé au bras droit ? A. Directement dans la tubulure de la perfusion en cours B. Au bras opposé, de préférence ✓ bonne réponse C. Il n'y a aucune précaution particulière D. Au-dessus de la perfusion, sur le même bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Quel matériel est le plus adapté pour un prélèvement veineux multiple ? A. Une seringue de 50 mL pour tous les tubes B. Une lancette C. Un cathéter de 14 G D. Un système sous vide avec corps de pompe et tubes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le garrot pour une prise de sang se place : A. Sur le poignet pour un prélèvement au coude B. Juste au niveau du point de ponction, serré fort pour bien faire saillir la veine C. Sur l'autre bras D. À quelques centimètres au-dessus du point de ponction ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Les tubes doivent être étiquetés : A. Le lendemain au laboratoire B. Avant de voir le patient, pour gagner du temps, sans vérification C. Par le coursier D. Au lit du patient, immédiatement après le prélèvement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Après une prise de sang, on applique : A. Un pansement compressif serré pendant plusieurs heures, bras replié B. Une compression du point de ponction, bras tendu ✓ bonne réponse C. Rien D. Un massage énergique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le tube sec (bouchon rouge ou jaune avec gel) sert surtout à : A. La numération formule B. Les hémocultures C. La biochimie sur sérum (ionogramme, bilan hépatique...) ✓ bonne réponse D. La numération formule sanguine et le bilan d'hémostase	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le tube à bouchon gris (fluorure) est souvent utilisé pour : A. La NFS B. La CRP en urgence uniquement C. Le groupe sanguin D. La glycémie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les hémocultures se prélèvent idéalement : A. Lors d'un pic fébrile ou de frissons, avant toute antibiothérapie ✓ bonne réponse B. Uniquement le matin à jeun C. Après plusieurs jours d'antibiotiques D. Uniquement la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour les hémocultures, on remplit en général : A. Un tube citraté B. Un seul tube sec C. Un tube EDTA et un tube citraté pour le laboratoire de bactériologie D. Un flacon aérobie et un flacon anaérobie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient fait un malaise vagal pendant la prise de sang. Vous : A. Continuez rapidement B. Arrêtez, l'allongez jambes surélevées, surveillez ✓ bonne réponse C. Le faites asseoir et finissez rapidement le prélèvement pour éviter de devoir repiquer D. Lui donnez un café pendant le prélèvement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le prélèvement de la gazométrie artérielle se fait habituellement : A. À la veine jugulaire, sous échographie systématique B. À la veine du pli du coude C. À la veine du pli du coude, avec une seringue héparinée et un garrot serré D. À l'artère radiale, après vérification de la circulation collatérale (test d'Allen) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La glycémie capillaire se fait de préférence : A. Au centre du doigt avec de l'alcool encore humide B. Côté de la pulpe du doigt, mains propres et sèches ✓ bonne réponse C. Sur la paume D. Au lobe de l'oreille uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un hématome apparaît au point de ponction. La cause la plus fréquente est : A. Un garrot trop lâche, qui laisse le sang s'échapper autour de l'aiguille pendant le prélèvement B. Une compression insuffisante après le prélèvement ✓ bonne réponse C. Un tube mal étiqueté par l'infirmier préleveur D. Un patient à jeun depuis plus de 12 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un bilan lipidique (cholestérol, triglycérides), le patient doit en général être : A. À jeun depuis une heure, après un petit-déjeuner léger sans matières grasses B. Après un repas copieux et riche en graisses C. Sans précaution particulière, à toute heure D. À jeun depuis environ 12 heures ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le transport des tubes vers le laboratoire doit se faire : A. Sans demande d'examen B. Au soleil C. Rapidement, dans un sachet adapté, avec la demande d'examen ✓ bonne réponse D. Dans la poche de la blouse jusqu'au lendemain	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 L'ordre de remplissage des tubes est important pour éviter : A. Rien, il n'a aucune importance B. Que le patient s'ennuie C. La contamination par les additifs d'un tube à l'autre ✓ bonne réponse D. Une erreur de facturation et un mauvais ordre d'analyse au laboratoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Surveillance des paramètres vitaux 20 questions

1 Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un adulte au repos ? A. 20 à 40 battements/min B. 60 à 100 battements/min ✓ bonne réponse C. 40 à 50 battements/min D. 110 à 140 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quelle est la fréquence respiratoire normale d'un adulte au repos ? A. 4 à 8 cycles/min B. 25 à 35 cycles/min C. 12 à 20 cycles/min ✓ bonne réponse D. 40 à 50 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Une saturation (SpO2) de 85 % chez un adulte sans pathologie respiratoire chronique : A. Est une hypoxémie qui nécessite une prise en charge immédiate ✓ bonne réponse B. Est normale la nuit C. Est normale D. Est acceptable chez un adulte qui dort, une nouvelle mesure au réveil suffisant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	À partir de quelle température parle-t-on habituellement de fièvre ? A. 39,5 °C B. 38 °C ✓ bonne réponse C. 36,5 °C D. 37 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une glycémie capillaire à 0,50 g/L (2,8 mmol/L) chez un patient diabétique correspond à : A. Une glycémie normale B. Une hypoglycémie ✓ bonne réponse C. Une hyperglycémie D. Une acidocétose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Hypotension, tachycardie, pâleur et sueurs après une intervention doivent faire suspecter : A. Une simple réaction à l'anesthésie, qui disparaît sans traitement au réveil complet B. Un réveil normal C. Une hypertension D. Une hémorragie / un état de choc ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une tension artérielle à 180/110 mmHg chez l'adulte est : A. Basse B. Normale C. Normale chez une personne âgée, sans contrôle nécessaire avant la visite du lendemain D. Élevée : il faut contrôler et prévenir le médecin selon le protocole ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Une tension artérielle systolique inférieure à 90 mmHg chez l'adulte évoque : A. Une valeur normale chez tous B. Une fièvre C. Une hypotension à signaler ✓ bonne réponse D. Une hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Pour mesurer la tension, le brassard doit être : A. Le plus petit possible B. Placé au poignet opposé C. Posé sur les vêtements épais D. Adapté à la taille du bras, au niveau du cœur, patient au repos ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10	La fréquence respiratoire se compte : A. Pendant 15 secondes en demandant au patient de respirer normalement, puis multipliée par 4 B. Uniquement la nuit C. En demandant au patient de respirer fort D. Pendant une minute entière, sans que le patient s'en aperçoive si possible ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le score de Glasgow évalue : A. Le risque d'escarre B. La douleur C. Le risque de chute de la personne âgée hospitalisée D. L'état de conscience (yeux, réponse verbale, réponse motrice) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un score de Glasgow à 15 correspond à : A. Un patient agité et désorienté qui répond de façon inadaptée aux questions B. Un patient en arrêt cardiaque C. Un coma profond sans réaction à la douleur D. Un patient conscient et orienté ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	La température normale du corps est d'environ : A. 38 à 38,5 °C B. 35 à 36 °C C. 36,5 à 37,5 °C ✓ bonne réponse D. 38 à 39 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Une diurèse (urines) inférieure à environ 0,5 mL/kg/h chez l'adulte doit faire évoquer : A. Une polyurie B. Une oligurie à signaler ✓ bonne réponse C. Une diurèse normale D. Un diabète obligatoirement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	L'échelle numérique de la douleur va de : A. 0 (pas de douleur) à 10 (douleur maximale imaginable) ✓ bonne réponse B. 0 à 100 en degrés C. De 1 (douleur légère) à 5 (douleur insupportable) D. A à E	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Une fréquence cardiaque à 130/min au repos chez l'adulte s'appelle : A. Une fréquence normale B. Une bradycardie C. Une tachycardie ✓ bonne réponse D. Une hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Une fréquence cardiaque à 45/min chez un adulte non sportif s'appelle :

- A. Une tachypnée
- B. Une bradycardie ✓ bonne réponse
- C. Une tachycardie
- D. Une fréquence normale

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 La saturation en oxygène (SpO2) normale chez un adulte sain est en général :

- A. Entre 95 et 100 % ✓ bonne réponse
- B. Entre 50 et 60 %
- C. Entre 70 et 80 %
- D. Toujours 85 %

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Quel facteur peut fausser la mesure de la SpO2 au doigt ?

- A. La taille du patient
- B. La couleur des cheveux
- C. Des extrémités froides ou du vernis à ongles foncé ✓ bonne réponse
- D. La taille et le poids du patient, ainsi que l'heure de la journée

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Les scores d'alerte précoce (type NEWS) servent à :

- A. Calculer la durée prévisible de l'hospitalisation de chaque patient
- B. Calculer les doses d'antibiotiques
- C. Repérer tôt l'aggravation d'un patient à partir de ses paramètres vitaux ✓ bonne réponse
- D. Évaluer l'autonomie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Pansements et soins des plaies 20 questions

1 Le nettoyage d'une plaie propre se fait :

- A. Uniquement à l'alcool
- B. Du plus sale vers le plus propre
- C. Par mouvements de va-et-vient
- D. Du plus propre vers le plus sale ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel est le produit de première intention pour nettoyer une plaie chronique (ulcère, escarre) ?

- A. Eau oxygénée pure puis Bétadine, pour désinfecter à chaque soin
- B. Sérum physiologique (ou eau et savon doux) ✓ bonne réponse
- C. Éosine aqueuse systématique
- D. Alcool à 90°

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une escarre de stade I se caractérise par :

- A. Une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression, peau intacte ✓ bonne réponse
- B. Une phlyctène (ampoule) ouverte avec une perte de substance superficielle
- C. Une nécrose noire
- D. Une plaie profonde avec os visible

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4	Quels signes locaux évoquent l'infection d'une plaie ?	A. Rougeur, chaleur, douleur, œdème, écoulement purulent ✓ bonne réponse B. Plaie qui se rétrécit C. Un bourgeonnement rose vif, humide et indolore qui recouvre le fond de la plaie D. Absence de douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un pansement doit être refait :	A. Jamais avant la sortie B. Uniquement si le patient le demande C. Toutes les heures pour vérifier la plaie, même si le pansement est propre et sec D. Selon la prescription ou s'il est souillé, décollé ou mouillé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Une plaie chirurgicale propre et fermée est en général :	A. Désinfectée toutes les heures B. Laisser à l'air dès la sortie du bloc dans tous les cas C. Massée D. Protégée par un pansement sec et peu manipulée les premiers jours ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un pansement hydrocolloïde est adapté :	A. Aux plaies très infectées et purulentes B. Aux plaies très infectées et purulentes, avec un écoulement abondant et malodorant C. Aux brûlures étendues du troisième degré D. Aux plaies peu exsudatives en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un pansement à base d'alginate est surtout utilisé pour :	A. Les plaies de la cornée et des muqueuses B. La peau saine autour de la plaie, en prévention C. Les plaies très exsudatives ou qui saignent un peu ✓ bonne réponse D. Les plaies sèches, nécrotiques, qu'il faut réhumidifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La détersion d'une plaie consiste à :	A. Appliquer un antibiotique local systématiquement B. Éliminer les tissus nécrosés et la fibrine ✓ bonne réponse C. Refermer la plaie avec des points D. Sécher la plaie avec un sèche-cheveux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les ablations de fils ou d'agrafes se font :	A. Systématiquement au 2^e jour, quelle que soit la localisation de la plaie B. Sur prescription, selon le délai prévu, avec un matériel stérile ✓ bonne réponse C. Par le patient lui-même D. Dès le lendemain de l'intervention dans tous les cas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Une escarre de stade 4 correspond à : A. Une ampoule (phlyctène) intacte, remplie de liquide clair, sur une peau rouge B. Une perte de substance profonde atteignant le muscle, le tendon ou l'os ✓ bonne réponse C. Une rougeur qui blanchit à la pression D. Une simple sécheresse cutanée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le mot « exsudat » désigne : A. Un antiseptique B. Le liquide qui s'écoule d'une plaie ✓ bonne réponse C. Un type de pansement D. Un antiseptique utilisé pour nettoyer les plaies chroniques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour un ulcère veineux de jambe, le traitement de base associe soins locaux et : A. Chaleur locale B. Massages profonds de la plaie C. Contention ou compression veineuse prescrite ✓ bonne réponse D. Immobilisation stricte au lit pendant des mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le pied diabétique nécessite une surveillance attentive car : A. La douleur y est toujours très forte, ce qui pousse le patient à consulter trop souvent B. Une plaie peut passer inaperçue et s'infecter vite ✓ bonne réponse C. La cicatrisation est toujours plus rapide D. Les diabétiques ne font jamais de plaie au niveau des pieds, même s'ils marchent	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Avant de refaire un pansement douloureux, il est recommandé de : A. Faire le soin le plus vite possible, sans l'annoncer, pour éviter l'appréhension du patient B. Ne rien dire au patient C. Faire le soin le plus vite possible sans prévenir D. Anticiper la douleur avec l'antalgique prescrit ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Une plaie qui sent mauvais, avec un écoulement verdâtre, évoque : A. Une réaction normale du pansement hydrocolloïde, sans signe d'alerte B. Une allergie au pansement uniquement C. Une infection possible, à signaler au médecin ✓ bonne réponse D. Une cicatrisation normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le tissu de granulation (bourgeonnement) est : A. Rouge, humide et granuleux : signe de cicatrisation ✓ bonne réponse B. Jaune, fibrineux et adhérent au fond de la plaie, signe de cicatrisation C. Noir et sec D. Jaune et collant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Un pansement doit être changé avec une technique :

- A. Avec les mêmes compresses pour plusieurs patients
- B. Aseptique, du plus propre vers le plus sale ✓ bonne réponse
- C. Propre mais non stérile, du plus sale vers le plus propre pour éliminer d'abord les germes
- D. Sans gants ni hygiène des mains

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 L'évaluation d'une plaie dans le dossier comprend :

- A. Taille, aspect, exsudat, odeur, douleur, peau autour ✓ bonne réponse
- B. Uniquement la date
- C. Rien si la plaie est petite
- D. Uniquement le nom du pansement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Pour une brûlure superficielle peu étendue, on évite :

- A. Un pansement propre
- B. Le refroidissement à l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes
- C. Corps gras, coton et percement des cloques ✓ bonne réponse
- D. L'avis médical si la brûlure est au visage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bloc opératoire et stérilisation

Postes concernés : Infirmier(ère) de bloc opératoire · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation

Instrumentation chirurgicale 20 questions

1 Le compte des compresses, aiguilles et instruments au bloc opératoire est réalisé :

- A. Avant l'incision, avant la fermeture, en fin d'intervention ✓ bonne réponse
- B. Uniquement si le chirurgien le demande
- C. Uniquement en fin de journée
- D. Une seule fois en début de programme

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Un instrument stérile tombe au sol pendant l'intervention. Que faites-vous ?

- A. Il est contaminé : retiré et remplacé ✓ bonne réponse
- B. Il est réutilisé si personne ne l'a vu
- C. Il est réutilisé après l'avoir essuyé
- D. Il est trempé dans une solution antiseptique pendant quelques minutes puis réutilisé

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quel instrument sert principalement à saisir et clamper un vaisseau ?

- A. Un écarteur de Farabeuf
- B. Un écarteur autostatique de type Gosset
- C. Une pince hémostatique (type Kocher ou Pean) ✓ bonne réponse
- D. Une curette

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Le porte-aiguille sert à :

- A. Tenir l'aiguille lors de la suture ✓ bonne réponse
- B. Couper les fils
- C. Écarter les berges de la plaie
- D. Aspirer le sang

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5	Qui peut toucher la table d'instrumentation stérile ? A. Uniquement les personnes habillées stérilement ✓ bonne réponse B. Toute l'équipe présente en salle C. Toute l'équipe du bloc, avec une tenue de bloc propre D. L'infirmier circulant, s'il a réalisé une friction hydro-alcoolique des mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'écarteur de Farabeuf sert à : A. Clamper une artère pendant la dissection des tissus B. Écarter les berges de l'incision ✓ bonne réponse C. Couper les tissus D. Tenir l'aiguille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les ciseaux de Mayo sont plutôt utilisés pour : A. Aspirer le sang B. Saisir un vaisseau C. Écarter la paroi D. Couper les tissus résistants et les fils ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Les ciseaux de Metzenbaum sont des ciseaux : A. Pour couper les fils de suture et les tissus résistants B. Pour couper les os C. Fins, pour disséquer les tissus délicats ✓ bonne réponse D. Pour couper les fils et les pansements en fin d'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une pince à disséquer « à griffes » est utilisée pour : A. Saisir l'intestin fragile B. Tenir une compresse dans l'abdomen C. Saisir des tissus résistants comme la peau ✓ bonne réponse D. Saisir l'intestin et les tissus fragiles sans les abîmer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le bistouri électrique en mode « coagulation » sert à : A. Couper les tissus en profondeur sans provoquer de saignement B. Aspirer la fumée et le sang du champ opératoire C. Arrêter les petits saignements ✓ bonne réponse D. Écarter les tissus et les organes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Quand le chirurgien tend la main ouverte, l'instrumentiste : A. Dépose fermement l'instrument dans la paume, prêt à l'emploi ✓ bonne réponse B. Attend qu'il le prenne sur la table C. Pose l'instrument sur le patient D. Lance l'instrument	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Les lames de bistouri usagées sont : A. Retirées avec les doigts gantés, puis jetées dans le sac des déchets infectieux B. Réutilisées pour le patient suivant C. Laissées sur la table D. Retirées avec une pince ou un dispositif adapté et jetées dans le collecteur piquant-coupant ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Un fil résorbable est utilisé : A. Uniquement pour la peau du visage, car il laisse une cicatrice moins visible B. Pour fixer les drains de façon définitive C. Jamais au bloc D. Pour les plans profonds non retirés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La table d'instrumentation est préparée : A. Juste avant l'intervention, par une personne habillée stérilement ✓ bonne réponse B. Par le brancardier C. Sans champ stérile D. La veille au soir pour gagner du temps, recouverte d'un champ stérile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un instrument défectueux (mors abîmés) découvert pendant l'intervention doit être : A. Réparé sur place avec du ruban adhésif B. Utilisé jusqu'à la fin de l'intervention, puis signalé au service de stérilisation C. Remis dans la boîte sans rien dire D. Écarté, remplacé et signalé à la stérilisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les compresses utilisées dans le champ opératoire sont : A. Ordinaires et non comptées B. Réutilisables C. Découpées à la main D. Radio-opaques et comptées ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le porte-aiguille se tient en général avec l'aiguille montée : A. Au tiers postérieur de l'aiguille, à l'extrémité des mors ✓ bonne réponse B. Par la pointe C. Au milieu des mors, près de l'articulation de la pince D. Au niveau de la pointe de l'aiguille, au milieu des mors	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 En fin d'intervention, les instruments souillés doivent être : A. Pré-désinfectés sans tarder ✓ bonne réponse B. Rincés au lavabo des mains C. Jetés à la poubelle D. Laissés secs dans le bac jusqu'au lendemain matin, puis envoyés en stérilisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le comptage final ne correspond pas (une compresse manque). Il faut : A. Ne rien dire B. Prévenir immédiatement le chirurgien et rechercher la compresse avant la fermeture ✓ bonne réponse C. Noter un chiffre au hasard D. Fermer quand même et prévoir une radiographie de contrôle le lendemain	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le rôle de l'infirmier « circulant » est notamment de : A. Rester assis hors de la salle B. Aider le chirurgien en tenant les écarteurs dans le champ opératoire C. Servir l'équipe stérile et tracer ✓ bonne réponse D. Instrumenter à la place du chirurgien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Avant la stérilisation, un dispositif médical réutilisable doit être : A. Désinfecté à l'alcool, essuyé puis rangé dans l'armoire du bloc B. Rincé à l'eau puis directement mis dans l'autoclave, la vapeur suffisant à le nettoyer C. Pré-désinfecté, nettoyé, séché puis conditionné ✓ bonne réponse D. Directement mis dans l'autoclave sale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quel est le cycle de référence de l'autoclave pour les dispositifs médicaux en stérilisation hospitalière ? A. 121 °C pendant 2 minutes, quel que soit le type de dispositif B. 60 °C pendant 1 heure C. 134 °C pendant au moins 18 minutes ✓ bonne réponse D. 100 °C pendant 5 minutes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le test de Bowie-Dick sert à vérifier : A. La bonne pénétration de la vapeur et l'évacuation de l'air dans l'autoclave ✓ bonne réponse B. La date de péremption des emballages C. La stérilité de chaque instrument contenu dans la charge D. La stérilité d'un instrument	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un sachet de stérilisation est déchiré ou humide : A. Il peut être utilisé s'il est récent B. Il suffit de le scotcher C. Il peut être utilisé au bloc si l'intervention est courte D. Le contenu est considéré comme non stérile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le lavage chirurgical des mains est réalisé : A. Après l'intervention uniquement B. Uniquement si les mains sont sales C. Avant d'enfiler la casaque et les gants stériles ✓ bonne réponse D. Avec une solution hydro-alcoolique sur des mains souillées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La différence entre désinfection et stérilisation : A. La désinfection de haut niveau élimine aussi toutes les spores bactériennes B. Il n'y a aucune différence C. La stérilisation détruit aussi les spores ✓ bonne réponse D. La désinfection est plus efficace	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un dispositif « critique » (qui pénètre un tissu stérile) doit être : A. Lavé à l'eau B. Désinfecté à bas niveau C. Simplement propre D. Stérile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 L'indicateur de passage sur un emballage indique : A. La date de fabrication de l'instrument B. Que le contenu est stérile et utilisable pendant au moins cinq ans C. Qu'il est passé dans un stérilisateur ✓ bonne réponse D. Le nom du patient et du chirurgien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La date de péremption d'un dispositif stérile dépend surtout : A. De l'emballage et des conditions de stockage ✓ bonne réponse B. De la couleur de l'instrument et de sa taille exacte C. Du chirurgien et du type d'intervention prévue D. De la date de fabrication de l'instrument contenu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les produits stériles sont stockés : A. Au sol dans le couloir B. Au propre, au sec, à l'abri de la lumière ✓ bonne réponse C. Dans les vestiaires, emballés dans du papier D. Près d'un point d'eau dans la salle de soins pour être facilement accessibles	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le principe « premier périmé, premier utilisé » s'applique aux stocks stériles pour : A. Éviter d'utiliser des produits périmés ✓ bonne réponse B. Faire des économies d'électricité dans la réserve C. Classer les produits stériles par ordre alphabétique de nom D. Ranger les produits par couleur d'emballage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le nettoyage des instruments avant stérilisation est indispensable car : A. Il évite seulement d'abîmer l'autoclave avec des résidus B. Il remplace la stérilisation C. Il n'est pas indispensable D. La vapeur ne stérilise pas correctement un instrument encore sale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un laveur-désinfecteur sert à : A. Stériliser les implants B. Laver les blouses C. Nettoyer et désinfecter les instruments avant le conditionnement ✓ bonne réponse D. Stériliser les instruments thermosensibles à basse température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les dispositifs à usage unique : A. Sont toujours réutilisables B. Peuvent être réutilisés pour le même patient le lendemain C. Ne doivent jamais être restérilisés ni réutilisés ✓ bonne réponse D. Peuvent être restérilisés deux fois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 La traçabilité en stérilisation permet de retrouver : A. Le nom de l'agent qui a lavé l'instrument, pour l'évaluation annuelle B. Le cycle de stérilisation utilisé pour chaque dispositif et le patient concerné ✓ bonne réponse C. Le prix de l'instrument D. La marque de la blouse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un emballage stérile tombé au sol : A. Reste stérile s'il n'est pas déchiré, même s'il est humide ou s'il a été piétiné B. N'est plus considéré comme stérile ✓ bonne réponse C. Doit être ouvert pour vérifier D. Est toujours stérile s'il n'est pas visiblement souillé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le lavage chirurgical des mains peut se faire par : A. Un lavage simple au savon doux de 30 secondes, suivi du port de gants stériles B. Friction chirurgicale hydro-alcoolique ✓ bonne réponse C. Port de gants sans hygiène des mains D. Simple rinçage à l'eau froide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Dans la zone stérile, on évite : A. De porter un masque B. De tourner le dos au champ stérile ✓ bonne réponse C. De garder les mains au-dessus de la taille et devant soi pendant toute l'intervention D. De garder les mains au-dessus de la taille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les mains d'une personne habillée stérilement doivent rester : A. Sous les aisselles B. Le long du corps, détendues, pour ne pas fatiguer les épaules pendant l'intervention C. Dans les poches de la casaque stérile D. Au-dessus de la taille et devant soi ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le contrôle de la stérilisation par vapeur comprend notamment : A. Uniquement la couleur des instruments B. Aucun contrôle C. Uniquement la date inscrite sur l'étiquette de chaque sachet après la sortie de l'autoclave D. Paramètres du cycle et indicateurs ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Bloc opératoire 20 questions

1 La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » se déroule : A. Uniquement à la sortie du bloc B. Seulement pour les urgences C. Avant l'induction, l'incision et après ✓ bonne réponse D. Uniquement à l'arrivée du patient au bloc, avant son installation en salle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--

2 Le « temps de pause » avant l'incision permet de vérifier : A. Identité, côté, site et intervention ✓ bonne réponse B. Le nombre de lits disponibles C. Le nombre de compresses et d'instruments disponibles pour l'intervention D. Les horaires de l'équipe et le planning de garde	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Lors de l'installation du patient sur la table, le principal risque à prévenir est : A. L'allergie au latex chez tous les patients B. L'hypothermie liée au contact avec la table, plus que les compressions C. Les compressions et lésions cutanées ou nerveuses ✓ bonne réponse D. L'hyperglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 La plaque neutre du bistouri électrique doit être placée : A. Sur une zone humide B. Sur une zone musculaire bien vascularisée, propre et sèche, proche du site opératoire ✓ bonne réponse C. Sur une cicatrice ou une saillie osseuse, à distance du site opératoire D. Sur une saillie osseuse, loin du site opératoire, pour éviter toute brûlure	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Dans la salle d'opération, les portes doivent rester : A. Fermées autant que possible ✓ bonne réponse B. Ouvertes en permanence pour aérer C. Ouvertes pendant l'intervention pour faciliter le passage du matériel D. Sans importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Avant une intervention programmée, le patient doit en général : A. Avoir respecté le jeûne, la préparation cutanée et retiré bijoux et prothèses amovibles ✓ bonne réponse B. Avoir pris un repas copieux C. Garder ses bijoux D. Garder ses bijoux et ses prothèses dentaires, qui seront retirés au bloc par l'équipe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le marquage du site opératoire (côté) est fait : A. Par le brancardier seul B. Une fois le patient endormi, par l'infirmier de bloc C. Avant le bloc, patient conscient si possible ✓ bonne réponse D. Jamais par l'infirmier, seulement par le chirurgien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 La position opératoire doit être : A. Choisie par le chirurgien seul, une fois le patient endormi, sans autre vérification B. Toujours la même pour toutes les interventions C. Modifiée sans prévenir l'anesthésiste D. Vérifiée par l'équipe ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Pourquoi protège-t-on les points d'appui (talons, coudes) au bloc ? A. Pour améliorer la stabilité du patient et le confort du chirurgien pendant l'intervention B. Pour gagner du temps C. Pour prévenir les lésions cutanées et nerveuses ✓ bonne réponse D. Pour réchauffer la salle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 L'hypothermie au bloc opératoire est prévenue par : A. Un patient découvert pour surveiller la peau B. Une salle froide C. Le réchauffement du patient (couverture chauffante, solutés réchauffés) ✓ bonne réponse D. La suppression des perfusions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le circuit propre/sale au bloc vise à : A. Raccourcir les déplacements du personnel entre les salles d'opération et la stérilisation B. Séparer le propre du sale ✓ bonne réponse C. Séparer les hommes et les femmes D. Organiser les pauses	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La tenue de bloc comprend : A. Des bijoux discrets sous la tenue, sans les retirer B. Une blouse de bloc enfilée par-dessus la tenue de ville, avec une coiffe et un masque C. Tenue dédiée, coiffe, masque, chaussures du bloc ✓ bonne réponse D. Des chaussures de ville nettoyées à l'entrée du bloc	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le nombre de personnes et les allers-retours en salle d'opération doivent être : A. Augmentés pour former les étudiants B. Sans importance si chacun porte une tenue de bloc et un masque C. Encouragés pendant l'incision D. Limités ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les pièces opératoires (prélèvements) doivent être : A. Identifiées, placées dans un récipient adapté et accompagnées de la demande d'examen ✓ bonne réponse B. Jetées avec les déchets C. Gardées au bloc jusqu'au lendemain, puis étiquetées par la secrétaire du service D. Remises à la famille à la sortie du bloc opératoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le bistouri électrique et les solutions alcooliques exposent au risque : A. D'allergie alimentaire B. D'hypoglycémie C. D'incendie au bloc ✓ bonne réponse D. De brûlure chimique de la peau par l'antiseptique, quelle que soit la durée de séchage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Le bionettoyage de la salle entre deux interventions sert à : A. Remplacer la stérilisation des instruments B. Stériliser complètement l'air et toutes les surfaces de la salle entre deux patients C. Préparer une salle propre pour le patient suivant ✓ bonne réponse D. Changer la décoration	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient porteur d'un pacemaker opéré au bistouri électrique : A. Nécessite une vigilance particulière ✓ bonne réponse B. Ne pose aucun problème si le bistouri électrique est utilisé en mode coagulation uniquement C. Ne peut jamais être opéré D. Doit retirer son pacemaker	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La feuille d'écologie ou de traçabilité du bloc recense : A. Uniquement le nom du chirurgien et la durée de l'intervention, pour la facturation B. Le menu du jour servi au patient après le bloc C. Les congés du personnel et les horaires de pause D. Équipe, horaires, implants, événements ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 En salle de surveillance post-interventionnelle, le patient est transféré : A. Avec les transmissions de l'équipe ✓ bonne réponse B. Par le brancardier, le dossier étant transmis plus tard au service d'hospitalisation C. Après avoir mangé D. Directement à domicile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une rupture d'asepsie constatée pendant l'intervention doit être : A. Signalée immédiatement ✓ bonne réponse B. Cachée C. Ignorée si elle est petite D. Notée sur la feuille de bloc et corrigée à la fin de l'intervention pour ne pas interrompre le chirurgien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

Suivi de grossesse 20 questions

1 Quelle est la durée moyenne d'une grossesse en semaines d'aménorrhée (SA) ? A. Environ 32 SA B. Environ 36 SA C. Environ 45 SA D. Environ 41 SA ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--

2 À partir de quel terme une naissance est-elle considérée « à terme » ? A. 40 SA uniquement B. 32 SA C. 34 SA D. 37 SA révolues ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Une tension artérielle $\geq 140/90$ mmHg avec protéinurie après 20 SA évoque : A. Une anémie B. Un diabète gestationnel C. Une grossesse normale D. Une prééclampsie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Quelle supplémentation est recommandée en début de grossesse pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural ? A. Acide folique (vitamine B9) ✓ bonne réponse B. Vitamine K C. Vitamine A à forte dose D. Fer injectable systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le dépistage du diabète gestationnel par HGPO 75 g se fait habituellement : A. Après l'accouchement B. Entre 24 et 28 SA ✓ bonne réponse C. À 38 SA D. À 8 SA	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La date présumée d'accouchement se calcule habituellement à partir : A. De la date du mariage B. Du dernier jour des dernières règles, en ajoutant neuf mois exacts C. Du premier jour des dernières règles ✓ bonne réponse D. Du poids de la mère	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 L'échographie du premier trimestre (vers 11–14 SA) permet notamment : A. De confirmer le sexe du fœtus et d'estimer le poids de naissance B. De dater la grossesse, clarté nucale ✓ bonne réponse C. De connaître le poids de naissance exact D. De déclencher l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Quel signe doit faire consulter en urgence pendant la grossesse ? A. Une envie fréquente d'uriner et des nausées le matin au premier trimestre B. Saignements ou baisse des mouvements du bébé ✓ bonne réponse C. Une envie fréquente d'uriner au premier trimestre D. Des nausées le matin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les signes de prééclampsie peuvent associer : A. Des démangeaisons des mains et des pieds, surtout la nuit, sans autre signe B. Maux de tête, troubles visuels, douleur en barre épigastrique, œdèmes brutaux ✓ bonne réponse C. Uniquement des démangeaisons D. Une faim excessive et une prise de poids rapide au 1er trimestre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10	La hauteur utérine mesurée en consultation sert à : A. Surveiller la croissance du fœtus ✓ bonne réponse B. Prévoir le sexe du bébé et la date exacte C. Calculer la glycémie D. Estimer la date d'accouchement et la position exacte du placenta	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La toxoplasmose est surveillée chez la femme enceinte non immunisée car : A. Elle provoque toujours l'accouchement B. Elle est sans danger C. Elle peut atteindre le fœtus ✓ bonne réponse D. Elle protège le fœtus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Conseil hygiéno-diététique à une femme enceinte non immunisée contre la toxoplasmose : A. Manger la viande saignante B. Bien cuire la viande et laver soigneusement fruits et légumes ✓ bonne réponse C. Éviter les légumes crus et privilégier la viande peu cuite, plus riche en fer D. Toucher la litière du chat sans gants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	L'alcool pendant la grossesse : A. Est à éviter totalement ✓ bonne réponse B. Est sans risque pour le fœtus C. Est recommandé au troisième trimestre D. Est autorisé en petite quantité chaque jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Une femme Rhésus négatif avec un conjoint Rhésus positif nécessite : A. Une transfusion de sang Rhésus positif à la mère en fin de grossesse, par précaution B. Une prévention par immunoglobulines anti-D ✓ bonne réponse C. Un arrêt de la grossesse D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Les mouvements actifs du fœtus sont en général perçus par la mère : A. Jamais avant l'accouchement B. Entre 16 et 22 SA environ ✓ bonne réponse C. Dès la 4e SA D. Seulement après 38 SA	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Le diabète gestationnel expose surtout à : A. Une myopie maternelle B. Un retard de croissance du bébé et une prématurité systématique C. Aucune complication D. Une macrosomie fœtale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Une menace d'accouchement prématuré se manifeste par : A. Des contractions irrégulières et indolores après un effort, sans modification du col B. Des nausées au premier trimestre C. Des mouvements fœtaux actifs D. Contractions et modifications du col avant 37 SA ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 La supplémentation en fer pendant la grossesse vise à prévenir :

- A. L'hypertension
- B. L'anémie ✓ **bonne réponse**
- C. La prééclampsie de façon certaine
- D. Le diabète

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 L'entretien prénatal précoce permet surtout :

- A. De programmer la date de l'accouchement et de choisir la maternité
- B. D'identifier les besoins, les difficultés et de préparer la naissance ✓ **bonne réponse**
- C. De prescrire des antibiotiques préventifs
- D. De réaliser l'accouchement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Une femme enceinte se plaint de brûlures en urinant. Il faut :

- A. Rechercher une infection urinaire (ECBU) ✓ **bonne réponse**
- B. Lui conseiller de boire moins pour réduire les brûlures en attendant l'accouchement
- C. Ne rien faire, c'est normal
- D. Attendre l'accouchement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Accouchement eutocique 20 questions

1 Le travail actif est défini par une dilatation du col :

- A. Uniquement à 10 cm
- B. À partir d'environ 5 à 6 cm ✓ **bonne réponse**
- C. À partir de 1 cm
- D. Dès la perte du bouchon muqueux, même sans contractions régulières

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La délivrance correspond à :

- A. Le début des contractions
- B. La rupture de la poche des eaux qui précède l'expulsion de l'enfant
- C. La sortie de l'enfant
- D. L'expulsion du placenta ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une hémorragie du post-partum est définie par une perte sanguine d'au moins :

- A. 500 mL dans les 24 heures ✓ **bonne réponse**
- B. 100 mL
- C. 200 mL
- D. 2 000 mL

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Quel médicament est recommandé en prévention de l'hémorragie de la délivrance ?

- A. Le salbutamol
- B. Le paracétamol
- C. L'insuline
- D. L'ocytocine ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 La présentation la plus fréquente à l'accouchement est : A. Le siège B. Céphalique (sommet) ✓ bonne réponse C. La présentation transverse D. La présentation de la face	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le premier stade du travail correspond à : A. La dilatation du col ✓ bonne réponse B. L'expulsion du bébé C. La descente et l'expulsion du bébé après dilatation complète D. La surveillance du post-partum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le deuxième stade du travail correspond à : A. La délivrance B. L'expulsion du fœtus ✓ bonne réponse C. La consultation prénatale D. La dilatation du col	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un liquide amniotique teinté (méconial) doit faire : A. Faire marcher la patiente pour accélérer le travail sans modifier la surveillance B. Ignorer l'information si la mère se sent bien C. Surveiller le cœur fœtal, prévenir l'équipe ✓ bonne réponse D. Arrêter la surveillance du rythme cardiaque fœtal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le rythme cardiaque fœtal normal se situe en général entre : A. 180 et 220 battements/min B. 40 et 60 battements/min C. 60 et 90 battements/min D. 110 et 160 battements/min ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le partogramme sert à : A. Prévoir la date de sortie et organiser le suivi de la mère après l'accouchement B. Suivre graphiquement le travail ✓ bonne réponse C. Calculer le prix de l'accouchement D. Noter le menu de la patiente	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Pendant le travail, une position verticale ou la mobilité de la patiente : A. Peut faciliter la descente du bébé ✓ bonne réponse B. Est déconseillée car elle empêche toute surveillance du rythme cardiaque du bébé C. Provoque systématiquement une hémorragie D. Est toujours interdite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Après la naissance, le clampage du cordon : A. Doit toujours être fait avant la sortie de la tête B. Peut être retardé d'environ une minute ✓ bonne réponse C. Se fait au bout d'une heure obligatoirement D. Doit toujours être immédiat, dans les secondes qui suivent la naissance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 L'examen du placenta après la délivrance vérifie : A. Qu'il est complet ✓ bonne réponse B. Sa couleur et son odeur, pour dépister une infection maternelle C. Sa couleur uniquement D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un globe utérin bien formé après la délivrance signifie : A. Un placenta retenu certain B. Un utérus bien rétracté ✓ bonne réponse C. Une hémorragie en cours D. Une rétention de placenta nécessitant une révision utérine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La surveillance en salle de naissance après l'accouchement dure en général : A. Aucune surveillance B. 24 heures en salle de naissance C. Environ 2 heures ✓ bonne réponse D. Une quinzaine de minutes, le temps de vérifier le globe utérin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'épisiotomie : A. Est obligatoire à chaque accouchement B. Se fait avant le début du travail C. N'est pas systématique ✓ bonne réponse D. Est recommandée chez toutes les femmes qui accouchent de leur premier enfant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une procidence du cordon (cordon devant la présentation) est : A. Un signe de fin de travail normale B. Une complication sans gravité C. Une urgence obstétricale ✓ bonne réponse D. Une situation normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une rupture des membranes sans contractions à terme impose : A. D'attendre une semaine à domicile B. D'attendre les contractions à domicile pendant plusieurs jours, sans consulter C. Une consultation à la maternité ✓ bonne réponse D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Une déchirure périnéale après l'accouchement : A. Est une contre-indication à l'allaitement B. Est examinée et suturée si nécessaire ✓ bonne réponse C. Nécessite une césarienne D. Est toujours laissée sans soin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le peau-à-peau à la naissance favorise : A. Les infections B. Le risque d'hypothermie, ce qui impose de le limiter à quelques secondes C. La régulation thermique du bébé, le lien mère-enfant et la première tétée ✓ bonne réponse D. Le retard de l'allaitement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Le score d'Apgar est évalué : A. À 1, 5 et 10 minutes de vie ✓ bonne réponse B. Au 3e jour C. Uniquement si l'enfant est prématuré D. À 1 heure de vie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quels éléments composent le score d'Apgar ? A. Température, glycémie, bilirubine B. Fréquence cardiaque, respiration, tonus, réactivité, coloration ✓ bonne réponse C. Poids, taille, périmètre crânien D. Pleurs, sommeil, alimentation et couleur des selles	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Quelle vitamine est administrée au nouveau-né pour prévenir la maladie hémorragique ? A. Vitamine D à forte dose B. Vitamine B12 C. Vitamine K ✓ bonne réponse D. Vitamine C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un nouveau-né ? A. 120 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 200 à 240 battements/min C. 80 à 100 battements/min D. 60 à 80 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Pour prévenir l'hypothermie du nouveau-né, on privilégie : A. Une pièce non chauffée B. Séchage immédiat et peau-à-peau ✓ bonne réponse C. Le bain immédiat D. Le laisser nu sur la table	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le poids de naissance moyen d'un nouveau-né à terme est d'environ : A. 6 kg B. 500 g C. 1 kg D. 2 à 2,5 kg en moyenne ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La perte de poids physiologique des premiers jours est en général : A. Définitive, sans récupération attendue avant 2 mois B. Jusqu'à 20 % du poids de naissance, récupérée au bout de deux mois C. Inexistante D. Inférieure à 10 % du poids de naissance, récupéré vers 10-15 jours ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un ictère (jaunisse) apparaissant dans les 24 premières heures de vie est : A. Un signe de bonne santé et d'appétit B. Physiologique, il disparaît spontanément en quelques jours C. Anormal, à signaler vite ✓ bonne réponse D. Sans aucune importance chez le nouveau-né	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La fréquence respiratoire normale d'un nouveau-né est d'environ : A. 20 cycles/min exactement B. 40 à 60 cycles/min ✓ bonne réponse C. 80 à 100 cycles/min D. 10 à 15 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les soins du cordon ombilical reposent sur : A. Une hygiène simple : garder le cordon propre et sec ✓ bonne réponse B. Tirer dessus pour qu'il tombe vite C. Le recouvrir d'un pansement serré et humide D. L'application de poudre ou de produits traditionnels	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le cordon ombilical tombe en général : A. Le jour de la naissance B. Jamais C. Entre 5 et 15 jours ✓ bonne réponse D. Entre 1 et 2 mois après la naissance, quand le nombril est cicatrisé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le dépistage néonatal par prélèvement de sang au talon permet de repérer : A. Le groupe scolaire B. La taille adulte C. Le groupe sanguin et le risque d'allergie alimentaire du nouveau-né D. Certaines maladies rares (comme l'hypothyroïdie congénitale) selon le programme du pays ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un nouveau-né à risque d'hypoglycémie (mère diabétique, petit poids) nécessite : A. Un jeûne de 12 heures B. Glycémie et alimentation précoce ✓ bonne réponse C. Aucune surveillance D. Un bain froid	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les premières selles du nouveau-né, noires et collantes, s'appellent : A. Le colostrum B. Le lanugo C. Le vernix D. Le méconium ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le vernix caseosa est : A. Une infection de la peau B. Une infection de la peau à traiter par un antiseptique C. Une infection cutanée bénigne du nouveau-né D. Un enduit blanchâtre qui protège la peau du nouveau-né ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La température idéale d'une salle de naissance pour accueillir un nouveau-né est d'environ :

A. 10 °C
B. 15 °C
C. 35 °C
D. 18 à 20 °C, comme une chambre ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Un nouveau-né qui ne respire pas à la naissance après séchage et stimulation nécessite :

A. Une ventilation au masque immédiatement selon l'algorithme de réanimation néonatale ✓ **bonne réponse**
B. Un bain
C. Une mise au sein immédiate pour le stimuler
D. Une aspiration prolongée de la bouche et du nez avant tout autre geste

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 La vaccination à la naissance en Tunisie comprend notamment :

A. Le vaccin contre la rougeole et la poliomyélite injectable, dès la salle de naissance
B. Le vaccin contre la rougeole et les oreillons
C. Aucun vaccin
D. Le BCG et l'hépatite B (1re dose) ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Le couchage recommandé du nouveau-né :

A. Sur le dos, sans oreiller ni tour de lit ✓ **bonne réponse**
B. Dans le lit des parents entre deux oreillers
C. Avec plusieurs couvertures épaisses
D. Sur le ventre, la tête tournée sur le côté pour éviter les régurgitations

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Un nouveau-né fébrile (température $\geq 38^{\circ}\text{C}$) doit :

A. Être simplement déshabillé et surveillé une semaine
B. Être baigné à l'eau froide
C. Être examiné rapidement par un médecin ✓ **bonne réponse**
D. Recevoir de l'aspirine

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Allaitement maternel 20 questions

1 L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à :

A. 3 mois
B. 6 mois ✓ **bonne réponse**
C. 1 mois
D. 12 mois

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quand débiter idéalement la première tétée ?

A. Après le premier bain
B. Après 24 heures
C. Dans l'heure qui suit la naissance ✓ **bonne réponse**
D. Après le bain et les premiers soins, vers la 6e heure de vie, quand la mère est reposée

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le colostrum est : A. Le premier lait, riche en anticorps ✓ bonne réponse B. Un lait de mauvaise qualité à jeter C. Un lait artificiel D. Un signe d'infection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Une bonne prise du sein se reconnaît à : A. Bouche grande ouverte, lèvres retroussées, aréole prise ✓ bonne réponse B. Le bébé qui tète uniquement le bout du mamelon C. Des bruits de claquement réguliers et des joues qui se creusent à chaque succion D. Une douleur intense chez la mère	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Pendant les premières semaines, un nouveau-né allaité tète en général : A. Toutes les 4 heures exactement, en le réveillant si nécessaire B. Au moins 8 fois par 24 heures, à la demande ✓ bonne réponse C. Toutes les 6 heures, en réveillant le bébé si besoin D. Deux fois par jour, à heures fixes, matin et soir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un signe que le bébé reçoit suffisamment de lait : A. Ses urines sont très foncées B. Il dort de longues périodes sans réclamer, même la nuit, dès les premiers jours C. Couches bien mouillées, prise de poids régulière ✓ bonne réponse D. Il pleure tout le temps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Des crevasses du mamelon sont le plus souvent dues à : A. Un lait de mauvaise qualité B. Une alimentation trop salée C. Des tétées trop fréquentes, qui fatiguent la peau du mamelon D. Une mauvaise prise du sein ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un engorgement mammaire se soulage par : A. Des tétées fréquentes et efficaces, éventuellement de la chaleur avant et du froid après ✓ bonne réponse B. L'arrêt brutal de l'allaitement C. Une restriction des boissons chez la mère allaitante D. Un espacement des tétées et un bandage serré des seins pendant quelques jours	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Une mastite se manifeste par : A. Une zone rouge, chaude, douloureuse, avec fièvre ✓ bonne réponse B. Une simple fatigue C. Une perte de cheveux D. Un lait plus sucré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 En cas de mastite, l'allaitement : A. Doit être remplacé par de l'eau sucrée B. Est dangereux pour le bébé dans tous les cas C. Peut en général être poursuivi ✓ bonne réponse D. Doit être suspendu du côté atteint jusqu'à la fin du traitement antibiotique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Les compléments d'eau ou de lait artificiel chez un nouveau-né allaité en bonne santé : A. Sont conseillés la nuit pour laisser la mère se reposer pendant les premières semaines B. Sont obligatoires chaque jour C. Ne sont pas nécessaires ✓ bonne réponse D. Remplacent le colostrum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La montée de lait survient généralement : A. Pendant la grossesse uniquement B. Dès la première heure, au moment de la première tétée en salle de naissance C. Entre le 2e et le 4e jour ✓ bonne réponse D. Le jour de l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le lait maternel exprimé peut être conservé au réfrigérateur (environ 4 °C) : A. Indéfiniment B. 1 heure seulement C. Environ 48 heures ✓ bonne réponse D. Une semaine, dans la porte du réfrigérateur pour qu'il soit facile d'accès	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pour décongeler du lait maternel, on évite : A. Un chauffe-biberon électrique B. Le four à micro-ondes ✓ bonne réponse C. Le bain-marie à l'eau tiède D. Le réfrigérateur, car la décongélation y est trop lente pour garder ses qualités	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Quel médicament prendre pendant l'allaitement ? A. N'importe lequel sans avis B. Ceux validés comme compatibles par un professionnel ✓ bonne réponse C. Les mêmes que pendant la grossesse sans vérifier D. Aucun traitement n'est jamais possible pendant toute la durée de l'allaitement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La position « ballon de rugby » est utile notamment : A. Uniquement pour les biberons B. Pour les bébés de plus de 2 ans C. Après une césarienne ✓ bonne réponse D. Pour les bébés qui régurgitent beaucoup, afin de les garder en position allongée sur le dos	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Le réflexe d'éjection du lait est favorisé par :

- A. La progestérone
- B. L'ocytocine ✓ **bonne réponse**
- C. La prolactine seule, stimulée par le stress et la fatigue de la mère
- D. L'insuline rapide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Les avantages de l'allaitement pour le bébé incluent :

- A. Une protection contre certaines infections ✓ **bonne réponse**
- B. Une absence totale de maladies
- C. Une croissance plus rapide que la normale
- D. Aucun avantage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Une mère qui reprend le travail et veut poursuivre l'allaitement peut :

- A. Arrêter l'allaitement deux semaines avant la reprise pour habituer le bébé au biberon
- B. Tirer et conserver son lait ✓ **bonne réponse**
- C. Allaiter seulement une fois par semaine
- D. Donner du lait non conservé au froid

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Les signes d'une bonne succion au sein :

- A. Succions amples, déglutitions audibles ✓ **bonne réponse**
- B. Des succions rapides et superficielles, joues creusées, avec des bruits de claquement
- C. Douleur intense de la mère pendant toute la tétée
- D. Bruits de claquement de langue

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

Anesthésie générale 20 questions

1 Avant une anesthésie programmée, le jeûne habituel pour les solides est d'au moins :

- A. 30 minutes
- B. 24 heures
- C. 1 heure
- D. 6 heures ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Les liquides clairs (eau, thé sans lait) sont généralement autorisés jusqu'à :

- A. 24 heures avant
- B. 2 heures avant l'anesthésie ✓ **bonne réponse**
- C. Ils sont interdits dès la veille
- D. 12 heures avant

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le propofol est :

- A. Un curare non dépolarisant de courte durée
- B. Un antalgique morphinique
- C. Un morphinique puissant utilisé pour l'analgésie peropératoire
- D. Un hypnotique intraveineux ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4	Quel est l'antidote des morphiniques ?	A. La naloxone ✓ bonne réponse B. La néostigmine C. Le flumazénil D. L'atropine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Quel est l'antidote des benzodiazépines ?	A. La vitamine K B. La protamine C. Le flumazénil ✓ bonne réponse D. La naloxone	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La consultation d'anesthésie a lieu :	A. Uniquement après l'intervention B. Quelques jours avant l'intervention ✓ bonne réponse C. Elle est facultative pour les interventions programmées D. Au bloc, juste avant l'induction, pour gagner du temps sur le programme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les trois composantes classiques de l'anesthésie générale sont :	A. Hypnose, analgésie, curarisation si besoin ✓ bonne réponse B. Hydratation, nutrition et marche C. Sédation légère, anesthésie locale et ventilation spontanée sans surveillance D. Fièvre, toux et douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un curare provoque :	A. Un sommeil profond et une analgésie, sans effet sur la respiration B. Une paralysie musculaire ✓ bonne réponse C. Une augmentation de la vigilance D. Une analgésie seule	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'induction en « séquence rapide » est indiquée chez un patient :	A. Uniquement chez les enfants, pour raccourcir le temps passé au bloc B. Uniquement pour une anesthésie locale C. À jeun depuis la veille sans risque D. À l'estomac plein ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La vérification de l'appareil d'anesthésie se fait :	A. Uniquement en cas de panne B. Une fois par an, lors de la maintenance réalisée par le fabricant C. Avant chaque programme ✓ bonne réponse D. Par le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	L'hyperthermie maligne est une complication rare déclenchée notamment par :	A. Le sérum physiologique B. Le paracétamol injectable et les antibiotiques administrés au bloc C. L'oxygène D. Halogénés et succinylcholine ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Le traitement spécifique de l'hyperthermie maligne est : A. La naloxone B. Le dantrolène ✓ bonne réponse C. La vitamine K D. L'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient à risque de nausées et vomissements postopératoires peut recevoir : A. Aucune prévention B. Une prophylaxie antiémétique ✓ bonne réponse C. Une dose de morphine plus élevée, pour éviter que la douleur ne provoque des nausées D. Un repas avant l'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La sévoflurane est : A. Un morphinique de synthèse B. Un curare non dépolarisant C. Un curare d'action rapide utilisé pour l'intubation D. Un halogéné inhalé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La kétamine a pour particularité de : A. Être un antiémétique utilisé en salle de réveil B. Provoquer une paralysie musculaire nécessitant toujours une intubation C. Préserver la ventilation spontanée ✓ bonne réponse D. Être un curare de courte durée d'action	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le score ASA sert à évaluer : A. L'état de santé général du patient avant l'anesthésie (risque anesthésique) ✓ bonne réponse B. La durée de l'intervention C. La douleur postopératoire prévisible D. La difficulté prévisible de l'intubation à partir de l'ouverture de bouche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Avant l'induction, l'équipe vérifie notamment : A. Le menu du soir B. Identité, jeûne, allergies, matériel ✓ bonne réponse C. La couleur de la blouse D. Rien de plus : la consultation d'anesthésie a déjà tout vérifié quelques jours avant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'anesthésie locorégionale (rachianesthésie, péridurale) consiste à : A. Donner un antalgique par la bouche B. Anesthésier une région du corps ✓ bonne réponse C. Bloquer tous les muscles du corps D. Endormir le patient par voie intraveineuse, sans intubation, pour une courte intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Une complication possible de la rachianesthésie est :

- A. Une hypotension artérielle ✓ bonne réponse
- B. Une hyperglycémie systématique
- C. Une perte de cheveux
- D. Une fracture

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La toxicité des anesthésiques locaux peut se manifester par :

- A. Une diarrhée et des vomissements répétés
- B. Une simple rougeur au point d'injection, sans autre conséquence
- C. Une fièvre isolée
- D. Des signes neurologiques et cardiaques ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Intubation et ventilation 20 questions

1 La manœuvre de Sellick consiste à :

- A. Comprimer le thorax
- B. Appuyer sur le cartilage cricoïde ✓ bonne réponse
- C. Surélever les jambes du patient en position décline
- D. Basculer la tête en arrière et tirer la mâchoire vers l'avant pour dégager la langue

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel est le moyen le plus fiable pour confirmer la position de la sonde d'intubation dans la trachée ?

- A. La capnographie ✓ bonne réponse
- B. La buée dans la sonde et le soulèvement du thorax à l'insufflation
- C. La couleur de la peau
- D. Le nombre de centimètres seul

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Avant l'intubation, la pré-oxygénation se fait :

- A. Avec de l'oxygène pur environ 3 minutes ✓ bonne réponse
- B. Avec de l'air enrichi à 30 % d'oxygène pendant une dizaine de secondes
- C. À l'air ambiant, patient en position assise
- D. Uniquement après l'intubation et l'induction

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) sert à :

- A. Réchauffer le patient
- B. Aspirer les sécrétions
- C. Administrer de l'oxygène à un patient qui respire seul, sans aucune pression
- D. Ventiler manuellement un patient ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une désaturation brutale chez un patient intubé et ventilé doit faire rechercher en priorité :

- A. Une erreur de la tension
- B. Une hyperthermie ou une réaction allergique aux produits anesthésiques
- C. Un problème de sonde ou de ventilateur ✓ bonne réponse
- D. Une hypoglycémie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	La laryngoscopie permet de : A. Visualiser la glotte ✓ bonne réponse B. Aspirer le contenu de l'estomac avant l'induction de l'anesthésie C. Mesurer la tension D. Prendre la température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une intubation sélective dans la bronche souche droite se manifeste par : A. Une fièvre B. Une hypertension isolée C. Une diminution du bruit respiratoire à droite et un thorax qui se soulève mieux à gauche D. Un murmure vésiculaire diminué à gauche ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le ballonnet de la sonde d'intubation sert à : A. Humidifier l'air B. Mesurer la température C. Assurer l'étanchéité ✓ bonne réponse D. Maintenir la sonde en place dans la trachée, la fixation externe devenant inutile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La pression du ballonnet est contrôlée pour éviter : A. La fièvre B. Les allergies C. L'hypoglycémie D. Les lésions de la trachée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le masque laryngé est : A. Un masque à oxygène simple B. Un dispositif supraglottique utilisé pour ventiler sans intubation trachéale ✓ bonne réponse C. Un masque chirurgical D. Une sonde introduite dans la trachée, plus courte qu'une sonde d'intubation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Une intubation difficile imprévue nécessite : A. D'appeler de l'aide et de suivre l'algorithme ✓ bonne réponse B. De réveiller le chirurgien C. De multiplier rapidement les tentatives de laryngoscopie avant d'appeler de l'aide D. D'arrêter l'oxygène et de retirer la sonde d'intubation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Le volume courant habituellement réglé chez l'adulte en ventilation protectrice est d'environ : A. 6 à 8 mL/kg de poids idéal ✓ bonne réponse B. 12 à 15 mL/kg C. 2 à 3 mL/kg D. 20 mL/kg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 La PEP (pression expiratoire positive) sert à : A. Maintenir les alvéoles ouvertes ✓ bonne réponse B. Endormir le patient C. Diminuer la pression dans les voies aériennes pendant l'inspiration D. Augmenter la fréquence cardiaque	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une alarme de pression haute sur le respirateur peut indiquer : A. Sonde coudée, sécrétions, bronchospasme ✓ bonne réponse B. Une batterie chargée C. Une déconnexion du circuit ou une fuite au niveau du ballonnet D. Un patient qui dort bien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une alarme de pression basse sur le respirateur évoque en premier : A. Une déconnexion ou une fuite ✓ bonne réponse B. Une fièvre C. Un bronchospasme ou une sonde coudée par la morsure du patient D. Un patient trop sédaté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'aspiration trachéale chez un patient intubé se fait : A. Pendant plusieurs minutes, pour retirer toutes les sécrétions en une seule fois B. Aseptique, sonde adaptée, durée courte ✓ bonne réponse C. Sans oxygénation préalable même si le patient désature D. Avec la même sonde pour plusieurs patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La position de la sonde d'intubation est notée en centimètres : A. Au niveau de la narine, quelle que soit la voie d'intubation B. Au niveau du sternum, sur la ligne médiane C. Aux dents ou à la commissure ✓ bonne réponse D. Au niveau du lobe de l'oreille du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le bronchospasme se manifeste par : A. Une augmentation de la diurèse B. Des sifflements, une difficulté à ventiler et une baisse de la saturation ✓ bonne réponse C. Une baisse des pressions d'insufflation et une augmentation du CO2 expiré D. Une diarrhée et des douleurs abdominales aiguës	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Avant l'extubation, on vérifie notamment : A. Que le patient a mangé B. Uniquement l'heure C. Uniquement que la saturation est supérieure à 90 % sous oxygène pur D. Réveil, ventilation efficace, décurarisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La fraction inspirée en oxygène (FiO2) de l'air ambiant est d'environ : A. 50 % B. 21 % ✓ bonne réponse C. 100 % D. 5 %	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	La pression artérielle moyenne (PAM) se calcule approximativement par : A. $(PAS + 2 \times PAD) / 3$ ✓ bonne réponse B. $PAS \times 2$ C. $PAS - PAD$ D. $(PAS + 2 \times PAD) / 2$	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Le monitoring minimal d'une anesthésie générale comprend : A. ECG, PA, SpO2, capnographie ✓ bonne réponse B. Uniquement la diurèse et la température cutanée C. Uniquement la température D. La SpO2 et la fréquence cardiaque, la capnographie étant réservée à la réanimation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Sur l'ECG du scope, une ligne plate chez un patient inconscient doit d'abord faire : A. Changer d'abord les électrodes et le câble, puis attendre une minute avant de conclure B. Changer d'imprimante C. Attendre la fin de l'intervention D. Vérifier patient et électrodes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Une bradycardie sévère au bloc peut être traitée en première intention par : A. Le propofol B. Un bêtabloquant injectable, pour régulariser le rythme cardiaque C. Le furosémide D. L'atropine ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	La pression artérielle invasive est mesurée grâce à : A. Un thermomètre tympanique B. Un brassard au bras automatique C. Un cathéter artériel ✓ bonne réponse D. Un brassard automatique gonflé toutes les minutes au bras opposé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le capteur de pression d'une ligne artérielle doit être placé : A. Au niveau du point de ponction artérielle, au poignet du patient B. Au niveau de l'oreillette droite ✓ bonne réponse C. Au niveau du sol D. Au-dessus de la tête	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mmHg chez l'adulte en réanimation est en général : A. Insuffisante pour perfuser les organes ✓ bonne réponse B. Idéale C. Élevée D. Sans importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8	La capnographie mesure :	A. Le CO₂ dans l'air expiré ✓ bonne réponse B. L'oxygène dans le sang veineux C. La glycémie D. La température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une chute brutale du CO₂ expiré pendant une anesthésie peut signaler :	A. Une amélioration de l'état du patient B. Une hyperventilation volontaire du patient en cours de réveil, sans gravité C. Un réveil normal et une reprise de la respiration D. Une déconnexion, une embolie, un arrêt ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le monitoring de la curarisation (train de quatre) sert à :	A. Évaluer la profondeur du sommeil anesthésique B. Mesurer la diurèse C. Mesurer la tension D. Évaluer la curarisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La pression veineuse centrale se mesure à l'aide :	A. D'un cathéter périphérique au pied B. D'une sonde urinaire C. D'un cathéter veineux central ✓ bonne réponse D. D'un brassard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Sur l'ECG, une fibrillation ventriculaire est :	A. Une tachycardie rapide mais bien tolérée, à surveiller sans traitement B. Une bradycardie sans gravité C. Un rythme normal D. Un rythme choquable ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Une asystolie est :	A. Une hypertension B. Une tachycardie C. Une tachycardie rapide et régulière D. Une absence d'activité électrique cardiaque (rythme non choquable) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	La température centrale se surveille au bloc pour prévenir :	A. L'hypothermie ✓ bonne réponse B. Les réactions allergiques aux produits d'anesthésie C. La fracture du col D. Le diabète insulino-dépendant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	La diurèse horaire est un reflet :	A. De la douleur B. De la perfusion rénale ✓ bonne réponse C. De la profondeur du sommeil D. De la fonction respiratoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 L'index bispectral (BIS) sert à évaluer : A. Le niveau de curarisation des muscles B. Le débit urinaire horaire en salle C. La fréquence respiratoire du patient D. La profondeur de l'hypnose ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les alarmes du scope doivent être : A. Réglées avec les mêmes seuils pour tous les patients du service B. Adaptées au patient, jamais coupées ✓ bonne réponse C. Toujours désactivées pour le calme D. Ignorées la nuit pour ne pas réveiller les patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une hypotension après l'induction est souvent traitée en première intention par : A. Un diurétique pour éliminer l'excès de liquide perfusé pendant l'induction B. Un antibiotique C. Remplissage et/ou vasopresseur ✓ bonne réponse D. Un arrêt de l'oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les électrodes de l'ECG à 3 brins se placent classiquement : A. Sur le visage B. Rouge à droite, jaune à gauche, verte en bas à gauche ✓ bonne réponse C. Sur le dos uniquement D. Rouge à gauche sous la clavicule, jaune à droite sous la clavicule, verte en bas à droite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une saturation qui chute alors que la courbe de pouls est de mauvaise qualité doit faire : A. Augmenter l'oxygène sans regarder le patient, la valeur affichée faisant foi B. Arrêter l'oxygène C. Ignorer l'alarme si le patient paraît bien D. Vérifier capteur et patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Surveillance post-interventionnelle 20 questions

1 Le score d'Aldrete sert à : A. Évaluer la douleur postopératoire et adapter les doses de morphine B. Autoriser la sortie de SSPI ✓ bonne réponse C. Évaluer le risque d'escarre D. Évaluer la profondeur de l'anesthésie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quel est le premier signe de dépression respiratoire liée aux morphiniques à surveiller ? A. Des démangeaisons et des nausées, qui précèdent toujours l'arrêt respiratoire B. La sédation ✓ bonne réponse C. Une hypertension isolée D. La fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 En salle de réveil, des frissons avec température à 35 °C nécessitent : A. Un bain froid B. Un réchauffement actif ✓ bonne réponse C. Une surveillance simple : les frissons disparaissent toujours seuls en quelques minutes D. Une sortie immédiate	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Une échelle numérique de la douleur à 7/10 en SSPI signifie : A. Une douleur absente B. Une douleur modérée, habituelle après une chirurgie, à réévaluer dans 2 heures C. Une douleur importante ✓ bonne réponse D. Une douleur normale à ignorer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 En salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), la surveillance porte sur : A. Uniquement la tension artérielle et la diurèse B. Uniquement la tension et la saturation, le reste étant surveillé dans le service C. Uniquement la douleur et la température cutanée D. Conscience, respiration, circulation, douleur ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un patient ronfle bruyamment en SSPI avec une saturation qui baisse. Il faut penser à : A. Une diurèse abondante après l'intervention B. Une obstruction des voies aériennes (subluxer la mâchoire, oxygène, alerter) ✓ bonne réponse C. Un sommeil réparateur normal après l'anesthésie, sans action particulière D. Une simple fatigue liée à l'anesthésie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Des nausées et vomissements en SSPI exposent à : A. Une meilleure récupération B. Une baisse de la douleur C. Un risque d'inhalation ✓ bonne réponse D. Un réveil plus rapide, car les vomissements éliminent les produits anesthésiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un globe vésical en SSPI se manifeste par : A. Agitation, douleur, masse sus-pubienne ✓ bonne réponse B. Une diarrhée et des douleurs abdominales diffuses, sans masse palpable C. Une diarrhée et des nausées après l'anesthésie D. Une baisse de la température et des frissons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La morphine titrée en SSPI consiste à : A. Ne jamais traiter la douleur B. Donner de petites doses répétées ✓ bonne réponse C. Donner une forte dose unique dès l'arrivée, pour éviter de réveiller le patient ensuite D. Donner une forte dose unique sans surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Un saignement important sur le pansement en SSPI doit faire : A. Prévenir l'anesthésiste et le chirurgien ✓ bonne réponse B. Renforcer le pansement par-dessus et surveiller jusqu'au retour dans le service C. Attendre le lendemain D. Retirer les drains et refaire un pansement compressif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La surveillance après une rachianesthésie comprend notamment : A. La motricité et la sensibilité des jambes ✓ bonne réponse B. La glycémie capillaire et la diurèse uniquement C. Uniquement la température et la couleur des pieds D. Uniquement la température, la rachianesthésie n'ayant pas d'effet sur la tension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le frisson postopératoire augmente : A. La vision et l'audition du patient B. La diurèse et la température centrale de façon durable C. La glycémie uniquement D. La consommation d'oxygène ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les critères de sortie de SSPI reposent sur : A. Une durée fixe de 30 minutes en SSPI, quelle que soit l'intervention B. Un score validé et l'avis de l'anesthésiste ✓ bonne réponse C. La demande de la famille D. Le nombre de lits disponibles uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une décurarisation incomplète peut se manifester par : A. Une hyperactivité B. Une hypertension isolée C. Faiblesse musculaire, gêne respiratoire ✓ bonne réponse D. Une fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient agité et confus au réveil : avant tout, on recherche : A. Un problème administratif B. Rien, on le sédate sans chercher C. Une hypoxie, une douleur, un globe vésical ou une hypoglycémie ✓ bonne réponse D. Un problème administratif ou une contrariété familiale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La surveillance de l'enfant en SSPI nécessite : A. Des normes adaptées à l'âge ✓ bonne réponse B. Aucune surveillance particulière C. Les mêmes normes que l'adulte, sans présence des parents pour éviter de les inquiéter D. Un jeûne prolongé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Les drains chirurgicaux sont surveillés pour :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Leur couleur décorative B. Le bruit qu'ils font et leur longueur C. Leur prix D. La quantité et l'aspect de ce qui s'écoule ✓ bonne réponse	
18	Un patient opéré sous anesthésie générale peut en général boire :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une fois bien réveillé, selon la prescription ✓ bonne réponse B. Uniquement de l'alcool C. Jamais avant 24 heures, quelle que soit l'intervention et l'état de réveil D. Immédiatement à l'arrivée en SSPI, encore endormi	
19	Les transmissions à la sortie de SSPI comprennent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Intervention, anesthésie, antalgiques, constantes, consignes ✓ bonne réponse B. Uniquement l'heure C. Le nom du patient et l'intervention, le reste figurant dans le dossier informatique D. Rien si tout s'est bien passé	
20	Une SpO2 à 88 % en SSPI chez un patient sans pathologie respiratoire impose :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Faire sortir le patient de SSPI B. Couper l'alarme C. Attendre 30 minutes D. Stimuler, oxygéner, vérifier les voies aériennes ✓ bonne réponse	

Imagerie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)

Radioprotection 20 questions

1	Les trois principes de la radioprotection sont :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Temps, distance et écran, appliqués à chaque examen B. Prévention, traitement, suivi C. Justification, optimisation, limitation ✓ bonne réponse D. Rapidité, précision, efficacité	
2	Quels sont les trois moyens de se protéger d'une source de rayonnement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Température, pression, humidité B. Gants, masque, lunettes de soleil C. Temps, distance, écran ✓ bonne réponse D. Lavage, désinfection, stérilisation	
3	Avant un examen radiologique chez une femme en âge de procréer, il faut :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Vérifier son groupe sanguin B. Rechercher une grossesse ✓ bonne réponse C. Rien de particulier D. Vérifier son groupe sanguin et ses allergies à l'iode, même sans injection	

4 Le dosimètre individuel porté par le personnel sert à : A. Mesurer la dose reçue ✓ bonne réponse B. Mesurer la tension artérielle C. Prévenir le manipulateur par une alarme lorsqu'il entre dans la zone contrôlée D. Mesurer le temps de travail	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le principe ALARA signifie : A. Augmenter les doses pour une meilleure image B. Des doses aussi basses que raisonnablement possible ✓ bonne réponse C. Appliquer à chaque patient le même réglage standard pour comparer les images D. Ne jamais faire de radiographie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 L'unité de dose efficace utilisée en radioprotection est : A. Le sievert (Sv), souvent exprimé en millisievert (mSv) ✓ bonne réponse B. Le décibel C. Le gray (Gy) D. Le becquerel (Bq)	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Doubler la distance à une source de rayons X divise la dose reçue environ par : A. 4 ✓ bonne réponse B. 2, la dose étant proportionnelle à la distance C. 10 D. Elle ne change pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le tablier plombé protège : A. Contre le rayonnement direct du faisceau principal, même en se plaçant dans le champ B. Du rayonnement diffusé ✓ bonne réponse C. Contre les infections D. Contre le bruit de l'appareil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le cache-thyroïde est utile car la thyroïde est : A. Un organe qui fixe le produit de contraste iodé pendant les radiographies standard B. Insensible aux rayons C. Un organe radiosensible ✓ bonne réponse D. Un organe de protection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La zone contrôlée d'un service d'imagerie est : A. Signalée et à accès réglementé ✓ bonne réponse B. Un vestiaire C. Une salle d'attente libre d'accès D. Une zone libre d'accès pour le personnel, sans signalisation particulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 La collimation du faisceau consiste à : A. Ouvrir au maximum le champ pour ne rien manquer B. Augmenter la dose pour obtenir une image plus contrastée de la zone étudiée C. Limiter le champ à la zone utile ✓ bonne réponse D. Augmenter la dose pour améliorer la qualité de l'image	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Chez l'enfant, la radioprotection est renforcée car : A. Ses tissus sont plus sensibles et son espérance de vie plus longue ✓ bonne réponse B. Il ne bouge jamais pendant l'examen radiologique C. Les appareils sont différents D. Les doses n'ont aucun effet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le parent qui maintient un enfant pendant une radiographie doit : A. Se placer dans le faisceau B. Se placer derrière le paravent et laisser l'enfant seul sur la table pendant l'exposition C. Porter un tablier, ne pas être enceinte ✓ bonne réponse D. Tenir l'enfant à mains nues dans le champ	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le principe de justification signifie : A. Qu'on refait toujours l'examen deux fois B. Que chaque examen doit utiliser la dose la plus faible, même si l'image est inexploitable C. Un bénéfice supérieur au risque ✓ bonne réponse D. Qu'on justifie la facture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le dosimètre passif doit être porté : A. Seulement à la maison B. Sur le poignet du patient C. Dans le vestiaire, à l'abri des rayonnements D. Sur la poitrine, sous le tablier plombé selon les consignes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un examen de remplacement non irradiant est à privilégier quand c'est possible, par exemple : A. Une scintigraphie B. L'échographie ou l'IRM ✓ bonne réponse C. Un scanner D. Une radiographie de plus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Pendant une exposition en salle de radiologie, le manipulateur se place : A. Derrière le paravent ✓ bonne réponse B. Dans le faisceau C. À côté du patient avec un tablier plombé, pour le rassurer pendant l'exposition D. À côté du patient sans protection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Le voyant lumineux « rayons X en cours » à l'entrée de la salle signifie : A. Ne pas entrer ✓ bonne réponse B. Que la salle est prête et que le patient suivant peut entrer C. Que la salle est libre D. Que le patient est sorti	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'effet des rayonnements ionisants à faible dose est surtout un risque : A. D'allergie B. Une brûlure cutanée immédiate, visible quelques heures après chaque examen C. De brûlure immédiate systématique D. Probabiliste, à long terme ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les doses reçues par le personnel exposé sont : A. Jamais contrôlées chez l'adulte B. Mesurées une fois par an lors de la visite médicale, sans limite réglementaire C. Suivies et limitées ✓ bonne réponse D. Sans limite pour les patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Radiologie conventionnelle 20 questions

1 Une radiographie pulmonaire de face standard se fait de préférence : A. Couché, en expiration forcée B. Debout, en inspiration bloquée ✓ bonne réponse C. Assis, en expiration complète, pour mieux voir les bases pulmonaires D. Debout, en toussant pendant l'exposition	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Pour la radiographie d'un membre traumatisé, on réalise habituellement : A. Une seule incidence de face B. Uniquement un profil C. Deux incidences : face et profil ✓ bonne réponse D. Une incidence oblique seule	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Avant une radiographie, on demande au patient de retirer : A. Rien du tout, la radiographie traversant le métal B. Ses chaussettes uniquement C. Le métal de la zone examinée ✓ bonne réponse D. Tous ses vêtements, même pour une radiographie d'un doigt	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Sur une radiographie standard, l'os apparaît : A. Blanc (radio-opaque) ✓ bonne réponse B. Transparent C. Noir D. Gris foncé comme l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5	L'air apparaît sur une radiographie :	A. Invisible B. Blanc C. Noir ✓ bonne réponse D. Blanc, comme les structures osseuses denses	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Une radiographie de thorax « de profil » permet notamment :	A. De remplacer le scanner dans tous les cas B. De mieux localiser une lésion vue de face ✓ bonne réponse C. De mesurer la tension D. D'étudier les dents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Avant une radiographie, le manipulateur vérifie :	A. Identité, prescription, zone à radiographier ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur des vêtements et l'absence de bijoux C. Uniquement le nom du médecin prescripteur et la date D. Uniquement le nom inscrit sur la prescription, l'identité étant vérifiée à l'accueil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Pour une radiographie du bassin chez une femme jeune, on interroge sur :	A. Ses allergies alimentaires uniquement B. Ses horaires de travail C. Une possible grossesse ✓ bonne réponse D. Son groupe sanguin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La radiographie au lit du patient (mobile) est utilisée :	A. Jamais B. Uniquement pour les radios dentaires programmées C. Quand le patient n'est pas transportable ✓ bonne réponse D. Pour tous les patients hospitalisés, afin d'éviter les brancardages	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le flou cinétique sur une image est dû :	A. À la couleur de la peau B. À une dose trop faible ou à un mauvais réglage de la tension du tube C. À la température de la salle D. Aux mouvements du patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	L'incidence « face » d'une main se réalise :	A. Paume à plat sur le détecteur ✓ bonne réponse B. Main dans le dos C. Main en l'air, au-dessus de la tête D. Main de profil, pouce vers le haut, doigts écartés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Les objets métalliques dans la zone examinée :	A. N'ont aucune influence avec les détecteurs numériques actuels B. Sont obligatoires C. Améliorent l'image D. Sont retirés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 La mammographie est un examen utilisant : A. Des ultrasons uniquement B. Des rayons X avec compression ✓ bonne réponse C. Un champ magnétique et des ondes radio D. Des ultrasons, sans aucune irradiation, avec un gel de contact	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) peut montrer : A. Des niveaux hydro-aériques ✓ bonne réponse B. Le fonctionnement du cerveau C. Le fonctionnement des reins et la présence de sang dans les urines D. La tension artérielle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le contrôle de qualité de l'image vérifie : A. Centrage, exposition, absence d'artéfact ✓ bonne réponse B. Uniquement la présence du nom du patient et la date sur l'image C. La signature du patient sur le bon d'examen D. La couleur de l'écran uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le PACS est : A. Un produit de contraste B. Un logiciel de facturation des actes de radiologie C. Le système d'archivage et de transmission des images ✓ bonne réponse D. Un type de scanner	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 En traumatologie du rachis cervical, le manipulateur : A. Fait tourner la tête du patient pour mieux voir B. Mobilise en bloc, axe maintenu, sur avis médical ✓ bonne réponse C. Fait asseoir le patient rapidement D. Retire le collier cervical sans avis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une radiographie de thorax de face est réalisée de préférence : A. En expiration forcée B. Postéro-antérieure (dos au tube) ✓ bonne réponse C. Allongé sur le ventre, face au détecteur D. En antéro-postérieure, dos contre le détecteur, pour tous les patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les clichés comparatifs (côté sain) sont parfois utiles : A. Pour la facturation B. Chez l'enfant (cartilages de croissance) ✓ bonne réponse C. Jamais D. Pour remplacer l'examen clinique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 L'identification de chaque image comprend : A. Nom, date, repère droite/gauche ✓ bonne réponse B. Le prix de l'examen C. Le nom du manipulateur et la référence de l'appareil utilisé D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Quelle est la principale contre-indication à l'IRM ? A. Une prothèse dentaire en résine ou des lentilles de contact souples B. Le diabète C. Certains implants (pacemaker non compatible...) ✓ bonne réponse D. Le port de lentilles de contact ou de lunettes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Avant l'injection d'un produit de contraste iodé, on recherche notamment : A. Un groupe sanguin rare B. Un antécédent d'appendicectomie C. Une allergie et une insuffisance rénale ✓ bonne réponse D. Une myopie ou un daltonisme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	L'IRM utilise : A. Un champ magnétique et des radiofréquences ✓ bonne réponse B. Des ultrasons C. Des rayons X D. Des rayons X à faible dose associés à un champ électrique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le scanner (tomodensitométrie) utilise : A. Des ultrasons B. Des rayons X ✓ bonne réponse C. Aucun rayonnement D. Un champ magnétique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Chez un patient diabétique traité par metformine, l'injection d'iode impose surtout de : A. Contre-indiquer définitivement l'examen B. Arrêter définitivement la metformine et la remplacer par de l'insuline C. Doubler la dose de metformine D. Vérifier la fonction rénale et suivre le protocole d'arrêt temporaire si nécessaire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Avant une IRM, le patient doit retirer : A. Tous les objets métalliques ✓ bonne réponse B. Rien C. Uniquement ses bijoux en or, les autres métaux n'étant pas attirés D. Ses lunettes de vue uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le questionnaire de sécurité avant IRM recherche notamment : A. Le niveau d'études B. Pacemaker, implants, éclats métalliques ✓ bonne réponse C. Le groupe sanguin D. Les préférences alimentaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le produit de contraste utilisé en IRM est le plus souvent : A. De l'air B. À base d'iode C. À base de gadolinium ✓ bonne réponse D. Du baryum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Le bruit pendant une IRM impose de : A. Protéger l'audition du patient ✓ bonne réponse B. Ne rien prévoir C. Augmenter le volume de la musique D. Laisser la porte de la salle ouverte pour que le patient se sente moins enfermé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un patient claustrophobe avant une IRM peut être aidé par : A. Un examen sans le prévenir B. Explications, contact verbal, prémédication si prescrite ✓ bonne réponse C. Une contention forcée D. Le laisser seul sans information	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un objet métallique ferromagnétique introduit en salle d'IRM peut : A. Être sans danger s'il est petit, comme un stylo ou une paire de ciseaux B. Être violemment attiré par l'aimant ✓ bonne réponse C. Améliorer la qualité des images de l'examen D. Arrêter le champ magnétique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le champ magnétique d'une IRM est : A. Actif uniquement pendant l'examen B. Toujours actif ✓ bonne réponse C. Coupé entre deux patients et rallumé au début de chaque examen D. Inexistant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour un scanner avec injection d'iode, on demande souvent : A. Un test d'effort et une échographie cardiaque B. Un bilan ophtalmologique C. Un bilan de la fonction rénale récent selon les facteurs de risque ✓ bonne réponse D. Un électroencéphalogramme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une réaction allergique à l'iode pendant l'injection se manifeste par : A. Une sensation de chaleur généralisée et un goût métallique, toujours graves B. Urticaire, gêne respiratoire, hypotension ✓ bonne réponse C. Une meilleure qualité d'image D. Une faim soudaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Après une injection de produit de contraste iodé, on conseille en général : A. De faire du sport intense immédiatement B. De bien s'hydrater ✓ bonne réponse C. De jeûner 3 jours D. De ne pas boire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16	Une extravasation de produit de contraste au point d'injection impose :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. D'arrêter, surélever le membre, prévenir ✓ bonne réponse B. De ne rien faire C. De masser fortement la zone et d'appliquer de la chaleur pour disperser le produit D. D'augmenter le débit	
17	Le scanner est particulièrement utile en urgence pour :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Rechercher un saignement intracrânien ✓ bonne réponse B. Remplacer l'échographie cardiaque C. Mesurer la glycémie D. Étudier un fœtus en première intention chez une femme enceinte traumatisée	
18	Le coroscanner ou l'angioscanner nécessitent souvent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Aucune voie veineuse, l'injection étant intramusculaire B. Une voie veineuse de bon calibre ✓ bonne réponse C. Un jeûne de 48 heures D. Une anesthésie générale et une intubation chez tous les patients	
19	Les patients diabétiques sous metformine doivent signaler leur traitement avant :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une prise de tension B. Une radiographie du doigt C. Une injection d'iode ✓ bonne réponse D. Une radiographie standard du thorax ou d'un membre	
20	Un implant « compatible IRM sous conditions » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un examen possible sous conditions ✓ bonne réponse B. Que tout examen est interdit pendant six mois C. Que l'examen est possible uniquement sur les appareils les plus puissants D. Qu'il n'y a aucune précaution particulière à prendre	

Laboratoire / biologie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale

Phase pré-analytique 20 questions

1	Un tube arrive au laboratoire sans étiquette d'identification. Que faire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le refuser, redemander un prélèvement ✓ bonne réponse B. Le traiter et deviner le patient C. L'étiqueter avec le patient le plus probable D. L'analyser et rendre le résultat au service, qui retrouvera le patient concerné	
2	La glycémie à jeun se prélève après un jeûne d'au moins :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 1 heure B. 24 heures C. 8 heures ✓ bonne réponse D. 30 minutes	

3	Une hémolyse de l'échantillon augmente faussement notamment : A. Le sodium B. Le potassium ✓ bonne réponse C. Les plaquettes D. La glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un tube pour bilan d'hémostase (citrate) insuffisamment rempli : A. Fausse les résultats ✓ bonne réponse B. Donne des résultats plus précis C. Peut être analysé normalement si le laboratoire corrige le résultat par le calcul D. Est sans conséquence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un échantillon pour gazométrie artérielle doit être : A. Laisser à l'air libre une heure B. Congelé avant analyse C. Laisser débouché quelques minutes pour équilibrer l'oxygène avant l'analyse D. Analysé vite, sans bulle ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La phase pré-analytique comprend : A. Tout ce qui précède l'analyse ✓ bonne réponse B. La validation biologique des résultats et la transmission du compte rendu C. Uniquement la validation des résultats D. Uniquement la facturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La majorité des erreurs de laboratoire surviennent : A. En pré-analytique ✓ bonne réponse B. Pendant l'analyse automatisée, à cause des pannes et des réactifs C. Jamais D. Pendant l'analyse automatisée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un échantillon de sang pour bilan d'hémostase doit être acheminé : A. Dans la glace pilée, avec une agitation régulière pendant le transport B. Congelé C. Vite, à température ambiante ✓ bonne réponse D. Au soleil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Un tube coagulé alors qu'il devait rester liquide (EDTA) est le plus souvent dû à : A. Un patient à jeun B. Une homogénéisation insuffisante ✓ bonne réponse C. Un prélèvement réalisé chez un patient sous anticoagulant D. Un tube trop rempli de façon correcte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Pour un dosage de la kaliémie, un prélèvement fait avec un garrot prolongé et le poing serré peut : A. Diminuer faussement la glycémie du patient B. Diminuer faussement le potassium par dilution du sang C. Augmenter faussement la kaliémie ✓ bonne réponse D. N'avoir aucun effet sur les résultats du bilan	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 La recherche de sang dans les selles, les urines de 24 h ou certains dosages hormonaux nécessitent : A. Un jeûne de 3 jours B. Des consignes précises de recueil ✓ bonne réponse C. Un prélèvement au hasard D. Aucune explication	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le recueil des urines de 24 heures commence : A. En gardant les premières urines du matin et en jetant celles de la nuit suivante B. En gardant les urines du matin et en jetant les autres C. Sur une seule miction, prélevée au milieu du jet, le matin à jeun D. Premières urines du matin jetées, puis tout recueillir 24 h ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un prélèvement destiné à un dosage d'ammoniémie doit être : A. Congelé à -20 °C sans délai B. Agité fortement C. Transporté rapidement dans la glace ✓ bonne réponse D. Lissé à température ambiante plusieurs heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La feuille de demande d'examens doit comporter : A. Uniquement le nom du patient et les examens, le reste étant noté par le laboratoire B. Uniquement le nom du préleveur et le numéro du service demandeur C. Uniquement le nom du préleveur D. Identité, prescripteur, examens, date et heure ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un échantillon lipémique (sérum laiteux) peut : A. Être sans conséquence B. Améliorer la précision C. Indiquer une hémolyse et une augmentation du potassium dans tous les cas D. Interférer avec certaines analyses ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le délai entre prélèvement et centrifugation est important car : A. Certains paramètres évoluent ✓ bonne réponse B. Il n'a aucune importance C. Le tube change de couleur D. La centrifugation doit attendre au moins 24 heures pour que le sérum se forme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le transport des prélèvements biologiques se fait : A. En triple emballage ✓ bonne réponse B. Dans un sac plastique simple, fermé, avec les autres documents du service C. Dans un sac poubelle D. Dans la poche du coursier sans protection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Pour un dosage de médicament (taux résiduel), le prélèvement se fait :

- A. À n'importe quel moment
- B. Deux heures après la prise du médicament
- C. Juste avant la prise suivante du médicament ✓ bonne réponse
- D. Juste après la prise

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Un échantillon non conforme (tube inadapté) est :

- A. Traité selon la procédure ✓ bonne réponse
- B. Toujours analysé, quelle que soit sa conformité
- C. Analysé normalement, le résultat étant accompagné d'un commentaire du technicien
- D. Jeté sans prévenir

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le prélèvement pour une sérologie nécessite en général :

- A. Un tube sec (sérum) ✓ bonne réponse
- B. Un tube citraté
- C. Un flacon d'hémoculture
- D. Un pot à urine

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Hématologie 20 questions

1 Le taux normal d'hémoglobine chez une femme adulte est d'environ :

- A. 18 à 22 g/dL
- B. 5 à 8 g/dL
- C. 12 à 16 g/dL ✓ bonne réponse
- D. 1 à 3 g/dL

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le nombre normal de plaquettes chez l'adulte est d'environ :

- A. 1 à 2 millions /mm³ de sang
- B. 10 000 à 50 000 /mm³
- C. 150 000 à 400 000 /mm³ ✓ bonne réponse
- D. 4 000 à 10 000 /mm³ de sang

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le nombre normal de leucocytes chez l'adulte est d'environ :

- A. 500 à 1 000 /mm³
- B. 150 000 à 400 000 /mm³
- C. 4 000 à 10 000 /mm³ ✓ bonne réponse
- D. 50 000 /mm³

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Un VGM (volume globulaire moyen) bas évoque principalement :

- A. Une leucémie certaine
- B. Une polyglobulie
- C. Une carence en vitamine B12 ou en folates, très fréquente
- D. Une anémie microcytaire ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le receveur universel en transfusion de globules rouges est de groupe :

- A. O Rh+
- B. O Rh-
- C. AB Rh+ ✓ bonne réponse
- D. AB Rh-

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Le frottis sanguin permet de : A. Observer au microscope la forme et la répartition des cellules sanguines ✓ bonne réponse B. Mesurer la créatinine C. Mettre en culture les bactéries présentes dans le sang D. Doser le glucose et les électrolytes du sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 La coloration la plus utilisée pour le frottis sanguin est : A. Encre de Chine B. Gram, après fixation à la chaleur C. May-Grünwald-Giemsa ✓ bonne réponse D. Ziehl-Neelsen	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Une polynucléose neutrophile évoque souvent : A. Une carence en fer chronique B. Une allergie ou une parasitose intestinale C. Une déshydratation sévère D. Une infection bactérienne ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Une hyperéosinophilie peut évoquer : A. Une hémorragie B. Une allergie ou une parasitose ✓ bonne réponse C. Un diabète D. Une infection virale banale uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le taux de prothrombine (TP) explore : A. La glycémie B. Le nombre et la fonction des plaquettes sanguines C. La fonction rénale D. La voie extrinsèque (AVK, INR) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le TCA est utilisé notamment pour surveiller : A. Un traitement antibiotique B. L'héparine non fractionnée ✓ bonne réponse C. La grossesse D. Un traitement par insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un INR cible entre 2 et 3 concerne en général : A. Les patients sous héparine de bas poids moléculaire préventive B. Les patients sous AVK ✓ bonne réponse C. Les nouveau-nés D. Les patients sans traitement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le groupage sanguin ABO repose sur : A. La mesure de l'hémoglobine et de l'hématocrite B. Antigènes globulaires et anticorps plasmatiques ✓ bonne réponse C. La mesure de l'hémoglobine D. La numération des plaquettes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14	Le donneur universel de globules rouges est : A. B Rhésus négatif B. O Rhésus négatif ✓ bonne réponse C. AB Rhésus positif D. A Rhésus positif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	La recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) est réalisée : A. Uniquement chez les patients déjà transfusés plusieurs fois B. Pour doser le cholestérol C. Pour mesurer la glycémie D. Avant transfusion et pendant la grossesse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Les réticulocytes reflètent : A. Le taux de sucre B. La coagulation C. La fonction du foie et des voies biliaires D. La production médullaire de globules rouges ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	La vitesse de sédimentation (VS) est un marqueur : A. Spécifique des infections bactériennes, plus que la CRP B. D'inflammation ✓ bonne réponse C. D'allergie alimentaire D. De grossesse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une thrombopénie sévère expose surtout à : A. Une thrombose veineuse profonde B. Un risque de thrombose veineuse profonde C. Un risque hémorragique ✓ bonne réponse D. Une hyperglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	L'hématocrite correspond à : A. Le nombre de plaquettes par millimètre cube de sang B. Le % du volume occupé par les hématies ✓ bonne réponse C. La concentration d'hémoglobine dans chaque globule rouge D. La quantité de plasma uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Les automates d'hématologie doivent être soumis à : A. Un contrôle uniquement lors de l'installation de l'appareil B. Des contrôles qualité réguliers ✓ bonne réponse C. Un nettoyage annuel seulement, sans contrôle de qualité D. Aucun contrôle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Analyses biochimiques 20 questions

1	La glycémie à jeun normale est d'environ : A. 0,20 à 0,40 g/L B. 0,70 à 1,10 g/L ✓ bonne réponse C. 1,50 à 2 g/L D. 2 à 3 g/L	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--	---

2	La kaliémie (potassium) normale est d'environ : A. 135 à 145 mmol/L B. 0,5 à 1,0 mmol/L C. 3,5 à 5,0 mmol/L ✓ bonne réponse D. 8 à 10 mmol/L	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	La natrémie (sodium) normale est d'environ : A. 3,5 à 5 mmol/L B. 160 à 180 mmol/L C. 95 à 105 mmol/L D. 135 à 145 mmol/L ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	La créatininémie est surtout utilisée pour évaluer : A. La fonction rénale ✓ bonne réponse B. La fonction hépatique C. La thyroïde D. La coagulation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	L'HbA1c (hémoglobine glyquée) reflète l'équilibre glycémique des : A. 2 à 3 derniers mois ✓ bonne réponse B. 7 derniers jours C. 24 dernières heures D. 2 dernières années	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La CRP (protéine C réactive) est un marqueur : A. De la fonction du foie et des voies biliaires B. D'inflammation ✓ bonne réponse C. Du diabète D. De la fonction thyroïdienne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les transaminases (ASAT, ALAT) explorent principalement : A. Le foie ✓ bonne réponse B. Le cœur uniquement C. Les os D. Les reins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La troponine est dosée pour rechercher : A. Une atteinte cardiaque ✓ bonne réponse B. Une infection urinaire basse C. Une atteinte du muscle squelettique après un effort intense D. Une insuffisance hépatique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'urée et la créatinine augmentées évoquent : A. Une anémie B. Une allergie C. Une hépatite ou une atteinte des voies biliaires D. Une insuffisance rénale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 La bilirubine augmentée provoque : A. Un ictère ✓ bonne réponse B. Une hypoglycémie C. Une toux D. Une coloration bleutée de la peau et des lèvres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La TSH est dosée pour explorer : A. Le pancréas B. La moelle osseuse C. La thyroïde ✓ bonne réponse D. Le rein	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La ferritine basse évoque : A. Une infection B. Une hyperglycémie C. Un excès de vitamine C D. Une carence en fer ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le dosage des bêta-hCG sert notamment à : A. Explorer le foie B. Surveiller la fonction thyroïdienne pendant la grossesse C. Mesurer le cholestérol D. Diagnostiquer une grossesse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La calcémie normale chez l'adulte est d'environ : A. 5 à 10 mmol/L B. 135 à 145 mmol/L C. 0,2 à 0,5 mmol/L D. 2,2 à 2,6 mmol/L ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les lipases augmentées (plus de 3 fois la normale) avec douleur abdominale évoquent : A. Une pancréatite aiguë ✓ bonne réponse B. Une infection urinaire C. Une fracture D. Une appendicite certaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le principe de la spectrophotométrie repose sur : A. La centrifugation des échantillons sanguins B. La coloration de Gram C. La culture des bactéries D. La mesure de l'absorption de la lumière par une solution ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un contrôle de qualité hors limites sur un automate impose : A. De rendre les résultats avec un commentaire, puis de refaire le contrôle le lendemain B. De rendre les résultats et refaire le contrôle demain C. D'ignorer le contrôle si les patients vont bien D. De bloquer les résultats et chercher la cause ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Une hyperkaliémie importante est dangereuse car elle peut provoquer : A. Une fièvre et des frissons B. Une chute de cheveux importante C. Des crampes musculaires bénignes sans autre conséquence D. Des troubles du rythme ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un résultat critique (valeur d'alerte) doit être : A. Communiqué sans délai ✓ bonne réponse B. Gardé pour la fin de la journée C. Rendu le lendemain D. Rendu avec les autres résultats, en le surlignant pour qu'il soit remarqué	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L (7 mmol/L) à deux reprises définit : A. Une valeur normale B. Une anémie C. Une hypoglycémie D. Un diabète ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Microbiologie 20 questions

1 La coloration de Gram permet de distinguer : A. Gram positif et Gram négatif ✓ bonne réponse B. Les groupes sanguins C. Les cellules cancéreuses D. Les virus des bactéries	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Pour un ECBU, le recueil des urines se fait : A. Au premier jet, sans toilette B. Dans n'importe quel récipient propre C. Au premier jet du matin, sans toilette, pour recueillir le plus de bactéries D. Après toilette, milieu de jet, flacon stérile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Un échantillon pour culture bactériologique qui ne peut être analysé immédiatement est : A. Congelé systématiquement à -80°C B. Laissé à 37°C au soleil C. Conservé selon le protocole (souvent à $+4^{\circ}\text{C}$) ✓ bonne réponse D. Laissé à température ambiante jusqu'au lendemain, les bactéries ne se multipliant pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Escherichia coli est : A. Un coque Gram positif qui se dispose en chaînettes B. Un champignon levuriforme C. Un bacille Gram négatif ✓ bonne réponse D. Un coque Gram positif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5	Un ECBU est considéré comme évocateur d'infection urinaire en présence de :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. De nombreux cristaux et du mucus, sans leucocytes ni bactéries B. Uniquement de cristaux C. Leucocyturie et bactériurie significatives, à interpréter selon le contexte ✓ bonne réponse D. Uniquement de mucus	
6	L'antibiogramme permet de :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Tester la sensibilité aux antibiotiques ✓ bonne réponse B. Compter les globules rouges et les plaquettes C. Doser le sucre et l'urée dans le sang D. Identifier l'espèce bactérienne responsable de l'infection	
7	Staphylococcus aureus est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un bacille Gram négatif B. Un parasite C. Un coque Gram positif en amas ✓ bonne réponse D. Un champignon	
8	La coloration de Ziehl-Neelsen est utilisée pour rechercher :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Les levures B. Les streptocoques et les pneumocoques C. Les streptocoques D. Les mycobactéries ✓ bonne réponse	
9	Candida albicans est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un virus B. Une levure ✓ bonne réponse C. Une bactérie D. Une bactérie Gram positif de la flore cutanée	
10	Les prélèvements pour recherche de germes anaérobies doivent être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. À l'abri de l'air, rapidement ✓ bonne réponse B. Congelés immédiatement à -20 °C C. Laissés à l'air libre pour favoriser la croissance des bactéries D. Laissés à l'air libre	
11	Le poste de sécurité microbiologique (PSM) protège :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Contre l'incendie B. Uniquement l'échantillon, le manipulateur devant porter un masque FFP2 C. Uniquement contre le bruit D. Le manipulateur, l'échantillon, l'environnement ✓ bonne réponse	
12	Une bactérie multirésistante (BMR) est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Résistante à plusieurs antibiotiques ✓ bonne réponse B. Un champignon C. Sensible à tous les antibiotiques D. Un virus	

13 Le milieu gélose au sang permet notamment d'observer : A. La sensibilité des bactéries aux antibiotiques B. L'hémolyse bactérienne ✓ bonne réponse C. La glycémie et l'urée D. Le groupe sanguin du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le résultat d'une hémoculture positive doit être : A. Ignoré B. Transmis rapidement au clinicien (examen direct, puis identification) ✓ bonne réponse C. Rendu une semaine plus tard D. Archivé avec les autres résultats	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La PCR est une technique : A. De culture rapide des micro-organismes sur milieu enrichi B. De culture sur gélose C. De coloration D. D'amplification génétique ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un prélèvement de gorge pour recherche de streptocoque se fait avec : A. Une seringue intraveineuse B. Un tube EDTA C. Un écouvillon sur les amygdales ✓ bonne réponse D. Un pot à selles	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La recherche de parasites dans les selles (examen parasitologique) nécessite souvent : A. Un jeûne de 48 heures B. Un seul prélèvement congelé C. Plusieurs prélèvements espacés ✓ bonne réponse D. Du sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Les déchets contaminés du laboratoire de microbiologie sont : A. Éliminés en filière infectieuse ✓ bonne réponse B. Lavés à l'eau de Javel puis jetés avec les ordures ménagères C. Jetés dans les ordures ménagères D. Lavés et réutilisés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les cultures bactériennes sont en général incubées à : A. 4 °C B. 35 à 37 °C ✓ bonne réponse C. -20 °C D. À température ambiante, autour de 20 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La mise en évidence d'Escherichia coli dans une eau de boisson indique : A. Un excès de calcium B. Une eau trop froide C. Une contamination fécale ✓ bonne réponse D. Une eau parfaitement potable	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Pharmacie

Postes concernés : Préparateur(trice) en pharmacie

Gestion des stocks pharmaceutiques 20 questions

1 La règle de rotation des stocks recommandée pour les médicaments est :

- A. Le plus cher en premier
- B. Premier entré, premier sorti, quelle que soit la date de péremption
- C. Premier périmé, premier sorti ✓ bonne réponse
- D. Au hasard

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Un médicament périmé trouvé en rayon doit être :

- A. Retiré, isolé, éliminé ✓ bonne réponse
- B. Remis en rayon après vérification visuelle
- C. Délivré en priorité s'il est périmé depuis moins d'un mois
- D. Délivré en priorité

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le stock de sécurité correspond à :

- A. La quantité minimale gardée pour faire face aux retards ou à une hausse de consommation ✓ bonne réponse
- B. Le stock maximal autorisé pour une seule commande
- C. Le stock de médicaments périmés
- D. La quantité de médicaments rangée dans l'armoire sécurisée

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 L'inventaire permet de :

- A. Fixer les prix de vente
- B. Comparer stock réel et stock théorique ✓ bonne réponse
- C. Remplacer les ordonnances
- D. Calculer les salaires

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le point de commande correspond :

- A. Au prix d'achat
- B. À la quantité maximale que la pharmacie peut stocker
- C. Au seuil de déclenchement de la commande ✓ bonne réponse
- D. Au jour de l'inventaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Une rupture de stock d'un médicament essentiel doit être :

- A. Cachée au prescripteur pour ne pas retarder le traitement
- B. Compensée par un médicament au hasard
- C. Gérée en attendant la prochaine livraison, sans prévenir les prescripteurs
- D. Signalée, avec recherche d'une alternative ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 À la réception d'une commande, on vérifie :

- A. Uniquement le nombre de colis, le contenu étant contrôlé lors du rangement
- B. La conformité et l'état des colis ✓ bonne réponse
- C. La couleur des boîtes et le nom du transporteur
- D. Uniquement le nombre de cartons

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

8 Les médicaments de la chaîne du froid reçus en livraison doivent être : A. Mis au congélateur B. Laissés dans le carton jusqu'au lendemain C. Rangés sur l'étagère ordinaire D. Rangés immédiatement au réfrigérateur ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les stupéfiants sont stockés : A. Dans le bureau de l'accueil B. Avec les autres médicaments C. Avec les autres médicaments, dans une zone réservée au personnel D. Sous clé, avec un registre ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le registre des stupéfiants permet : A. De tracer entrées et sorties ✓ bonne réponse B. De noter les prix d'achat et les fournisseurs des stupéfiants C. De noter les congés et les horaires du personnel D. De calculer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un écart entre stock réel et stock informatique doit être : A. Modifié sans explication B. Corrigé directement dans le logiciel pour que les deux stocks correspondent C. Analysé et corrigé ✓ bonne réponse D. Ignoré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La rotation des stocks permet notamment : A. De limiter les périmés ✓ bonne réponse B. De garder plus longtemps les produits chers pour éviter les ruptures C. De garder des produits plus longtemps D. D'augmenter les pertes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le rangement d'une pharmacie se fait souvent : A. Au hasard B. Par fournisseur, les livraisons les plus récentes étant placées devant C. Par couleur de boîte, les nouvelles livraisons devant D. Par ordre logique, dates courtes devant ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un médicament rappelé par le fabricant (rappel de lot) doit être : A. Délivré jusqu'à épuisement B. Délivré jusqu'à la fin du stock, puis remplacé par un nouveau lot C. Retiré et isolé ✓ bonne réponse D. Remis en rayon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le numéro de lot d'un médicament sert à : A. Indiquer la date de fabrication et le dosage du médicament B. Indiquer la posologie C. Indiquer le prix D. Assurer la traçabilité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La consommation moyenne mensuelle sert à : A. Fixer les horaires B. Fixer le prix de vente des médicaments les plus utilisés C. Calculer les besoins ✓ bonne réponse D. Déterminer les congés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les produits inflammables (alcool, éther) sont stockés : A. Dans le réfrigérateur alimentaire B. Dans le réfrigérateur à médicaments, pour éviter leur évaporation C. Dans une armoire adaptée, au frais ✓ bonne réponse D. Près d'un radiateur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Les médicaments non utilisés rapportés par les patients sont : A. Remis en rayon B. Revendus C. Éliminés par la filière dédiée ✓ bonne réponse D. Remis en stock après vérification de la date et de l'état de l'emballage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un inventaire tournant consiste à : A. Ne jamais compter B. Tout compter une fois tous les dix ans C. Compter régulièrement une partie du stock tout au long de l'année ✓ bonne réponse D. Compter tout le stock en une seule fois, à la fin de chaque année	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La dotation d'un service hospitalier est : A. La quantité de médicaments commandée pour chaque patient hospitalisé B. Le nombre de lits C. La liste et les quantités de médicaments disponibles en permanence dans le service ✓ bonne réponse D. Le budget du personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Délivrance et conseil 20 questions

1 Avant de délivrer un médicament, il faut vérifier sur l'ordonnance : A. Uniquement le prix B. Uniquement le nom du médicament et la signature du prescripteur C. Uniquement le nom du médicament D. Patient, prescripteur, date, posologie, durée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un médicament « générique » est : A. Un médicament moins dosé, donc moins efficace, mais moins cher B. Un médicament réservé à l'hôpital C. Un médicament sans principe actif, utilisé comme placebo D. Une copie du médicament de référence, avec le même principe actif et la même efficacité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 La posologie « 1 cp 3 fois par jour pendant 7 jours » correspond à : A. 3 comprimés B. 7 comprimés C. 10 comprimés D. 21 comprimés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un patient sous anticoagulant (AVK) demande de l'aspirine pour un mal de tête. Que conseiller ? A. Délivrer de l'aspirine à forte dose B. Doubler l'anticoagulant C. Délivrer de l'aspirine à faible dose, qui ne pose pas de problème avec les AVK D. Éviter l'aspirine et orienter ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Une ordonnance dont la date de prescription est trop ancienne : A. Peut être délivrée si le patient est connu de la pharmacie B. Reste valable sans limite pour les traitements chroniques C. Doit être vérifiée avant toute délivrance ✓ bonne réponse D. Peut toujours être délivrée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un patient demande un antibiotique sans ordonnance. Vous : A. Délivrez une petite boîte, en lui conseillant de consulter si cela ne passe pas B. Refusez et orientez-le vers un médecin ✓ bonne réponse C. Délivrez la boîte la plus grande D. Délivrez un antibiotique au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 « 1 cp matin et soir » signifie : A. Deux comprimés le matin B. Un comprimé tous les deux jours C. Un comprimé deux fois par jour ✓ bonne réponse D. Un comprimé par semaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le conseil associé à un antibiotique comprend : A. Arrêter dès qu'on se sent mieux B. Doubler la dose en cas d'oubli C. Respecter la durée prescrite ✓ bonne réponse D. Arrêter dès que la fièvre a disparu, pour limiter les résistances	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Une interaction médicamenteuse est : A. Une réaction allergique à un médicament pris pour la première fois B. Un effet modifié par un autre médicament ✓ bonne réponse C. Une allergie alimentaire D. Une erreur de prix	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Chez la femme enceinte, avant de délivrer un médicament sans ordonnance : A. On propose de l'aspirine à forte dose B. On vérifie la compatibilité ✓ bonne réponse C. On délivre les médicaments à base de plantes, toujours sans danger pendant la grossesse D. On délivre comme pour tout le monde	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) sont à éviter notamment : A. En cas de rhume simple uniquement B. En fin de grossesse, ulcère, insuffisance rénale ✓ bonne réponse C. Chez tous les adultes en bonne santé D. Uniquement chez l'enfant de moins de 12 ans, en cas de fièvre élevée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le paracétamol en automédication chez l'adulte ne doit pas dépasser en général : A. 3 à 4 g par jour ✓ bonne réponse B. 6 à 8 g par jour, répartis en prises toutes les 4 heures C. 500 mg par semaine D. Il n'y a pas de limite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Une forme « gastro-résistante » : A. Se prend uniquement en suppositoire B. Doit être dissoute dans l'eau chaude C. Peut être coupée sans conséquence D. Ne doit pas être croquée ni écrasée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient âgé polymédiqué présente un risque accru : A. De meilleure tolérance, l'organisme étant habitué aux médicaments B. D'interactions ✓ bonne réponse C. De guérison plus rapide D. D'aucun effet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les collyres ouverts se conservent en général : A. Peu de temps après ouverture (selon la notice) ✓ bonne réponse B. Uniquement au congélateur C. Jusqu'à la date de péremption imprimée sur la boîte, même après ouverture D. Indéfiniment	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Lors de la délivrance d'un inhalateur pour l'asthme, on explique : A. Qu'il faut inspirer rapidement avant d'appuyer et ne jamais retenir sa respiration B. Qu'il s'utilise une fois par mois C. La technique et le rinçage de la bouche ✓ bonne réponse D. Qu'il faut l'avaler	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Un générique peut remplacer le médicament de référence :

- A. Uniquement pour les enfants
- B. Selon la réglementation, sauf mention contraire du prescripteur ✓ bonne réponse
- C. Uniquement si le patient paie plus
- D. Jamais sans accord écrit du médecin traitant

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Un sirop pour enfant se dose avec :

- A. Une cuillère à soupe de cuisine au hasard
- B. Le doseur fourni ✓ bonne réponse
- C. Le bouchon d'une autre bouteille
- D. Une cuillère à café de cuisine, qui correspond toujours à 5 mL

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Un patient décrit une éruption cutanée après un nouveau médicament. Vous :

- A. Lui conseillez de doubler la dose
- B. Lui conseillez une crème apaisante et de continuer le traitement normalement
- C. L'orientez vers son médecin, signalez ✓ bonne réponse
- D. Lui vendez un autre médicament au hasard

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le secret professionnel au comptoir impose :

- A. De commenter l'ordonnance devant les autres clients
- B. La discrétion sur les traitements ✓ bonne réponse
- C. D'annoncer les traitements à voix haute
- D. De vérifier l'identité à voix haute pour éviter toute erreur de délivrance

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Conservation des médicaments 20 questions

1 La plupart des vaccins et insulines non entamées se conservent :

- A. À plus de 30 °C
- B. Entre +2 et +8 °C ✓ bonne réponse
- C. Au congélateur, pour prolonger leur durée de conservation
- D. À température ambiante au soleil

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La « chaîne du froid » signifie :

- A. Le stockage des médicaments au congélateur
- B. Le refroidissement du patient
- C. Une température maintenue sans interruption ✓ bonne réponse
- D. Le stockage de tous les médicaments au réfrigérateur dès leur réception

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un flacon d'insuline en cours d'utilisation peut généralement être conservé :

- A. Au congélateur
- B. À température ambiante (moins de 25-30 °C) pendant environ 4 semaines, selon la notice ✓ bonne réponse
- C. Au soleil
- D. Au réfrigérateur uniquement, jusqu'à la date de péremption de la boîte

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4	La température du réfrigérateur à médicaments doit être : A. Vérifiée une fois par an B. Jamais vérifiée C. Réglée sur la position la plus froide (négative) D. Contrôlée et tracée régulièrement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	La mention « à conserver à une température ne dépassant pas 25 °C » signifie : A. Un stockage obligatoire au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C B. Un stockage au congélateur C. Aucune précaution, quelle que soit la saison de stockage D. Un stockage à température ambiante contrôlée, à l'abri de la chaleur ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un vaccin congelé par erreur : A. Peut être donné à moitié dose B. Peut être utilisé après une décongélation lente au réfrigérateur C. N'est plus utilisable ✓ bonne réponse D. Est plus efficace	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un réfrigérateur à médicaments ne doit pas contenir : A. Des vaccins B. Des aliments ou des boissons ✓ bonne réponse C. De l'insuline non entamée D. Un thermomètre, qui fausse le froid en ouvrant la porte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	En cas de panne du réfrigérateur à médicaments, il faut : A. Mettre les produits au soleil B. Jeter immédiatement tous les produits sans demander d'avis C. Ne rien dire D. Transférer, noter durée et température, avertir le pharmacien ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Les médicaments photosensibles doivent être : A. Mis sous une lampe B. Sortis de leur boîte et rangés dans des flacons transparents pour être reconnus C. Exposés au soleil D. À l'abri de la lumière ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une solution buvable ouverte se conserve : A. Selon la notice ✓ bonne réponse B. Jusqu'à la date de péremption imprimée sur le flacon C. Indéfiniment D. Toujours 24 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Un médicament qui a changé d'aspect (couleur, odeur, dépôt) : A. Doit être dilué B. Est plus actif C. Ne doit pas être utilisé ✓ bonne réponse D. Peut être utilisé normalement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Le relevé de température d'un réfrigérateur doit être : A. Fait une fois par semaine, sauf en cas de panne visible B. Quotidien et enregistré ✓ bonne réponse C. Inutile D. Fait uniquement en été	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 L'humidité est néfaste pour : A. Les comprimés et gélules ✓ bonne réponse B. Aucun médicament C. Uniquement les solutions buvables et les sirops D. Les étiquettes uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le transport de médicaments thermosensibles nécessite : A. Un sac plastique ordinaire au soleil B. Le coffre d'une voiture chaude C. Un sac isotherme simple, sans contrôle, si le trajet est court D. Une glacière avec contrôle de température ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La date « EXP 06/2027 » signifie que le médicament : A. Est périmé depuis 2026 B. Est utilisable jusqu'à fin juin 2027 ✓ bonne réponse C. N'a pas de date limite D. Doit être utilisé avant le début du mois de juin 2027	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les multidoses injectables entamées (flacons) doivent être : A. Utilisées jusqu'à la fin du flacon, quelle que soit la date d'ouverture B. Utilisées sans limite de temps C. Datées et utilisées dans le délai prévu ✓ bonne réponse D. Partagées entre patients sans aucune précaution particulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un stylo à insuline en cours d'utilisation se conserve en général : A. À température ambiante (sans dépasser environ 25–30 °C selon la notice), à l'abri de la lumière ✓ bonne réponse B. Au soleil sur le tableau de bord C. Au réfrigérateur, avec l'aiguille en place pour la prochaine injection D. Au congélateur, pour une conservation prolongée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Les suppositoires se conservent : A. Près d'un radiateur B. Au frais ✓ bonne réponse C. Au congélateur, pour les durcir et faciliter leur administration D. Au soleil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La température d'une pièce de stockage des médicaments doit être : A. Ignorée B. Surveillée, surtout en été ✓ bonne réponse C. Toujours inférieure à 0 °C D. La plus chaude possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Les médicaments périmés d'un service sont :

- A. Utilisés en priorité s'ils sont périmés depuis moins de trois mois
- B. Retournés à la pharmacie ✓ **bonne réponse**
- C. Jetés à la poubelle ordinaire
- D. Gardés pour l'année suivante

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Rééducation

Postes concernés : Kinésithérapeute

Rééducation fonctionnelle 20 questions

1 Après une prothèse totale de hanche par voie postérieure, quel mouvement est à éviter en début de rééducation ?

- A. La marche avec cannes et la contraction statique du quadriceps dès le lendemain
- B. La marche avec aide technique
- C. La respiration profonde
- D. Flexion, adduction et rotation interne ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le testing musculaire coté de 0 à 5 : la cote 3 correspond à :

- A. Un mouvement complet contre la pesanteur, sans résistance ✓ **bonne réponse**
- B. Une force normale
- C. Une contraction visible sans aucun mouvement
- D. Une contraction sans mouvement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Pour un patient hémiparétique, la canne se tient :

- A. Du côté atteint
- B. Elle est déconseillée
- C. Avec les deux mains
- D. Du côté sain ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La mobilisation précoce après une chirurgie vise notamment à prévenir :

- A. La fièvre
- B. La fièvre postopératoire et les infections du site opératoire
- C. L'hypoglycémie
- D. Phlébite, escarres, enraidissement ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une entorse récente de la cheville se prend en charge initialement par :

- A. Chaleur, massage et reprise immédiate de la marche sans limitation
- B. Glace, compression, surélévation ✓ **bonne réponse**
- C. Chaleur et reprise immédiate de la course
- D. Massage profond immédiat de la zone

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Après une ligamentoplastie du genou, la rééducation précoce vise d'abord à : A. Reprendre la course dès le 3^e jour B. Immobiliser strictement le genou plusieurs semaines avant toute mobilisation C. Masser la cicatrice profondément le premier jour D. Douleur, œdème, extension, quadriceps ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Une contraction isométrique est : A. Une contraction sans mouvement ✓ bonne réponse B. Un étirement passif réalisé par le thérapeute C. Un massage profond du muscle D. Une contraction avec raccourcissement du muscle et mouvement de l'articulation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 La mobilisation passive est réalisée : A. Par le thérapeute ✓ bonne réponse B. Uniquement en piscine C. Par le patient lui-même, sans aide, contre une résistance légère D. Avec des poids lourds	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Un patient hémiplégique : pour l'aider à s'habiller, on commence par : A. Le côté atteint ✓ bonne réponse B. Indifféremment C. Le côté sain D. Les chaussures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La rééducation de l'équilibre chez la personne âgée a pour objectif principal : A. D'augmenter la vitesse de marche, quel que soit le risque de chute B. De faire maigrir le patient en surpoids C. De traiter le diabète D. De prévenir les chutes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 L'utilisation de béquilles pour monter un escalier : on monte d'abord : A. Les béquilles seules B. La jambe opérée et les béquilles ensemble, puis la jambe saine C. La jambe saine ✓ bonne réponse D. En sautant à pieds joints	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Une entorse grave du ligament croisé antérieur se teste notamment par : A. Le test d'Allen B. Le test de Lachman ✓ bonne réponse C. Le score d'Apgar D. Le score de Glasgow	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le renforcement musculaire progressif repose sur : A. Une progression graduelle ✓ bonne réponse B. Des charges maximales dès la première séance C. Des charges maximales dès la première séance, pour gagner du temps D. Des étirements uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14	Une douleur qui augmente fortement et persiste après les séances doit faire :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Arrêter de boire B. Augmenter l'intensité C. Ignorer la douleur D. Adapter et informer le médecin ✓ bonne réponse	
15	Après une fracture du poignet plâtrée, on surveille :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La tension artérielle et la température du patient B. Uniquement l'état et la propreté du plâtre lui-même C. L'état du plâtre uniquement, la circulation étant vérifiée par le médecin D. Couleur, chaleur, sensibilité, mobilité des doigts ✓ bonne réponse	
16	La cryothérapie (froid) est utilisée pour :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Préparer les muscles avant l'effort et augmenter leur souplesse B. Réduire douleur et œdème ✓ bonne réponse C. Augmenter l'inflammation D. Traiter une plaie infectée	
17	L'ergothérapie vise surtout à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Favoriser l'autonomie au quotidien ✓ bonne réponse B. Traiter les caries C. Rééduquer la parole et la déglutition après un AVC D. Réaliser des radiographies	
18	La lombalgie commune aiguë : la recommandation actuelle est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une chirurgie immédiate B. Maintenir les activités autant que possible ✓ bonne réponse C. Le port permanent d'un corset D. Un repos strict au lit pendant plusieurs semaines, jusqu'à disparition de la douleur	
19	Le bilan articulaire d'un genou en extension complète correspond à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 180° B. 45° C. 0° ✓ bonne réponse D. 90°	
20	Un patient sous anticoagulants en rééducation : on évite :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Les exercices respiratoires B. Les techniques traumatisantes ✓ bonne réponse C. La marche D. Toute mobilisation active, le risque de saignement étant trop important	

Kinésithérapie respiratoire 20 questions

1	Le désencombrement bronchique vise à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Augmenter la capacité respiratoire par un renforcement des muscles B. Évacuer les sécrétions bronchiques ✓ bonne réponse C. Augmenter la tension artérielle D. Diminuer la fréquence cardiaque	

2	Chez le patient BPCO, la ventilation lèvres pincées permet de : A. Accélérer l'inspiration pour mieux oxygéner le sang B. Augmenter la toux sèche C. Freiner l'expiration ✓ bonne réponse D. Accélérer la respiration	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	La spirométrie incitative après chirurgie abdominale sert à : A. Renforcer les muscles abdominaux après l'intervention B. Prévenir les atelectasies en encourageant les inspirations profondes ✓ bonne réponse C. Faire travailler les abdominaux après la chirurgie D. Mesurer la capacité pulmonaire avant la sortie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pendant une séance, une SpO2 qui chute à 86 % impose de : A. Retirer l'oxygène B. Interrompre l'effort et surveiller / alerter selon la prescription d'oxygène ✓ bonne réponse C. Poursuivre l'exercice : la saturation remonte toujours à l'arrêt D. Augmenter l'intensité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le drainage bronchique chez le nourrisson est indiqué : A. Uniquement la nuit B. Selon la prescription, avec prudence ✓ bonne réponse C. Jamais sur prescription D. Systématiquement, pour toute bronchiolite, plusieurs fois par jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'augmentation du flux expiratoire (AFE) vise à : A. Mobiliser les sécrétions vers les grosses bronches ✓ bonne réponse B. Bloquer la respiration C. Augmenter le volume d'air inspiré D. Diminuer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La toux dirigée sert à : A. Provoquer des vomissements B. Mesurer la saturation C. Évacuer les sécrétions proximales ✓ bonne réponse D. Mobiliser les sécrétions situées dans les petites bronches distales	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Après une chirurgie thoracique ou abdominale, la kinésithérapie respiratoire prévient : A. Les atelectasies et les infections pulmonaires ✓ bonne réponse B. La phlébite et l'embolie pulmonaire uniquement C. Les phlébites et les escarres D. Les fractures de côtes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La réhabilitation respiratoire chez le patient BPCO comprend : A. Un repos prolongé et une oxygénothérapie continue, sans effort physique B. Uniquement des antibiotiques C. Réentraînement, éducation, techniques respiratoires ✓ bonne réponse D. Une chirurgie systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Avant une séance de désencombrement, il est préférable que le patient : A. Soit allongé à plat ventre sans surveillance B. Ait arrêté son oxygène pour mieux tolérer les techniques C. Ait mangé un repas copieux D. Ne vienne pas de manger ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le débit expiratoire de pointe (peak-flow) est utile pour suivre : A. La glycémie B. La vision C. La fonction rénale D. L'asthme ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La ventilation dirigée abdomino-diaphragmatique vise à : A. Provoquer une apnée prolongée B. Mobiliser surtout les muscles du cou et des épaules C. Augmenter le travail respiratoire D. Améliorer l'efficacité de la respiration et diminuer l'essoufflement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient sous oxygène pendant la séance : on surveille : A. Uniquement la tension B. Uniquement la température C. Saturation, fréquence respiratoire, tolérance ✓ bonne réponse D. Uniquement la tension artérielle et la température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les signes de détresse respiratoire incluent : A. Une respiration lente et ample avec une bonne coloration B. Tirage, cyanose, polypnée ✓ bonne réponse C. Une respiration calme et lente D. Un sommeil paisible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les aérosols (nébulisations) prescrits avant la séance servent souvent à : A. Endormir le patient B. Fluidifier ou dilater les bronches ✓ bonne réponse C. Apporter de l'oxygène à la place de la séance de kinésithérapie D. Mesurer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le spiromètre incitatif doit être utilisé : A. En soufflant le plus fort et le plus longtemps possible dans l'appareil B. Une fois par semaine C. Régulièrement, inspirations lentes ✓ bonne réponse D. Uniquement en position couchée à plat	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le positionnement du patient (drainage postural) utilise : A. Le froid B. Les vibrations mécaniques appliquées sur le thorax C. La gravité ✓ bonne réponse D. Le bruit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Chez un patient atteint de mucoviscidose, la kinésithérapie respiratoire est : A. Contre-indiquée B. Inutile C. Quotidienne et essentielle ✓ bonne réponse D. Réservée aux adultes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'hygiène du matériel de kinésithérapie respiratoire (embouts, spiromètres) impose : A. Aucune précaution, l'air expiré n'étant pas contaminant B. Un rinçage à l'eau du robinet entre deux patients, puis un séchage à l'air C. Le partage sans nettoyage D. Usage individuel ou désinfection ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La saturation qui chute pendant l'effort chez un patient BPCO : A. Est normale et ne justifie aucune adaptation de la séance B. Est sans importance si le patient ne se plaint pas C. Doit être ignorée pendant la séance de réentraînement D. Impose d'adapter l'effort et l'oxygène ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Bilan et évaluation 20 questions

1 Le bilan initial en rééducation sert à : A. Poser un diagnostic fonctionnel ✓ bonne réponse B. Choisir les horaires C. Remplacer la prescription médicale et choisir le nombre de séances D. Remplacer la prescription médicale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 La goniométrie mesure : A. La force musculaire de chaque muscle B. La fréquence respiratoire C. Les amplitudes articulaires ✓ bonne réponse D. La force musculaire de chaque groupe de muscles	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 L'échelle visuelle analogique (EVA) évalue : A. L'anxiété et la qualité du sommeil du patient B. La force de préhension C. L'équilibre D. La douleur ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un objectif de rééducation bien formulé est : A. Le même pour tous les patients B. Précis, mesurable et daté ✓ bonne réponse C. Vague pour pouvoir s'adapter D. Fixé uniquement par la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 L'échelle de Berg ou le test « Timed Up and Go » évaluent : A. La douleur B. La fonction rénale C. L'équilibre et le risque de chute ✓ bonne réponse D. La mémoire uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

6 La mesure de Barthel évalue : A. La mémoire et l'orientation dans le temps et l'espace B. La saturation C. La force de préhension seule D. L'autonomie au quotidien ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le périmètre de marche correspond à : A. Le tour de taille B. La distance que le patient peut parcourir avant de devoir s'arrêter ✓ bonne réponse C. La taille du couloir D. La vitesse de marche mesurée sur un trajet de 10 mètres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un bilan de rééducation doit être : A. Fait une seule fois B. Réalisé une seule fois, en début de prise en charge C. Daté, chiffré, répété ✓ bonne réponse D. Fait par la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 L'œdème d'un membre peut se mesurer : A. Par des mesures de périmètre (centimétriques) répétées aux mêmes repères ✓ bonne réponse B. À l'œil seulement C. Avec un thermomètre D. Par une simple observation, en comparant à l'œil les deux membres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le test des 6 minutes de marche évalue : A. La vitesse maximale de course sur un tapis roulant B. La vision C. La mémoire D. La capacité à l'effort ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La douleur chez une personne âgée non communicante peut être évaluée par : A. Une échelle visuelle analogique, que le patient remplit lui-même B. Une échelle d'hétéro-évaluation comportementale (type Algoplus, Doloplus) ✓ bonne réponse C. Une échelle numérique de 0 à 10 D. Une auto-évaluation par l'EVA	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le dynamomètre de préhension mesure : A. La fréquence respiratoire B. La tension C. La force de la main ✓ bonne réponse D. La température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les objectifs de rééducation sont fixés : A. Par le thérapeute seul, selon les protocoles habituels du service B. Au hasard C. Sans le patient D. Avec le patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Le bilan initial doit rechercher aussi : A. Les contre-indications et précautions ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du médecin et la date de la prescription C. Uniquement les préférences du patient concernant les horaires des séances D. Les préférences musicales uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une évaluation de la spasticité peut utiliser : A. Le score de Glasgow de l'état de conscience B. Le testing musculaire coté de 0 à 5 C. Le score d'Apgar du nouveau-né D. L'échelle d'Ashworth ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le bilan de sortie de rééducation sert à : A. Remplacer le bilan initial, qui n'est plus utile en fin de traitement B. Facturer uniquement C. Comparer aux objectifs et transmettre ✓ bonne réponse D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une mesure fiable nécessite : A. Des conditions différentes à chaque fois, pour tester toutes les situations B. Des positions différentes C. Les mêmes conditions et méthode ✓ bonne réponse D. Un appareil différent à chaque fois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le testing musculaire coté 0 correspond à : A. Un mouvement complet B. Aucune contraction perceptible ✓ bonne réponse C. Une force normale D. Un mouvement contre résistance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le testing musculaire coté 5 correspond à : A. Une force normale ✓ bonne réponse B. Une contraction sans mouvement C. Un mouvement sans pesanteur D. Aucune contraction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le compte rendu de bilan est transmis : A. Au prescripteur et au dossier ✓ bonne réponse B. Uniquement à la famille C. Sur les réseaux sociaux D. À personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Diététique et nutrition

Postes concernés : Diététicien(ne) / Nutritionniste

1	L'indice de masse corporelle (IMC) se calcule ainsi : A. Poids moins la taille en cm B. Poids (kg) divisé par la taille (cm), multiplié par 100 C. Poids / taille² ✓ bonne réponse D. Taille divisée par le poids	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Chez l'adulte, un IMC entre 18,5 et 25 correspond à : A. Un surpoids B. Une obésité C. Une dénutrition sévère D. Une corpulence normale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ? A. Environ 9 kcal ✓ bonne réponse B. Environ 4 kcal C. Environ 1 kcal D. Environ 7 kcal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Combien de kilocalories apporte 1 g de protéines ou de glucides ? A. Environ 0,5 kcal B. Environ 4 kcal ✓ bonne réponse C. Environ 12 kcal D. Environ 9 kcal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une perte de poids involontaire de plus de 5 % en un mois doit faire évoquer : A. Une dénutrition ✓ bonne réponse B. Un régime réussi C. Une situation normale D. Une déshydratation bénigne uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un aliment riche en protéines de bonne qualité : A. Les huiles végétales et le beurre B. Les œufs, le poisson, la viande, les produits laitiers ✓ bonne réponse C. Le pain blanc, les pâtes et le riz D. Le sucre blanc et les confiseries	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les fibres alimentaires se trouvent surtout dans : A. La viande, le poisson et les produits laitiers B. Les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes ✓ bonne réponse C. Le sucre blanc D. La viande et l'huile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	L'albumine basse peut être un marqueur : A. De déshydratation uniquement B. D'un excès d'apport en protéines dans l'alimentation C. De dénutrition ✓ bonne réponse D. D'obésité certaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Les besoins hydriques d'un adulte sont en moyenne d'environ : A. 0,2 litre par jour B. 1,5 à 2 L par jour ✓ bonne réponse C. Aucun besoin si on mange D. 4 à 5 litres par jour, quel que soit l'âge ou le poids	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La nutrition entérale est : A. Un régime sans sel B. Une alimentation par voie veineuse centrale C. Par sonde dans le tube digestif ✓ bonne réponse D. Une alimentation par la bouche uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La nutrition parentérale est : A. Une boisson enrichie B. Une alimentation par sonde placée dans l'estomac ou l'intestin C. Un régime riche en fibres D. Par voie veineuse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le syndrome de renutrition inappropriée survient surtout : A. Après un repas normal chez un patient en bonne santé B. Lors d'une réalimentation trop rapide chez un patient très dénutri ✓ bonne réponse C. Chez un patient en surpoids D. Lors d'un régime hypocalorique strict chez un patient obèse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un régime pauvre en sel est souvent prescrit en cas : A. D'hypoglycémie B. De fracture C. D'hypertension ✓ bonne réponse D. D'anémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Chez l'insuffisant rénal chronique, on surveille souvent les apports en : A. Potassium, phosphore, protéines ✓ bonne réponse B. Uniquement la vitamine C et les fibres alimentaires C. Eau minérale uniquement D. Vitamine C uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les compléments nutritionnels oraux sont utilisés : A. Pour remplacer tous les repas d'une personne en bonne santé B. Pour remplacer tous les repas des patients hospitalisés C. En complément, chez les dénutris ✓ bonne réponse D. Uniquement chez l'enfant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un patient âgé dénutri doit être pesé : A. Régulièrement ✓ bonne réponse B. Jamais C. Uniquement à l'entrée et à la sortie de l'hospitalisation D. Uniquement à la sortie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 La maladie cœliaque nécessite un régime : A. Sans eau B. Sans protéines C. Sans sucre D. Sans gluten ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'évaluation nutritionnelle comprend : A. Uniquement la taille B. Uniquement le dosage de l'albumine et de la glycémie à jeun C. Uniquement la couleur de peau D. Poids, perte de poids, IMC, apports ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les besoins énergétiques sont augmentés en cas : A. De repos complet au lit et d'immobilisation B. De jeûne volontaire prolongé chez l'adulte sain C. D'infection, brûlure, chirurgie ✓ bonne réponse D. De repos complet au lit et d'immobilisation prolongée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un régime adapté aux troubles de la déglutition utilise : A. Des textures modifiées ✓ bonne réponse B. Aucune adaptation C. Des aliments durs et secs D. Des liquides clairs uniquement, faciles à avaler, comme l'eau plate	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Prise en charge du diabète 20 questions

1 Quels sont les signes typiques d'une hypoglycémie ? A. Soif intense, urines abondantes et bouche sèche B. Sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion ✓ bonne réponse C. Fièvre et toux D. Démangeaisons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Face à une hypoglycémie chez un patient conscient, on donne : A. De l'insuline rapide en sous-cutané, puis contrôle B. Rien, cela passera seul en quelques minutes C. Un repas complet riche en graisses et en protéines D. 15 g de sucre rapide, puis contrôle ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Les aliments à index glycémique bas : A. Font monter la glycémie très rapidement B. Sont interdits aux diabétiques C. Ne contiennent aucun glucide D. Font monter la glycémie plus lentement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Chez le diabétique, l'activité physique régulière : A. Fait toujours monter la glycémie B. Améliore l'équilibre glycémique ✓ bonne réponse C. N'a aucun effet D. Est contre-indiquée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5	Le diabète de type 1 est principalement dû à : A. Une infection virale du pancréas B. Une consommation excessive de sucre pendant l'enfance C. Un déficit en insuline ✓ bonne réponse D. Une infection urinaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le diabète de type 2 est souvent associé à : A. Une infection virale du pancréas chez l'enfant B. Une carence en vitamine C C. Une fracture D. Le surpoids et la sédentarité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les signes d'hyperglycémie importante : A. Soif, urines abondantes, fatigue ✓ bonne réponse B. Sueurs froides et tremblements C. Fièvre isolée D. Toux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	L'objectif d'HbA1c chez beaucoup de diabétiques de type 2 est souvent : A. Autour de 12 %, pour éviter toute hypoglycémie B. 2 % C. Il n'y a pas d'objectif D. Autour de 7 % ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'éducation thérapeutique du patient diabétique porte notamment sur : A. Uniquement le prix des médicaments B. Autosurveillance, alimentation, activité, alertes ✓ bonne réponse C. Uniquement la technique d'injection, le reste relevant du médecin D. La couleur des stylos	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les sites d'injection d'insuline doivent être : A. Toujours au même endroit B. Toujours au même endroit, pour une absorption régulière C. Alternés ✓ bonne réponse D. Dans une veine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le resucrage d'une hypoglycémie est suivi : A. D'un jeûne B. D'un contrôle 15 minutes après ✓ bonne réponse C. D'aucune surveillance D. D'une injection d'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Les pieds d'un patient diabétique doivent être : A. Examinés, lavés, séchés ✓ bonne réponse B. Coupés avec des ciseaux pointus sans précaution C. Laissés pieds nus en permanence D. Trempés longuement dans l'eau chaude pour ramollir la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Les aliments à éviter en grande quantité chez le diabétique : A. Les sucreries ✓ bonne réponse B. L'eau C. Les légumes verts D. Les légumes verts et les fibres, qui augmentent la glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 L'acidocétose diabétique est : A. Un régime alimentaire B. Une hypoglycémie légère, corrigée par un apport de sucre C. Une complication bénigne D. Une complication grave ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Pendant le jeûne du Ramadan, un patient diabétique doit : A. Consulter avant ✓ bonne réponse B. Arrêter tous ses traitements sans avis C. Prendre toutes ses doses habituelles au moment de la rupture du jeûne D. Ne rien changer sans avis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'activité physique chez le diabétique traité par insuline peut provoquer : A. Une hyperglycémie systématique, qui impose d'augmenter l'insuline B. Une hypoglycémie ✓ bonne réponse C. Une hyperglycémie systématique D. Une fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les complications chroniques du diabète touchent notamment : A. Uniquement la peau, les ongles et les cheveux B. Aucun organe en dehors du pancréas C. Yeux, reins, nerfs, cœur, vaisseaux ✓ bonne réponse D. Uniquement la peau et les cheveux, sans atteinte des organes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une alimentation équilibrée pour un diabétique répartit les glucides : A. Sur les différents repas ✓ bonne réponse B. En supprimant les féculents et en les remplaçant par des fruits C. Uniquement le soir D. En un seul repas par jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'autosurveillance glycémique se note : A. Nulle part B. Uniquement de mémoire, entre deux consultations C. Uniquement lors des consultations, de mémoire D. Dans un carnet ou une application ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le fond d'œil est recommandé chez le diabétique pour dépister : A. La carie dentaire B. La rétinopathie ✓ bonne réponse C. La myopie uniquement D. Une myopie liée à l'hyperglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide-soignant(e) / auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

Soins d'hygiène et de confort 20 questions

1 Lors d'une toilette au lit, on procède :

- A. Dans n'importe quel ordre
- B. Du plus sale vers le plus propre
- C. Du plus propre vers le plus sale ✓ bonne réponse
- D. Uniquement le visage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant la toilette d'un patient, il faut préserver :

- A. La fenêtre ouverte en hiver
- B. Son intimité et son autonomie ✓ bonne réponse
- C. La rapidité du soin, pour réduire le temps où il est découvert
- D. Uniquement la rapidité du soin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un patient qui peut faire une partie de sa toilette seul :

- A. Doit attendre sa famille pour faire sa toilette
- B. Doit être encouragé à la faire ✓ bonne réponse
- C. Ne doit pas être lavé
- D. Doit être lavé entièrement par le soignant pour éviter qu'il se fatigue

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pendant la toilette, vous remarquez une rougeur au sacrum. Que faites-vous ?

- A. Vous la massez énergiquement avec une crème pour réactiver la circulation
- B. Vous le signalez et le notez ✓ bonne réponse
- C. Vous appliquez de l'alcool
- D. Vous n'en parlez pas

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Les soins de bouche chez un patient alité permettent de prévenir :

- A. L'hypertension
- B. Les fractures
- C. Les escarres du talon
- D. Infections buccales et inconfort ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 La température de l'eau pour une toilette est vérifiée :

- A. Avec le coude ou un thermomètre ✓ bonne réponse
- B. Avec le bout des doigts, l'eau devant être bien chaude pour le confort
- C. Elle n'a pas d'importance
- D. En demandant au patient après coup

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 Pour la toilette intime, on utilise :

- A. Un gant d'un autre patient
- B. Un gant et une serviette dédiés, du haut vers le bas (de l'avant vers l'arrière) ✓ bonne réponse
- C. De l'alcool
- D. Le même gant que pour le reste du corps, en terminant par le visage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

8 Les soins de bouche d'un patient porteur d'une prothèse dentaire comprennent : A. Le nettoyage de la prothèse et de la bouche ✓ bonne réponse B. Le rangement de la prothèse dans un mouchoir C. Le port de la prothèse jour et nuit sans nettoyage D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le shampoing au lit nécessite : A. Protéger le lit, bien installer ✓ bonne réponse B. Aucune préparation particulière, l'eau étant absorbée par le matelas C. De faire asseoir le patient au bord du lit, même s'il ne tient pas assis D. De mouiller tout le lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La réfection d'un lit occupé se fait : A. En secouant les draps B. En faisant lever le patient au fauteuil, même s'il ne peut pas se tenir debout C. En tournant le patient de côté ✓ bonne réponse D. Sans prévenir le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le linge sale est : A. Posé au sol dans la chambre puis ramassé en fin de tournée B. Mis directement dans le sac, sans le secouer ✓ bonne réponse C. Posé par terre dans la chambre puis ramassé en fin de tournée D. Posé sur le lit d'à côté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un patient incontinent doit bénéficier : A. De changes réguliers ✓ bonne réponse B. D'aucun soin particulier C. D'un change une fois par jour D. D'une limitation des boissons pour réduire le nombre de changes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le rasage d'un patient sous anticoagulant se fait de préférence : A. Au rasoir à lame B. Avec des ciseaux C. Au rasoir électrique ✓ bonne réponse D. Ce n'est jamais possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pendant la toilette, l'aide-soignant observe notamment : A. Peau, autonomie, humeur, douleur ✓ bonne réponse B. Uniquement la propreté du patient à la fin de la toilette C. Uniquement l'heure et la durée de la toilette D. Uniquement la couleur des draps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les ongles d'un patient diabétique : A. Sont limés avec une lime métallique agressive B. Ne nécessitent aucune attention C. Sont coupés très court et arrondis pour éviter qu'ils ne s'incarnent D. Ne sont pas coupés sans avis ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 L'installation au fauteuil d'un patient comprend : A. Le laisser plusieurs heures sans changer de position B. Confort, pieds posés, sonnette à portée ✓ bonne réponse C. Le laisser glisser D. L'installer plusieurs heures sans changer de position pour qu'il se repose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La pudeur d'un patient pendant le change est respectée en : A. Faisant le soin devant les visiteurs B. Faisant le soin rapidement, porte entrouverte pour pouvoir appeler de l'aide C. Porte fermée, corps couvert ✓ bonne réponse D. Laissant la porte ouverte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un patient en fin de vie a besoin en priorité : A. D'une toilette complète toutes les heures B. De confort et de présence ✓ bonne réponse C. D'être réveillé souvent D. D'une toilette complète plusieurs fois par jour pour qu'il soit toujours propre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'hygiène des mains de l'aide-soignant est réalisée : A. Uniquement en fin de journée B. Avant et après chaque soin ✓ bonne réponse C. Uniquement si les mains sont visiblement sales, les gants protégeant le reste du temps D. Uniquement si les mains sont sales	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un bain ou une douche chez un patient âgé fragile impose : A. De le laisser seul B. Une surveillance ✓ bonne réponse C. Une eau très chaude et une durée prolongée pour bien le détendre D. Une durée la plus longue possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Prévention des escarres 20 questions

1 Quelles sont les zones les plus à risque d'escarre chez un patient alité sur le dos ? A. Ventre et cuisses B. Sacrum, talons, coudes ✓ bonne réponse C. Mains et doigts D. Ventre, cuisses et face antérieure des genoux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Pour prévenir les escarres, il faut changer la position d'un patient à risque : A. Toutes les 2 à 3 heures environ ✓ bonne réponse B. Une fois par jour, au moment de la toilette du matin C. Une fois par jour, lors de la toilette du matin D. Jamais pour ne pas le réveiller	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 Quel facteur favorise l'apparition d'une escarre ? A. Une marche régulière B. Une hydratation suffisante et une alimentation riche en protéines C. La dénutrition et l'immobilité ✓ bonne réponse D. Un matelas adapté et des changements de position réguliers	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Quel outil sert à évaluer le risque d'escarre ? A. L'échelle de Braden ✓ bonne réponse B. Le score d'Apgar du nouveau-né C. L'échelle visuelle analogique (EVA) d'évaluation de la douleur D. Le score de Glasgow	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Une escarre est due principalement à : A. Un manque de soleil B. Une pression prolongée ✓ bonne réponse C. Une infection virale D. Une réaction allergique aux draps ou aux produits de toilette	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un matelas anti-escarres : A. Répartit les pressions, sans dispenser des retournements ✓ bonne réponse B. Est inutile chez un patient qui change de position seul et surveillé C. Supprime le besoin de changer de position et de surveiller la peau du patient D. Doit être recouvert de plusieurs couches de draps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Pour un patient assis au fauteuil, la zone la plus exposée est : A. Les ischions ✓ bonne réponse B. Les mains C. Les genoux et la face antérieure des cuisses D. Le front	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 La position semi-latérale à 30° est recommandée car : A. Elle empêche de respirer B. Elle évite l'appui sur trochanter et sacrum ✓ bonne réponse C. Elle est plus rapide à installer D. Elle augmente la pression sur la hanche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 L'humidité (urine, transpiration) favorise les escarres car : A. Elle n'a aucun effet B. Elle fragilise la peau ✓ bonne réponse C. Elle hydrate la peau et la rend plus résistante aux frottements D. Elle protège la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les frottements et le cisaillement surviennent notamment quand : A. On fait glisser le patient sur le drap ✓ bonne réponse B. Le patient marche seul jusqu'au fauteuil C. On utilise un drap de glisse D. On soulève le patient à deux à l'aide d'un drap de glisse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Masser une rougeur persistante au niveau d'un point d'appui : A. Est recommandé avec de l'alcool pour stimuler la circulation sanguine B. Est obligatoire C. Est recommandé fortement D. Est déconseillé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Une bonne alimentation et une hydratation suffisante : A. Font partie de la prévention ✓ bonne réponse B. Augmentent le risque C. N'ont aucun rôle D. Sont réservées aux sportifs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Les talons d'un patient alité peuvent être protégés en : A. Les entourant de bandes serrées et d'une épaisse couche de coton B. Les mettant en décharge ✓ bonne réponse C. Les laissant hors du lit D. Les posant directement sur le matelas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	L'évaluation du risque d'escarre se fait : A. Dès l'admission, puis régulièrement ✓ bonne réponse B. Uniquement si une rougeur ou une plaie apparaît sur un point d'appui C. Une seule fois à la sortie D. Uniquement si une plaie apparaît à la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Les changements de position doivent être : A. Évités la nuit dans tous les cas, pour préserver le sommeil du patient B. Faits sans noter C. Faits une fois par semaine D. Planifiés et notés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Le drap du lit doit être : A. Tendu, sans plis ✓ bonne réponse B. Mouillé pour rafraîchir C. Rugueux D. Plié en plusieurs épaisseurs sous le bassin pour absorber l'humidité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un patient très maigre a un risque d'escarre : A. Identique à tous B. Diminué, car son poids exerce moins de pression sur le matelas C. Augmenté ✓ bonne réponse D. Nul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	L'aide-soignant qui découvre une phlyctène au talon : A. N'en parle pas B. Applique du talc C. La signale et met le talon en décharge ✓ bonne réponse D. La perce avec une aiguille stérile puis applique un pansement sec	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 L'immobilité prolongée favorise :

- A. Uniquement la perte de poids
- B. Une meilleure circulation sanguine grâce au repos des muscles
- C. Escarres, phlébites, enraidissement ✓ bonne réponse
- D. La guérison rapide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Un coussin en forme de « bouée » au fauteuil :

- A. Est déconseillé ✓ bonne réponse
- B. Est obligatoire
- C. Est le meilleur dispositif pour répartir la pression au niveau du sacrum
- D. Prévient toutes les escarres

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Manutention des patients 20 questions

1 Pour soulever une charge ou aider un patient, il faut :

- A. Dos droit, genoux fléchis ✓ bonne réponse
- B. Porter seul, loin du corps
- C. Plier le dos en gardant les jambes tendues pour protéger les genoux
- D. Faire une torsion du tronc

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Avant de lever un patient, la première chose à faire est :

- A. Expliquer et évaluer ses capacités ✓ bonne réponse
- B. Le lever rapidement sans prévenir
- C. Appeler sa famille
- D. Retirer les freins du lit pour pouvoir l'approcher du fauteuil

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Lors d'un transfert lit-fauteuil, le fauteuil doit être :

- A. Sans repose-pieds réglés
- B. Placé loin du lit
- C. Près du lit, freins serrés ✓ bonne réponse
- D. Freins desserrés

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Un lève-personne (soulève-malade) est utilisé :

- A. Pour tous les patients autonomes qui marchent seuls
- B. Pour tous les patients, y compris ceux qui peuvent se lever seuls
- C. Pour les patients non participants ✓ bonne réponse
- D. Uniquement pour les enfants et les patients légers

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Avant de mobiliser un patient lourd seul(e), il faut :

- A. Le porter seul(e) rapidement
- B. Évaluer la situation et demander de l'aide ou utiliser une aide technique ✓ bonne réponse
- C. Le tirer par les bras en gardant le dos bien droit pour ne pas se blesser
- D. Attendre qu'il tombe

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Le drap de glisse sert à :

- A. Faire la toilette
- B. Couvrir le patient
- C. Protéger le matelas de l'urine et de la transpiration du patient
- D. Déplacer le patient sans frottement ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 Le lit doit être réglé, pour un soin, à une hauteur : A. La plus haute possible B. La plus basse possible C. Permettant au soignant de travailler le dos droit ✓ bonne réponse D. Peu importe, le soignant s'adapte en se penchant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Pour aider un patient à se lever du lit, on l'encourage d'abord à : A. S'asseoir au bord du lit un moment ✓ bonne réponse B. Se lever les yeux fermés C. Se lever directement en une fois, pour éviter de le fatiguer D. Sauter du lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Un patient qui fait un malaise lors du lever doit être : A. Recouché ou assis en sécurité et surveillé ✓ bonne réponse B. Laissé debout C. Maintenu debout en le soutenant D. Tiré par le bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le verticalisateur est utile pour un patient : A. Qui peut prendre appui sur ses jambes ✓ bonne réponse B. Totalelement autonome C. Qui marche seul D. Qui ne peut pas du tout porter son poids ni tenir sa tête	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Pendant un transfert, il est important de : A. Le surprendre B. Expliquer et faire participer ✓ bonne réponse C. Faire vite et sans parler pour ne pas le stresser inutilement D. Le tirer par le cou	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le fauteuil roulant est approché du lit : A. Freins desserrés B. Freins desserrés et repose-pieds baissés pour poser les pieds du patient C. Le plus loin possible du lit, freins desserrés D. Freins serrés, repose-pieds relevés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les troubles musculo-squelettiques du soignant sont favorisés par : A. L'utilisation d'aides techniques et le travail en binôme lors des transferts B. Le lit à bonne hauteur C. Les postures penchées et le port de charges ✓ bonne réponse D. Le travail à deux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pour tourner un patient sur le côté, on : A. Le tire par un bras B. Le pousse loin de soi, au bord opposé du lit, sans le prévenir pour aller vite C. Le fait rouler vers soi, après l'avoir prévenu ✓ bonne réponse D. Le soulève seul à bout de bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Avant d'utiliser un lève-personne, on vérifie : A. Uniquement la couleur et la propreté de la sangle B. Que le patient est debout et peut marcher seul C. Sangle, charge maximale, fonctionnement ✓ bonne réponse D. Uniquement la propreté de la sangle et la charge de la batterie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un patient opéré de la hanche doit être mobilisé : A. En lui croisant les jambes B. Jamais avant trois semaines C. Comme n'importe quel patient, la prothèse étant solide dès la pose D. En respectant les consignes de mouvements interdits données par le chirurgien ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La marche accompagnée d'un patient fragile se fait : A. En le laissant seul pour stimuler son autonomie B. À côté, en retrait, côté faible ✓ bonne réponse C. Devant lui, en le tenant par les deux mains tendues pour le guider D. Derrière lui à plusieurs mètres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le chariot de soins ou de linge se pousse plutôt : A. Dos droit, bras près du corps ✓ bonne réponse B. En le tirant derrière soi, penché en avant pour avoir plus de force C. D'une seule main, en se penchant sur le côté D. En le tirant derrière soi, dos penché	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La mobilisation précoce des patients sert à prévenir : A. Les chutes, en limitant les déplacements du patient au maximum B. L'autonomie C. Les complications de l'immobilité ✓ bonne réponse D. La guérison	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient au sol après une chute ne doit être relevé : A. Immédiatement en le tirant par les bras B. Immédiatement par un seul soignant, pour qu'il ne prenne pas froid au sol C. Qu'après évaluation de son état ✓ bonne réponse D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide aux repas et hydratation 20 questions

1 Pour aider un patient présentant des troubles de la déglutition à manger, il faut l'installer : A. Assis, tête fléchie en avant ✓ bonne réponse B. Assis, tête en arrière C. Allongé à plat sur le dos D. Tête en arrière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un patient tousse et s'étouffe à chaque gorgée d'eau. Vous devez : A. Arrêter et le signaler ✓ bonne réponse B. Lui donner plus vite à boire C. Ne rien signaler D. Lui donner plus vite à boire, par grandes gorgées, pour éviter qu'il tousse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Quels signes peuvent évoquer une déshydratation chez une personne âgée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Œdèmes des jambes uniquement B. Prise de poids rapide C. Bouche sèche, urines foncées, confusion ✓ bonne réponse D. Une prise de poids et des œdèmes	
4	La surveillance des repas consiste notamment à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Supprimer les collations entre les repas B. Noter les quantités consommées ✓ bonne réponse C. Forcer le patient à finir D. Débarrasser rapidement pour libérer la table	
5	Avant le repas, on installe le patient :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Assis, mains lavées, prothèses en place ✓ bonne réponse B. Sans lui laver les mains C. Sans ses lunettes D. Allongé à plat, la tête tournée sur le côté pour éviter les fausses routes	
6	Le régime alimentaire prescrit (sans sel, diabétique, mixé) doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Changé selon les goûts du soignant B. Vérifié pour chaque plateau ✓ bonne réponse C. Remplacé par le régime du voisin D. Ignoré	
7	Une personne qui a des difficultés pour couper ses aliments :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Est aidée en favorisant son autonomie (couverts adaptés, aide partielle) ✓ bonne réponse B. Doit attendre la famille pour être aidée au repas C. Reçoit uniquement des repas liquides ou mixés D. Est nourrie entièrement par le soignant pour gagner du temps	
8	Aider un patient à manger se fait :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. En le pressant B. Assis, à son rythme ✓ bonne réponse C. En parlant au téléphone D. Debout à côté du lit, par grosses bouchées pour qu'il ne se fatigue pas	
9	Les signes de fausse route sont :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Somnolence et digestion lente après le repas uniquement B. Bon appétit et repas terminé rapidement C. Somnolence et digestion lente après le repas D. Toux, voix mouillée, gêne respiratoire pendant le repas ✓ bonne réponse	
10	Pour une personne âgée qui boit peu, on peut :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Supprimer les boissons le soir pour éviter les levers nocturnes B. Proposer régulièrement des boissons variées, gélifiées si besoin ✓ bonne réponse C. Attendre qu'elle réclame D. Lui faire boire un grand verre d'eau le soir, avant le coucher	

11 Le relevé des ingesta consiste à : A. Noter ce qu'il a bu et mangé ✓ bonne réponse B. Noter le menu affiché C. Noter le nom du cuisinier D. Peser le plateau vide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un patient à jeun pour un examen : A. Peut boire un café B. Ne reçoit ni repas ni boisson ✓ bonne réponse C. Peut manger léger D. Peut manger s'il a faim	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Après le repas, le patient qui a des troubles de la déglutition reste : A. Assis environ 30 minutes ✓ bonne réponse B. Allongé à plat immédiatement après C. Allongé à plat immédiatement pour faciliter la digestion D. Allongé sur le ventre pour digérer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une alimentation enrichie consiste à : A. Ajouter de l'eau B. Supprimer les protéines C. Plus de calories et protéines, même volume ✓ bonne réponse D. Augmenter les portions servies, en doublant le volume de chaque plat	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient qui ne mange pas plusieurs repas de suite : A. Est laissé tranquille : l'appétit revient toujours spontanément B. Est forcé à manger C. Est signalé ✓ bonne réponse D. Est privé de dessert	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'eau gélifiée est utile pour : A. Les nourrissons de moins d'un mois B. Les fausses routes aux liquides ✓ bonne réponse C. Les patients déshydratés qui ne peuvent pas avoir de perfusion D. Remplacer les repas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les plateaux repas sont distribués : A. En respectant les règles d'hygiène et en vérifiant le nom et le régime ✓ bonne réponse B. Au hasard C. Après les avoir posés au sol D. Dans l'ordre des chambres sans vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le respect des habitudes et des convictions alimentaires du patient : A. N'a aucune importance B. Est impossible à respecter dans un établissement de santé C. Fait partie de la qualité des soins ✓ bonne réponse D. Est impossible à l'hôpital, où un menu unique est servi à tous	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Une bouche sèche chez un patient en fin de vie se soulage par :

- A. Rien
- B. Un jeûne
- C. Une perfusion systématique
- D. Des soins de bouche fréquents ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La surveillance de l'hydratation chez la personne âgée inclut :

- A. Diurèse, urines, muqueuses, comportement ✓ bonne réponse
- B. Uniquement la pesée annuelle et la mesure de la tension artérielle
- C. Uniquement le poids annuel et la tension artérielle
- D. Uniquement la couleur des cheveux

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Accueil et secrétariat médical

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e)

Accueil et relation patient 20 questions

1 Un patient s'énervé à l'accueil après une longue attente. La meilleure attitude est :

- A. Rester calme, écouter, informer ✓ bonne réponse
- B. L'ignorer jusqu'à ce qu'il se calme
- C. Appeler immédiatement la sécurité pour le faire sortir de la salle
- D. Lui répondre sur le même ton

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Au téléphone, un appelant décrit une douleur thoracique intense. Que faire ?

- A. Lui conseiller de prendre un antalgique et de rappeler si la douleur persiste
- B. Orienter vers le SAMU (190) ✓ bonne réponse
- C. Lui donner un rendez-vous la semaine suivante
- D. Raccrocher

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 L'écoute active consiste à :

- A. Reformuler et questionner ✓ bonne réponse
- B. Écouter en faisant autre chose
- C. Couper la parole pour gagner du temps
- D. Préparer sa réponse pendant que la personne parle, pour gagner du temps

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pour accueillir une personne malentendante, il est préférable de :

- A. S'adresser uniquement à l'accompagnant, qui transmettra les informations
- B. Crier
- C. Parler en tournant le dos
- D. Être face à elle, parler lentement ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Au téléphone, la première phrase professionnelle comprend :

- A. Le numéro de téléphone du service et l'heure d'ouverture du secrétariat
- B. Uniquement « Allô ? »
- C. Rien, on attend que l'appelant parle
- D. Le service, son prénom, une salutation ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Un patient ne parle ni arabe ni français. Vous :	A. Refusez de le recevoir B. Lui parlez plus fort et plus lentement en français jusqu'à ce qu'il comprenne C. Cherchez un interprète ou un outil ✓ bonne réponse D. Le faites attendre jusqu'à la fermeture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Pour une personne en fauteuil roulant à l'accueil, on veille à :	A. Se pencher au-dessus d'elle B. La laisser derrière le comptoir haut C. Se mettre à sa hauteur ✓ bonne réponse D. Parler uniquement à l'accompagnant, pour lui éviter de répondre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un appel concerne une urgence vitale (enfant qui ne respire plus). Vous :	A. Prenez un rendez-vous B. Demandez de rappeler plus tard, quand un médecin sera disponible C. Orientez immédiatement vers le SAMU (190) et alertez un soignant ✓ bonne réponse D. Lui demandez de rappeler plus tard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La gestion de la salle d'attente comprend :	A. L'ignorance des patients B. Le passage des patients strictement par ordre d'arrivée, sans exception C. La fermeture des fenêtres en permanence D. Informer et veiller aux fragiles ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient mécontent menace de porter plainte. Vous :	A. Lui dites qu'il n'a aucun droit de réclamer, pour clore la discussion B. Lui demandez de quitter immédiatement l'établissement C. Restez calme, l'écoutez et l'orientez vers la procédure de réclamation ✓ bonne réponse D. Le menacez à votre tour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Une bonne posture d'accueil inclut :	A. Tourner le dos B. Continuer sa saisie en écoutant la personne sans la regarder C. Regarder la personne, sourire, se présenter et rester disponible ✓ bonne réponse D. Mâcher un chewing-gum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Lorsqu'on doit faire patienter quelqu'un au téléphone :	A. On raccroche B. On le prévient et on reprend l'appel rapidement ✓ bonne réponse C. On continue une autre conversation sans le dire D. On le met en attente sans prévenir pendant longtemps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Les informations médicales données à l'accueil :	A. Sont données par téléphone à n'importe qui B. Sont affichées publiquement C. Sont limitées ✓ bonne réponse D. Peuvent être données à tout membre de la famille qui se présente	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Un patient âgé désorienté arrive seul. Vous : A. L'ignorez B. Le laissez repartir seul C. Le rassurez et prévenez l'équipe ✓ bonne réponse D. Lui demandez de rentrer chez lui et de revenir accompagné d'un proche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La prise de rendez-vous doit tenir compte : A. Du hasard B. Uniquement de l'heure de pause C. Uniquement de l'ordre des appels, sans considération de l'urgence D. De l'urgence et des consignes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 En cas de retard important du médecin, l'accueil : A. Ne dit rien B. Informe les patients ✓ bonne réponse C. Annule tous les rendez-vous de la journée sans prévenir les patients D. Ferme le cabinet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une réclamation écrite d'un patient doit être : A. Enregistrée et transmise au responsable selon la procédure ✓ bonne réponse B. Laisée sans réponse ni enregistrement C. Classée sans suite D. Rendue au patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le vouvoiement avec les patients est : A. Réservé aux personnes âgées B. Inutile à l'hôpital C. Réservé aux médecins D. La règle par défaut, par respect ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Pour expliquer un trajet dans l'hôpital, il est utile de : A. Donner des repères simples ✓ bonne réponse B. Refuser de répondre C. Dire « c'est par là » sans préciser D. Lui conseiller de demander son chemin aux autres patients dans les couloirs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un appelant agressif au téléphone insulte la secrétaire. Elle peut : A. Lui donner les informations demandées, même confidentielles, pour le calmer B. Poser une limite, raccrocher, signaler ✓ bonne réponse C. Insulter en retour D. Lui donner les informations demandées pour qu'il se calme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Le dossier patient doit être : A. Laissé sur le bureau d'accueil B. Confidentiel et à jour ✓ bonne réponse C. Communiqué à toute personne de la famille qui en fait la demande D. Détruit après chaque consultation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Deux patients portent le même nom et prénom. Pour éviter une erreur, vous vérifiez : A. Uniquement l'adresse, qui suffit à différencier les deux patients B. Date de naissance et n° de dossier ✓ bonne réponse C. La couleur des vêtements D. Rien, ils sont identiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Votre session sur le logiciel du cabinet doit être : A. Ouverte en permanence B. Partagée avec un mot de passe commun affiché C. Verrouillée dès que vous quittez votre poste ✓ bonne réponse D. Laissée ouverte pour les collègues	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un résultat d'analyse arrive pour un patient. Vous pouvez le communiquer par téléphone : A. Oui, à toute personne qui donne le nom et la date de naissance du patient B. Non, sauf procédure prévue : les résultats sont remis au patient ou au médecin de façon sécurisée ✓ bonne réponse C. Au voisin D. À l'employeur du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 À l'admission, les documents demandés au patient sont notamment : A. Identité et prise en charge ✓ bonne réponse B. Aucun document C. Uniquement son numéro de téléphone D. Son dernier bulletin de salaire et une attestation de domicile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le numéro de dossier unique permet : A. De calculer l'âge B. Rien C. De fixer le prix D. D'éviter les erreurs d'identité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un doublon de dossier (même patient avec deux dossiers) doit être : A. Signalé pour fusion ✓ bonne réponse B. Supprimé immédiatement par la secrétaire, sans autre vérification C. Laissé tel quel D. Utilisé alternativement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les documents papier contenant des données médicales sont : A. Laissés sur le comptoir B. Jetés à la poubelle ordinaire C. Recyclés comme brouillon au secrétariat après la fin de la consultation D. Sous clé, puis broyés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Envoyer un compte rendu médical par email nécessite : A. N'importe quelle adresse email B. Une messagerie sécurisée ✓ bonne réponse C. Une copie à tout le service, pour assurer la continuité des soins D. Aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un mot de passe de logiciel médical doit être : A. Le même pour tout le service, pour dépanner en cas d'absence B. Personnel et robuste ✓ bonne réponse C. Votre date de naissance D. Écrit sur un post-it sur l'écran	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La facturation d'un acte nécessite : A. Le bon code et la bonne identité ✓ bonne réponse B. Aucune information C. Le nom d'un autre patient D. Une estimation du tarif, corrigée plus tard si nécessaire par la comptabilité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un patient demande une copie de son dossier : A. On refuse toujours de transmettre des copies au patient B. La demande est traitée selon la procédure légale de l'établissement, avec vérification de son identité ✓ bonne réponse C. On donne le dossier original à la personne qui appelle, sans délai D. On envoie le dossier sans vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La saisie de l'identité du patient se fait : A. Phonétiquement, d'après ce que dit le patient, pour aller plus vite B. Avec un surnom C. Sans date de naissance D. D'après la pièce d'identité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un courrier médical arrivé au secrétariat est : A. Ouvert et lu par l'accueil, puis rangé dans une pile en attente de classement B. Laissé dans une pile en attente de classement C. Lu par l'accueil et rangé dans une pile D. Enregistré, transmis, classé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La sauvegarde des données informatiques sert à : A. Éviter la perte des dossiers ✓ bonne réponse B. Accélérer le démarrage de l'ordinateur C. Partager les dossiers sur internet D. Partager les données avec d'autres établissements via internet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les résultats d'examens sont classés : A. Par date de réception, dans un classeur commun à tous les patients B. Au hasard C. Dans le bon dossier, identité vérifiée ✓ bonne réponse D. Dans un tiroir commun, par ordre d'arrivée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Un écran affichant un dossier patient à l'accueil doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Laisse ouvert pendant la pause, pour reprendre plus vite le travail B. Non visible et verrouillé ✓ bonne réponse C. Sans importance D. Tourné vers la salle d'attente	
18	La durée de conservation des dossiers médicaux :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Est libre et décidée par le médecin B. Est libre C. Est fixée par la réglementation et doit être respectée ✓ bonne réponse D. Est d'une semaine	
19	La planification des rendez-vous dans un agenda partagé exige :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Des informations exactes (motif, durée, coordonnées) et sa mise à jour ✓ bonne réponse B. Aucune mise à jour une fois le rendez-vous fixé C. Uniquement le prénom D. Des rendez-vous en double, pour compenser les absences des patients	
20	Une fuite de données (dossier envoyé à une mauvaise personne) doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Corrigée en envoyant d'autres dossiers B. Ignorée si personne ne s'en rend compte C. Cachée D. Signalée immédiatement au responsable ✓ bonne réponse	

Terminologie médicale 20 questions

1	Le suffixe « -ite » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Inflammation ✓ bonne réponse B. Ablation chirurgicale C. Tumeur bénigne d'un organe ou d'un tissu D. Douleur	
2	Le suffixe « -ectomie » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Ablation ✓ bonne réponse B. Suture C. Inflammation D. Examen visuel à l'aide d'un instrument optique	
3	« Tachycardie » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Tension artérielle élevée de façon permanente B. Arrêt du cœur C. Cœur rapide ✓ bonne réponse D. Rythme cardiaque lent	
4	Le préfixe « hyper- » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Au-dessus, excès ✓ bonne réponse B. À l'intérieur C. En dessous, insuffisance D. Autour	

5 Un « ORL » est spécialiste : A. Oreilles, nez, gorge ✓ bonne réponse B. De la peau et des muqueuses C. Du cœur et des vaisseaux D. Des os, des articulations et des ligaments	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 « Hypotension » signifie : A. Tension artérielle basse ✓ bonne réponse B. Tension artérielle élevée C. Fièvre D. Rythme cardiaque rapide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 « Dyspnée » signifie : A. Trouble du sommeil B. Difficulté à avaler les aliments solides C. Douleur abdominale D. Gêne respiratoire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 « Dysphagie » signifie : A. Difficulté à avaler ✓ bonne réponse B. Perte de mémoire C. Trouble de la vue D. Difficulté à respirer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le suffixe « -algie » signifie : A. Inflammation B. Écoulement anormal d'un liquide C. Douleur ✓ bonne réponse D. Ablation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le suffixe « -scopie » signifie : A. Douleur B. Ablation C. Suture chirurgicale d'un organe D. Examen visuel ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le suffixe « -tomie » signifie : A. Inflammation B. Examen du sang C. Ablation totale d'un organe D. Incision ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 « Hématurie » signifie : A. Urines abondantes B. Présence de sang dans les urines ✓ bonne réponse C. Absence d'urines D. Présence de sucre dans les urines	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13	« Anurie » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Douleur en urinant B. Absence d'urines ✓ bonne réponse C. Urines abondantes D. Sang dans les urines	
14	Le préfixe « héli- » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Moitié ✓ bonne réponse B. Sang C. Autour de, à proximité de D. Double	
15	« Néphrologie » est la spécialité :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Du cœur B. Du cerveau C. Des reins ✓ bonne réponse D. De la peau	
16	« Gastro-entérologie » concerne :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Les poumons B. Les yeux C. Le tube digestif ✓ bonne réponse D. Les os	
17	« Pneumologie » concerne :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le système nerveux et le cerveau B. Les poumons et la respiration ✓ bonne réponse C. Les reins et l'appareil urinaire D. Le cœur, les artères et les vaisseaux	
18	« IV » sur une prescription signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Quatre fois par jour B. Intraveineuse ✓ bonne réponse C. Par la bouche D. Intramusculaire	
19	« ATCD » dans un dossier signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Analyse B. Attestation C. Antécédents ✓ bonne réponse D. Autorisation	
20	« Bradypnée » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Respiration lente ✓ bonne réponse B. Respiration rapide C. Cœur lent D. Cœur rapide	

Transport sanitaire

Postes concernés : Ambulancier(ère)

Transport sanitaire 20 questions

1 Quel est le numéro du SAMU en Tunisie ?

- A. 190 ✓ bonne réponse
- B. 198
- C. 197
- D. 1 899

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant le transport, un patient devient pâle, en sueurs et ne répond plus. Que faire ?

- A. Accélérer sans rien vérifier
- B. Ouvrir les fenêtres et continuer en accélérant vers l'hôpital
- C. Arrêter le véhicule en sécurité, évaluer conscience et respiration, alerter et débiter les gestes d'urgence ✓ bonne réponse
- D. Attendre l'arrivée à l'hôpital

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Après un transport de patient contagieux, l'ambulance doit être :

- A. Utilisée immédiatement
- B. Lavée une fois par mois
- C. Désinfectée selon le protocole ✓ bonne réponse
- D. Aérée pendant quelques minutes avant le transport suivant

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Lors du transport, le brancard doit être :

- A. Sans sangles
- B. Verrouillé dans son système de fixation, patient sanglé ✓ bonne réponse
- C. Libre de bouger, pour amortir les secousses de la route
- D. Retiré du véhicule

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Avant de partir en intervention, l'ambulancier vérifie :

- A. Le véhicule, l'oxygène, le matériel de soins et de communication ✓ bonne réponse
- B. Rien
- C. Uniquement le carburant et la pression des pneus
- D. La radio musicale

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 La position demi-assise pendant le transport convient :

- A. À un traumatisé du rachis
- B. À un patient dyspnéique ✓ bonne réponse
- C. À un patient en état de choc, tension effondrée
- D. À une victime inconsciente

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 Une femme enceinte au 3e trimestre est transportée de préférence :

- A. Assise penchée en avant pour soulager le dos
- B. Sur le ventre
- C. Sur le dos à plat
- D. En position latérale gauche (ou inclinée à gauche) ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

8 Un patient en état de choc est souvent installé : A. Sur le ventre B. Allongé, jambes éventuellement surélevées selon le contexte, et surveillé ✓ bonne réponse C. Assis, buste penché en avant pour faciliter la respiration D. Debout, soutenu par deux sauveteurs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La bouteille d'oxygène doit être : A. Fixée, manipulée sans graisse et éloignée de toute flamme ✓ bonne réponse B. Posée libre sur le brancard C. Graissée au niveau du robinet pour faciliter l'ouverture D. Placée près du chauffage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le bilan transmis au médecin régulateur comprend : A. Conscience, respiration, circulation, plaintes et circonstances ✓ bonne réponse B. Uniquement l'adresse, le nom et l'âge du patient C. Uniquement le nom du patient D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Pendant le transport, l'ambulancier : A. Reste dans la cabine et ne vérifie qu'à l'arrivée B. Laisse le patient seul à l'arrière C. Reste dans la cabine et ne vérifie le patient qu'à l'arrivée D. Surveille le patient en permanence ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 L'usage des avertisseurs lumineux et sonores est : A. Permanent B. Réservé aux urgences ✓ bonne réponse C. Interdit en toutes circonstances D. Autorisé pour tout transport sanitaire, même sans urgence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La ceinture de sécurité du patient et de l'accompagnant : A. Est interdite pour le patient allongé B. Est retirée pendant le trajet, car elle gêne la surveillance du patient C. Est facultative pour l'accompagnant D. Doit être attachée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient sous oxygène refuse son masque pendant le transport. On : A. Explique, rassure et informe le médecin ✓ bonne réponse B. Force le masque sur le visage C. Débranche le patient D. Arrête l'oxygène jusqu'à l'arrivée, puisque le patient le refuse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La fiche d'intervention ou de transport doit être : A. Jetée B. Remplie le lendemain, de mémoire, au retour à la base C. Remplie et transmise à l'équipe qui accueille le patient ✓ bonne réponse D. Remise à un passant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Le nettoyage du brancard et de la cellule sanitaire se fait : A. Jamais B. Une fois par mois C. Après chaque transport ✓ bonne réponse D. Uniquement s'il est très sale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient dialysé transporté régulièrement : on veille surtout à : A. Protéger le bras de la fistule ✓ bonne réponse B. Le transporter debout C. Prendre la tension sur le bras de la fistule, plus facile d'accès D. Ne rien vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 En arrivant sur un accident de la route, l'ambulancier commence par : A. Courir vers la première victime sans regarder B. Déplacer les véhicules impliqués pour dégager la route rapidement C. Baliser les lieux ✓ bonne réponse D. Prendre des photos	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le secret professionnel s'applique aux ambulanciers : A. Seulement pour les mineurs et les patients sous tutelle B. Seulement la nuit C. Non, jamais D. Oui ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient agité risque de se blesser pendant le transport. On : A. Le laisse seul à l'arrière pour ne pas l'énervé B. Le laisse se lever dans le véhicule C. Accélère pour arriver plus vite et le confier aux urgences D. Sécurise l'installation, rassure et demande un renfort médical si besoin ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Immobilisation et relevage 20 questions

1 Chez un blessé suspect de traumatisme du rachis, il faut : A. Maintenir la tête dans l'axe ✓ bonne réponse B. Le soulever par les bras C. Le faire asseoir rapidement pour vérifier qu'il peut bouger les jambes D. Lui tourner la tête pour le faire parler	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Le matelas immobilisateur à dépression (coquille) sert à : A. Mesurer la tension et le pouls B. Immobiliser tout le corps ✓ bonne réponse C. Réchauffer le patient et le protéger du sol pendant le transport D. Réchauffer le patient pendant le trajet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Une attelle doit immobiliser : A. Uniquement le foyer de fracture B. Tout le corps C. Les articulations sus- et sous-jacentes ✓ bonne réponse D. Aucune articulation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Avant de poser une attelle sur un membre, on vérifie : A. Rien B. Uniquement la douleur C. Sensibilité, motricité, circulation ✓ bonne réponse D. La température corporelle et la tension artérielle du blessé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le collier cervical est posé : A. Sans maintien de la tête B. Après maintien de la tête, taille adaptée ✓ bonne réponse C. Uniquement si le patient le demande D. Avant tout examen, en tournant la tête du blessé pour bien l'ajuster	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le relevage d'une victime suspecte de traumatisme du rachis nécessite : A. Un seul sauveteur qui la soulève en la tenant sous les aisselles B. De la tirer par les pieds C. De la faire marcher D. Plusieurs sauveteurs coordonnés et un matériel adapté (brancard cuillère, plan dur) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le brancard cuillère permet : A. De soulever sans bouger la victime ✓ bonne réponse B. De transporter la victime assise sur de longues distances C. De la réanimer D. De la réchauffer et la couvrir pendant le trajet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un membre fracturé avec déformation doit être : A. Massé B. Laissé sans immobilisation C. Immobilisé tel quel ✓ bonne réponse D. Remis dans l'axe par l'ambulancier avant toute immobilisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Après l'immobilisation d'un membre, on vérifie à nouveau : A. Circulation, sensibilité, motricité ✓ bonne réponse B. Rien C. Uniquement la bonne fermeture des sangles de l'attelle D. La couleur du matériel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Une victime casquée (moto) consciente et qui respire : A. Doit être secouée B. Garde son casque, retiré à deux si besoin ✓ bonne réponse C. Doit retirer elle-même son casque rapidement pour mieux respirer D. Doit garder le casque en toutes circonstances même si elle vomit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le chef d'équipe lors d'un relevage : A. Ne parle pas B. Coordonne et donne les ordres ✓ bonne réponse C. Porte la tête de la victime et laisse chacun bouger à son rythme D. Filme l'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Une écharpe (bras en écharpe) est utilisée pour immobiliser : A. Une fracture de la jambe B. Une blessure de la colonne C. Une blessure du membre supérieur ✓ bonne réponse D. Une plaie du crâne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 L'attelle à dépression se moule : A. Après l'arrivée à l'hôpital B. Autour du membre, puis on fait le vide ✓ bonne réponse C. En gonflant fortement D. Avec de l'eau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une fracture ouverte (os visible) nécessite : A. De la laisser à l'air pour éviter la macération B. De remettre l'os dans la plaie C. De laver la plaie au savon et de remettre l'os dans l'axe D. De protéger la plaie stérilement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La position latérale de sécurité est contre-indiquée chez : A. Une victime inconsciente qui vomit, sans traumatisme B. Une victime inconsciente qui respire, sans aucun traumatisme C. Un traumatisé du rachis, sans technique adaptée ✓ bonne réponse D. Une victime intoxiquée qui respire normalement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le plan dur (planche) est utilisé : A. Pour transporter le matériel de réanimation uniquement B. Pour immobiliser un traumatisé ✓ bonne réponse C. Pour faire la toilette D. Pour réchauffer la victime	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Avant de soulever une victime, les sauveteurs : A. Dos droit, et soulèvent au signal ✓ bonne réponse B. Soulèvent chacun à leur rythme, sans attendre de signal commun C. Tirent la victime par les vêtements D. Soulèvent dos courbé jambes tendues	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'immobilisation du bassin (ceinture pelvienne) est indiquée : A. Fracture grave du bassin suspectée ✓ bonne réponse B. Pour toute douleur de hanche, même légère C. Pour une plaie du doigt D. Pour toute douleur de hanche, même légère, chez la personne âgée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le dégagement d'urgence d'une victime (sans immobilisation préalable) est réservé : A. Aux victimes âgées B. À un danger réel, immédiat et non contrôlable (incendie, risque d'explosion) ✓ bonne réponse C. À toutes les situations D. Aux victimes conscientes qui peuvent aider les sauveteurs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Une victime en hypothermie doit être manipulée :

- A. Plongée rapidement dans un bain chaud
- B. Avec douceur, isolée du froid ✓ bonne réponse
- C. Frictionnée vivement pour la réchauffer
- D. Massée énergiquement et frictionnée pour la réchauffer vite

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Pédiatrie

Postes concernés : Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Soins néonataux](#) (Sage-femme),
[Préparation et administration des médicaments](#) (Infirmier(ère)).

Soins pédiatriques 20 questions

1 Chez l'enfant, la dose d'un médicament est généralement calculée :

- A. Selon la taille seulement
- B. Comme chez l'adulte, divisée par deux
- C. Uniquement selon l'âge en années
- D. En fonction du poids (mg/kg) ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le paracétamol chez l'enfant se donne habituellement à la dose de :

- A. 1 g par prise quel que soit l'âge
- B. 5 mg/kg toutes les 2 heures, sans dose maximale journalière
- C. 15 mg/kg toutes les 6 heures ✓ bonne réponse
- D. 50 mg/kg par prise

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un nourrisson a une diarrhée, la fontanelle déprimée et les yeux creux. Il faut suspecter :

- A. Une otite simple
- B. Une déshydratation ✓ bonne réponse
- C. Une poussée dentaire
- D. Une constipation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, on le couche :

- A. Dans le lit des parents avec un oreiller
- B. Sur le côté, calé par des coussins pour éviter qu'il ne se retourne
- C. Sur le ventre
- D. Sur le dos, sans oreiller ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Un enfant fait une convulsion avec de la fièvre. Que faire en premier ?

- A. Lui mettre un objet entre les dents
- B. Le protéger des chocs, ne rien mettre dans sa bouche, le placer en position latérale de sécurité après la crise et alerter ✓ bonne réponse
- C. Le maintenir fermement et lui mettre un objet entre les dents
- D. Le plonger dans un bain d'eau froide pour faire baisser la fièvre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 La fréquence cardiaque normale d'un nourrisson au repos est d'environ :

- A. 100 à 160 battements/min ✓ bonne réponse
- B. 60 à 80 battements/min
- C. 200 à 240 battements/min
- D. 40 à 60 battements/min

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	La fréquence respiratoire normale d'un enfant de 1 à 5 ans est d'environ : A. 100 cycles/min B. 20 à 30 cycles/min ✓ bonne réponse C. 60 à 80 cycles/min D. 5 à 10 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le calcul d'une dose pédiatrique : 15 mg/kg pour un enfant de 12 kg donne : A. 120 mg B. 180 mg ✓ bonne réponse C. 15 mg D. 1 800 mg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La bronchiolite du nourrisson est le plus souvent due : A. À une carence en fer B. À un virus (souvent le VRS) ✓ bonne réponse C. À une allergie D. À une bactérie systématiquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les signes de gravité d'une bronchiolite incluent : A. Difficulté à s'alimenter, signes de lutte respiratoire, pauses respiratoires ✓ bonne réponse B. Une toux légère et un nez qui coule depuis quelques jours C. Un simple nez qui coule D. Un bon appétit et un sommeil calme et réparateur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Pour réhydrater un enfant atteint de diarrhée sans signe de gravité, on utilise : A. Un jeûne complet de 24 heures B. Un SRO en petites quantités ✓ bonne réponse C. De l'eau très sucrée à volonté D. Des boissons gazeuses sucrées, bues en grandes quantités	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La douleur chez l'enfant de moins de 4 ans s'évalue avec : A. Une échelle comportementale ✓ bonne réponse B. La tension artérielle seule C. Aucune échelle D. Une échelle numérique de 0 à 10 qu'il remplit seul avec ses parents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le calendrier vaccinal de l'enfant doit être : A. Vérifié uniquement par le médecin traitant, jamais à l'hôpital B. Ignoré à l'hôpital C. Rempli par la famille seule D. Vérifié à chaque occasion ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	La présence des parents lors des soins chez l'enfant : A. Augmente toujours son anxiété B. Est en général favorable ✓ bonne réponse C. N'a aucun intérêt pour l'enfant hospitalisé D. Augmente systématiquement l'anxiété et la douleur de l'enfant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Une fièvre chez un nourrisson de moins de 3 mois : A. Impose un avis médical rapide ✓ bonne réponse B. Est toujours bénigne C. Se traite par un bain froid D. Ne nécessite aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La déshydratation sévère chez l'enfant se manifeste par : A. Une agitation, des urines abondantes et claires et une prise de poids B. Une somnolence, des yeux creux, une peau qui garde le pli et une diminution des urines ✓ bonne réponse C. Une prise de poids et des urines claires D. Une agitation joyeuse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La sécurité d'un enfant hospitalisé impose notamment : A. De laisser ses médicaments sur la table de nuit pour qu'il les prenne seul B. Barrières relevées, rien à portée ✓ bonne réponse C. De le laisser seul sans surveillance D. De lui laisser des petits objets	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un enfant, les explications avant un soin doivent être : A. Adaptées à son âge, honnêtes et rassurantes ✓ bonne réponse B. Absentes pour ne pas l'effrayer C. Fausses (« ça ne fera rien ») systématiquement D. Données uniquement aux parents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La crème anesthésiante locale avant une ponction veineuse chez l'enfant : A. S'applique après la ponction B. Est appliquée assez longtemps avant ✓ bonne réponse C. Agit immédiatement et peut donc être appliquée juste avant la piqure D. Est contre-indiquée chez tous les enfants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les signes d'une détresse respiratoire chez le nourrisson incluent : A. Tirage, geignement, teint gris ✓ bonne réponse B. Un sommeil calme et une respiration régulière C. Une respiration lente et régulière avec une bonne prise des biberons D. Une bonne prise des biberons et un teint rosé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Laboratoire de PMA

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire PMA

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Phase pré-analytique](#) (Laboratoire / biologie médicale).

1 L'ICSI consiste à : A. Mettre en contact ovocytes et spermatozoïdes dans une boîte sans micro-injection B. Congeler les ovocytes C. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus D. Injecter un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de l'ovocyte ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Les gamètes et les embryons sont cryoconservés dans : A. Un réfrigérateur à +4 °C B. L'azote liquide ✓ bonne réponse C. L'incubateur à 37 °C D. Un congélateur à -80 °C, dans des paillettes étiquetées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Règle essentielle à chaque manipulation de gamètes ou d'embryons au laboratoire de PMA : A. La vérification par une seule personne en fin de journée B. Le contrôle uniquement lors du transfert C. L'étiquetage des boîtes après la manipulation D. La double vérification de l'identité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le stade blastocyste est généralement atteint : A. Vers J5–J6 ✓ bonne réponse B. Au 10e jour C. Au 1er jour D. Au 2e jour, quand l'embryon compte environ quatre cellules	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Avant un spermogramme, la durée d'abstinence recommandée est généralement de : A. 15 jours au minimum B. 2 à 7 jours ✓ bonne réponse C. 12 heures D. 1 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Les incubateurs de culture embryonnaire sont réglés à : A. +4 °C B. Environ 37 °C, CO2 contrôlé ✓ bonne réponse C. La température ambiante, avec une atmosphère enrichie en oxygène pur D. 42 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 La FIV « classique » consiste à : A. Congeler l'embryon sans fécondation B. Mettre ovocytes et spermatozoïdes en contact ✓ bonne réponse C. Injecter un spermatozoïde sélectionné directement dans l'ovocyte D. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 L'insémination intra-utérine consiste à : A. Prélever des ovocytes B. Déposer du sperme préparé dans l'utérus ✓ bonne réponse C. Transférer un embryon D. Injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte avant de le transférer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La ponction ovocytaire se fait en général : A. Sans aucune préparation B. Par prise de sang C. Sous échographie, par voie vaginale ✓ bonne réponse D. Par chirurgie abdominale systématique, sous anesthésie générale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le signe d'une fécondation normale observé vers 16–20 heures est : A. Un ovocyte sans changement B. Trois cellules C. Deux pronucléi ✓ bonne réponse D. La présence d'un blastocyste avec une masse cellulaire interne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La vitrification est : A. Une technique de coloration B. Une technique d'échographie C. Une congélation ultra-rapide ✓ bonne réponse D. Un milieu de culture utilisé pour le développement jusqu'au blastocyste	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La préparation du sperme avant une AMP vise à : A. Les congeler immédiatement B. Sélectionner les spermatozoïdes mobiles ✓ bonne réponse C. Colorer les spermatozoïdes D. Augmenter le volume de sperme et le nombre total de spermatozoïdes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Dans un spermogramme, la mobilité progressive est : A. Le nombre total de spermatozoïdes vivants par millilitre d'éjaculat B. Le pH de l'éjaculat C. Le % de spermatozoïdes qui avancent ✓ bonne réponse D. Le volume total de l'éjaculat en millilitres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La qualité de l'air dans un laboratoire de FIV est importante car : A. Elle n'a aucune importance B. Elle concerne seulement le confort et la température des biologistes C. Les embryons sont sensibles aux polluants ✓ bonne réponse D. Elle sert à la congélation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le transfert embryonnaire est en général réalisé : A. À J2–J3 ou J5–J6 ✓ bonne réponse B. Après au moins deux semaines de culture au laboratoire C. À J15 D. Le jour de la ponction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La traçabilité au laboratoire de PMA permet de relier : A. Chaque gamète et embryon au bon couple ✓ bonne réponse B. Les embryons à la facture C. Les patients au parking D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les cuves d'azote liquide nécessitent : A. Une manipulation à mains nues pour plus de précision, sans surveillance B. Un stockage au soleil C. Une surveillance et des protections ✓ bonne réponse D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le risque principal lors de la manipulation de l'azote liquide est : A. Les brûlures par le froid et le risque d'asphyxie dans un local mal ventilé ✓ bonne réponse B. L'irradiation et la contamination radioactive des échantillons C. L'électrocution lors du remplissage de la cuve D. L'allergie alimentaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La culture embryonnaire nécessite un contrôle précis : A. Du bruit et des vibrations uniquement B. De la couleur des boîtes C. De la température, du pH et de l'osmolarité des milieux ✓ bonne réponse D. De la luminosité maximale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne est : A. Un résultat normal, attendu, signe d'une bonne réponse au traitement B. Une complication du transfert de sperme C. Une maladie du nouveau-né D. Une complication de la stimulation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Stérilisation

Postes concernés : Agent(e) de stérilisation

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Instrumentation chirurgicale](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Panseur(se)

Postes concernés : Panseur(se)

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Pansements et soins des plaies](#) (Infirmier(ère)), [Prévention des escarres](#) (Aide-soignant(e) / auxiliaire).

Encadrement des soins

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Préparation et administration des médicaments](#) (Infirmier(ère)), [Surveillance des paramètres vitaux](#) (Infirmier(ère)).

1 Le planning de l'équipe soignante doit avant tout garantir : A. La continuité et la sécurité des soins ✓ bonne réponse B. Un minimum de personnel la nuit, sans exception C. Les préférences de chacun avant les besoins du service D. Le même nombre de gardes pour tous, quelle que soit l'activité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un nouvel infirmier arrive dans le service. La bonne pratique est : A. Le laisser seul dès le premier jour pour le tester B. Attendre qu'il pose des questions C. L'intégrer avec un tuteur ✓ bonne réponse D. Lui confier uniquement les nuits, plus calmes, pour qu'il s'adapte seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Deux soignants se disputent devant les patients. Que faites-vous en premier ? A. Laisser faire, ils finiront par se calmer B. Changer l'un d'eux de service sans discussion C. Sanctionner immédiatement les deux devant l'équipe D. Les recevoir à part et écouter chacun ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un infirmier peut confier un soin à un aide-soignant : A. Toujours, quel que soit le soin B. S'il relève de ses compétences ✓ bonne réponse C. Si le médecin est absent D. Uniquement la nuit, lorsque l'effectif infirmier est réduit, quel que soit le soin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Les transmissions lors de la relève servent avant tout à : A. Évaluer le travail des soignants de l'équipe précédente B. Remplir le temps de la relève C. Remplacer le dossier de soins par un échange oral D. Assurer la continuité des soins ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La fiche de poste d'un soignant décrit : A. Sa vie privée B. Ses congés C. Son salaire, ses primes et ses horaires de travail uniquement D. Missions, responsabilités, hiérarchie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 L'entretien annuel d'évaluation sert à : A. Faire le bilan de l'année, fixer des objectifs et identifier les besoins de formation ✓ bonne réponse B. Sanctionner les erreurs de l'année et décider des augmentations C. Fixer les vacances uniquement D. Remplacer les transmissions écrites de l'année	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un absentéisme élevé dans une équipe doit faire rechercher : A. Rien B. Uniquement la paresse C. Un coupable unique, pour le sanctionner et dissuader les autres D. Des causes organisationnelles ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 La délégation efficace suppose : A. De ne jamais déléguer B. De déléguer uniquement les tâches pénibles sans explication C. De tout déléguer sans contrôle, par confiance envers l'équipe D. Une tâche claire, suivie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Une réunion de service efficace comprend : A. Une durée illimitée, pour que chacun puisse s'exprimer librement B. Uniquement des reproches sur les erreurs de la semaine C. Ordre du jour, durée, compte rendu ✓ bonne réponse D. Aucune préparation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Lors d'un pic d'activité imprévu, le surveillant : A. Ne change rien à l'organisation B. Réorganise les priorités, mobilise des renforts si possible et informe sa hiérarchie ✓ bonne réponse C. Demande à l'équipe de rester sans limite D. Ne change rien et demande à l'équipe de faire des heures supplémentaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La charge en soins d'un service se mesure notamment avec : A. Le nombre de visiteurs et d'appels téléphoniques reçus par jour B. Le nombre de fenêtres C. Le budget de la cafétéria D. Des outils d'évaluation de la dépendance et de la gravité des patients ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le plan de formation d'un service doit : A. Concerner uniquement le surveillant B. Répondre aux besoins identifiés ✓ bonne réponse C. Être fixé au hasard D. Être identique chaque année, pour garantir l'équité entre les agents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un conflit entre un soignant et un médecin doit être géré : A. Par un échange en privé, factuel, centré sur le patient, avec médiation si nécessaire ✓ bonne réponse B. En ignorant le problème jusqu'à ce qu'il se règle seul C. Devant l'équipe D. Par un mail adressé à toute l'équipe, pour que chacun soit informé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le tutorat d'un étudiant en stage comprend : A. Lui confier uniquement des tâches de ménage B. Aucun suivi, l'école se chargeant de tout C. Accueil, objectifs, suivi, évaluation ✓ bonne réponse D. Le laisser seul en autonomie totale dès le premier jour pour le former	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La gestion du stock et du matériel du service relève : A. De l'organisation du surveillant, en lien avec la pharmacie et les services techniques ✓ bonne réponse B. Uniquement des services techniques de l'établissement C. Uniquement des patients D. Uniquement de la pharmacie, sans participation du service	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La motivation d'une équipe est favorisée par : A. Les changements de planning sans prévenir B. Reconnaissance et participation ✓ bonne réponse C. L'absence de communication D. Les reproches publics, qui incitent chacun à faire mieux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un nouveau protocole de soins est mis en place. Le surveillant : A. L'affiche en salle de soins et laisse chacun l'appliquer à sa façon B. Forme l'équipe et vérifie ✓ bonne réponse C. Le garde dans son bureau D. Laisse chacun l'interpréter	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le surveillant de nuit est notamment responsable : A. Uniquement des admissions administratives et de la fermeture des portes B. Uniquement de la fermeture des portes C. De la cuisine D. De la sécurité des soins la nuit ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Pour prévenir l'épuisement d'une équipe, l'encadrant peut : A. Équilibrer les plannings, écouter ✓ bonne réponse B. Supprimer les pauses C. Ignorer les signes de fatigue D. Augmenter les heures supplémentaires pour réduire la charge de chacun	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Qualité et gestion des risques 20 questions

1 Après un événement indésirable grave, l'encadrant doit : A. Sécuriser, déclarer, analyser les causes ✓ bonne réponse B. Ne rien déclarer si le patient va bien C. Rechercher le responsable pour le sanctionner rapidement D. Attendre une plainte écrite de la famille avant d'agir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Une revue de morbi-mortalité (RMM) a pour but : A. D'informer la presse B. D'analyser les causes ensemble ✓ bonne réponse C. De calculer les primes D. D'identifier le soignant fautif pour le sanctionner devant ses collègues	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le chariot d'urgence du service doit être : A. Fermé à clé, clé chez le médecin chef B. Rangé dans une réserve éloignée, à l'abri des patients C. Vérifié régulièrement, avec traçabilité ✓ bonne réponse D. Vérifié uniquement après une utilisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Un audit montre une faible observance de l'hygiène des mains. L'action la plus pertinente est : A. Supprimer la solution hydro-alcoolique B. Former, équiper, réauditer ✓ bonne réponse C. Ne rien changer D. Imposer le port permanent de gants, changés une fois par poste	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	La traçabilité des soins dans le dossier patient permet : A. Uniquement de facturer B. De remplacer toutes les transmissions orales, même les plus urgentes C. Rien de particulier D. Prouver les soins et assurer la continuité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La démarche qualité repose sur le cycle : A. Acheter, stocker, jeter B. Punir, contrôler, sanctionner C. Commencer, abandonner, oublier D. Planifier, faire, vérifier, améliorer ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un indicateur qualité sert à : A. Fixer les salaires et les primes de chaque soignant du service B. Décorer le service C. Remplacer les soins D. Mesurer pour suivre l'évolution ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	L'analyse des causes d'un événement indésirable cherche : A. À cacher l'événement B. À désigner le soignant fautif rapidement C. Uniquement l'erreur individuelle, pour identifier le soignant en faute D. Les causes profondes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La méthode des « 5 pourquoi » sert à : A. Remonter progressivement aux causes profondes d'un problème ✓ bonne réponse B. Compter les patients C. Évaluer la satisfaction des patients en cinq questions D. Calculer une dose de médicament	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un audit clinique consiste à : A. Comparer les pratiques réelles à un référentiel pour les améliorer ✓ bonne réponse B. Évaluer les repas uniquement C. Contrôler les vestiaires D. Faire l'inventaire de la pharmacie et du matériel du service	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La certification d'un établissement de santé vise à : A. Construire de nouveaux bâtiments B. Fixer les tarifs des consultations et des hospitalisations C. Évaluer qualité et sécurité ✓ bonne réponse D. Recruter du personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Un questionnaire de satisfaction des patients permet : A. De remplacer les soins B. De sanctionner les patients C. De recueillir leur avis ✓ bonne réponse D. D'évaluer individuellement chaque soignant pour le calcul des primes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La cartographie des risques d'un service identifie : A. Les congés et la répartition géographique des soignants dans le service B. L'emplacement des fenêtres C. Les risques, leur fréquence, leur gravité ✓ bonne réponse D. Le menu de la semaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un protocole de soins validé doit être : A. Valable sans limite de temps une fois signé par le chef de service B. Gardé secret C. Daté, connu, révisé ✓ bonne réponse D. Écrit à la main sans validation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le signalement d'un événement indésirable doit être encouragé grâce : A. Au silence B. À l'anonymat des fautes graves sans analyse C. À la menace de sanctions D. À une culture de sécurité non punitive ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'identitovigilance, l'hygiène des mains et la check-list du bloc sont : A. Facultatifs B. Des tâches administratives inutiles C. Des obligations réservées aux médecins et aux chirurgiens du bloc D. Des pratiques de sécurité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Après un événement grave, l'équipe peut bénéficier : A. D'un débriefing et d'un soutien ✓ bonne réponse B. D'aucun soutien C. D'un changement de service immédiat de tous les soignants impliqués D. D'une sanction collective	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le plan d'actions qualité comprend : A. Uniquement des idées d'amélioration, sans date ni responsable désigné B. Actions, responsables, échéances ✓ bonne réponse C. Des actions sans responsable désigné D. Uniquement des idées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La gestion des plaintes et réclamations des patients : A. Doit être ignorée B. Sert à sanctionner le patient C. Est réservée au service juridique sans retour au service D. Est une source d'amélioration et doit être analysée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a pour but :

- A. De noter individuellement les soignants pour le calcul de leur paie
- B. De réduire le nombre de soignants
- C. De remplacer la formation initiale
- D. D'améliorer la qualité des soins ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Encadrement du bloc opératoire

Postes concernés : Surveillant(e) de bloc opératoire

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Bloc opératoire](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Encadrement de l'imagerie

Postes concernés : Surveillant(e) de radiologie

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Radioprotection](#) (Imagerie médicale), [Scanner et IRM](#) (Imagerie médicale).

Annexe – Correspondance poste → questions

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Infirmier(ère) polyvalent(e)	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) de bloc opératoire	Soins infirmiers	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Infirmier(ère) en réanimation	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) aux urgences	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Technicien(ne) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Panseur(se)	Soins infirmiers	Panseur(se) : Pansements et soins des plaies, Prévention des escarres + tronc commun
Sage-femme	Sage-femme	Sage-femme : Suivi de grossesse, Accouchement eutocique, Soins néonataux, Allaitement maternel + tronc commun
Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation : Anesthésie générale, Intubation et ventilation, Monitoring hémodynamique, Surveillance post-interventionnelle + tronc commun
Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Imagerie médicale : Radioprotection, Radiologie conventionnelle, Scanner et IRM + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire / biologie médicale : Phase pré-analytique, Hématologie, Analyses biochimiques, Microbiologie + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire PMA	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire de PMA : Laboratoire de PMA, Phase pré-analytique + tronc commun
Kinésithérapeute	Rééducation et nutrition	Rééducation : Rééducation fonctionnelle, Kinésithérapie respiratoire, Bilan et évaluation + tronc commun
Diététicien(ne) / Nutritionniste	Rééducation et nutrition	Diététique et nutrition : Nutrition clinique, Prise en charge du diabète + tronc commun
Préparateur(trice) en pharmacie	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Pharmacie : Gestion des stocks pharmaceutiques, Délivrance et conseil, Conservation des médicaments + tronc commun
Aide-soignant(e)	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun
Auxiliaire de puériculture	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Technicien(ne) en hygiène hospitalière	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Technicien(ne) en instrumentation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Agent(e) de stérilisation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Stérilisation : Asepsie et stérilisation, Instrumentation chirurgicale + tronc commun
Surveillant(e) d'étage	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) général(e)	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de nuit	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de bloc opératoire	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement du bloc opératoire : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Bloc opératoire, Asepsie et stérilisation + tronc commun
Surveillant(e) de radiologie	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement de l'imagerie : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Radioprotection, Scanner et IRM + tronc commun
Assistant(e) dentaire	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Secrétaire médical(e)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Ambulancier(ère)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Transport sanitaire : Transport sanitaire, Immobilisation et relevage + tronc commun