

Questions de l'entretien IA et des QCM de compétences

Document de validation par des spécialistes – classé par poste · 8 octobre 2026

180

questions d'entretien
IA

48

compétences

961

questions de QCM

28

postes

Consignes aux relecteurs

Pour chaque question, cochez « **Validée** » ou « **À corriger** » et indiquez votre remarque (formulation, exactitude médicale, bonne réponse, distracteurs trop faciles ou ambigus, adaptation au contexte tunisien). Dans les QCM, la bonne réponse est signalée en **vert** ✓ ; les trois autres choix sont des distracteurs qui doivent être clairement faux. Une compétence partagée entre plusieurs métiers n'est détaillée qu'une seule fois (un renvoi est indiqué).

Point de vigilance : dans de nombreuses questions, la bonne réponse est aussi la plus longue ou la plus détaillée, ce qui peut aider un candidat à deviner. N'hésitez pas à proposer des distracteurs plus crédibles ou une bonne réponse plus courte.

1. Partie 1 – Entretien IA (communication), par famille de postes
2. Partie 2 – QCM de compétences : tronc commun puis familles de métiers
3. Annexe – Correspondance poste → questions

Nom du relecteur	Spécialité / fonction	Date et signature

Partie 1 – Entretien IA (communication)

Chaque entretien comporte 5 questions orales : 3 questions générales tirées au hasard et 2 questions propres au métier. La question est lue par une voix féminine puis le candidat répond à l'oral (2 minutes maximum), sans temps de préparation. L'IA évalue la clarté, la structure, l'empathie, le vocabulaire professionnel et l'adaptation à l'interlocuteur.

Questions générales tous les postes

1	Présentez-vous en quelques phrases et expliquez pourquoi vous avez choisi ce métier.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient anxieux refuse un soin. Que lui dites-vous pour le rassurer ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment annonceriez-vous un retard ou une mauvaise nouvelle à la famille d'un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Racontez une situation où vous avez dû gérer un désaccord avec un collègue. Comment l'avez-vous résolu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Comment transmettez-vous les informations importantes à l'équipe lors d'un changement de garde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un médecin vous donne une consigne qui vous semble incorrecte. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliqueriez-vous un traitement à une personne âgée qui entend mal et comprend difficilement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Décrivez une situation stressante vécue au travail et la façon dont vous avez communiqué pendant cette situation.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre un bon et un excellent soignant ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Racontez un moment de votre parcours dont vous êtes particulièrement fier ou fière.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment gérez-vous une situation où vous avez commis une erreur au travail ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un collègue est débordé et vous êtes vous-même très occupé. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment réagissez-vous lorsqu'un patient ou une famille vous parle de manière agressive ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment vous organisez-vous lorsque plusieurs patients ont besoin de vous en même temps ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Pourquoi souhaitez-vous travailler dans notre établissement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment expliquez-vous une information importante à un patient qui ne parle que l'arabe dialectal ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Un patient vous demande de garder un secret qui concerne sa santé. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment faites-vous pour rester bienveillant après une longue garde fatigante ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Décrivez une situation où vous avez dû vous adapter rapidement à un changement imprévu.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Quelles sont vos qualités et le point que vous cherchez à améliorer dans votre pratique ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins infirmiers

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) de bloc opératoire · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences · Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie · Panseur(se)

1	Expliquez à un patient, avec des mots simples, comment va se dérouler la pose de sa perfusion.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient se plaint que personne ne répond à sa sonnette. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rédigez-vous et présentez-vous une transmission ciblée à l'équipe de nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un patient vous demande pourquoi il doit prendre autant de médicaments. Que lui expliquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient diabétique refuse son injection d'insuline. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment annoncez-vous au médecin de garde l'aggravation de l'état d'un patient pendant la nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La famille d'un patient vous demande des informations sur son diagnostic. Que leur répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un patient âgé confus veut quitter le service en pleine nuit. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient les signes qui doivent l'alerter après sa sortie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment présentez-vous les soins de la journée à un patient qui vient d'arriver dans le service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Un patient se plaint d'une douleur que vous trouvez exagérée. Comment communiquez-vous avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Vous remarquez qu'un collègue n'a pas respecté le protocole d'hygiène. Comment lui en parlez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment expliquez-vous la préparation d'une intervention chirurgicale à un patient inquiet ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un enfant hospitalisé a peur de la prise de sang. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	Comment réagissez-vous lorsqu'un patient vous remercie ou vous offre un cadeau ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Aux urgences, une famille réclame d'être prise en charge avant les autres. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment accompagnez-vous un patient qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment éduquez-vous un patient à surveiller lui-même sa tension ou sa glycémie à domicile ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient refuse de rester allongé après son examen. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment travaillez-vous en équipe avec l'aide-soignante pendant une garde chargée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

1	Une future maman très inquiète vous demande si son accouchement va bien se passer. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliqueriez-vous les premiers gestes de l'allaitement à une jeune mère fatiguée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le conjoint s'énerve en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous à une patiente les signes qui doivent la faire venir à la maternité ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une femme enceinte refuse une échographie de contrôle. Comment abordez-vous ses réticences ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment annoncez-vous à un couple qu'une césarienne en urgence est nécessaire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une jeune mère pleure souvent depuis la naissance. Comment l'accompagnez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment expliquez-vous les différentes méthodes de soulagement de la douleur pendant le travail ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une patiente souhaite accoucher sans péridurale. Comment l'accompagnez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment donnez-vous les conseils de sortie à une maman qui rentre à domicile avec son bébé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Une famille insiste pour être nombreuse en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment expliquez-vous à une adolescente enceinte le suivi de sa grossesse ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13	Une maman ne parvient pas à allaiter et se sent coupable. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment présentez-vous les vaccins du nouveau-né aux parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment parlez-vous de contraception après l'accouchement avec une patiente ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Une patiente présente des signes de prééclampsie. Comment l'informez-vous sans l'affoler ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment transmettez-vous les informations sur une naissance difficile à l'équipe de suites de couches ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une patiente vous confie des violences de la part de son conjoint. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment accompagnez-vous des parents dont le bébé doit être transféré en néonatalogie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment expliquez-vous à un couple l'importance du peau-à-peau après la naissance ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

1	Un patient a peur de l'anesthésie générale. Comment le rassurez-vous avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment communiquez-vous avec le médecin anesthésiste lors d'une complication au bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Expliquez au patient ce qu'il va ressentir au réveil de l'anesthésie.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous à un patient pourquoi il doit être à jeun avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient vous dit qu'il a mangé ce matin alors qu'il est au bloc. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment présentez-vous la rachianesthésie à un patient qui a peur de la piqûre dans le dos ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment rassurez-vous un enfant et ses parents avant une anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment réalisez-vous la check-list de sécurité avec l'équipe du bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Un chirurgien vous presse de commencer alors qu'une vérification n'est pas faite. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment transmettez-vous les informations sur un patient à l'équipe de la salle de réveil ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Un patient se réveille agité et désorienté. Comment lui parlez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment expliquez-vous l'utilisation de la pompe à morphine à un patient opéré ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment signalez-vous un incident survenu pendant l'anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient vous demande s'il risque de se réveiller pendant l'opération. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment communiquez-vous avec un patient sourd ou malentendant avant l'induction ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment réagissez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec le choix d'un médecin anesthésiste ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	En réanimation, comment informez-vous la famille sur l'état d'un patient intubé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment accueillez-vous un patient qui arrive au bloc en urgence et très angoissé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment formez-vous un nouveau collègue à la préparation du poste d'anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Un patient âgé ne comprend pas bien les consignes de la salle de réveil. Comment vous adaptez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie) · Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale · Technicien(ne) de laboratoire PMA · Préparateur(trice) en pharmacie · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation · Agent(e) de stérilisation

1	Un patient demande le résultat de son examen avant que le médecin ne l'ait vu. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous la préparation nécessaire avant un examen à un patient qui ne parle pas bien français ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Vous constatez une erreur d'étiquetage sur un prélèvement. Comment le signalez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous le déroulement d'une IRM à un patient claustrophobe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient refuse de retirer ses bijoux avant l'examen. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment présentez-vous les risques d'une injection de produit de contraste au patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un patient se plaint du temps d'attente au laboratoire. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8	Comment informez-vous un médecin d'un résultat d'analyse très anormal ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient la façon de recueillir correctement ses urines ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une mère inquiète accompagne son enfant pour une radiographie. Comment la rassurez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment réagissez-vous si un collègue ne respecte pas les règles de radioprotection ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient pense que la radiographie est dangereuse et refuse l'examen. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment expliquez-vous la préparation de la stérilisation à un nouvel agent de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Au bloc, un chirurgien vous reproche qu'un instrument manque dans la boîte. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment donnez-vous les consignes de prise d'un médicament à un patient au comptoir de la pharmacie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un patient demande si son médicament générique est aussi efficace. Que lui expliquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment informez-vous un couple sur le déroulement d'une ponction ovocytaire ou d'un transfert d'embryon ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment signalez-vous une panne d'appareil qui retarde les examens de la journée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient vous demande de lui interpréter ses résultats. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment travaillez-vous avec les services de soins pour éviter les prélèvements non conformes ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Rééducation et nutrition

Postes concernés : Kinésithérapeute · Diététicien(ne) / Nutritionniste

1	Un patient découragé ne veut plus faire ses exercices de rééducation. Comment le motivez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous les objectifs d'une séance à un enfant et à ses parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rendez-vous compte de l'évolution d'un patient au médecin prescripteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous l'intérêt des exercices à faire à domicile entre les séances ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient âgé a peur de tomber et refuse de marcher. Comment l'encouragez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

6	Comment adaptez-vous vos explications pour un patient qui a des troubles de la mémoire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un patient vous demande quand il pourra reprendre le sport. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment fixez-vous des objectifs réalistes avec un patient très ambitieux ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient diabétique les changements à apporter à son alimentation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient ne suit pas les conseils nutritionnels que vous lui avez donnés. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment présentez-vous un régime alimentaire à une famille qui cuisine pour le patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient a mal pendant la séance. Comment communiquez-vous avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment travaillez-vous avec l'équipe soignante pour la mobilisation d'un patient hospitalisé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment expliquez-vous les techniques de respiration à un patient essoufflé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Un patient se compare à un autre qui progresse plus vite. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment annoncez-vous à un patient que ses progrès seront plus lents que prévu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment expliquez-vous à un enfant pourquoi il doit porter son attelle ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Un patient arrive systématiquement en retard à ses séances. Comment abordez-vous le sujet ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment rendez-vous la séance motivante pour un patient déprimé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment présentez-vous votre bilan de fin de prise en charge au patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide-soignant(e) et auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

1	Une personne âgée refuse sa toilette ce matin. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment signalez-vous à l'infirmière un changement inquiétant chez un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un patient vous confie qu'il se sent seul. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Comment aidez-vous un patient à manger sans lui faire perdre son autonomie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient vous demande de l'aider à se lever alors que le médecin a prescrit le repos au lit. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment réagissez-vous si un patient vous fait des remarques déplacées pendant un soin ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment préservez-vous la pudeur d'un patient pendant sa toilette ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La famille d'un patient se plaint que son proche n'a pas été changé. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment accompagnez-vous un patient en fin de vie et sa famille ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient refuse de boire alors qu'il fait très chaud. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment expliquez-vous à un patient la nécessité de changer de position régulièrement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un enfant hospitalisé pleure et réclame ses parents. Comment le réconfortez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment travaillez-vous avec l'infirmière pour organiser les soins du matin ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient tombe dans sa chambre. Que faites-vous et comment l'expliquez-vous à l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment accueillez-vous un nouveau patient qui arrive dans le service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un patient âgé ne vous reconnaît pas et devient agité. Comment le calmez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment réagissez-vous lorsqu'un collègue manque de respect envers un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment expliquez-vous à une maman les gestes de soin de son nouveau-né ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient vous confie qu'il a peur de mourir. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment transmettez-vous vos observations de la journée à l'équipe suivante ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Encadrement (surveillant·e·s)

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit · Surveillant(e) de bloc opératoire · Surveillant(e) de radiologie

1	Un membre de votre équipe arrive régulièrement en retard. Comment abordez-vous la situation avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--	--

2	Comment annoncez-vous à votre équipe un changement d'organisation qui ne plaît pas à tout le monde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une famille se plaint de la qualité des soins dans le service. Comment la recevez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment accueillez-vous et intégrez-vous un nouveau soignant dans votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Deux membres de votre équipe sont en conflit. Comment intervenez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment organisez-vous le planning lorsqu'un soignant est absent au dernier moment ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un soignant commet une erreur de médicament. Comment réagissez-vous avec lui et avec l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment présentez-vous un nouveau protocole à une équipe réticente au changement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment repérez-vous et accompagnez-vous un soignant qui montre des signes d'épuisement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment menez-vous l'entretien annuel d'évaluation d'un membre de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La direction vous demande de réduire les heures supplémentaires. Comment l'annoncez-vous à l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment valorisez-vous le travail de votre équipe auprès de la direction ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un médecin se plaint régulièrement de votre équipe. Comment gérez-vous cette relation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment organisez-vous la continuité des soins pendant la nuit dans plusieurs services ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment animez-vous une réunion de service pour qu'elle soit utile et courte ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment réagissez-vous lorsqu'un événement indésirable grave survient dans votre service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un soignant expérimenté refuse d'encadrer les stagiaires. Comment abordez-vous la question ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment gérez-vous une plainte écrite d'un patient contre un soignant de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment préparez-vous votre service à une visite de certification ou à un audit qualité ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment répartissez-vous les patients entre les soignants lors d'une journée très chargée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e) · Ambulancier(ère)

1	Un patient attend depuis longtemps et s'énerve à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous à un patient les documents à fournir pour son dossier ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un appel urgent arrive pendant que vous renseignez une famille. Comment gérez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment accueillez-vous un patient qui arrive pour la première fois dans l'établissement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient demande à voir le médecin immédiatement sans rendez-vous. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment répondez-vous au téléphone lorsqu'un appelant demande des informations sur un patient hospitalisé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliquez-vous à un patient les tarifs et les modalités de paiement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un patient ne comprend pas pourquoi sa prise en charge par l'assurance est refusée. Comment l'aidez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment gérez-vous un agenda de rendez-vous lorsque le médecin a un empêchement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une personne âgée ne retrouve pas son rendez-vous. Comment l'aidez-vous avec patience ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment réagissez-vous si un patient vous demande de modifier une date sur un document ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Au cabinet dentaire, un enfant a peur et refuse d'entrer. Comment aidez-vous les parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Pendant un transport sanitaire, comment rassurez-vous un patient angoissé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	En ambulance, comment transmettez-vous les informations sur le patient à l'équipe des urgences ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Une famille veut monter dans l'ambulance alors qu'il n'y a pas de place. Que leur dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment présentez-vous l'établissement et ses services à un visiteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un patient mécontent publie un avis négatif et vient en parler à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment protégez-vous la confidentialité des patients dans une salle d'attente pleine ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Comment travaillez-vous avec les soignants pour réduire le temps d'attente des patients ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient arrive très en retard à son rendez-vous. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Partie 2 – QCM de compétences

Chaque QCM tire au hasard 5 compétences (celles du métier et du tronc commun) et 3 questions par compétence, soit 15 questions de 30 secondes. Une compétence est validée avec 3 bonnes réponses sur 3. Sur le site, l'ordre des 4 choix est tiré au hasard à chaque QCM : la bonne réponse n'est jamais à une place fixe. Dans ce document, les choix sont également mélangés et la **bonne réponse** est indiquée en vert ✓.

Tronc commun tous les postes

Hygiène et prévention des infections 20 questions

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Quelle est la mesure la plus efficace pour prévenir les infections associées aux soins ?
A. Le changement quotidien de blouse
B. L'hygiène des mains ✓ bonne réponse
C. Le port permanent de gants
D. L'antibiothérapie préventive systématique | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 2 | Combien de temps dure une friction hydro-alcoolique des mains correctement réalisée ?
A. 2 minutes
B. 5 minutes
C. Environ 20 à 30 secondes ✓ bonne réponse
D. 5 secondes | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 3 | Dans quel cas la friction hydro-alcoolique ne suffit pas et un lavage des mains au savon est nécessaire ?
A. Avant tout contact avec un patient
B. Avant une injection intramusculaire
C. Mains visiblement souillées ou contact avec un patient atteint de Clostridioides difficile ✓ bonne réponse
D. Après avoir retiré des gants propres | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 4 | Après utilisation, une aiguille doit être :
A. Recapuchonnée à deux mains puis jetée
B. Jetée immédiatement, sans la recapuchonner, dans un collecteur pour objets piquants-coupants ✓ bonne réponse
C. Posée sur le plateau jusqu'à la fin du soin
D. Jetée dans le sac à déchets ménagers | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |
| 5 | Que faire en premier après une piqûre accidentelle avec une aiguille souillée ?
A. Ne pas faire saigner, nettoyer à l'eau et au savon, rincer puis désinfecter (au moins 5 minutes), puis déclarer l'accident ✓ bonne réponse
B. Appliquer de l'alcool à 70° pendant 5 secondes et reprendre le travail
C. Attendre la fin de la garde pour consulter
D. Faire saigner fortement la plaie en pressant | ☐ Validée
☐ À corriger
Remarque : |

6 Les précautions « standard » s'appliquent : A. Uniquement au bloc opératoire B. Uniquement en réanimation C. Uniquement aux patients infectés connus D. À tous les patients, quel que soit leur statut infectieux ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Quelle tenue est recommandée pour les mains d'un soignant ? A. Faux ongles autorisés s'ils sont courts B. Ongles courts, sans vernis ni bijoux aux mains et aux poignets ✓ bonne réponse C. Montre autorisée si elle est propre D. Alliance et bracelet tolérés en permanence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les gants à usage unique doivent être : A. Portés en permanence dans le couloir B. Lavés à la solution hydro-alcoolique entre deux patients C. Gardés pour toute la tournée D. Changés entre deux patients et entre deux soins chez le même patient si nécessaire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Dans quelle poubelle jette-t-on des compresses souillées de sang ? A. Le collecteur à verre B. Les ordures ménagères C. Le circuit des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) ✓ bonne réponse D. Le tri sélectif du papier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les précautions « contact » (patient porteur de bactérie multirésistante) comprennent notamment : A. L'interdiction de toute visite B. Hygiène des mains renforcée et tablier ou surblouse pour les soins rapprochés ✓ bonne réponse C. Aucune mesure particulière D. Le port d'un masque FFP2 par le patient uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Les précautions « gouttelettes » (grippe par exemple) imposent surtout : A. Le port d'un masque chirurgical par le soignant à proximité du patient ✓ bonne réponse B. Un tablier plombé C. Des gants stériles D. Le port de bottes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La tuberculose pulmonaire contagieuse relève des précautions : A. « Air », avec un masque FFP2 pour le soignant et une chambre porte fermée ✓ bonne réponse B. Aucune, elle n'est pas transmissible C. Standard seulement D. « Contact » uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Avant d'entrer dans la chambre d'un patient en précautions complémentaires, il faut : A. Attendre que le patient sorte B. Lire la signalétique et appliquer les mesures indiquées ✓ bonne réponse C. Porter systématiquement une tenue stérile D. Demander au patient quelles mesures appliquer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les surfaces proches du patient (barrières de lit, adaptable) doivent être : A. Nettoyées et désinfectées régulièrement selon le protocole ✓ bonne réponse B. Désinfectées uniquement à la sortie du patient C. Nettoyées une fois par mois D. Laissées en l'état pour ne pas déranger	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le masque chirurgical est efficace pendant environ : A. Quelques heures (en général 4 h) ; il doit être changé s'il est humide ou souillé ✓ bonne réponse B. Une semaine C. Il n'a pas de durée limite D. Toute la garde de 24 h sans changement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un soignant qui a de la fièvre et une toux doit : A. Retirer son masque pour mieux respirer B. Prendre un antibiotique sans avis C. Le signaler et suivre la procédure de l'établissement (masque, avis médical, éviction si nécessaire) ✓ bonne réponse D. Venir travailler sans rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 L'antiseptique doit être appliqué : A. Puis essuyé immédiatement B. Mélangé à un autre antiseptique pour plus d'efficacité C. Sur une peau propre, en respectant le temps de séchage ✓ bonne réponse D. Sur une peau souillée, sans nettoyage préalable	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le collecteur à objets piquants-coupants doit être fermé : A. Lorsqu'il atteint la limite de remplissage indiquée ✓ bonne réponse B. Jamais C. Uniquement lorsqu'il déborde D. Chaque heure, même vide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La vaccination recommandée en priorité pour les soignants exposés au sang est celle contre : A. La rage B. L'hépatite B ✓ bonne réponse C. Le choléra D. La fièvre jaune	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Quel est le rôle principal de la tenue professionnelle (blouse, pyjama) ?

- A. Protéger le patient et le soignant ; elle ne se porte pas en dehors de l'établissement ✓ **bonne réponse**
- B. Être portée aussi dans les transports en commun
- C. Être changée une fois par mois
- D. Remplacer l'hygiène des mains

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Gestes d'urgence 20 questions

1 Face à un adulte inconscient qui ne respire pas normalement, quel est le rythme des compressions thoraciques ?

- A. 150 à 180 compressions par minute
- B. 60 compressions par minute
- C. 100 à 120 compressions par minute ✓ **bonne réponse**
- D. 30 compressions par minute

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Chez l'adulte, quel est le rapport compressions / insufflations lors de la réanimation cardio-pulmonaire ?

- A. 15 pour 2
- B. 5 pour 1
- C. 10 pour 1
- D. 30 compressions pour 2 insufflations ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quelle est la profondeur recommandée des compressions thoraciques chez l'adulte ?

- A. Environ 5 cm (sans dépasser 6 cm) ✓ **bonne réponse**
- B. Environ 1 à 2 cm
- C. Environ 8 à 10 cm
- D. Aussi profond que possible

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une victime inconsciente qui respire normalement doit être placée :

- A. Sur le ventre
- B. Sur le dos, jambes surélevées, sans surveillance
- C. En position latérale de sécurité ✓ **bonne réponse**
- D. Assise

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Face à une hémorragie externe importante, le premier geste est :

- A. La surélévation du membre uniquement
- B. La compression directe de la plaie ✓ **bonne réponse**
- C. La pose immédiate d'un garrot sur toute plaie
- D. L'application de glace

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un adulte conscient s'étouffe et ne peut plus parler ni tousser. Que faire en premier ?

- A. Le faire boire de l'eau
- B. Commencer immédiatement le bouche-à-bouche
- C. Jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis jusqu'à 5 compressions abdominales si besoin ✓ **bonne réponse**
- D. Le coucher sur le dos et attendre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Quel est le numéro de la Protection civile en Tunisie ? A. 197 B. 190 C. 198 ✓ bonne réponse D. 193	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Dans la chaîne de survie, que faire dès qu'on constate un arrêt cardiaque ? A. Mettre la victime en position assise B. Alerter, commencer le massage cardiaque et faire chercher un défibrillateur ✓ bonne réponse C. Attendre l'arrivée du médecin avant tout geste D. Donner à boire à la victime	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Le défibrillateur automatisé externe (DAE) : A. Remplace le massage cardiaque B. Peut être utilisé par toute personne, en suivant les instructions vocales ✓ bonne réponse C. Est réservé aux médecins D. Ne doit jamais être utilisé sur une personne inconsciente	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Pendant l'analyse du rythme par le défibrillateur, il faut : A. Continuer le massage B. Ne pas toucher la victime ✓ bonne réponse C. Retirer les électrodes D. Ventiler la victime	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Où place-t-on les mains pour le massage cardiaque chez l'adulte ? A. Sur le cou B. Sur le ventre C. Au milieu du thorax, sur la moitié inférieure du sternum ✓ bonne réponse D. Sur le côté gauche de la poitrine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Pour libérer les voies aériennes d'une victime inconsciente, on : A. Penche la tête en avant B. Fait boire la victime C. Met un oreiller sous la tête D. Bascule prudemment la tête en arrière et élève le menton ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Signes évocateurs d'un accident vasculaire cérébral : A. Fièvre isolée B. Démangeaisons des jambes C. Déformation de la bouche, faiblesse d'un bras, trouble de la parole ✓ bonne réponse D. Toux grasse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Devant des signes d'AVC, la conduite à tenir est : A. Faire marcher la personne B. Attendre le lendemain C. Alerter immédiatement les secours en notant l'heure de début des signes ✓ bonne réponse D. Donner un comprimé d'aspirine sans avis médical	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une douleur thoracique serrant la poitrine et irradiant dans le bras gauche doit faire évoquer : A. Une entorse B. Un infarctus du myocarde ✓ bonne réponse C. Une indigestion banale sans gravité D. Une crise d'angoisse uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Choc anaphylactique : quel médicament est le traitement d'urgence de référence ? A. Un antibiotique B. L'adrénaline (selon prescription / protocole) ✓ bonne réponse C. Le paracétamol D. L'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une victime de brûlure thermique étendue récente : premier geste ? A. Percer les cloques B. Mettre de la glace directement sur la peau C. Refroidir à l'eau tempérée (environ 15 à 25 °C) pendant une vingtaine de minutes, puis alerter ✓ bonne réponse D. Appliquer du beurre ou de l'huile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une personne fait une crise convulsive. Il faut : A. Lui donner à boire pendant la crise B. Écarter les objets dangereux, ne pas la maintenir de force, puis la mettre en PLS ✓ bonne réponse C. La maintenir fermement au sol D. Lui mettre une cuillère dans la bouche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Hypoglycémie chez une personne inconsciente : que ne faut-il PAS faire ? A. Surveiller sa respiration B. La mettre en position latérale de sécurité C. Alerter les secours D. Lui donner du sucre par la bouche ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Pour un nourrisson en arrêt cardiaque, les compressions thoraciques se font : A. Avec deux doigts (ou les deux pouces) sur le sternum ✓ bonne réponse B. Avec le poing C. Avec les deux mains superposées comme chez l'adulte D. Sur le ventre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Avant tout soin ou administration d'un traitement, l'identité du patient se vérifie : A. En lui demandant simplement « Vous êtes bien M. X ? » B. En lui demandant de décliner ses nom, prénom et date de naissance et en contrôlant le bracelet ✓ bonne réponse C. En lisant le numéro de la chambre D. En se fiant au lit occupé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 La règle des « 5 B » de l'administration médicamenteuse vise à donner : A. Le bon médicament au bon service B. Le bon traitement uniquement le matin C. Le médicament le moins cher au bon moment D. Le bon médicament, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment, au bon patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quelle mesure réduit le risque de chute d'un patient hospitalisé ? A. Contention systématique de tous les patients âgés B. Lit en position basse, sonnette et objets usuels à portée de main ✓ bonne réponse C. Éclairage éteint la nuit dans toute la chambre D. Barrières de lit relevées pour tous les patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Vous découvrez une erreur d'administration d'un médicament. Que faites-vous ? A. Ne rien dire si le patient va bien B. Attendre la visite du lendemain pour en parler C. Corriger le dossier sans informer personne D. Surveiller le patient, prévenir immédiatement le médecin et déclarer l'événement indésirable ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Lors d'une transmission orale d'une prescription urgente, la bonne pratique est : A. Attendre la fin de la garde pour la noter B. Répéter la prescription à voix haute pour la faire confirmer, puis la faire tracer par écrit ✓ bonne réponse C. La mémoriser sans la répéter D. La noter sur un papier libre que l'on jette après	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le bracelet d'identification d'un patient hospitalisé doit être posé : A. À la demande du patient B. Dès l'admission et vérifié avant chaque acte ✓ bonne réponse C. Uniquement avant un passage au bloc D. Uniquement si le patient est confus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Que signifie le mot « identitovigilance » ? A. La surveillance et la prévention des erreurs d'identification des patients ✓ bonne réponse B. La vérification des badges du personnel C. Le contrôle des visiteurs D. La sécurité informatique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Deux patients ont le même nom dans le service. Que faire ? A. Les mettre dans la même chambre B. Ne rien faire de particulier C. Signaler le risque (alerte homonymie) et renforcer les vérifications d'identité ✓ bonne réponse D. Utiliser seulement le numéro de chambre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Avant une transfusion sanguine, le contrôle ultime au lit du patient vérifie : A. Rien, le laboratoire l'a déjà fait B. Uniquement la date de péremption C. Uniquement le groupe du soignant D. La concordance entre l'identité du patient, la prescription et le produit sanguin, et la compatibilité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les médicaments « à haut risque » (insuline, potassium injectable, anticoagulants...) nécessitent : A. Une vigilance renforcée et un double contrôle selon le protocole ✓ bonne réponse B. Une préparation par le patient lui-même C. Un stockage avec les autres médicaments sans distinction D. Aucune précaution particulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Une prescription médicale illisible doit être : A. Clarifiée avec le prescripteur avant toute administration ✓ bonne réponse B. Interprétée au mieux C. Lue par un collègue qui devine D. Ignorée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Quel facteur augmente le risque de chute d'un patient âgé ? A. La prise de somnifères ou de sédatifs ✓ bonne réponse B. Une sonnette à portée de main C. Un éclairage suffisant D. Des chaussures fermées et adaptées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient tombe de son lit. Que faire en premier ? A. Le remettre au lit sans rien dire B. Évaluer son état et le sécuriser, prévenir le médecin, puis déclarer l'événement ✓ bonne réponse C. Attendre le lendemain D. Le laisser au sol jusqu'à la relève	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La contention physique d'un patient : A. Peut être décidée par n'importe quel soignant sans traçabilité B. Est toujours la première solution contre les chutes C. Nécessite une prescription médicale, une surveillance régulière et une réévaluation ✓ bonne réponse D. Ne demande aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	Pourquoi déclarer un événement indésirable même sans conséquence (« presque accident ») ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Ce n'est pas utile B. Pour remplir des statistiques sans suite C. Pour analyser les causes et éviter qu'il se reproduise avec des conséquences ✓ bonne réponse D. Pour sanctionner un collègue	
16	Avant de préparer un médicament injectable, il faut vérifier :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Uniquement le nom du patient B. Rien si le médicament est habituel C. Uniquement la couleur du produit D. L'identité du patient, le médicament, la dose, la voie, l'heure et la date de péremption ✓ bonne réponse	
17	Un patient signale une allergie à la pénicilline. Le soignant doit :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Attendre une réaction pour la noter B. La noter clairement dans le dossier et la signaler, avant toute prescription ✓ bonne réponse C. La transmettre uniquement oralement D. L'ignorer si le patient ne se souvient pas de la réaction	
18	Les escarres, les chutes et les erreurs médicamenteuses sont des exemples de :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Événements inévitables B. Maladies infectieuses C. Problèmes administratifs D. Risques liés aux soins que l'on peut prévenir ✓ bonne réponse	
19	La méthode de communication SAED (ou SBAR) sert à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Transmettre une information structurée sur un patient (situation, antécédents, évaluation, demande) ✓ bonne réponse B. Classer les déchets C. Évaluer la douleur D. Calculer une dose	
20	Lors d'un transfert entre services, la sécurité du patient repose surtout sur :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La rapidité du brancardage uniquement B. Le transfert sans dossier C. Le bavardage avec le patient D. Une transmission complète des informations et des documents ✓ bonne réponse	

Éthique et secret professionnel 20 questions

1	Le secret professionnel s'applique :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Uniquement pendant les heures de service B. Uniquement aux médecins C. À toutes les informations apprises, vues ou comprises dans l'exercice de la profession ✓ bonne réponse D. Uniquement au diagnostic médical	

2 Un voisin du patient vous téléphone pour connaître son diagnostic. Que répondez-vous ? A. Vous donnez seulement le nom du service B. Vous ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse C. Vous donnez le diagnostic s'il connaît bien le patient D. Vous lui lisez le compte rendu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Avant un soin, le consentement du patient doit être : A. Libre et éclairé, après une information claire ✓ bonne réponse B. Obtenu uniquement pour les interventions chirurgicales C. Présumé pour tous les soins courants, sans information D. Donné par la famille dans tous les cas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Publier sur un réseau social la photo d'un patient, même sans son nom : A. Est autorisé si le visage est flou B. Est autorisé après sa sortie C. Est autorisé si le compte est privé D. Est interdit sans son accord : cela porte atteinte à sa vie privée et au secret ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Un patient majeur et lucide refuse un soin après avoir été informé. Que faire ? A. Le sortir immédiatement du service B. Demander à la famille de signer à sa place C. Respecter son refus, le réinformer des risques, prévenir le médecin et tracer le refus ✓ bonne réponse D. Réaliser le soin malgré tout	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le secret professionnel s'impose : A. À tous les professionnels de santé et au personnel de l'établissement ✓ bonne réponse B. Uniquement aux médecins C. Uniquement pendant l'hospitalisation D. Uniquement au service de psychiatrie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le secret professionnel cesse-t-il après la mort du patient ? A. Oui, immédiatement B. Oui, si la famille le demande oralement C. Oui, après un an D. Non, il continue après le décès ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un employeur appelle pour savoir pourquoi son salarié est hospitalisé. Vous : A. Confirmez seulement la maladie B. Ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse C. Lisez le dossier D. Donnez le diagnostic	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Dans un ascenseur avec des visiteurs, deux collègues parlent d'un patient par son nom. C'est : A. Recommandé pour gagner du temps B. Acceptable si le ton est bas C. Une atteinte au secret professionnel ✓ bonne réponse D. Sans importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le dossier médical d'un patient peut être consulté : A. Par les visiteurs avec l'accord d'un soignant B. Par les collègues curieux C. Par tout le personnel de l'établissement D. Par les professionnels qui participent à sa prise en charge ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La bientraitance consiste notamment à : A. Respecter la dignité, l'intimité et les choix du patient ✓ bonne réponse B. Tutoyer tous les patients C. Décider à la place du patient D. Faire les soins le plus vite possible sans expliquer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un soignant constate qu'un collègue maltraite un patient âgé. Il doit : A. Protéger le patient et signaler les faits à sa hiérarchie ✓ bonne réponse B. Ne rien dire par solidarité C. Attendre que cela se reproduise D. En parler sur les réseaux sociaux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Quand un patient mineur est hospitalisé, l'information et le consentement concernent : A. Uniquement l'enfant B. Ses représentants légaux, tout en associant l'enfant selon sa maturité ✓ bonne réponse C. Aucune personne D. Uniquement le médecin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le respect de la pudeur pendant un soin passe par : A. Le fait de ne pas prévenir le patient B. La présence de tous les étudiants C. Une porte ouverte pour la surveillance D. Une porte fermée, un paravent et le fait de ne découvrir que la zone nécessaire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient demande à lire son dossier. En principe : A. C'est toujours interdit B. Il doit passer par un avocat C. Il a le droit d'accéder aux informations le concernant, selon la procédure de l'établissement ✓ bonne réponse D. Seule sa famille peut le lire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Accepter un cadeau important (argent) d'un patient :

- A. Est recommandé
- B. Est sans conséquence
- C. Est à éviter : cela peut créer une dépendance ou un conflit d'intérêts ✓
bonne réponse
- D. Est obligatoire par politesse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Le principe de non-discrimination impose de soigner :

- A. En priorité les patients qui paient plus
- B. Uniquement les patients de sa région
- C. Tous les patients avec la même qualité, quelles que soient leur origine, leur religion ou leur situation ✓
bonne réponse
- D. Selon ses préférences personnelles

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Annoncer un diagnostic grave au patient relève :

- A. De la famille uniquement
- B. De l'aide-soignant de nuit
- C. Du secrétariat
- D. Du médecin ; le soignant accompagne et soutient le patient ✓
bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Le droit à l'information du patient signifie qu'il doit recevoir :

- A. Une information claire, loyale et adaptée sur son état et ses soins ✓
bonne réponse
- B. Une information seulement à sa sortie
- C. Aucune information pour ne pas l'inquiéter
- D. Une information uniquement écrite en latin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Photographier une plaie pour le dossier de soins nécessite :

- A. Une publication sur internet
- B. Un téléphone personnel et un partage dans un groupe de discussion
- C. Aucune précaution
- D. L'accord du patient et un appareil autorisé par l'établissement ✓
bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Infirmier(ère)

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences

Préparation et administration des médicaments 21 questions

1 Prescription : 500 mg d'un antibiotique. Le flacon contient 1 g à diluer dans 10 mL. Quel volume prélever ?

- A. 2 mL
- B. 10 mL
- C. 0,5 mL
- D. 5 mL ✓
bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2	Prescription : 1 000 mL de sérum en 8 heures avec un perfuseur standard (20 gouttes/mL). Quel débit régler ? A. Environ 21 gouttes/min B. Environ 125 gouttes/min C. Environ 42 gouttes/min ✓ bonne réponse D. Environ 8 gouttes/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une seringue électrique doit délivrer 48 mL en 24 heures. Quel débit programmer ? A. 24 mL/h B. 4 mL/h C. 2 mL/h ✓ bonne réponse D. 0,5 mL/h	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Combien de microgrammes y a-t-il dans 1 milligramme ? A. 10 µg B. 100 µg C. 1 000 µg ✓ bonne réponse D. 1 000 000 µg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le chlorure de potassium (KCl) concentré : A. S'administre uniquement en sous-cutané B. Peut être injecté pur dans la tubulure C. Ne s'injecte jamais en intraveineuse directe : il doit être dilué et perfusé lentement ✓ bonne réponse D. S'injecte en IV directe rapide en cas d'hypokaliémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un médicament prescrit « per os » s'administre : A. Par voie sous-cutanée B. Par voie rectale C. Par voie intraveineuse D. Par la bouche ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Prescription : 1 g de paracétamol. Les comprimés sont dosés à 500 mg. Combien en donner ? A. 2 comprimés ✓ bonne réponse B. 1 comprimé C. 4 comprimés D. Un demi-comprimé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Une ampoule de 10 mL contient 20 mg de produit. Quelle est la concentration ? A. 2 mg/mL ✓ bonne réponse B. 200 mg/mL C. 20 mg/mL D. 0,5 mg/mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Prescription : 250 mL en 2 heures à la seringue ou à la pompe. Quel débit programmer ? A. 250 mL/h B. 50 mL/h C. 500 mL/h D. 125 mL/h ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Combien de milligrammes y a-t-il dans 1 gramme ? A. 10 000 mg B. 10 mg C. 1 000 mg ✓ bonne réponse D. 100 mg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La voie sous-cutanée (SC) correspond à une injection : A. Dans le tissu sous la peau (ventre, cuisse, bras) ✓ bonne réponse B. Dans un muscle profond C. Dans une veine D. Dans la peau superficielle seulement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 L'injection intramusculaire chez l'adulte se fait de préférence : A. Dans la face interne du poignet B. Dans le quadrant supéro-externe de la fesse ou la face latérale de la cuisse ✓ bonne réponse C. Dans le pli du coude D. Dans le ventre autour du nombril	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un médicament reconstitué doit être : A. Conservé sans étiquette B. Étiqueté (nom, dose, date et heure) et utilisé dans le délai prévu ✓ bonne réponse C. Utilisé quelle que soit la date D. Mélangé avec d'autres produits restants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les héparines de bas poids moléculaire s'injectent : A. Par voie sous-cutanée, sans purger la bulle d'air de la seringue préremplie ✓ bonne réponse B. Par voie intramusculaire C. En intraveineuse directe rapide systématiquement D. Par voie orale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient sous anticoagulant présente des saignements de gencives et des hématomes. Vous : A. Arrêtez tous les traitements sans avis B. Attendez le prochain bilan dans un mois C. Prévenez le médecin, car il peut s'agir d'un surdosage ✓ bonne réponse D. Augmentez la dose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'insuline rapide doit être administrée : A. Au hasard de la journée B. Uniquement la nuit C. Selon la prescription, en tenant compte de la glycémie et des repas ✓ bonne réponse D. Toujours en intramusculaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Écraser un comprimé à libération prolongée est :

- A. Sans conséquence
- B. Recommandé pour tous les comprimés
- C. Obligatoire chez la personne âgée
- D. **Déconseillé : cela modifie la libération du médicament ✓ bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 La traçabilité de l'administration d'un médicament se fait :

- A. Elle n'est pas nécessaire
- B. **Immédiatement après l'administration, par la personne qui l'a administré ✓ bonne réponse**
- C. En fin de garde, de mémoire
- D. Par un collègue qui n'a pas vu le soin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Un patient refuse son traitement. Le soignant :

- A. **Cherche la raison, l'informe, prévient le médecin et trace le refus ✓ bonne réponse**
- B. Ne le note pas
- C. Le force à le prendre
- D. Le cache dans son repas

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Morphine : quel effet indésirable surveiller en priorité ?

- A. L'hypertension artérielle
- B. La toux sèche
- C. **La dépression respiratoire (sédation, fréquence respiratoire basse) ✓ bonne réponse**
- D. La chute de cheveux

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

21 La règle d'or face à une prescription orale non urgente est :

- A. **Demander une prescription écrite (ou informatisée) avant d'administrer ✓ bonne réponse**
- B. Faire confiance à sa mémoire
- C. Demander à la famille de confirmer
- D. Administrer et oublier

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Pose de perfusion 20 questions

1 Combien de temps peut-on laisser en place un garrot lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique ?

- A. 15 minutes
- B. 5 minutes minimum
- C. **Le moins longtemps possible, idéalement moins d'une minute ✓ bonne réponse**
- D. Jusqu'à la fin de la perfusion

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel site privilégier pour un cathéter veineux périphérique chez l'adulte ?

- A. **L'avant-bras, sur le membre non dominant de préférence ✓ bonne réponse**
- B. Le bras porteur d'une fistule artério-veineuse
- C. Le pli du coude en première intention
- D. Une veine du membre inférieur

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3	Quel signe doit faire suspecter une extravasation (diffusion) au point de perfusion ? A. Gonflement, peau froide et pâle, douleur, ralentissement du débit ✓ bonne réponse B. Débit qui augmente C. Reflux de sang dans la tubulure D. Peau chaude et rouge le long de la veine sans gonflement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Rougeur, chaleur et cordon induré le long de la veine perfusée évoquent : A. Un fonctionnement normal B. Une réaction allergique généralisée C. Une hypoglycémie D. Une phlébite ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Avant de brancher une perfusion, la tubulure doit être : A. Rincée à l'alcool B. Laisée vide, l'air étant sans danger C. Purgée afin d'en chasser tout l'air ✓ bonne réponse D. Remplie à moitié	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Quel est le premier geste avant de préparer le matériel de pose de cathéter ? A. Piquer la veine B. Mettre des gants stériles sans hygiène des mains C. Poser le garrot D. Une friction hydro-alcoolique des mains ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le cathéter veineux périphérique doit être réévalué : A. Une fois par mois B. Jamais C. Uniquement s'il tombe D. Chaque jour, et retiré dès qu'il n'est plus nécessaire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le pansement d'un cathéter veineux périphérique doit être : A. Retiré pour la toilette B. Remplacé par un sparadrap simple non stérile C. Stérile, transparent de préférence, et refait s'il est décollé ou souillé ✓ bonne réponse D. Recouvert de coton	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Quel signe impose de retirer un cathéter veineux périphérique ? A. Un patient qui dort B. Un pansement propre C. Douleur, rougeur, induration ou écoulement au point de ponction ✓ bonne réponse D. Un débit régulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Où éviter de poser un cathéter veineux ? A. Sur l'avant-bras B. Sur un membre paralysé, une fistule de dialyse ou le côté d'un curage ganglionnaire axillaire ✓ bonne réponse C. Sur le membre non dominant D. Sur le dos de la main	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le calibre « 18 G » par rapport au « 22 G » est : A. Identique B. Plus fin C. Plus gros ✓ bonne réponse D. Réservé aux nourrissons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Pour un remplissage rapide en urgence, on choisit un cathéter : A. Sous-cutané B. De très petit calibre (26 G) C. Intramusculaire D. De gros calibre (14 à 18 G) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Avant de raccorder une perfusion, on vérifie : A. Rien B. Uniquement la couleur de la poche C. La prescription, le soluté, sa limpidité, la date de péremption et l'identité du patient ✓ bonne réponse D. Uniquement le nom du médecin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le reflux de sang dans le cathéter lors de la pose indique : A. Une perforation de l'artère obligatoirement B. Que le cathéter est bien dans la veine ✓ bonne réponse C. Une infection D. Un problème de pompe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une bulle d'air importante dans la tubulure doit être : A. Ignorée B. Évacuée avant qu'elle n'atteigne le patient ✓ bonne réponse C. Poussée rapidement dans la veine D. Laisée passer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La ligne de perfusion (tubulure) d'un soluté standard se change en général : A. Uniquement si le patient le demande B. Selon le protocole de l'établissement (souvent tous les 4 jours) et après les produits sanguins ou lipidiques ✓ bonne réponse C. Jamais pendant le séjour D. Toutes les heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Une perfusion ne coule plus. Que vérifier en premier ?

- A. Changer immédiatement de veine sans vérifier
- B. Augmenter la hauteur du lit
- C. Secouer la poche
- D. Le clamp, la position du membre, la tubulure coudée et le point de ponction ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 L'antisepsie de la peau avant la pose d'un cathéter se fait :

- A. Avec un antiseptique alcoolique, en respectant le temps de séchage ✓ **bonne réponse**
- B. Avec de l'éther
- C. Avec de l'eau du robinet
- D. Sans antisepsie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Après la pose, on note dans le dossier :

- A. Seulement si le patient se plaint
- B. Rien
- C. La date, le site, le calibre et le nom du soignant ✓ **bonne réponse**
- D. Uniquement l'heure du repas

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Un patient perfusé présente frissons et fièvre brutale. Il faut suspecter :

- A. Une simple fatigue
- B. Un effet de la météo
- C. Une infection liée au cathéter et prévenir le médecin ✓ **bonne réponse**
- D. Un débit trop lent

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Prélèvements sanguins 20 questions

1 Pour une hémoculture, la désinfection de la peau doit être :

- A. Soigneuse, avec un antiseptique et un temps de séchage respecté avant la ponction ✓ **bonne réponse**
- B. Réalisée après la ponction
- C. Inutile si le patient est propre
- D. Faite à l'eau uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le tube à bouchon violet (EDTA) est principalement utilisé pour :

- A. Les hémocultures
- B. La numération formule sanguine (NFS) ✓ **bonne réponse**
- C. Le bilan d'hémostase (TP, TCA)
- D. La glycémie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le tube citraté (bouchon bleu) pour le bilan d'hémostase doit être :

- A. Agité vigoureusement pendant une minute
- B. Prélèvement en dernier impérativement après plusieurs tubes secs
- C. Rempli à moitié
- D. Rempli jusqu'au trait de remplissage ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pour éviter une hémolyse lors d'un prélèvement, il faut : A. Agiter énergiquement les tubes B. Laisser le garrot en place plusieurs minutes C. Utiliser une aiguille la plus fine possible et aspirer fort D. Éviter un garrot trop long et ne pas secouer les tubes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Où réaliser un prélèvement sanguin chez un patient perfusé au bras droit ? A. Directement dans la tubulure de la perfusion en cours B. Au bras opposé (ou en aval de la perfusion après arrêt, selon le protocole) ✓ bonne réponse C. Il n'y a aucune précaution particulière D. Au-dessus de la perfusion, sur le même bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Quel matériel est le plus adapté pour un prélèvement veineux multiple ? A. Une seringue de 50 mL pour tous les tubes B. Une lancette C. Un cathéter de 14 G D. Un système sous vide avec corps de pompe et tubes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le garrot pour une prise de sang se place : A. Sur le poignet pour un prélèvement au coude B. Directement sur le point de ponction C. Sur l'autre bras D. À quelques centimètres au-dessus du point de ponction ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les tubes doivent être étiquetés : A. Le lendemain au laboratoire B. Avant de voir le patient, pour gagner du temps, sans vérification C. Par le coursier D. Au lit du patient, immédiatement après le prélèvement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Après une prise de sang, on applique : A. Un garrot serré B. Une compression du point de ponction, bras tendu ✓ bonne réponse C. Rien D. Un massage énergique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le tube sec (bouchon rouge ou jaune avec gel) sert surtout à : A. La numération formule B. Les hémocultures C. La biochimie sur sérum (ionogramme, bilan hépatique...) ✓ bonne réponse D. L'hémostase	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le tube à bouchon gris (fluorure) est souvent utilisé pour : A. La NFS B. La CRP en urgence uniquement C. Le groupe sanguin D. La glycémie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Les hémocultures se prélèvent idéalement : A. Lors d'un pic fébrile ou de frissons, avant toute antibiothérapie ✓ bonne réponse B. Uniquement le matin à jeun C. Après plusieurs jours d'antibiotiques D. Uniquement la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour les hémocultures, on remplit en général : A. Un tube citraté B. Un seul tube sec C. Un tube EDTA D. Un flacon aérobie et un flacon anaérobie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient fait un malaise vagal pendant la prise de sang. Vous : A. Continuez rapidement B. Arrêtez le prélèvement, l'allongez jambes surélevées et surveillez ✓ bonne réponse C. Le faites lever D. Lui donnez un café pendant le prélèvement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le prélèvement de la gazométrie artérielle se fait habituellement : A. À la veine jugulaire B. À la veine du pli du coude C. Au bout du doigt D. À l'artère radiale, après vérification de la circulation collatérale (test d'Allen) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La glycémie capillaire se fait de préférence : A. Au centre du doigt avec de l'alcool encore humide B. Sur le côté de la pulpe du doigt, mains propres et sèches ✓ bonne réponse C. Sur la paume D. Au lobe de l'oreille uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un hématome apparaît au point de ponction. La cause la plus fréquente est : A. Un garrot trop lâche B. Une compression insuffisante après le retrait de l'aiguille ✓ bonne réponse C. Un tube mal étiqueté D. Un patient à jeun	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un bilan lipidique (cholestérol, triglycérides), le patient doit en général être : A. À jeun depuis 1 heure B. Après un repas copieux C. Sans précaution D. À jeun depuis environ 12 heures ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Le transport des tubes vers le laboratoire doit se faire :

- A. Sans demande d'examen
- B. Au soleil
- C. Rapidement, dans un sachet adapté, avec la demande d'examen ✓ **bonne réponse**
- D. Dans la poche de la blouse jusqu'au lendemain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 L'ordre de remplissage des tubes est important pour éviter :

- A. Rien, il n'a aucune importance
- B. Que le patient s'ennuie
- C. La contamination par les additifs d'un tube à l'autre ✓ **bonne réponse**
- D. Une erreur de facturation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Surveillance des paramètres vitaux 20 questions

1 Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un adulte au repos ?

- A. 20 à 40 battements/min
- B. 60 à 100 battements/min ✓ **bonne réponse**
- C. 40 à 50 battements/min
- D. 110 à 140 battements/min

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quelle est la fréquence respiratoire normale d'un adulte au repos ?

- A. 4 à 8 cycles/min
- B. 25 à 35 cycles/min
- C. 12 à 20 cycles/min ✓ **bonne réponse**
- D. 40 à 50 cycles/min

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une saturation (SpO₂) de 85 % chez un adulte sans pathologie respiratoire chronique :

- A. Est une hypoxémie qui nécessite une prise en charge immédiate ✓ **bonne réponse**
- B. Est normale la nuit
- C. Est normale
- D. Ne nécessite qu'une nouvelle mesure le lendemain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 À partir de quelle température parle-t-on habituellement de fièvre ?

- A. 39,5 °C
- B. 38 °C ✓ **bonne réponse**
- C. 36,5 °C
- D. 37 °C

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une glycémie capillaire à 0,50 g/L (2,8 mmol/L) chez un patient diabétique correspond à :

- A. Une glycémie normale
- B. Une hypoglycémie ✓ **bonne réponse**
- C. Une hyperglycémie
- D. Une acidocétose

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Hypotension, tachycardie, pâleur et sueurs après une intervention doivent faire suspecter :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une hypothermie bénigne B. Un réveil normal C. Une hypertension D. Une hémorragie / un état de choc ✓ bonne réponse	
7	Une tension artérielle à 180/110 mmHg chez l'adulte est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Basse B. Normale C. Normale après un repas D. Élevée : il faut contrôler et prévenir le médecin selon le protocole ✓ bonne réponse	
8	Une tension artérielle systolique inférieure à 90 mmHg chez l'adulte évoque :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une valeur normale chez tous B. Une fièvre C. Une hypotension à signaler ✓ bonne réponse D. Une hypertension	
9	Pour mesurer la tension, le brassard doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le plus petit possible B. Placé au poignet opposé C. Posé sur les vêtements épais D. Adapté à la taille du bras, au niveau du cœur, patient au repos ✓ bonne réponse	
10	La fréquence respiratoire se compte :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Pendant 5 secondes B. Uniquement la nuit C. En demandant au patient de respirer fort D. Pendant une minute entière, sans que le patient s'en aperçoive si possible ✓ bonne réponse	
11	Le score de Glasgow évalue :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le risque d'escarre B. La douleur C. La déshydratation D. L'état de conscience (yeux, réponse verbale, réponse motrice) ✓ bonne réponse	
12	Un score de Glasgow à 15 correspond à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un patient agité B. Un patient en arrêt cardiaque C. Un coma profond D. Un patient conscient et orienté ✓ bonne réponse	

13 La température normale du corps est d'environ : A. 34 °C B. 35 à 36 °C C. 36,5 à 37,5 °C ✓ bonne réponse D. 38 à 39 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une diurèse (urines) inférieure à environ 0,5 mL/kg/h chez l'adulte doit faire évoquer : A. Une polyurie B. Une oligurie à signaler ✓ bonne réponse C. Une diurèse normale D. Un diabète obligatoirement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 L'échelle numérique de la douleur va de : A. 0 (pas de douleur) à 10 (douleur maximale imaginable) ✓ bonne réponse B. 0 à 100 en degrés C. 1 à 3 D. A à E	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Une fréquence cardiaque à 130/min au repos chez l'adulte s'appelle : A. Une fréquence normale B. Une bradycardie C. Une tachycardie ✓ bonne réponse D. Une hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une fréquence cardiaque à 45/min chez un adulte non sportif s'appelle : A. Une tachypnée B. Une bradycardie ✓ bonne réponse C. Une tachycardie D. Une fréquence normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La saturation en oxygène (SpO2) normale chez un adulte sain est en général : A. Entre 95 et 100 % ✓ bonne réponse B. Entre 50 et 60 % C. Entre 70 et 80 % D. Toujours 85 %	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Quel facteur peut fausser la mesure de la SpO2 au doigt ? A. La taille du patient B. La couleur des cheveux C. Des extrémités froides ou du vernis à ongles foncé ✓ bonne réponse D. L'heure de la journée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les scores d'alerte précoce (type NEWS) servent à : A. Classer les dossiers B. Calculer les doses d'antibiotiques C. Repérer tôt l'aggravation d'un patient à partir de ses paramètres vitaux ✓ bonne réponse D. Évaluer l'autonomie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Le nettoyage d'une plaie propre se fait : A. Uniquement à l'alcool B. Du plus sale vers le plus propre C. Par mouvements de va-et-vient D. Du plus propre vers le plus sale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quel est le produit de première intention pour nettoyer une plaie chronique (ulcère, escarre) ? A. Eau oxygénée pure B. Sérum physiologique (ou eau et savon doux) ✓ bonne réponse C. Éosine aqueuse systématique D. Alcool à 90°	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une escarre de stade I se caractérise par : A. Une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression, peau intacte ✓ bonne réponse B. Une phlyctène ouverte C. Une nécrose noire D. Une plaie profonde avec os visible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quels signes locaux évoquent l'infection d'une plaie ? A. Rougeur, chaleur, douleur, œdème, écoulement purulent ✓ bonne réponse B. Plaie qui se rétrécit C. Bourgeonnement rose et indolore D. Absence de douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un pansement doit être refait : A. Jamais avant la sortie B. Uniquement si le patient le demande C. Toutes les heures D. Selon la prescription ou s'il est souillé, décollé ou mouillé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Une plaie chirurgicale propre et fermée est en général : A. Désinfectée toutes les heures B. Laisser à l'air dès la sortie du bloc dans tous les cas C. Massée D. Protégée par un pansement sec et peu manipulée les premiers jours ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un pansement hydrocolloïde est adapté : A. Aux plaies très infectées et purulentes B. Aux fractures ouvertes C. Aux brûlures étendues du troisième degré D. Aux plaies peu exsudatives en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un pansement à base d'alginate est surtout utilisé pour : A. Les plaies de la cornée B. La peau saine C. Les plaies très exsudatives ou qui saignent un peu ✓ bonne réponse D. Les plaies sèches	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La détersion d'une plaie consiste à : A. Appliquer un antibiotique local systématiquement B. Éliminer les tissus nécrosés et la fibrine ✓ bonne réponse C. Refermer la plaie avec des points D. Sécher la plaie avec un sèche-cheveux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les ablations de fils ou d'agrafes se font : A. Sans désinfection B. Sur prescription, selon le délai prévu, avec un matériel stérile ✓ bonne réponse C. Par le patient lui-même D. Dès le lendemain de l'intervention dans tous les cas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Une escarre de stade 4 correspond à : A. Une ampoule intacte B. Une perte de substance profonde atteignant le muscle, le tendon ou l'os ✓ bonne réponse C. Une rougeur qui blanchit à la pression D. Une simple sécheresse cutanée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le mot « exsudat » désigne : A. Un antiseptique B. Le liquide qui s'écoule d'une plaie ✓ bonne réponse C. Un type de pansement D. Une suture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour un ulcère veineux de jambe, le traitement de base associe soins locaux et : A. Chaleur locale B. Massages profonds de la plaie C. Contention ou compression veineuse prescrite ✓ bonne réponse D. Immobilisation stricte au lit pendant des mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le pied diabétique nécessite une surveillance attentive car : A. La douleur y est toujours très forte B. Une plaie peut passer inaperçue (perte de sensibilité) et s'infecter rapidement ✓ bonne réponse C. La cicatrisation est toujours plus rapide D. Les diabétiques ne font jamais de plaie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Avant de refaire un pansement douloureux, il est recommandé de : A. Attendre que le patient s'endorme B. Ne rien dire au patient C. Faire le soin le plus vite possible sans prévenir D. Prévenir et traiter la douleur (antalgique prescrit) avant le soin ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Une plaie qui sent mauvais, avec un écoulement verdâtre, évoque : A. Un problème de régime B. Une allergie au pansement uniquement C. Une infection possible, à signaler au médecin ✓ bonne réponse D. Une cicatrisation normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le tissu de granulation (bourgeonnement) est : A. Rouge, humide et granuleux : signe de cicatrisation ✓ bonne réponse B. Blanc et cartonné C. Noir et sec D. Jaune et collant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un pansement doit être changé avec une technique : A. Avec les mêmes compresses pour plusieurs patients B. Aseptique : mains désinfectées, matériel stérile, de la zone propre vers la zone sale ✓ bonne réponse C. En réutilisant l'ancien pansement D. Sans gants ni hygiène des mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'évaluation d'une plaie dans le dossier comprend : A. La taille, l'aspect, l'exsudat, l'odeur, la douleur et la peau autour ✓ bonne réponse B. Uniquement la date C. Rien si la plaie est petite D. Uniquement le nom du pansement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Pour une brûlure superficielle peu étendue, on évite : A. Un pansement propre B. Le refroidissement à l'eau C. Les produits gras, le coton et le percement des cloques ✓ bonne réponse D. L'avis médical si la brûlure est au visage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Bloc opératoire et stérilisation

Postes concernés : Infirmier(ère) de bloc opératoire · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation

1	Le compte des compresses, aiguilles et instruments au bloc opératoire est réalisé : A. Avant l'incision, avant la fermeture et en fin d'intervention, et tracé ✓ bonne réponse B. Uniquement si le chirurgien le demande C. Uniquement en fin de journée D. Une seule fois en début de programme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un instrument stérile tombe au sol pendant l'intervention. Que faites-vous ? A. Il est considéré comme contaminé : il est retiré et remplacé ✓ bonne réponse B. Il est réutilisé si personne ne l'a vu C. Il est réutilisé après l'avoir essuyé D. Il est trempé dans l'alcool puis réutilisé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Quel instrument sert principalement à saisir et clamper un vaisseau ? A. Un écarteur de Farabeuf B. Un porte-aiguille C. Une pince hémostatique (type Kocher ou Pean) ✓ bonne réponse D. Une curette	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le porte-aiguille sert à : A. Tenir l'aiguille lors de la suture ✓ bonne réponse B. Couper les fils C. Écarter les berges de la plaie D. Aspirer le sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Qui peut toucher la table d'instrumentation stérile ? A. Uniquement les personnes habillées stérilement ✓ bonne réponse B. Le brancardier C. Toute l'équipe du bloc D. L'infirmier circulant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'écarteur de Farabeuf sert à : A. Clamper une artère B. Écarter les berges de l'incision ✓ bonne réponse C. Couper les tissus D. Tenir l'aiguille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les ciseaux de Mayo sont plutôt utilisés pour : A. Aspirer le sang B. Saisir un vaisseau C. Écarter la paroi D. Couper les tissus résistants et les fils ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Les ciseaux de Metzenbaum sont des ciseaux : A. Pour couper les plâtres B. Pour couper les os C. Fins, pour disséquer les tissus délicats ✓ bonne réponse D. Pour couper les pansements	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Une pince à disséquer « à griffes » est utilisée pour : A. Saisir l'intestin fragile B. Tenir une compresse dans l'abdomen C. Saisir des tissus résistants comme la peau ✓ bonne réponse D. Clamper l'aorte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le bistouri électrique en mode « coagulation » sert à : A. Couper le fil de suture B. Aspirer la fumée C. Arrêter les petits saignements ✓ bonne réponse D. Écarter les tissus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Quand le chirurgien tend la main ouverte, l'instrumentiste : A. Dépose fermement l'instrument dans la paume, prêt à l'emploi ✓ bonne réponse B. Attend qu'il le prenne sur la table C. Pose l'instrument sur le patient D. Lance l'instrument	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les lames de bistouri usagées sont : A. Retirées avec les doigts B. Réutilisées pour le patient suivant C. Laissées sur la table D. Retirées avec une pince ou un dispositif adapté et jetées dans le collecteur piquant-coupant ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un fil résorbable est utilisé : A. Uniquement pour la peau du visage B. Pour fixer les drains de façon définitive C. Jamais au bloc D. Pour les plans profonds qui ne seront pas retirés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La table d'instrumentation est préparée : A. Juste avant l'intervention, par une personne habillée stérilement ✓ bonne réponse B. Par le brancardier C. Sans champ stérile D. La veille au soir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un instrument défectueux (mors abîmés) découvert pendant l'intervention doit être : A. Réparé sur place avec du ruban adhésif B. Utilisé quand même C. Remis dans la boîte sans rien dire D. Écarté, remplacé et signalé à la stérilisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les compresses utilisées dans le champ opératoire sont : A. Ordinaires et non comptées B. Réutilisables C. Découpées à la main D. Radio-opaques et comptées ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Le porte-aiguille se tient en général avec l'aiguille montée :

- A. Au tiers postérieur de l'aiguille, à l'extrémité des mors ✓ **bonne réponse**
B. Par la pointe
C. N'importe comment
D. Au milieu du chas

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 En fin d'intervention, les instruments souillés doivent être :

- A. Pré-désinfectés rapidement pour éviter que les salissures ne sèchent ✓ **bonne réponse**
B. Rincés au lavabo des mains
C. Jetés à la poubelle
D. Laissés secs jusqu'au lendemain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Le comptage final ne correspond pas (une compresse manque). Il faut :

- A. Ne rien dire
B. Prévenir immédiatement le chirurgien et rechercher la compresse avant la fermeture ✓ **bonne réponse**
C. Noter un chiffre au hasard
D. Fermer quand même

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le rôle de l'infirmier « circulant » est notamment de :

- A. Rester assis hors de la salle
B. Toucher le champ opératoire
C. Servir l'équipe stérile en matériel et assurer la traçabilité ✓ **bonne réponse**
D. Instrumenter à la place du chirurgien

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Asepsie et stérilisation 20 questions

1 Avant la stérilisation, un dispositif médical réutilisable doit être :

- A. Désinfecté à l'alcool et rangé
B. Seulement rincé à l'eau
C. Pré-désinfecté, nettoyé, séché puis conditionné ✓ **bonne réponse**
D. Directement mis dans l'autoclave sale

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel est le cycle de référence de l'autoclave pour les dispositifs médicaux en stérilisation hospitalière ?

- A. 200 °C pendant 2 minutes
B. 60 °C pendant 1 heure
C. 134 °C pendant au moins 18 minutes ✓ **bonne réponse**
D. 100 °C pendant 5 minutes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le test de Bowie-Dick sert à vérifier :

- A. La bonne pénétration de la vapeur et l'évacuation de l'air dans l'autoclave ✓ **bonne réponse**
B. La date de péremption des emballages
C. La propreté des mains
D. La stérilité d'un instrument

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4	Un sachet de stérilisation est déchiré ou humide :	A. Il peut être utilisé s'il est récent B. Il suffit de le scotcher C. Il peut être utilisé au bloc si l'intervention est courte D. Le contenu est considéré comme non stérile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le lavage chirurgical des mains est réalisé :	A. Après l'intervention uniquement B. Uniquement si les mains sont sales C. Avant d'enfiler la casaque et les gants stériles ✓ bonne réponse D. Avec une solution hydro-alcoolique sur des mains souillées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La différence entre désinfection et stérilisation :	A. La stérilisation ne concerne que les virus B. Il n'y a aucune différence C. La stérilisation élimine tous les micro-organismes, y compris les spores ✓ bonne réponse D. La désinfection est plus efficace	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un dispositif « critique » (qui pénètre un tissu stérile) doit être :	A. Lavé à l'eau B. Désinfecté à bas niveau C. Simplement propre D. Stérile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	L'indicateur de passage sur un emballage indique :	A. La date de fabrication B. Que l'objet est stérile pour toujours C. Que le paquet est passé dans un stérilisateur (et non qu'il est forcément stérile) ✓ bonne réponse D. Le nom du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La date de péremption d'un dispositif stérile dépend surtout :	A. De l'emballage et des conditions de stockage ✓ bonne réponse B. De la couleur de l'instrument C. Du chirurgien D. De la saison	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les produits stériles sont stockés :	A. Au sol dans le couloir B. Dans un endroit propre, sec, à l'abri de la lumière directe et de la poussière ✓ bonne réponse C. Dans les vestiaires D. Près d'un évier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le principe « premier périmé, premier utilisé » s'applique aux stocks stériles pour :	A. Éviter d'utiliser des produits périmés ✓ bonne réponse B. Faire des économies d'électricité C. Rien de particulier D. Ranger par couleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Le nettoyage des instruments avant stérilisation est indispensable car : A. Il donne une belle couleur B. Il remplace la stérilisation C. Il n'est pas indispensable D. La vapeur ne stérilise pas correctement un instrument encore sale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un laveur-désinfecteur sert à : A. Stériliser les implants B. Laver les blouses C. Nettoyer et désinfecter les instruments avant le conditionnement ✓ bonne réponse D. Laver les mains du personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les dispositifs à usage unique : A. Sont toujours réutilisables B. Peuvent être réutilisés pour le même patient le lendemain C. Ne doivent jamais être restérilisés ni réutilisés ✓ bonne réponse D. Peuvent être restérilisés deux fois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La traçabilité en stérilisation permet de retrouver : A. L'âge du chirurgien B. Le cycle de stérilisation utilisé pour chaque dispositif et le patient concerné ✓ bonne réponse C. Le prix de l'instrument D. La marque de la blouse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un emballage stérile tombé au sol : A. Peut être utilisé après avoir été essuyé B. Est considéré comme non stérile s'il est abîmé ou selon le protocole ✓ bonne réponse C. Doit être ouvert pour vérifier D. Est toujours stérile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le lavage chirurgical des mains peut se faire par : A. Application de crème B. Friction chirurgicale avec un produit hydro-alcoolique sur des mains propres et sèches ✓ bonne réponse C. Port de gants sans hygiène des mains D. Simple rinçage à l'eau froide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Dans la zone stérile, on évite : A. De porter un masque B. De tourner le dos au champ stérile et de passer entre deux zones stériles ✓ bonne réponse C. De parler à voix basse D. De garder les mains au-dessus de la taille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Les mains d'une personne habillée stérilement doivent rester :

- A. Sous les aisselles
- B. Derrière le dos
- C. Dans les poches
- D. Au-dessus de la taille et devant soi ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le contrôle de la stérilisation par vapeur comprend notamment :

- A. Uniquement la couleur des instruments
- B. Aucun contrôle
- C. Uniquement l'odeur
- D. La vérification des paramètres du cycle (température, pression, durée) et des indicateurs ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bloc opératoire 20 questions

1 La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » se déroule :

- A. Uniquement à la sortie du bloc
- B. Seulement pour les urgences
- C. Avant l'induction, avant l'incision et après l'intervention ✓ bonne réponse
- D. Le lendemain de l'intervention

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le « temps de pause » avant l'incision permet de vérifier :

- A. L'identité du patient, le côté et le site opératoire, l'intervention prévue ✓ bonne réponse
- B. Le nombre de lits disponibles
- C. Le programme du lendemain
- D. Les horaires de l'équipe

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Lors de l'installation du patient sur la table, le principal risque à prévenir est :

- A. L'allergie au latex chez tous les patients
- B. La fièvre
- C. Les compressions et lésions cutanées ou nerveuses ✓ bonne réponse
- D. L'hyperglycémie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La plaque neutre du bistouri électrique doit être placée :

- A. Sur une zone humide
- B. Sur une zone musculaire bien vascularisée, propre et sèche, proche du site opératoire ✓ bonne réponse
- C. Sur une cicatrice
- D. Sur une saillie osseuse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Dans la salle d'opération, les portes doivent rester :

- A. Fermées autant que possible pour limiter la contamination de l'air ✓ bonne réponse
- B. Ouvertes en permanence pour aérer
- C. Ouvertes pendant l'incision
- D. Sans importance

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Avant une intervention programmée, le patient doit en général : A. Avoir respecté le jeûne, la préparation cutanée et retiré bijoux et prothèses amovibles ✓ bonne réponse B. Avoir pris un repas copieux C. Garder ses bijoux D. Venir maquillé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le marquage du site opératoire (côté) est fait : A. Par le brancardier seul B. Après l'incision C. Avant l'arrivée au bloc, en présence du patient conscient si possible ✓ bonne réponse D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La position opératoire doit être : A. Choisie par le patient B. Toujours la même pour toutes les interventions C. Modifiée sans prévenir l'anesthésiste D. Vérifiée par l'équipe pour éviter compressions, étirements et brûlures ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Pourquoi protège-t-on les points d'appui (talons, coudes) au bloc ? A. Pour le confort du chirurgien B. Pour gagner du temps C. Pour prévenir les lésions cutanées et nerveuses ✓ bonne réponse D. Pour réchauffer la salle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	L'hypothermie au bloc opératoire est prévenue par : A. Un patient découvert B. Une salle froide C. Le réchauffement du patient (couverture chauffante, solutés réchauffés) ✓ bonne réponse D. La suppression des perfusions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le circuit propre/sale au bloc vise à : A. Faire gagner du temps au personnel B. Éviter de croiser le matériel stérile et les déchets ou le matériel souillé ✓ bonne réponse C. Séparer les hommes et les femmes D. Organiser les pauses	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La tenue de bloc comprend : A. Des bijoux sous la tenue B. La tenue de ville sous une blouse C. Tenue dédiée, coiffe couvrant les cheveux, masque, chaussures réservées au bloc ✓ bonne réponse D. Des chaussures de ville	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Le nombre de personnes et les allers-retours en salle d'opération doivent être : A. Augmentés pour former les étudiants B. Sans importance C. Encouragés pendant l'incision D. Limités pour réduire le risque infectieux ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les pièces opératoires (prélèvements) doivent être : A. Identifiées, placées dans un récipient adapté et accompagnées de la demande d'examen ✓ bonne réponse B. Jetées avec les déchets C. Gardées sans étiquette D. Remises à la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le bistouri électrique et les solutions alcooliques exposent au risque : A. D'allergie alimentaire B. D'hypoglycémie C. D'incendie au bloc : il faut laisser sécher l'antiseptique ✓ bonne réponse D. De fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le bionettoyage de la salle entre deux interventions sert à : A. Remplacer la stérilisation des instruments B. Stériliser l'air C. Remettre la salle dans un état de propreté adapté pour le patient suivant ✓ bonne réponse D. Changer la décoration	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient porteur d'un pacemaker opéré au bistouri électrique : A. Nécessite une vigilance particulière (avis de l'anesthésiste, position de la plaque) ✓ bonne réponse B. Ne pose aucun problème C. Ne peut jamais être opéré D. Doit retirer son pacemaker	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La feuille d'écologie ou de traçabilité du bloc recense : A. Uniquement le nom du chirurgien B. Le menu du jour C. Les congés du personnel D. L'équipe, les horaires, les dispositifs implantés et les événements ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 En salle de surveillance post-interventionnelle, le patient est transféré : A. Avec les transmissions de l'équipe d'anesthésie et du bloc ✓ bonne réponse B. Seul, sans informations C. Après avoir mangé D. Directement à domicile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Une rupture d'asepsie constatée pendant l'intervention doit être :

- A. Signalée immédiatement pour être corrigée ✓ **bonne réponse**
- B. Cachée
- C. Ignorée si elle est petite
- D. Corrigée après la fin de l'intervention

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

Suivi de grossesse 20 questions

1 Quelle est la durée moyenne d'une grossesse en semaines d'aménorrhée (SA) ?

- A. Environ 32 SA
- B. Environ 36 SA
- C. Environ 45 SA
- D. Environ 41 SA ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 À partir de quel terme une naissance est-elle considérée « à terme » ?

- A. 40 SA uniquement
- B. 32 SA
- C. 34 SA
- D. 37 SA révolues ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une tension artérielle $\geq 140/90$ mmHg avec protéinurie après 20 SA évoque :

- A. Une anémie
- B. Un diabète gestationnel
- C. Une grossesse normale
- D. Une prééclampsie ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Quelle supplémentation est recommandée en début de grossesse pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural ?

- A. Acide folique (vitamine B9) ✓ **bonne réponse**
- B. Vitamine K
- C. Vitamine A à forte dose
- D. Fer injectable systématique

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le dépistage du diabète gestationnel par HGPO 75 g se fait habituellement :

- A. Après l'accouchement
- B. Entre 24 et 28 SA ✓ **bonne réponse**
- C. À 38 SA
- D. À 8 SA

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 La date présumée d'accouchement se calcule habituellement à partir :

- A. De la date du mariage
- B. Du dernier jour des règles
- C. Du premier jour des dernières règles (ou de l'échographie de datation) ✓ **bonne réponse**
- D. Du poids de la mère

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	L'échographie du premier trimestre (vers 11-14 SA) permet notamment :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. De diagnostiquer le diabète gestationnel B. De dater la grossesse et de mesurer la clarté nucale ✓ bonne réponse C. De connaître le poids de naissance exact D. De déclencher l'accouchement	
8	Quel signe doit faire consulter en urgence pendant la grossesse ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une légère fatigue B. Des saignements vaginaux ou une diminution des mouvements du bébé ✓ bonne réponse C. Une envie fréquente d'uriner au premier trimestre D. Des nausées le matin	
9	Les signes de prééclampsie peuvent associer :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une toux B. Maux de tête, troubles visuels, douleur en barre épigastrique, œdèmes brutaux ✓ bonne réponse C. Uniquement des démangeaisons D. Une faim excessive	
10	La hauteur utérine mesurée en consultation sert à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Surveiller la croissance du fœtus ✓ bonne réponse B. Prévoir le sexe du bébé C. Calculer la glycémie D. Mesurer la tension	
11	La toxoplasmose est surveillée chez la femme enceinte non immunisée car :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Elle provoque toujours l'accouchement B. Elle est sans danger C. Elle peut atteindre le fœtus ✓ bonne réponse D. Elle protège le fœtus	
12	Conseil hygiéno-diététique à une femme enceinte non immunisée contre la toxoplasmose :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Manger la viande saignante B. Bien cuire la viande et laver soigneusement fruits et légumes ✓ bonne réponse C. Éviter de se laver les mains D. Toucher la litière du chat sans gants	
13	L'alcool pendant la grossesse :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Est à éviter totalement ✓ bonne réponse B. Est sans risque pour le fœtus C. Est recommandé au troisième trimestre D. Est autorisé en petite quantité chaque jour	

14 Une femme Rhésus négatif avec un conjoint Rhésus positif nécessite : A. Une transfusion systématique B. Une prévention de l'allo-immunisation (immunoglobulines anti-D selon le protocole) ✓ bonne réponse C. Un arrêt de la grossesse D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les mouvements actifs du fœtus sont en général perçus par la mère : A. Jamais avant l'accouchement B. Entre 16 et 22 SA environ ✓ bonne réponse C. Dès la 4e SA D. Seulement après 38 SA	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le diabète gestationnel expose surtout à : A. Une myopie maternelle B. Une petite taille du bébé uniquement C. Aucune complication D. Une macrosomie fœtale et des complications à l'accouchement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une menace d'accouchement prématuré se manifeste par : A. Une prise de poids régulière B. Des nausées au premier trimestre C. Des mouvements fœtaux actifs D. Des contractions régulières et des modifications du col avant 37 SA ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La supplémentation en fer pendant la grossesse vise à prévenir : A. L'hypertension B. L'anémie ✓ bonne réponse C. La prééclampsie de façon certaine D. Le diabète	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'entretien prénatal précoce permet surtout : A. De choisir le prénom B. D'identifier les besoins, les difficultés et de préparer la naissance ✓ bonne réponse C. De prescrire des antibiotiques D. De réaliser l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une femme enceinte se plaint de brûlures en urinant. Il faut : A. Rechercher une infection urinaire (ECBU) car elle peut favoriser une prématurité ✓ bonne réponse B. Lui conseiller de boire moins C. Ne rien faire, c'est normal D. Attendre l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Le travail actif est défini par une dilatation du col : A. Uniquement à 10 cm B. À partir d'environ 5 à 6 cm avec des contractions régulières ✓ bonne réponse C. À partir de 1 cm D. Dès la perte du bouchon muqueux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La délivrance correspond à : A. Le début des contractions B. La rupture de la poche des eaux C. La sortie de l'enfant D. L'expulsion du placenta et des membranes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une hémorragie du post-partum est définie par une perte sanguine d'au moins : A. 500 mL dans les 24 heures suivant l'accouchement ✓ bonne réponse B. 100 mL C. 200 mL D. 2 000 mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quel médicament est recommandé en prévention de l'hémorragie de la délivrance ? A. Le salbutamol B. Le paracétamol C. L'insuline D. L'ocytocine ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	La présentation la plus fréquente à l'accouchement est : A. Le siège B. La présentation céphalique (sommet) ✓ bonne réponse C. La présentation transverse D. La présentation de la face	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le premier stade du travail correspond à : A. La dilatation du col jusqu'à dilatation complète ✓ bonne réponse B. L'expulsion du bébé C. La délivrance du placenta D. La surveillance du post-partum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le deuxième stade du travail correspond à : A. La délivrance B. L'expulsion du fœtus ✓ bonne réponse C. La consultation prénatale D. La dilatation du col	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un liquide amniotique teinté (méconial) doit faire : A. Faire marcher la patiente B. Ignorer l'information C. Renforcer la surveillance du rythme cardiaque fœtal et prévenir l'équipe ✓ bonne réponse D. Arrêter la surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	Le rythme cardiaque fœtal normal se situe en général entre : A. 180 et 220 battements/min B. 40 et 60 battements/min C. 60 et 90 battements/min D. 110 et 160 battements/min ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le partogramme sert à : A. Prévoir la date de sortie B. Suivre graphiquement l'évolution du travail et repérer les anomalies ✓ bonne réponse C. Calculer le prix de l'accouchement D. Noter le menu de la patiente	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Pendant le travail, une position verticale ou la mobilité de la patiente : A. Peut faciliter la descente du bébé et le confort ✓ bonne réponse B. Empêche la surveillance C. Provoque systématiquement une hémorragie D. Est toujours interdite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Après la naissance, le clampage du cordon : A. Doit toujours être fait avant la sortie de la tête B. Peut être retardé d'environ une minute chez un nouveau-né qui va bien ✓ bonne réponse C. Se fait au bout d'une heure obligatoirement D. Est inutile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	L'examen du placenta après la délivrance vérifie : A. Qu'il est complet (cotylédons et membranes) ✓ bonne réponse B. Son poids pour la facture C. Sa couleur uniquement D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un globe utérin bien formé après la délivrance signifie : A. Un placenta retenu certain B. Que l'utérus est bien rétracté, ce qui limite le saignement ✓ bonne réponse C. Une hémorragie en cours D. Une infection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	La surveillance en salle de naissance après l'accouchement dure en général : A. Aucune surveillance B. 24 heures en salle de naissance C. Environ 2 heures (saignements, tension, globe utérin) ✓ bonne réponse D. 5 minutes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	L'épisiotomie : A. Est obligatoire à chaque accouchement B. Se fait avant le début du travail C. N'est pas systématique ; elle se décide selon la situation ✓ bonne réponse D. Est interdite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Une procidence du cordon (cordon devant la présentation) est : A. Un signe de fin de travail normale B. Une complication sans gravité C. Une urgence obstétricale ✓ bonne réponse D. Une situation normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une rupture des membranes sans contractions à terme impose : A. D'attendre une semaine à domicile B. Un bain chaud prolongé C. Une consultation à la maternité pour évaluation ✓ bonne réponse D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Une déchirure périnéale après l'accouchement : A. Est une contre-indication à l'allaitement B. Est examinée et suturée si nécessaire ✓ bonne réponse C. Nécessite une césarienne D. Est toujours laissée sans soin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le peau-à-peau à la naissance favorise : A. Les infections B. L'hypothermie C. La régulation thermique du bébé, le lien mère-enfant et la première tétée ✓ bonne réponse D. Le retard de l'allaitement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins néonataux 20 questions

1 Le score d'Apgar est évalué : A. À 1, 5 et 10 minutes de vie ✓ bonne réponse B. Au 3e jour C. Uniquement si l'enfant est prématuré D. À 1 heure de vie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quels éléments composent le score d'Apgar ? A. Température, glycémie, bilirubine B. Fréquence cardiaque, respiration, tonus, réactivité, coloration ✓ bonne réponse C. Poids, taille, périmètre crânien D. Pleurs, sommeil, alimentation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quelle vitamine est administrée au nouveau-né pour prévenir la maladie hémorragique ? A. Vitamine D à forte dose B. Vitamine B12 C. Vitamine K ✓ bonne réponse D. Vitamine C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un nouveau-né ? A. 120 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 200 à 240 battements/min C. 80 à 100 battements/min D. 60 à 80 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Pour prévenir l'hypothermie du nouveau-né, on privilégie : A. Une pièce non chauffée B. Le séchage immédiat et le peau-à-peau avec la mère ✓ bonne réponse C. Le bain immédiat D. Le laisser nu sur la table	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le poids de naissance moyen d'un nouveau-né à terme est d'environ : A. 6 kg B. 500 g C. 1 kg D. 3 à 3,5 kg ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La perte de poids physiologique des premiers jours est en général : A. Définitive B. Supérieure à 20 % C. Inexistante D. Inférieure à 10 % du poids de naissance, récupéré vers 10-15 jours ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un ictère (jaunisse) apparaissant dans les 24 premières heures de vie est : A. Un signe de bonne santé B. Toujours normal C. Anormal et doit être signalé rapidement ✓ bonne réponse D. Sans aucune importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La fréquence respiratoire normale d'un nouveau-né est d'environ : A. 20 cycles/min exactement B. 40 à 60 cycles/min ✓ bonne réponse C. 80 à 100 cycles/min D. 10 à 15 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les soins du cordon ombilical reposent sur : A. Une hygiène simple : garder le cordon propre et sec ✓ bonne réponse B. Tirer dessus pour qu'il tombe vite C. Le recouvrir d'un pansement serré et humide D. L'application de poudre ou de produits traditionnels	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le cordon ombilical tombe en général : A. Le jour de la naissance B. Jamais C. Entre 5 et 15 jours après la naissance ✓ bonne réponse D. Après 2 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12	Le dépistage néonatal par prélèvement de sang au talon permet de repérer :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le groupe scolaire B. La taille adulte C. La couleur des yeux D. Certaines maladies rares (comme l'hypothyroïdie congénitale) selon le programme du pays ✓ bonne réponse	
13	Un nouveau-né à risque d'hypoglycémie (mère diabétique, petit poids) nécessite :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un jeûne de 12 heures B. Une surveillance de la glycémie et une alimentation précoce ✓ bonne réponse C. Aucune surveillance D. Un bain froid	
14	Les premières selles du nouveau-né, noires et collantes, s'appellent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le colostrum B. Le lanugo C. Le vernix D. Le méconium ✓ bonne réponse	
15	Le vernix caseosa est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une infection de la peau B. Un médicament C. Une maladie du sang D. Un enduit blanchâtre qui protège la peau du nouveau-né ✓ bonne réponse	
16	La température idéale d'une salle de naissance pour accueillir un nouveau-né est d'environ :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 10 °C B. 15 °C C. 35 °C D. 23 à 25 °C ✓ bonne réponse	
17	Un nouveau-né qui ne respire pas à la naissance après séchage et stimulation nécessite :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une ventilation au masque immédiatement selon l'algorithme de réanimation néonatale ✓ bonne réponse B. Un bain C. Une tétée D. Une pesée	
18	La vaccination à la naissance en Tunisie comprend notamment :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le vaccin contre la grippe uniquement B. Le vaccin contre la rage C. Aucun vaccin D. Le BCG et la première dose contre l'hépatite B, selon le calendrier national ✓ bonne réponse	

19 Le couchage recommandé du nouveau-né :

- A. Sur le dos, dans un lit sans oreiller ni tour de lit ✓ bonne réponse
- B. Dans le lit des parents entre deux oreillers
- C. Avec plusieurs couvertures épaisses
- D. Sur le ventre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Un nouveau-né fébrile (température $\geq 38^{\circ}\text{C}$) doit :

- A. Être simplement déshabillé et surveillé une semaine
- B. Être baigné à l'eau froide
- C. Être examiné rapidement par un médecin ✓ bonne réponse
- D. Recevoir de l'aspirine

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Allaitement maternel 20 questions

1 L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à :

- A. 3 mois
- B. 6 mois ✓ bonne réponse
- C. 1 mois
- D. 12 mois

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quand débiter idéalement la première tétée ?

- A. Après le premier bain
- B. Après 24 heures
- C. Dans l'heure qui suit la naissance ✓ bonne réponse
- D. Au 3e jour, à la montée de lait

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le colostrum est :

- A. Le premier lait, riche en anticorps ✓ bonne réponse
- B. Un lait de mauvaise qualité à jeter
- C. Un lait artificiel
- D. Un signe d'infection

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une bonne prise du sein se reconnaît à :

- A. Une bouche grande ouverte, lèvres retroussées, menton contre le sein, aréole largement prise ✓ bonne réponse
- B. Le bébé qui tète uniquement le bout du mamelon
- C. Des bruits de claquement
- D. Une douleur intense chez la mère

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Pendant les premières semaines, un nouveau-né allaité tète en général :

- A. Toutes les 6 heures exactement
- B. Au moins 8 fois par 24 heures, à la demande ✓ bonne réponse
- C. Uniquement la nuit
- D. Deux fois par jour

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Un signe que le bébé reçoit suffisamment de lait : A. Ses urines sont très foncées B. Il dort 12 heures sans téter C. Plusieurs couches mouillées par jour et une prise de poids régulière ✓ bonne réponse D. Il pleure tout le temps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Des crevasses du mamelon sont le plus souvent dues à : A. Un lait de mauvaise qualité B. Une alimentation trop salée C. Un excès de tétées D. Une mauvaise position ou une mauvaise prise du sein ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un engorgement mammaire se soulage par : A. Des tétées fréquentes et efficaces, éventuellement de la chaleur avant et du froid après ✓ bonne réponse B. L'arrêt brutal de l'allaitement C. Un jeûne de la mère D. Un bandage serré des seins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une mastite se manifeste par : A. Une zone du sein rouge, chaude, douloureuse, souvent avec de la fièvre ✓ bonne réponse B. Une simple fatigue C. Une perte de cheveux D. Un lait plus sucré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	En cas de mastite, l'allaitement : A. Doit être remplacé par de l'eau sucrée B. Est dangereux pour le bébé dans tous les cas C. Peut en général être poursuivi, avec un avis médical ✓ bonne réponse D. Doit toujours être arrêté définitivement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Les compléments d'eau ou de lait artificiel chez un nouveau-né allaité en bonne santé : A. Augmentent la lactation B. Sont obligatoires chaque jour C. Ne sont pas nécessaires sans indication médicale ✓ bonne réponse D. Remplacent le colostrum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La montée de lait survient généralement : A. Pendant la grossesse uniquement B. Après un mois C. Entre le 2e et le 4e jour après l'accouchement ✓ bonne réponse D. Le jour de l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le lait maternel exprimé peut être conservé au réfrigérateur (environ 4 °C) : A. Indéfiniment B. 1 heure seulement C. Environ 48 heures selon les recommandations courantes ✓ bonne réponse D. 1 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Pour décongeler du lait maternel, on évite : A. Le réfrigérateur B. Le four à micro-ondes ✓ bonne réponse C. L'eau tiède D. Le bain-marie tiède	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Quel médicament prendre pendant l'allaitement ? A. N'importe lequel sans avis B. Uniquement ceux validés par un médecin ou un pharmacien comme compatibles ✓ bonne réponse C. Les mêmes que pendant la grossesse sans vérifier D. Aucun traitement n'est jamais possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La position « ballon de rugby » est utile notamment : A. Uniquement pour les biberons B. Pour les bébés de plus de 2 ans C. Après une césarienne ou pour des jumeaux ✓ bonne réponse D. Pour faire dormir la mère	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le réflexe d'éjection du lait est favorisé par : A. Le froid B. L'ocytocine, stimulée par la succion et la détente de la mère ✓ bonne réponse C. Le stress D. L'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Les avantages de l'allaitement pour le bébé incluent : A. Une protection contre certaines infections ✓ bonne réponse B. Une absence totale de maladies C. Une croissance plus rapide que la normale D. Aucun avantage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Une mère qui reprend le travail et veut poursuivre l'allaitement peut : A. Arrêter forcément l'allaitement B. Tirer son lait et le conserver selon les règles d'hygiène ✓ bonne réponse C. Allaiter seulement une fois par semaine D. Donner du lait non conservé au froid	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les signes d'une bonne succion au sein : A. Succions lentes et profondes avec des déglutitions audibles ✓ bonne réponse B. Joues creusées C. Douleur intense de la mère pendant toute la tétée D. Bruits de claquement de langue	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

1	Avant une anesthésie programmée, le jeûne habituel pour les solides est d'au moins : A. 30 minutes B. 24 heures C. 1 heure D. 6 heures ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Les liquides clairs (eau, thé sans lait) sont généralement autorisés jusqu'à : A. 24 heures avant B. 2 heures avant l'anesthésie ✓ bonne réponse C. Ils sont interdits dès la veille D. 12 heures avant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le propofol est : A. Un curare B. Un antalgique morphinique C. Un antidote des benzodiazépines D. Un hypnotique d'induction intraveineux ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quel est l'antidote des morphiniques ? A. La naloxone ✓ bonne réponse B. La néostigmine C. Le flumazénil D. L'atropine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Quel est l'antidote des benzodiazépines ? A. La vitamine K B. La protamine C. Le flumazénil ✓ bonne réponse D. La naloxone	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La consultation d'anesthésie a lieu : A. Uniquement après l'intervention B. Plusieurs jours avant une intervention programmée ✓ bonne réponse C. Elle est facultative D. Au bloc, juste avant l'induction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les trois composantes classiques de l'anesthésie générale sont : A. Hypnose (sommeil), analgésie et, si besoin, curarisation (relâchement musculaire) ✓ bonne réponse B. Hydratation, nutrition et marche C. Sédatation, vomissement et hypertension D. Fièvre, toux et douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un curare provoque : A. Un sommeil sans effet sur la respiration B. Une paralysie des muscles, nécessitant une ventilation ✓ bonne réponse C. Une augmentation de la vigilance D. Une analgésie seule	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 L'induction en « séquence rapide » est indiquée chez un patient : A. Uniquement chez les enfants B. Uniquement pour une anesthésie locale C. À jeun depuis la veille sans risque D. À l'estomac plein (risque d'inhalation) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La vérification de l'appareil d'anesthésie se fait : A. Uniquement en cas de panne B. Une fois par an C. Avant chaque programme opératoire, selon une check-list ✓ bonne réponse D. Par le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 L'hyperthermie maligne est une complication rare déclenchée notamment par : A. Le sérum physiologique B. Le paracétamol C. L'oxygène D. Les halogénés et la succinylcholine ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le traitement spécifique de l'hyperthermie maligne est : A. La naloxone B. Le dantrolène ✓ bonne réponse C. La vitamine K D. L'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient à risque de nausées et vomissements postopératoires peut recevoir : A. Aucune prévention B. Une prophylaxie antiémétique selon le protocole ✓ bonne réponse C. Plus de morphine D. Un repas avant l'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La sévoflurane est : A. Un antibiotique B. Un anticoagulant C. Un curare D. Un agent anesthésique halogéné inhalé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La kétamine a pour particularité de : A. Être un antiémétique B. Bloquer la respiration de façon certaine C. Préserver en général la ventilation spontanée et la tension artérielle ✓ bonne réponse D. Être un curare	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le score ASA sert à évaluer : A. L'état de santé général du patient avant l'anesthésie (risque anesthésique) ✓ bonne réponse B. La durée de l'intervention C. La douleur D. La profondeur du coma	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Avant l'induction, l'équipe vérifie notamment :

- A. Le menu du soir
- B. Identité, jeûne, allergies, matériel d'intubation et d'aspiration ✓ **bonne réponse**
- C. La couleur de la blouse
- D. Rien, tout a été vu en consultation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 L'anesthésie locorégionale (rachianesthésie, péridurale) consiste à :

- A. Donner un antalgique par la bouche
- B. Anesthésier une région du corps en injectant un anesthésique local près des nerfs ✓ **bonne réponse**
- C. Bloquer tous les muscles du corps
- D. Endormir complètement le patient par inhalation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Une complication possible de la rachianesthésie est :

- A. Une hypotension artérielle ✓ **bonne réponse**
- B. Une hyperglycémie systématique
- C. Une perte de cheveux
- D. Une fracture

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La toxicité des anesthésiques locaux peut se manifester par :

- A. Une diarrhée
- B. Une éruption sans gravité uniquement
- C. Une fièvre isolée
- D. Des signes neurologiques (goût métallique, convulsions) et cardiaques ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Intubation et ventilation 20 questions

1 La manœuvre de Sellick consiste à :

- A. Comprimer le thorax
- B. Exercer une pression sur le cartilage cricoïde ✓ **bonne réponse**
- C. Surélever les jambes
- D. Tourner la tête du patient sur le côté

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel est le moyen le plus fiable pour confirmer la position de la sonde d'intubation dans la trachée ?

- A. La capnographie (présence de CO2 expiré) ✓ **bonne réponse**
- B. La buée dans la sonde
- C. La couleur de la peau
- D. Le nombre de centimètres seul

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Avant l'intubation, la pré-oxygénation se fait :

- A. Avec de l'oxygène pur au masque pendant environ 3 minutes ✓ **bonne réponse**
- B. Pendant 10 secondes
- C. À l'air ambiant
- D. Après l'intubation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4	Le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) sert à : A. Réchauffer le patient B. Aspirer les sécrétions C. Mesurer la tension artérielle D. Ventiler manuellement un patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une désaturation brutale chez un patient intubé et ventilé doit faire rechercher en priorité : A. Une erreur de la tension B. Une hyperthermie C. Un déplacement ou une obstruction de la sonde, un problème de ventilateur ✓ bonne réponse D. Une hypoglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La laryngoscopie permet de : A. Visualiser la glotte pour introduire la sonde d'intubation ✓ bonne réponse B. Aspirer l'estomac C. Mesurer la tension D. Prendre la température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une intubation sélective dans la bronche souche droite se manifeste par : A. Une fièvre B. Une hypertension isolée C. Une bradycardie isolée sans autre signe D. Une asymétrie du murmure vésiculaire (bruit respiratoire diminué à gauche) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le ballonnet de la sonde d'intubation sert à : A. Humidifier l'air B. Mesurer la température C. Assurer l'étanchéité et limiter l'inhalation ✓ bonne réponse D. Fixer la sonde à la joue	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La pression du ballonnet est contrôlée pour éviter : A. La fièvre B. Les allergies C. L'hypoglycémie D. Les lésions de la trachée par une pression trop élevée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le masque laryngé est : A. Un masque à oxygène simple B. Un dispositif supraglottique utilisé pour ventiler sans intubation trachéale ✓ bonne réponse C. Un masque chirurgical D. Une sonde gastrique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Une intubation difficile imprévue nécessite : A. D'appeler de l'aide et de suivre l'algorithme du service (vidéolaryngoscope, masque laryngé...) ✓ bonne réponse B. De réveiller le chirurgien C. De multiplier les tentatives seul D. D'arrêter l'oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Le volume courant habituellement réglé chez l'adulte en ventilation protectrice est d'environ : A. 6 à 8 mL/kg de poids idéal ✓ bonne réponse B. 1 mL/kg C. 50 mL/kg D. 20 mL/kg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	La PEP (pression expiratoire positive) sert à : A. Maintenir les alvéoles ouvertes et améliorer l'oxygénation ✓ bonne réponse B. Endormir le patient C. Faire tousser D. Augmenter la fréquence cardiaque	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Une alarme de pression haute sur le respirateur peut indiquer : A. Une sonde coudée, des sécrétions ou un bronchospasme ✓ bonne réponse B. Une batterie chargée C. Une déconnexion D. Un patient qui dort bien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Une alarme de pression basse sur le respirateur évoque en premier : A. Une déconnexion ou une fuite du circuit ✓ bonne réponse B. Une fièvre C. Un bronchospasme D. Un patient trop sédaté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	L'aspiration trachéale chez un patient intubé se fait : A. Pendant plusieurs minutes B. Avec une technique aseptique, une sonde adaptée et une durée courte ✓ bonne réponse C. Sans oxygénation préalable même si le patient désature D. Avec la même sonde pour plusieurs patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	La position de la sonde d'intubation est notée en centimètres : A. Elle n'est jamais notée B. Au niveau du nombril C. Au niveau des dents ou de la commissure labiale ✓ bonne réponse D. Au niveau de l'oreille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Le bronchospasme se manifeste par :

- A. Une augmentation de la diurèse
- B. Des sifflements, une difficulté à ventiler et une baisse de la saturation ✓ **bonne réponse**
- C. Une hypertension isolée
- D. Une diarrhée

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Avant l'extubation, on vérifie notamment :

- A. Que le patient a mangé
- B. Uniquement l'heure
- C. Que le chirurgien est parti
- D. Le réveil, la ventilation spontanée efficace et la décurarisation ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La fraction inspirée en oxygène (FiO2) de l'air ambiant est d'environ :

- A. 50 %
- B. 21 % ✓ **bonne réponse**
- C. 100 %
- D. 5 %

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Monitoring hémodynamique 20 questions

1 La pression artérielle moyenne (PAM) se calcule approximativement par :

- A. $(PAS + 2 \times PAD) / 3$ ✓ **bonne réponse**
- B. $PAS \times 2$
- C. $PAS - PAD$
- D. $(PAS + PAD) / 2$

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le monitoring minimal d'une anesthésie générale comprend :

- A. ECG, pression artérielle, SpO2, capnographie ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la diurèse
- C. Uniquement la température
- D. Uniquement la SpO2

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Sur l'ECG du scope, une ligne plate chez un patient inconscient doit d'abord faire :

- A. Diminuer le volume des alarmes
- B. Changer d'imprimante
- C. Attendre la fin de l'intervention
- D. Vérifier le patient et les électrodes, et débiter la réanimation si arrêt cardiaque ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une bradycardie sévère au bloc peut être traitée en première intention par :

- A. Le propofol
- B. La morphine
- C. Le furosémide
- D. L'atropine (selon prescription / protocole) ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5	La pression artérielle invasive est mesurée grâce à : A. Un thermomètre B. Un brassard au bras C. Un cathéter artériel relié à un capteur de pression ✓ bonne réponse D. Un oxymètre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le capteur de pression d'une ligne artérielle doit être placé : A. À n'importe quelle hauteur B. Au niveau de l'oreillette droite (zéro de référence) ✓ bonne réponse C. Au niveau du sol D. Au-dessus de la tête	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mmHg chez l'adulte en réanimation est en général : A. Insuffisante pour une bonne perfusion des organes ✓ bonne réponse B. Idéale C. Élevée D. Sans importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La capnographie mesure : A. Le CO₂ dans l'air expiré ✓ bonne réponse B. L'oxygène dans le sang veineux C. La glycémie D. La température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une chute brutale du CO₂ expiré pendant une anesthésie peut signaler : A. Une amélioration de l'état du patient B. Une fièvre C. Un réveil normal D. Une déconnexion, une embolie ou un arrêt circulatoire ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le monitoring de la curarisation (train de quatre) sert à : A. Mesurer la douleur B. Mesurer la diurèse C. Mesurer la tension D. Évaluer le relâchement musculaire et la décurarisation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La pression veineuse centrale se mesure à l'aide : A. D'un cathéter périphérique au pied B. D'une sonde urinaire C. D'un cathéter veineux central ✓ bonne réponse D. D'un brassard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Sur l'ECG, une fibrillation ventriculaire est : A. Une simple tachycardie sinusale B. Une bradycardie sans gravité C. Un rythme normal D. Un rythme d'arrêt cardiaque nécessitant une défibrillation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Une asystolie est : A. Une hypertension B. Une tachycardie C. Un rythme normal D. Une absence d'activité électrique cardiaque (rythme non choquable) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La température centrale se surveille au bloc pour prévenir : A. L'hypothermie peropératoire ✓ bonne réponse B. Les allergies C. La fracture D. Le diabète	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La diurèse horaire est un reflet : A. De la douleur B. De la perfusion rénale ✓ bonne réponse C. De la profondeur du sommeil D. De la fonction respiratoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'index bispectral (BIS) sert à évaluer : A. La saturation B. Le débit urinaire C. La fréquence respiratoire D. La profondeur de l'hypnose ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les alarmes du scope doivent être : A. Réglées au maximum pour tous B. Réglées selon le patient et jamais coupées sans surveillance ✓ bonne réponse C. Toujours désactivées pour le calme D. Ignorées la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une hypotension après l'induction est souvent traitée en première intention par : A. Un diurétique B. Un antibiotique C. Un remplissage et/ou un vasopresseur selon la prescription ✓ bonne réponse D. Un arrêt de l'oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les électrodes de l'ECG à 3 brins se placent classiquement : A. Sur le visage B. Rouge à droite sous la clavicule, jaune à gauche sous la clavicule, verte en bas à gauche ✓ bonne réponse C. Sur le dos uniquement D. Toutes sur la jambe droite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une saturation qui chute alors que la courbe de pouls est de mauvaise qualité doit faire : A. Couper le moniteur B. Arrêter l'oxygène C. Ignorer l'alarme D. Vérifier le capteur et l'état du patient avant de conclure ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Le score d'Aldrete sert à : A. Mesurer la douleur B. Évaluer la récupération et autoriser la sortie de salle de réveil ✓ bonne réponse C. Évaluer le risque d'escarre D. Évaluer la profondeur de l'anesthésie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quel est le premier signe de dépression respiratoire liée aux morphiniques à surveiller ? A. Des démangeaisons uniquement B. La sédation (somnolence) et la baisse de la fréquence respiratoire ✓ bonne réponse C. Une hypertension isolée D. La fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 En salle de réveil, des frissons avec température à 35 °C nécessitent : A. Un bain froid B. Un réchauffement actif du patient ✓ bonne réponse C. Aucune action D. Une sortie immédiate	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Une échelle numérique de la douleur à 7/10 en SSPI signifie : A. Une douleur absente B. Une erreur de mesure C. Une douleur importante à traiter selon le protocole ✓ bonne réponse D. Une douleur normale à ignorer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 En salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), la surveillance porte sur : A. Uniquement la tension B. Uniquement le confort C. Uniquement la douleur D. Conscience, respiration, circulation, douleur, température et pansements ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un patient ronfle bruyamment en SSPI avec une saturation qui baisse. Il faut penser à : A. Une diurèse abondante B. Une obstruction des voies aériennes (subluxer la mâchoire, oxygène, alerter) ✓ bonne réponse C. Un sommeil réparateur sans risque D. Une hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Des nausées et vomissements en SSPI exposent à : A. Une meilleure récupération B. Une baisse de la douleur C. Un risque d'inhalation chez un patient encore somnolent ✓ bonne réponse D. Aucun risque	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un globe vésical en SSPI se manifeste par : A. Une agitation, une douleur et une masse au-dessus du pubis ✓ bonne réponse B. Une toux C. Une diarrhée D. Une baisse de la température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La morphine titrée en SSPI consiste à : A. Ne jamais traiter la douleur B. Administrer de petites doses répétées en réévaluant la douleur et la vigilance ✓ bonne réponse C. Donner la morphine par voie rectale D. Donner une forte dose unique sans surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un saignement important sur le pansement en SSPI doit faire : A. Prévenir immédiatement l'anesthésiste et le chirurgien ✓ bonne réponse B. Changer simplement le pansement sans rien dire C. Attendre le lendemain D. Retirer les drains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La surveillance après une rachianesthésie comprend notamment : A. La récupération de la motricité et de la sensibilité des membres inférieurs ✓ bonne réponse B. La glycémie uniquement C. Uniquement la température D. La vision des couleurs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le frisson postopératoire augmente : A. La vision B. La diurèse C. La glycémie uniquement D. La consommation d'oxygène ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les critères de sortie de SSPI reposent sur : A. L'heure de fin de garde B. Un score validé (par exemple Aldrete) et l'avis de l'anesthésiste ✓ bonne réponse C. La demande de la famille D. Le nombre de lits disponibles uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une décurarisation incomplète peut se manifester par : A. Une hyperactivité B. Une hypertension isolée C. Une faiblesse musculaire et une difficulté respiratoire ✓ bonne réponse D. Une fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Un patient agité et confus au réveil : avant tout, on recherche : A. Un problème administratif B. Rien, on le sédate sans chercher C. Une hypoxie, une douleur, un globe vésical ou une hypoglycémie ✓ bonne réponse D. Un manque de télévision	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La surveillance de l'enfant en SSPI nécessite : A. Des valeurs normales adaptées à l'âge et la présence rassurante des parents si possible ✓ bonne réponse B. Aucune surveillance particulière C. Les mêmes valeurs que l'adulte D. Un jeûne prolongé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les drains chirurgicaux sont surveillés pour : A. Leur couleur décorative B. Le bruit qu'ils font C. Leur prix D. La quantité et l'aspect de ce qui s'écoule ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un patient opéré sous anesthésie générale peut en général boire : A. Lorsqu'il est bien réveillé, selon la prescription et l'intervention ✓ bonne réponse B. Uniquement de l'alcool C. Jamais pendant 3 jours D. Immédiatement à l'arrivée en SSPI, encore endormi	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les transmissions à la sortie de SSPI comprennent : A. Intervention, anesthésie, antalgiques donnés, constantes, consignes de surveillance ✓ bonne réponse B. Uniquement l'heure C. Uniquement le nom du patient D. Rien si tout s'est bien passé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une SpO2 à 88 % en SSPI chez un patient sans pathologie respiratoire impose : A. Faire sortir le patient de SSPI B. Couper l'alarme C. Attendre 30 minutes D. Stimuler le patient, oxygéner, vérifier les voies aériennes et alerter ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Imagerie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)

1	Les trois principes de la radioprotection sont : A. Distance, lumière, silence B. Prévention, traitement, suivi C. Justification, optimisation, limitation ✓ bonne réponse D. Rapidité, précision, efficacité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quels sont les trois moyens de se protéger d'une source de rayonnement ? A. Température, pression, humidité B. Gants, masque, lunettes de soleil C. Temps, distance, écran ✓ bonne réponse D. Lavage, désinfection, stérilisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Avant un examen radiologique chez une femme en âge de procréer, il faut : A. Vérifier son groupe sanguin B. Rechercher une éventuelle grossesse ✓ bonne réponse C. Rien de particulier D. Prendre sa température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le dosimètre individuel porté par le personnel sert à : A. Mesurer la dose de rayonnement reçue ✓ bonne réponse B. Mesurer la tension artérielle C. Détecter les métaux D. Mesurer le temps de travail	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le principe ALARA signifie : A. Augmenter les doses pour une meilleure image B. Maintenir les doses aussi basses que raisonnablement possible ✓ bonne réponse C. Utiliser toujours le même réglage D. Ne jamais faire de radiographie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'unité de dose efficace utilisée en radioprotection est : A. Le sievert (Sv), souvent exprimé en millisievert (mSv) ✓ bonne réponse B. Le décibel C. Le watt D. Le kilogramme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Doubler la distance à une source de rayons X divise la dose reçue environ par : A. 4 (loi de l'inverse du carré de la distance) ✓ bonne réponse B. 2 C. 10 D. Elle ne change pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le tablier plombé protège : A. Contre le champ magnétique de l'IRM B. Le tronc et les organes sensibles du rayonnement diffusé ✓ bonne réponse C. Contre les infections D. Contre le bruit de l'appareil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Le cache-thyroïde est utile car la thyroïde est : A. Sans lien avec l'imagerie B. Insensible aux rayons C. Un organe sensible aux rayonnements ✓ bonne réponse D. Un organe de protection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La zone contrôlée d'un service d'imagerie est : A. Signalée, à accès réglementé, où l'exposition peut dépasser certains seuils ✓ bonne réponse B. Un vestiaire C. Une salle d'attente libre d'accès D. Le bureau administratif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La collimation du faisceau consiste à : A. Mesurer la tension du patient B. Refroidir le tube C. Limiter le champ d'irradiation à la zone utile ✓ bonne réponse D. Augmenter la dose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Chez l'enfant, la radioprotection est renforcée car : A. Ses tissus sont plus sensibles et son espérance de vie plus longue ✓ bonne réponse B. Il ne bouge jamais C. Les appareils sont différents D. Les doses n'ont aucun effet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le parent qui maintient un enfant pendant une radiographie doit : A. Se placer dans le faisceau B. Ne prendre aucune précaution C. Porter un tablier de protection et ne pas être enceinte ✓ bonne réponse D. Tenir l'enfant à mains nues dans le champ	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le principe de justification signifie : A. Qu'on refait toujours l'examen deux fois B. Qu'on choisit la dose la plus forte C. Qu'un examen irradiant doit apporter un bénéfice supérieur au risque ✓ bonne réponse D. Qu'on justifie la facture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le dosimètre passif doit être porté : A. Seulement à la maison B. Sur le poignet du patient C. Dans le vestiaire D. Sur la poitrine, sous le tablier plombé selon les consignes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16	Un examen de remplacement non irradiant est à privilégier quand c'est possible, par exemple :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une scintigraphie B. L'échographie ou l'IRM ✓ bonne réponse C. Un scanner D. Une radiographie de plus	
17	Pendant une exposition en salle de radiologie, le manipulateur se place :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Derrière le paravent ou dans le pupitre protégé ✓ bonne réponse B. Dans le faisceau C. Dans le couloir porte ouverte D. À côté du patient sans protection	
18	Le voyant lumineux « rayons X en cours » à l'entrée de la salle signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Qu'il ne faut pas entrer pendant l'émission ✓ bonne réponse B. Que l'appareil est en panne C. Que la salle est libre D. Que le patient est sorti	
19	L'effet des rayonnements ionisants à faible dose est surtout un risque :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. D'allergie B. De fracture C. De brûlure immédiate systématique D. Probabiliste (augmentation du risque de cancer à long terme) ✓ bonne réponse	
20	Les doses reçues par le personnel exposé sont :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Jamais contrôlées B. Mesurées une seule fois dans la carrière C. Suivies régulièrement et soumises à des limites réglementaires ✓ bonne réponse D. Sans limite	

Radiologie conventionnelle 20 questions

1	Une radiographie pulmonaire de face standard se fait de préférence :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Couché, en expiration forcée B. Debout, en inspiration profonde bloquée ✓ bonne réponse C. Assis, en respirant normalement D. Debout, en toussant	
2	Pour la radiographie d'un membre traumatisé, on réalise habituellement :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une seule incidence de face B. Uniquement un profil C. Au moins deux incidences orthogonales (face et profil) ✓ bonne réponse D. Une incidence oblique seule	

3	Avant une radiographie, on demande au patient de retirer : A. Rien du tout B. Ses chaussettes uniquement C. Les objets métalliques dans la zone examinée ✓ bonne réponse D. Ses lunettes pour toute radiographie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Sur une radiographie standard, l'os apparaît : A. Blanc (radio-opaque) ✓ bonne réponse B. Transparent C. Noir D. Gris foncé comme l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	L'air apparaît sur une radiographie : A. Invisible B. Blanc C. Noir (radio-transparent) ✓ bonne réponse D. Gris clair comme l'os	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Une radiographie de thorax « de profil » permet notamment : A. De remplacer le scanner dans tous les cas B. De mieux localiser une lésion vue de face ✓ bonne réponse C. De mesurer la tension D. D'étudier les dents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Avant une radiographie, le manipulateur vérifie : A. L'identité du patient, la prescription et la zone à radiographier ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur des vêtements C. Rien D. Uniquement l'âge	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Pour une radiographie du bassin chez une femme jeune, on interroge sur : A. Ses allergies alimentaires uniquement B. Ses horaires de travail C. Une possible grossesse ✓ bonne réponse D. Son groupe sanguin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La radiographie au lit du patient (mobile) est utilisée : A. Jamais B. Uniquement pour les dents C. Quand le patient ne peut pas être déplacé (réanimation, soins intensifs) ✓ bonne réponse D. Pour tous les patients ambulatoires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le flou cinétique sur une image est dû : A. À la couleur de la peau B. À une dose trop faible uniquement C. À la température de la salle D. Aux mouvements du patient pendant l'exposition ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 L'incidence « face » d'une main se réalise : A. Main à plat, paume contre le détecteur ✓ bonne réponse B. Main dans le dos C. Main en l'air D. Poing fermé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les objets métalliques dans la zone examinée : A. N'ont aucune influence B. Sont obligatoires C. Améliorent l'image D. Sont retirés car ils masquent les structures ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La mammographie est un examen utilisant : A. Des ultrasons uniquement B. Des rayons X à faible énergie, avec compression du sein ✓ bonne réponse C. Un champ magnétique D. Aucune radiation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) peut montrer : A. Des niveaux hydro-aériques en cas d'occlusion ✓ bonne réponse B. Le fonctionnement du cerveau C. La vision D. La tension artérielle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le contrôle de qualité de l'image vérifie : A. Le bon centrage, la bonne exposition et l'absence d'artéfact ✓ bonne réponse B. Rien C. La signature du patient D. La couleur de l'écran uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le PACS est : A. Un produit de contraste B. Un tablier plombé C. Le système d'archivage et de transmission des images ✓ bonne réponse D. Un type de scanner	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 En traumatologie du rachis cervical, le manipulateur : A. Fait tourner la tête du patient pour mieux voir B. Mobilise le patient avec précaution, en maintenant l'axe, sur avis médical ✓ bonne réponse C. Fait asseoir le patient rapidement D. Retire le collier cervical sans avis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une radiographie de thorax de face est réalisée de préférence : A. En expiration forcée B. En incidence postéro-antérieure (dos au tube) ✓ bonne réponse C. Allongé sur le ventre D. De dos au détecteur systématiquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Les clichés comparatifs (côté sain) sont parfois utiles :

- A. Pour la facturation
- B. Chez l'enfant, pour interpréter les cartilages de croissance ✓ bonne réponse
- C. Jamais
- D. Pour remplacer l'examen clinique

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 L'identification de chaque image comprend :

- A. Le nom du patient, la date et le repère droite/gauche ✓ bonne réponse
- B. Le prix de l'examen
- C. Uniquement le nom du manipulateur
- D. Rien

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Scanner et IRM 20 questions

1 Quelle est la principale contre-indication à l'IRM ?

- A. Une prothèse dentaire en résine
- B. Le diabète
- C. Certains dispositifs implantés (pacemaker non compatible, corps étranger métallique intraoculaire...) ✓ bonne réponse
- D. Le port de lentilles

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Avant l'injection d'un produit de contraste iodé, on recherche notamment :

- A. Un groupe sanguin rare
- B. Un antécédent d'appendicectomie
- C. Une allergie antérieure et une insuffisance rénale ✓ bonne réponse
- D. Une myopie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 L'IRM utilise :

- A. Un champ magnétique et des ondes radiofréquence ✓ bonne réponse
- B. Des ultrasons
- C. Des rayons X
- D. Des rayons gamma

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Le scanner (tomodensitométrie) utilise :

- A. Des ultrasons
- B. Des rayons X ✓ bonne réponse
- C. Aucun rayonnement
- D. Un champ magnétique

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Chez un patient diabétique traité par metformine, l'injection d'iode impose surtout de :

- A. Contre-indiquer définitivement l'examen
- B. Faire un jeûne de 48 h
- C. Doubler la dose de metformine
- D. Vérifier la fonction rénale et suivre le protocole d'arrêt temporaire si nécessaire ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Avant une IRM, le patient doit retirer : A. Tous les objets métalliques (bijoux, montre, cartes magnétiques, épingles) ✓ bonne réponse B. Rien C. Uniquement ses chaussures D. Ses lunettes de vue uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le questionnaire de sécurité avant IRM recherche notamment : A. Le niveau d'études B. Pacemaker, implants, éclats métalliques, clips vasculaires ✓ bonne réponse C. Le groupe sanguin D. Les préférences alimentaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le produit de contraste utilisé en IRM est le plus souvent : A. De l'air B. À base d'iode C. À base de gadolinium ✓ bonne réponse D. Du baryum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le bruit pendant une IRM impose de : A. Fournir des protections auditives au patient ✓ bonne réponse B. Ne rien prévoir C. Augmenter le volume de la musique D. Laisser la porte ouverte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un patient claustrophobe avant une IRM peut être aidé par : A. Un examen sans le prévenir B. Des explications, un contact verbal et parfois une prémédication prescrite ✓ bonne réponse C. Une contention forcée D. Le laisser seul sans information	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un objet métallique ferromagnétique introduit en salle d'IRM peut : A. Être sans danger B. Être violemment attiré par l'aimant (effet projectile) ✓ bonne réponse C. Améliorer les images D. Arrêter le champ magnétique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le champ magnétique d'une IRM est : A. Actif uniquement pendant l'examen B. Toujours actif, même quand aucun examen n'est en cours ✓ bonne réponse C. Coupé la nuit D. Inexistant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour un scanner avec injection d'iode, on demande souvent : A. Un test d'effort B. Un bilan ophtalmologique C. Un bilan de la fonction rénale récent selon les facteurs de risque ✓ bonne réponse D. Un électroencéphalogramme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14	Une réaction allergique à l'iode pendant l'injection se manifeste par : A. Une baisse de la fièvre B. Urticaire, gêne respiratoire, chute de tension ✓ bonne réponse C. Une meilleure qualité d'image D. Une faim soudaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Après une injection de produit de contraste iodé, on conseille en général : A. De faire du sport intense immédiatement B. De bien s'hydrater ✓ bonne réponse C. De jeûner 3 jours D. De ne pas boire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Une extravasation de produit de contraste au point d'injection impose : A. D'arrêter l'injection, surélever le membre et prévenir le médecin ✓ bonne réponse B. De ne rien faire C. De masser fortement D. D'augmenter le débit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Le scanner est particulièrement utile en urgence pour : A. Rechercher un saignement intracrânien après un traumatisme ✓ bonne réponse B. Remplacer l'échographie cardiaque C. Mesurer la glycémie D. Étudier un fœtus en première intention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Le coroscanner ou l'angioscanner nécessitent souvent : A. Aucune voie veineuse B. Une voie veineuse de bon calibre pour l'injection rapide ✓ bonne réponse C. Un jeûne de 48 heures D. Une anesthésie générale systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Les patients diabétiques sous metformine doivent signaler leur traitement avant : A. Une prise de tension B. Une radiographie du doigt C. Un examen avec injection d'iode ✓ bonne réponse D. Une pesée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Un implant « compatible IRM sous conditions » signifie : A. Que l'examen est possible en respectant les conditions du fabricant ✓ bonne réponse B. Que tout examen est interdit C. Que l'implant doit être retiré D. Qu'il n'y a aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Laboratoire / biologie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale

1	Un tube arrive au laboratoire sans étiquette d'identification. Que faire ? A. Le refuser et demander un nouveau prélèvement ✓ bonne réponse B. Le traiter et deviner le patient C. L'étiqueter avec le patient le plus probable D. Le conserver sans rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La glycémie à jeun se prélève après un jeûne d'au moins : A. 1 heure B. 24 heures C. 8 heures ✓ bonne réponse D. 30 minutes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une hémolyse de l'échantillon augmente faussement notamment : A. Le sodium B. Le potassium ✓ bonne réponse C. Les plaquettes D. La glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un tube pour bilan d'hémostase (citrate) insuffisamment rempli : A. Fausse les résultats et doit être refusé ✓ bonne réponse B. Donne des résultats plus précis C. Peut être complété avec un autre tube D. Est sans conséquence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un échantillon pour gazométrie artérielle doit être : A. Laissé à l'air libre une heure B. Congelé avant analyse C. Agité à l'air D. Analysé rapidement, sans bulle d'air ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La phase pré-analytique comprend : A. Tout ce qui précède l'analyse : prescription, préparation du patient, prélèvement, transport ✓ bonne réponse B. Le rendu du compte rendu C. Uniquement la validation des résultats D. Uniquement la facturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La majorité des erreurs de laboratoire surviennent : A. Pendant la phase pré-analytique ✓ bonne réponse B. Après le rendu des résultats C. Jamais D. Pendant l'analyse automatisée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un échantillon de sang pour bilan d'hémostase doit être acheminé : A. Après 48 heures B. Congelé C. Rapidement, à température ambiante, sans être agité ✓ bonne réponse D. Au soleil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	Un tube coagulé alors qu'il devait rester liquide (EDTA) est le plus souvent dû à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un patient à jeun B. Une homogénéisation insuffisante après le prélèvement ✓ bonne réponse C. Une étiquette mal collée D. Un tube trop rempli de façon correcte	
10	Pour un dosage de la kaliémie, un prélèvement fait avec un garrot prolongé et le poing serré peut :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Fausser la couleur de l'urine B. Diminuer le sodium C. Augmenter faussement le potassium ✓ bonne réponse D. N'avoir aucun effet	
11	La recherche de sang dans les selles, les urines de 24 h ou certains dosages hormonaux nécessitent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un jeûne de 3 jours B. Des consignes de recueiI précises remises au patient ✓ bonne réponse C. Un prélèvement au hasard D. Aucune explication	
12	Le recueil des urines de 24 heures commence :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Uniquement la nuit B. En gardant les urines du matin et en jetant les autres C. Sur une seule miction D. Après avoir jeté les premières urines du matin, puis tout recueiIir jusqu'au lendemain même heure ✓ bonne réponse	
13	Un prélèvement destiné à un dosage d'ammoniémie doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Congelé à -20 °C sans délai B. Agité fortement C. Transporté rapidement dans la glace ✓ bonne réponse D. Laissé à température ambiante plusieurs heures	
14	La feuille de demande d'examens doit comporter :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Uniquement le prix B. Rien C. Uniquement le nom du préleveur D. Identité du patient, prescripteur, examens demandés, date et heure de prélèvement ✓ bonne réponse	
15	Un échantillon lipémique (sérum laiteux) peut :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Être sans conséquence B. Améliorer la précision C. Indiquer une hémolyse D. Interférer avec certaines analyses ✓ bonne réponse	

16 Le délai entre prélèvement et centrifugation est important car : A. Certains paramètres évoluent dans le tube (glucose, potassium...) ✓ bonne réponse B. Il n'a aucune importance C. Le tube change de couleur D. Le patient doit attendre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le transport des prélèvements biologiques se fait : A. Dans un triple emballage adapté pour la sécurité ✓ bonne réponse B. Avec les repas C. Dans un sac poubelle D. Dans la poche du coursier sans protection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un dosage de médicament (taux résiduel), le prélèvement se fait : A. À n'importe quel moment B. Le lendemain de l'arrêt C. Juste avant la prise suivante du médicament ✓ bonne réponse D. Juste après la prise	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un échantillon non conforme (tube inadapté) est : A. Refusé ou traité selon la procédure, avec information du service ✓ bonne réponse B. Toujours analysé C. Remplacé par un autre tube du même patient D. Jeté sans prévenir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le prélèvement pour une sérologie nécessite en général : A. Un tube sec (sérum) ✓ bonne réponse B. Un tube citraté C. Un flacon d'hémoculture D. Un pot à urine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Hématologie 20 questions

1 Le taux normal d'hémoglobine chez une femme adulte est d'environ : A. 18 à 22 g/dL B. 5 à 8 g/dL C. 12 à 16 g/dL ✓ bonne réponse D. 1 à 3 g/dL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Le nombre normal de plaquettes chez l'adulte est d'environ : A. 1 à 2 millions /mm³ B. 10 000 à 50 000 /mm³ C. 150 000 à 400 000 /mm³ ✓ bonne réponse D. 4 000 à 10 000 /mm³	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Le nombre normal de leucocytes chez l'adulte est d'environ : A. 500 à 1 000 /mm³ B. 150 000 à 400 000 /mm³ C. 4 000 à 10 000 /mm³ ✓ bonne réponse D. 50 000 /mm³	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un VGM (volume globulaire moyen) bas évoque principalement : A. Une leucémie certaine B. Une polyglobulie C. Une carence en vitamine B12 D. Une anémie microcytaire, souvent par carence en fer ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le receveur universel en transfusion de globules rouges est de groupe : A. A Rh+ B. O Rh- C. AB Rh+ ✓ bonne réponse D. B Rh-	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le frottis sanguin permet de : A. Observer au microscope la forme et la répartition des cellules sanguines ✓ bonne réponse B. Mesurer la créatinine C. Faire une culture bactérienne D. Doser le glucose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La coloration la plus utilisée pour le frottis sanguin est : A. Encre de Chine B. Gram C. May-Grünwald-Giemsa ✓ bonne réponse D. Ziehl-Neelsen	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Une polynucléose neutrophile évoque souvent : A. Une carence en fer B. Une allergie uniquement C. Une déshydratation D. Une infection bactérienne ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une hyperéosinophilie peut évoquer : A. Une hémorragie B. Une allergie ou une parasitose ✓ bonne réponse C. Un diabète D. Une infection virale banale uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le taux de prothrombine (TP) explore : A. La glycémie B. Les plaquettes uniquement C. La fonction rénale D. La voie extrinsèque de la coagulation (surveillance des AVK via l'INR) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Le TCA est utilisé notamment pour surveiller : A. Un traitement antibiotique B. Un traitement par héparine non fractionnée ✓ bonne réponse C. La grossesse D. Un traitement par insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un INR cible entre 2 et 3 concerne en général : A. Les patients sous insuline B. Les patients sous antivitamine K pour la plupart des indications ✓ bonne réponse C. Les nouveau-nés D. Les patients sans traitement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le groupage sanguin ABO repose sur : A. La culture du sang B. La recherche des antigènes globulaires et des anticorps du plasma ✓ bonne réponse C. La mesure de l'hémoglobine D. La numération des plaquettes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Le donneur universel de globules rouges est : A. B Rhésus négatif B. O Rhésus négatif ✓ bonne réponse C. AB Rhésus positif D. A Rhésus positif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	La recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) est réalisée : A. Uniquement après une fracture B. Pour doser le cholestérol C. Pour mesurer la glycémie D. Avant une transfusion et pendant la grossesse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Les réticulocytes reflètent : A. Le taux de sucre B. La coagulation C. La fonction du foie D. La production de globules rouges par la moelle osseuse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	La vitesse de sédimentation (VS) est un marqueur : A. Spécifique d'un cancer B. D'inflammation, peu spécifique ✓ bonne réponse C. D'allergie D. De grossesse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une thrombopénie sévère expose surtout à : A. Une thrombose B. Une hypertension C. Un risque hémorragique ✓ bonne réponse D. Une hyperglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 L'hématocrite correspond à :

- A. Le nombre de plaquettes
- B. Le pourcentage du volume sanguin occupé par les globules rouges ✓ **bonne réponse**
- C. Le taux de fer
- D. La quantité de plasma uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Les automates d'hématologie doivent être soumis à :

- A. Un contrôle tous les dix ans
- B. Des contrôles de qualité internes réguliers ✓ **bonne réponse**
- C. Un nettoyage annuel seulement
- D. Aucun contrôle

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Analyses biochimiques 20 questions

1 La glycémie à jeun normale est d'environ :

- A. 0,20 à 0,40 g/L
- B. 0,70 à 1,10 g/L ✓ **bonne réponse**
- C. 1,50 à 2 g/L
- D. 2 à 3 g/L

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La kaliémie (potassium) normale est d'environ :

- A. 135 à 145 mmol/L
- B. 0,5 à 1,0 mmol/L
- C. 3,5 à 5,0 mmol/L ✓ **bonne réponse**
- D. 8 à 10 mmol/L

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 La natrémie (sodium) normale est d'environ :

- A. 3,5 à 5 mmol/L
- B. 160 à 180 mmol/L
- C. 95 à 105 mmol/L
- D. 135 à 145 mmol/L ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La créatininémie est surtout utilisée pour évaluer :

- A. La fonction rénale ✓ **bonne réponse**
- B. La fonction hépatique
- C. La thyroïde
- D. La coagulation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 L'HbA1c (hémoglobine glyquée) reflète l'équilibre glycémique des :

- A. 2 à 3 derniers mois ✓ **bonne réponse**
- B. 7 derniers jours
- C. 24 dernières heures
- D. 2 dernières années

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	La CRP (protéine C réactive) est un marqueur :	A. De l'anémie B. D'inflammation, qui augmente rapidement en cas d'infection bactérienne ✓ bonne réponse C. Du diabète D. De la fonction thyroïdienne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les transaminases (ASAT, ALAT) explorent principalement :	A. Le foie ✓ bonne réponse B. Le cœur uniquement C. Les os D. Les reins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La troponine est dosée pour rechercher :	A. Une atteinte du muscle cardiaque (infarctus) ✓ bonne réponse B. Une grossesse C. Une carence en fer D. Une infection urinaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'urée et la créatinine augmentées évoquent :	A. Une anémie B. Une allergie C. Une hépatite D. Une insuffisance rénale ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La bilirubine augmentée provoque :	A. Un ictère (jaunisse) ✓ bonne réponse B. Une hypoglycémie C. Une toux D. Une hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La TSH est dosée pour explorer :	A. Le pancréas B. La moelle osseuse C. La thyroïde ✓ bonne réponse D. Le rein	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La ferritine basse évoque :	A. Une infection B. Une hyperglycémie C. Un excès de vitamine C D. Une carence en fer ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le dosage des bêta-hCG sert notamment à :	A. Explorer le foie B. Surveiller l'insuline C. Mesurer le cholestérol D. Diagnostiquer et suivre une grossesse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 La calcémie normale chez l'adulte est d'environ : A. 5 à 10 mmol/L B. 135 à 145 mmol/L C. 0,2 à 0,5 mmol/L D. 2,2 à 2,6 mmol/L ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les lipases augmentées (plus de 3 fois la normale) avec douleur abdominale évoquent : A. Une pancréatite aiguë ✓ bonne réponse B. Une infection urinaire C. Une fracture D. Une appendicite certaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le principe de la spectrophotométrie repose sur : A. La centrifugation seule B. La coloration de Gram C. La culture des bactéries D. La mesure de l'absorption de la lumière par une solution ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un contrôle de qualité hors limites sur un automate impose : A. De rendre les résultats quand même B. De changer de patient C. D'ignorer le contrôle D. De ne pas rendre les résultats et de rechercher la cause avant de reprendre ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une hyperkaliémie importante est dangereuse car elle peut provoquer : A. Une fièvre B. Une chute de cheveux C. Une myopie D. Des troubles du rythme cardiaque ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un résultat critique (valeur d'alerte) doit être : A. Communiqué sans délai au médecin ou au service selon la procédure ✓ bonne réponse B. Gardé pour la fin de la journée C. Rendu le lendemain D. Envoyé par courrier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L (7 mmol/L) à deux reprises définit : A. Une valeur normale B. Une anémie C. Une hypoglycémie D. Un diabète ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 La coloration de Gram permet de distinguer : A. Les bactéries Gram positif (violette) et Gram négatif (roses) ✓ bonne réponse B. Les groupes sanguins C. Les cellules cancéreuses D. Les virus des bactéries	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Pour un ECBU, le recueil des urines se fait : A. Au premier jet, sans toilette B. Dans n'importe quel récipient propre C. Sur 24 heures dans un bocal non stérile D. Après toilette, en milieu de jet, dans un flacon stérile ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Un échantillon pour culture bactériologique qui ne peut être analysé immédiatement est : A. Congelé systématiquement à -80 °C B. Laissé à 37 °C au soleil C. Conservé selon le protocole (souvent au réfrigérateur à +4 °C pour les urines) ✓ bonne réponse D. Jeté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Escherichia coli est : A. Un champignon B. Un virus C. Un bacille Gram négatif ✓ bonne réponse D. Un coque Gram positif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Un ECBU est considéré comme évocateur d'infection urinaire en présence de : A. Urines limpides sans cellules B. Uniquement de cristaux C. Leucocyturie et bactériurie significatives, à interpréter selon le contexte ✓ bonne réponse D. Uniquement de mucus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 L'antibiogramme permet de : A. Déterminer la sensibilité d'une bactérie aux antibiotiques ✓ bonne réponse B. Compter les globules rouges C. Doser le sucre D. Identifier un virus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Staphylococcus aureus est : A. Un bacille Gram négatif B. Un parasite C. Un coque Gram positif en amas ✓ bonne réponse D. Un champignon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 La coloration de Ziehl-Neelsen est utilisée pour rechercher : A. Les levures B. Les virus C. Les streptocoques D. Les mycobactéries (bacille de la tuberculose) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Candida albicans est : A. Un virus B. Une levure (champignon) ✓ bonne réponse C. Une bactérie D. Un parasite intestinal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les prélèvements pour recherche de germes anaérobies doivent être : A. Protégés de l'air et acheminés rapidement ✓ bonne réponse B. Congelés C. Séchés D. Laissés à l'air libre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le poste de sécurité microbiologique (PSM) protège : A. Contre l'incendie B. Contre les rayons X C. Uniquement contre le bruit D. Le manipulateur, l'échantillon et l'environnement selon sa classe ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Une bactérie multirésistante (BMR) est : A. Résistante à plusieurs familles d'antibiotiques ✓ bonne réponse B. Un champignon C. Sensible à tous les antibiotiques D. Un virus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le milieu gélose au sang permet notamment d'observer : A. Les virus B. L'hémolyse produite par certaines bactéries (streptocoques) ✓ bonne réponse C. La glycémie D. Le groupe sanguin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le résultat d'une hémoculture positive doit être : A. Ignoré B. Transmis rapidement au clinicien (examen direct, puis identification) ✓ bonne réponse C. Rendu une semaine plus tard D. Envoyé uniquement par courrier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	La PCR est une technique :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. De centrifugation B. De culture sur gélose C. De coloration D. D'amplification génétique permettant de détecter un micro-organisme ✓ bonne réponse	
16	Un prélèvement de gorge pour recherche de streptocoque se fait avec :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une seringue intraveineuse B. Un tube EDTA C. Un écouvillon frotté sur les amygdales ✓ bonne réponse D. Un pot à selles	
17	La recherche de parasites dans les selles (examen parasitologique) nécessite souvent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un jeûne de 48 heures B. Un seul prélèvement congelé C. Plusieurs prélèvements à quelques jours d'intervalle ✓ bonne réponse D. Du sang	
18	Les déchets contaminés du laboratoire de microbiologie sont :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Éliminés selon la filière des déchets infectieux, après inactivation si prévu ✓ bonne réponse B. Versés dans l'évier C. Jetés dans les ordures ménagères D. Lavés et réutilisés	
19	Les cultures bactériennes sont en général incubées à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 4 °C B. Environ 35 à 37 °C ✓ bonne réponse C. -20 °C D. 60 °C	
20	La mise en évidence d'Escherichia coli dans une eau de boisson indique :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un excès de calcium B. Une eau trop froide C. Une contamination fécale ✓ bonne réponse D. Une eau parfaitement potable	

Pharmacie

Postes concernés : Préparateur(trice) en pharmacie

Gestion des stocks pharmaceutiques 20 questions

1	La règle de rotation des stocks recommandée pour les médicaments est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le plus cher en premier B. Dernier entré, premier sorti C. Premier périmé, premier sorti (FEFO) ✓ bonne réponse D. Au hasard	

2 Un médicament périmé trouvé en rayon doit être : A. Retiré, isolé et éliminé selon la filière dédiée ✓ bonne réponse B. Remis en rayon C. Jeté à la poubelle ménagère D. Délivré en priorité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le stock de sécurité correspond à : A. La quantité minimale gardée pour faire face aux retards ou à une hausse de consommation ✓ bonne réponse B. Le stock du concurrent C. Le stock de médicaments périmés D. La quantité commandée chaque jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 L'inventaire permet de : A. Fixer les prix de vente B. Comparer le stock réel au stock théorique ✓ bonne réponse C. Remplacer les ordonnances D. Calculer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le point de commande correspond : A. Au prix d'achat B. Au stock maximal C. Au niveau de stock à partir duquel il faut passer commande ✓ bonne réponse D. Au jour de l'inventaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Une rupture de stock d'un médicament essentiel doit être : A. Cachée au prescripteur B. Compensée par un médicament au hasard C. Ignorée D. Signalée rapidement et une solution de remplacement recherchée avec le pharmacien ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 À la réception d'une commande, on vérifie : A. Rien B. La conformité (produits, quantités, lots, dates de péremption) et l'état des colis ✓ bonne réponse C. La couleur des boîtes D. Uniquement le nombre de cartons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les médicaments de la chaîne du froid reçus en livraison doivent être : A. Mis au congélateur B. Laissés dans le carton jusqu'au lendemain C. Rangés sur l'étagère ordinaire D. Rangés immédiatement au réfrigérateur ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les stupéfiants sont stockés : A. Dans le bureau de l'accueil B. Avec les autres médicaments C. En libre accès D. Dans une armoire sécurisée fermée à clé, avec un registre ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Le registre des stupéfiants permet : A. De tracer chaque entrée et sortie ✓ bonne réponse B. Rien de particulier C. De noter les congés D. De calculer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un écart entre stock réel et stock informatique doit être : A. Modifié sans explication B. Caché C. Analysé et corrigé selon la procédure ✓ bonne réponse D. Ignoré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La rotation des stocks permet notamment : A. De limiter les périmés et l'immobilisation financière ✓ bonne réponse B. D'éviter les inventaires C. De garder des produits plus longtemps D. D'augmenter les pertes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le rangement d'une pharmacie se fait souvent : A. Au hasard B. Par prix décroissant C. Par couleur de boîte D. Par ordre logique (alphabétique, forme galénique ou classe), avec les dates courtes devant ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un médicament rappelé par le fabricant (rappel de lot) doit être : A. Délivré jusqu'à épuisement B. Donné au personnel C. Retiré immédiatement des stocks et isolé ✓ bonne réponse D. Remis en rayon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le numéro de lot d'un médicament sert à : A. Rien B. Indiquer la posologie C. Indiquer le prix D. Assurer la traçabilité en cas de problème de qualité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La consommation moyenne mensuelle sert à : A. Fixer les horaires B. Choisir les fournisseurs au hasard C. Calculer les besoins et les quantités à commander ✓ bonne réponse D. Déterminer les congés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les produits inflammables (alcool, éther) sont stockés : A. Dans le réfrigérateur alimentaire B. Au soleil C. Dans un local ou une armoire adaptés, loin des sources de chaleur ✓ bonne réponse D. Près d'un radiateur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Les médicaments non utilisés rapportés par les patients sont : A. Remis en rayon B. Revendus C. Éliminés par la filière dédiée, jamais remis en stock ✓ bonne réponse D. Jetés dans l'évier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un inventaire tournant consiste à : A. Ne jamais compter B. Tout compter une fois tous les dix ans C. Compter régulièrement une partie du stock tout au long de l'année ✓ bonne réponse D. Compter uniquement les produits chers	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La dotation d'un service hospitalier est : A. La liste des patients B. Le nombre de lits C. La liste et les quantités de médicaments disponibles en permanence dans le service ✓ bonne réponse D. Le budget du personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Délivrance et conseil 20 questions

1 Avant de délivrer un médicament, il faut vérifier sur l'ordonnance : A. Uniquement le prix B. Uniquement la signature C. Uniquement le nom du médicament D. L'identité du patient, le prescripteur, la date, la posologie et la durée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un médicament « générique » est : A. Un médicament moins efficace B. Un médicament réservé à l'hôpital C. Un médicament sans principe actif D. Une copie du médicament de référence, avec le même principe actif et la même efficacité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 La posologie « 1 cp 3 fois par jour pendant 7 jours » correspond à : A. 3 comprimés B. 7 comprimés C. 10 comprimés D. 21 comprimés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un patient sous anticoagulant (AVK) demande de l'aspirine pour un mal de tête. Que conseiller ? A. Délivrer de l'aspirine à forte dose B. Doubler l'anticoagulant C. Aucune précaution D. Éviter l'aspirine (risque hémorragique) et orienter vers le pharmacien / médecin, le paracétamol étant généralement préféré ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5 Une ordonnance dont la date de prescription est trop ancienne : A. Doit être déchirée B. N'a pas de durée de validité C. Doit être vérifiée selon la réglementation avant toute délivrance ✓ bonne réponse D. Peut toujours être délivrée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un patient demande un antibiotique sans ordonnance. Vous : A. Lui donnez les restes d'un autre patient B. Refusez et l'orientez vers un médecin : les antibiotiques nécessitent une prescription ✓ bonne réponse C. Délivrez la boîte la plus grande D. Délivrez un antibiotique au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 « 1 cp matin et soir » signifie : A. Deux comprimés le matin B. Un comprimé tous les deux jours C. Un comprimé deux fois par jour ✓ bonne réponse D. Un comprimé par semaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le conseil associé à un antibiotique comprend : A. Arrêter dès qu'on se sent mieux B. Doubler la dose en cas d'oubli C. Respecter la durée prescrite même si les symptômes disparaissent ✓ bonne réponse D. Le partager avec la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Une interaction médicamenteuse est : A. Un changement d'emballage B. Une modification de l'effet d'un médicament par un autre ✓ bonne réponse C. Une allergie alimentaire D. Une erreur de prix	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Chez la femme enceinte, avant de délivrer un médicament sans ordonnance : A. On propose de l'aspirine à forte dose B. On vérifie qu'il est compatible avec la grossesse et on oriente si besoin ✓ bonne réponse C. On ne pose aucune question D. On délivre comme pour tout le monde	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) sont à éviter notamment : A. En cas de rhume simple uniquement B. En fin de grossesse et en cas d'ulcère ou d'insuffisance rénale ✓ bonne réponse C. Chez tous les adultes en bonne santé D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12	Le paracétamol en automédication chez l'adulte ne doit pas dépasser en général :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 3 à 4 g par jour selon le poids et le terrain ✓ bonne réponse B. 10 g par jour C. 500 mg par semaine D. Il n'y a pas de limite	
13	Une forme « gastro-résistante » :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Se prend uniquement en suppositoire B. Doit être dissoute dans l'eau chaude C. Peut être coupée sans conséquence D. Ne doit pas être croquée ni écrasée ✓ bonne réponse	
14	Un patient âgé polymédiqué présente un risque accru :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. De meilleure tolérance B. D'interactions et d'effets indésirables ✓ bonne réponse C. De guérison plus rapide D. D'aucun effet	
15	Les collyres ouverts se conservent en général :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Pendant une durée limitée après ouverture (souvent 15 à 30 jours, selon la notice) ✓ bonne réponse B. Uniquement au congélateur C. Un an après ouverture dans tous les cas D. Indéfiniment	
16	Lors de la délivrance d'un inhalateur pour l'asthme, on explique :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Qu'il ne faut jamais le secouer B. Qu'il s'utilise une fois par mois C. La technique d'inhalation et le rinçage de la bouche pour les corticoïdes ✓ bonne réponse D. Qu'il faut l'avaler	
17	Un générique peut remplacer le médicament de référence :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Uniquement pour les enfants B. Selon la réglementation, sauf mention contraire du prescripteur ✓ bonne réponse C. Uniquement si le patient paie plus D. Jamais	
18	Un sirop pour enfant se dose avec :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une cuillère à soupe de cuisine au hasard B. Le dispositif doseur fourni avec le médicament ✓ bonne réponse C. Le bouchon d'une autre bouteille D. Un verre	
19	Un patient décrit une éruption cutanée après un nouveau médicament. Vous :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Lui conseillez de doubler la dose B. Ignorez sa plainte C. L'orientez vers son médecin et signalez l'effet indésirable ✓ bonne réponse D. Lui vendez un autre médicament au hasard	

20 Le secret professionnel au comptoir impose :

- A. De commenter l'ordonnance devant les autres clients
- B. De parler discrètement et de respecter la confidentialité des traitements ✓
bonne réponse
- C. D'annoncer les traitements à voix haute
- D. De photocopier l'ordonnance pour les voisins

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Conservation des médicaments 20 questions

1 La plupart des vaccins et insulines non entamées se conservent :

- A. À plus de 30 °C
- B. Au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C ✓
bonne réponse
- C. Au congélateur
- D. À température ambiante au soleil

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La « chaîne du froid » signifie :

- A. Le stockage des médicaments au congélateur
- B. Le refroidissement du patient
- C. Le maintien de la température de conservation sans interruption, de la fabrication à l'administration ✓
bonne réponse
- D. Une méthode de livraison rapide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un flacon d'insuline en cours d'utilisation peut généralement être conservé :

- A. Au congélateur
- B. À température ambiante (moins de 25-30 °C) pendant environ 4 semaines, selon la notice ✓
bonne réponse
- C. Au soleil
- D. Indéfiniment

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La température du réfrigérateur à médicaments doit être :

- A. Vérifiée une fois par an
- B. Jamais vérifiée
- C. Réglée sur la position la plus froide (négative)
- D. Contrôlée et tracée régulièrement ✓
bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 La mention « à conserver à une température ne dépassant pas 25 °C » signifie :

- A. Un stockage au réfrigérateur obligatoire
- B. Un stockage au congélateur
- C. Aucune précaution
- D. Un stockage à température ambiante contrôlée, à l'abri de la chaleur ✓
bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un vaccin congelé par erreur :

- A. Peut être donné à moitié dose
- B. Peut être utilisé après décongélation
- C. Ne doit pas être utilisé et doit être signalé ✓
bonne réponse
- D. Est plus efficace

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Un réfrigérateur à médicaments ne doit pas contenir : A. Des vaccins B. De la nourriture ou des boissons ✓ bonne réponse C. De l'insuline non entamée D. Un thermomètre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	En cas de panne du réfrigérateur à médicaments, il faut : A. Mettre les produits au soleil B. Jeter tout sans évaluer C. Ne rien dire D. Transférer les produits dans un autre réfrigérateur, noter la durée et la température, et demander l'avis du pharmacien ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Les médicaments photosensibles doivent être : A. Mis sous une lampe B. Sortis de leur boîte C. Exposés au soleil D. Conservés à l'abri de la lumière, dans leur emballage ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une solution buvable ouverte se conserve : A. Selon la durée indiquée après ouverture sur la notice ✓ bonne réponse B. Toujours un an C. Indéfiniment D. Toujours 24 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Un médicament qui a changé d'aspect (couleur, odeur, dépôt) : A. Doit être dilué B. Est plus actif C. Ne doit pas être utilisé ✓ bonne réponse D. Peut être utilisé normalement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Le relevé de température d'un réfrigérateur doit être : A. Fait une fois par an B. Fait régulièrement (au moins quotidiennement) et enregistré ✓ bonne réponse C. Inutile D. Fait uniquement en été	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	L'humidité est néfaste pour : A. Les comprimés et gélules (dégradation) ✓ bonne réponse B. Aucun médicament C. Uniquement les seringues D. Les étiquettes uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Le transport de médicaments thermosensibles nécessite : A. Un sac plastique ordinaire au soleil B. Le coffre d'une voiture chaude C. Aucune précaution D. Une glacière adaptée avec contrôle de la température ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 La date « EXP 06/2027 » signifie que le médicament : A. Est périmé depuis 2026 B. Peut être utilisé jusqu'à la fin de juin 2027 s'il est bien conservé ✓ bonne réponse C. N'a pas de date limite D. Est fabriqué en 2027	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les multidoses injectables entamées (flacons) doivent être : A. Gardées ouvertes à l'air B. Utilisées sans limite de temps C. Datées à l'ouverture et utilisées selon le délai prévu, avec asepsie ✓ bonne réponse D. Partagées sans précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un stylo à insuline en cours d'utilisation se conserve en général : A. À température ambiante (sans dépasser environ 25–30 °C selon la notice), à l'abri de la lumière ✓ bonne réponse B. Au soleil sur le tableau de bord C. Dans l'eau chaude D. Au congélateur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Les suppositoires se conservent : A. Près d'un radiateur B. Au frais, à l'abri de la chaleur pour éviter qu'ils ne fondent ✓ bonne réponse C. Au congélateur obligatoirement D. Au soleil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La température d'une pièce de stockage des médicaments doit être : A. Ignorée B. Surveillée, surtout en été ✓ bonne réponse C. Toujours inférieure à 0 °C D. La plus chaude possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les médicaments périmés d'un service sont : A. Donnés aux patients B. Retournés à la pharmacie pour élimination selon la filière ✓ bonne réponse C. Jetés à la poubelle ordinaire D. Gardés pour l'année suivante	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Rééducation

Postes concernés : Kinésithérapeute

1	Après une prothèse totale de hanche par voie postérieure, quel mouvement est à éviter en début de rééducation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La contraction du quadriceps B. La marche avec aide technique C. La respiration profonde D. L'association flexion, adduction et rotation interne (risque de luxation) ✓ bonne réponse	
2	Le testing musculaire coté de 0 à 5 : la cote 3 correspond à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un mouvement complet contre la pesanteur, sans résistance ✓ bonne réponse B. Une force normale C. Aucune contraction D. Une contraction sans mouvement	
3	Pour un patient hémiplégique, la canne se tient :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Du côté atteint B. Elle est déconseillée C. Avec les deux mains D. Du côté sain ✓ bonne réponse	
4	La mobilisation précoce après une chirurgie vise notamment à prévenir :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La fièvre B. Les allergies C. L'hypoglycémie D. La phlébite, les escarres et l'enraidissement ✓ bonne réponse	
5	Une entorse récente de la cheville se prend en charge initialement par :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Chaleur intense B. Repos relatif, glace, compression, surélévation ✓ bonne réponse C. Course à pied D. Massage profond immédiat	
6	Après une ligamentoplastie du genou, la rééducation précoce vise d'abord à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Reprendre la course dès le 3e jour B. Immobiliser le genou pendant 3 mois C. Masser la cicatrice profondément le premier jour D. Contrôler la douleur et l'œdème, récupérer l'extension et le verrouillage du quadriceps ✓ bonne réponse	
7	Une contraction isométrique est :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une contraction sans mouvement de l'articulation ✓ bonne réponse B. Un étirement passif C. Un massage D. Une contraction avec un grand mouvement	

8 La mobilisation passive est réalisée : A. Par le thérapeute, sans contraction active du patient ✓ bonne réponse B. Uniquement en piscine C. Par le patient seul contre résistance D. Avec des poids lourds	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Un patient hémiparétique : pour l'aider à s'habiller, on commence par : A. Le côté atteint (et on déshabille d'abord le côté sain) ✓ bonne réponse B. Indifféremment C. Le côté sain D. Les chaussures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La rééducation de l'équilibre chez la personne âgée a pour objectif principal : A. D'améliorer la vue B. De faire maigrir C. De traiter le diabète D. De prévenir les chutes ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 L'utilisation de béquilles pour monter un escalier : on monte d'abord : A. Les béquilles seules B. La jambe opérée C. La jambe saine, puis les béquilles et la jambe opérée ✓ bonne réponse D. En sautant à pieds joints	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Une entorse grave du ligament croisé antérieur se teste notamment par : A. Le test d'Allen B. Le test de Lachman ✓ bonne réponse C. Le score d'Apgar D. Le score de Glasgow	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le renforcement musculaire progressif repose sur : A. Une augmentation graduelle de la charge et des répétitions ✓ bonne réponse B. Des charges maximales dès la première séance C. Le repos complet D. Des étirements uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une douleur qui augmente fortement et persiste après les séances doit faire : A. Arrêter de boire B. Augmenter l'intensité C. Ignorer la douleur D. Adapter le programme et en informer le médecin ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Après une fracture du poignet plâtrée, on surveille : A. La tension artérielle seule B. Rien C. Uniquement la couleur du plâtre D. La couleur, la chaleur, la sensibilité et la mobilité des doigts ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La cryothérapie (froid) est utilisée pour : A. Réchauffer les muscles avant l'effort B. Diminuer la douleur et l'œdème en phase aiguë ✓ bonne réponse C. Augmenter l'inflammation D. Traiter une plaie infectée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 L'ergothérapie vise surtout à : A. Favoriser l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne ✓ bonne réponse B. Traiter les caries C. Prescrire des médicaments D. Réaliser des radiographies	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La lombalgie commune aiguë : la recommandation actuelle est : A. Une chirurgie immédiate B. De maintenir les activités autant que possible, le repos strict prolongé étant déconseillé ✓ bonne réponse C. Le port permanent d'un corset D. Un repos strict au lit pendant 3 semaines	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le bilan articulaire d'un genou en extension complète correspond à : A. 180° B. 45° C. 0° ✓ bonne réponse D. 90°	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient sous anticoagulants en rééducation : on évite : A. Les exercices respiratoires B. Les techniques traumatisantes (massages profonds intenses) sans avis ✓ bonne réponse C. La marche D. Les explications	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Kinésithérapie respiratoire 20 questions

1 Le désencombrement bronchique vise à : A. Traiter une fracture B. Faciliter l'évacuation des sécrétions bronchiques ✓ bonne réponse C. Augmenter la tension artérielle D. Diminuer la fréquence cardiaque	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Chez le patient BPCO, la ventilation lèvres pincées permet de : A. Bloquer la respiration B. Augmenter la toux sèche C. Freiner l'expiration et limiter le piégeage de l'air ✓ bonne réponse D. Accélérer la respiration	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	La spirométrie incitative après chirurgie abdominale sert à : A. Traiter la douleur B. Prévenir les atelectasies en encourageant les inspirations profondes ✓ bonne réponse C. Faire maigrir le patient D. Mesurer la glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pendant une séance, une SpO2 qui chute à 86 % impose de : A. Retirer l'oxygène B. Interrompre l'effort et surveiller / alerter selon la prescription d'oxygène ✓ bonne réponse C. Ignorer la valeur D. Augmenter l'intensité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le drainage bronchique chez le nourrisson est indiqué : A. Uniquement la nuit B. Selon la prescription et les recommandations en vigueur, avec prudence ✓ bonne réponse C. Jamais sur prescription D. Systématiquement pour toute toux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'augmentation du flux expiratoire (AFE) vise à : A. Mobiliser les sécrétions vers les grosses bronches ✓ bonne réponse B. Bloquer la respiration C. Augmenter la tension D. Diminuer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La toux dirigée sert à : A. Provoquer des vomissements B. Mesurer la saturation C. Évacuer les sécrétions arrivées dans les voies proximales ✓ bonne réponse D. Calmer la douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Après une chirurgie thoracique ou abdominale, la kinésithérapie respiratoire prévient : A. Les atelectasies et les infections pulmonaires ✓ bonne réponse B. Le diabète C. Les allergies D. Les fractures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La réhabilitation respiratoire chez le patient BPCO comprend : A. Uniquement du repos B. Uniquement des antibiotiques C. Réentraînement à l'effort, éducation et techniques respiratoires ✓ bonne réponse D. Une chirurgie systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Avant une séance de désencombrement, il est préférable que le patient : A. Soit allongé à plat ventre sans surveillance B. Ait arrêté son oxygène C. Ait mangé un repas copieux D. Ne vienne pas de manger (risque de vomissement) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le débit expiratoire de pointe (peak-flow) est utile pour suivre : A. La glycémie B. La vision C. La fonction rénale D. L'asthme ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La ventilation dirigée abdomino-diaphragmatique vise à : A. Provoquer une apnée B. Bloquer le diaphragme C. Augmenter le travail respiratoire D. Améliorer l'efficacité de la respiration et diminuer l'essoufflement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient sous oxygène pendant la séance : on surveille : A. Uniquement la tension B. Uniquement la température C. La saturation, la fréquence respiratoire et la tolérance ✓ bonne réponse D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les signes de détresse respiratoire incluent : A. Une bonne coloration B. Tirage, battement des ailes du nez, cyanose, polypnée ✓ bonne réponse C. Une respiration calme et lente D. Un sommeil paisible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les aérosols (nébulisations) prescrits avant la séance servent souvent à : A. Endormir le patient B. Fluidifier ou dilater les bronches pour faciliter le désencombrement ✓ bonne réponse C. Remplacer l'oxygène D. Mesurer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le spiromètre incitatif doit être utilisé : A. En soufflant le plus fort possible dedans B. Une fois par semaine C. Régulièrement, avec des inspirations lentes et profondes ✓ bonne réponse D. Uniquement en position couchée à plat	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le positionnement du patient (drainage postural) utilise : A. Le froid B. La lumière C. La gravité pour aider à drainer certains segments pulmonaires ✓ bonne réponse D. Le bruit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Chez un patient atteint de mucoviscidose, la kinésithérapie respiratoire est :

- A. Contre-indiquée
- B. Inutile
- C. Quotidienne et essentielle au traitement ✓ **bonne réponse**
- D. Réservée aux adultes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 L'hygiène du matériel de kinésithérapie respiratoire (embouts, spiromètres) impose :

- A. Aucune précaution
- B. Un rinçage à l'eau seule entre patients
- C. Le partage sans nettoyage
- D. Un usage individuel ou une désinfection adaptée entre deux patients ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La saturation qui chute pendant l'effort chez un patient BPCO :

- A. Justifie d'augmenter l'effort
- B. Est sans importance
- C. Doit être ignorée
- D. Impose d'adapter l'intensité et l'oxygène selon la prescription ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bilan et évaluation 20 questions

1 Le bilan initial en rééducation sert à :

- A. Établir un diagnostic fonctionnel et fixer des objectifs mesurables ✓ **bonne réponse**
- B. Choisir les horaires
- C. Facturer la séance
- D. Remplacer la prescription médicale

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La goniométrie mesure :

- A. La force musculaire
- B. La fréquence respiratoire
- C. Les amplitudes articulaires ✓ **bonne réponse**
- D. La sensibilité

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 L'échelle visuelle analogique (EVA) évalue :

- A. Le niveau d'études
- B. La force de préhension
- C. L'équilibre
- D. L'intensité de la douleur ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Un objectif de rééducation bien formulé est :

- A. Le même pour tous les patients
- B. Précis, mesurable et daté ✓ **bonne réponse**
- C. Vague pour pouvoir s'adapter
- D. Fixé uniquement par la famille

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5	L'échelle de Berg ou le test « Timed Up and Go » évaluent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La douleur B. La fonction rénale C. L'équilibre et le risque de chute ✓ bonne réponse D. La mémoire uniquement	
6	La mesure de Barthel évalue :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La vision B. La saturation C. La force de préhension seule D. L'autonomie dans les activités de la vie quotidienne ✓ bonne réponse	
7	Le périmètre de marche correspond à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le tour de taille B. La distance que le patient peut parcourir avant de devoir s'arrêter ✓ bonne réponse C. La taille du couloir D. La longueur des jambes	
8	Un bilan de rééducation doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Fait une seule fois B. Uniquement oral C. Daté, chiffré et répété pour suivre l'évolution ✓ bonne réponse D. Fait par la famille	
9	L'œdème d'un membre peut se mesurer :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Par des mesures de périmètre (centimétriques) répétées aux mêmes repères ✓ bonne réponse B. À l'œil seulement C. Avec un thermomètre D. Avec une balance	
10	Le test des 6 minutes de marche évalue :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. L'équilibre assis B. La vision C. La mémoire D. La capacité fonctionnelle à l'effort ✓ bonne réponse	
11	La douleur chez une personne âgée non communicante peut être évaluée par :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une échelle visuelle analogique uniquement B. Une échelle d'hétéro-évaluation comportementale (type Algoplus, Doloplus) ✓ bonne réponse C. Le poids D. Aucune échelle	
12	Le dynamomètre de préhension mesure :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. La fréquence respiratoire B. La tension C. La force de la main ✓ bonne réponse D. La température	

13 Les objectifs de rééducation sont fixés : A. Par l'administration B. Au hasard C. Sans le patient D. Avec le patient, en tenant compte de son projet de vie ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le bilan initial doit rechercher aussi : A. Les contre-indications et les précautions (fractures, anticoagulants, cardiopathie...) ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du médecin C. Rien d'autre D. Les préférences musicales uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une évaluation de la spasticité peut utiliser : A. Le score de Glasgow B. L'IMC C. Le score d'Apgar D. L'échelle d'Ashworth modifiée ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le bilan de sortie de rééducation sert à : A. Remplacer le bilan initial B. Facturer uniquement C. Comparer les résultats aux objectifs et transmettre les informations utiles ✓ bonne réponse D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une mesure fiable nécessite : A. L'avis du patient seul B. Des positions différentes C. Les mêmes conditions et la même méthode à chaque évaluation ✓ bonne réponse D. Un appareil différent à chaque fois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le testing musculaire coté 0 correspond à : A. Un mouvement complet B. Aucune contraction perceptible ✓ bonne réponse C. Une force normale D. Un mouvement contre résistance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le testing musculaire coté 5 correspond à : A. Une force normale ✓ bonne réponse B. Une contraction sans mouvement C. Un mouvement sans pesanteur D. Aucune contraction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le compte rendu de bilan est transmis : A. Au médecin prescripteur et dans le dossier du patient ✓ bonne réponse B. Uniquement à la famille C. Sur les réseaux sociaux D. À personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Diététique et nutrition

Postes concernés : Diététicien(ne) / Nutritionniste

Nutrition clinique 20 questions

1 L'indice de masse corporelle (IMC) se calcule ainsi :

- A. Poids moins la taille en cm
- B. Poids multiplié par la taille
- C. Poids (kg) divisé par la taille (m) au carré ✓ bonne réponse
- D. Taille divisée par le poids

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Chez l'adulte, un IMC entre 18,5 et 25 correspond à :

- A. Un surpoids
- B. Une obésité
- C. Une dénutrition sévère
- D. Une corpulence normale ✓ bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ?

- A. Environ 9 kcal ✓ bonne réponse
- B. Environ 4 kcal
- C. Environ 1 kcal
- D. Environ 7 kcal

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Combien de kilocalories apporte 1 g de protéines ou de glucides ?

- A. Environ 0,5 kcal
- B. Environ 4 kcal ✓ bonne réponse
- C. Environ 12 kcal
- D. Environ 9 kcal

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une perte de poids involontaire de plus de 5 % en un mois doit faire évoquer :

- A. Une dénutrition ✓ bonne réponse
- B. Un régime réussi
- C. Une situation normale
- D. Une déshydratation bénigne uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un aliment riche en protéines de bonne qualité :

- A. Les boissons sucrées
- B. Les œufs, le poisson, la viande, les produits laitiers ✓ bonne réponse
- C. L'huile
- D. Le sucre blanc

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 Les fibres alimentaires se trouvent surtout dans :

- A. La viande
- B. Les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes ✓ bonne réponse
- C. Le sucre
- D. L'huile

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

8	L'albumine basse peut être un marqueur :	A. De déshydratation uniquement B. De diabète C. De dénutrition (à interpréter selon l'inflammation) ✓ bonne réponse D. D'obésité certaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Les besoins hydriques d'un adulte sont en moyenne d'environ :	A. 0,2 litre par jour B. 1,5 à 2 litres de boisson par jour, à adapter ✓ bonne réponse C. Aucun besoin si on mange D. 6 litres par jour pour tous	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La nutrition entérale est :	A. Un régime sans sel B. Une alimentation par voie veineuse C. Une alimentation par sonde dans le tube digestif ✓ bonne réponse D. Une alimentation par la bouche uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La nutrition parentérale est :	A. Une boisson enrichie B. Une alimentation par sonde gastrique C. Un régime riche en fibres D. Une alimentation administrée par voie veineuse ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Le syndrome de renutrition inappropriée survient surtout :	A. Après un repas normal B. Lors d'une réalimentation trop rapide chez un patient très dénutri ✓ bonne réponse C. Chez un patient en surpoids D. Chez le sportif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un régime pauvre en sel est souvent prescrit en cas :	A. De rhume B. De fracture C. D'hypertension ou d'insuffisance cardiaque ✓ bonne réponse D. D'anémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Chez l'insuffisant rénal chronique, on surveille souvent les apports en :	A. Potassium, phosphore et protéines selon le stade ✓ bonne réponse B. Rien C. Eau minérale uniquement D. Vitamine C uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Les compléments nutritionnels oraux sont utilisés :	A. Pour remplacer tous les repas d'une personne en bonne santé B. Pour maigrir C. Chez les patients dénutris ou à risque, en complément des repas ✓ bonne réponse D. Uniquement chez l'enfant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Un patient âgé dénutri doit être pesé : A. Régulièrement (au moins à l'entrée puis chaque semaine selon le protocole) ✓ bonne réponse B. Jamais C. Une fois par an D. Uniquement à la sortie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La maladie cœliaque nécessite un régime : A. Sans eau B. Sans protéines C. Sans sucre D. Sans gluten ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'évaluation nutritionnelle comprend : A. Uniquement la taille B. Uniquement la tension C. Uniquement la couleur de peau D. Poids, perte de poids, IMC, apports alimentaires et parfois des dosages biologiques ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les besoins énergétiques sont augmentés en cas : A. De repos complet B. De jeûne volontaire C. D'infection, de brûlure étendue ou de chirurgie lourde ✓ bonne réponse D. De sommeil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un régime adapté aux troubles de la déglutition utilise : A. Des textures modifiées (mixée, hachée) et des boissons épaissies selon l'évaluation ✓ bonne réponse B. Aucune adaptation C. Des aliments durs et secs D. De l'eau plate rapidement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Prise en charge du diabète 20 questions

1 Quels sont les signes typiques d'une hypoglycémie ? A. Soif intense et urines abondantes B. Sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion ✓ bonne réponse C. Fièvre et toux D. Démangeaisons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Face à une hypoglycémie chez un patient conscient, on donne : A. De l'insuline B. Rien, cela passera C. Un repas riche en graisses D. Environ 15 g de sucre rapide (ex. 3 morceaux de sucre), puis contrôle ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 Les aliments à index glycémique bas : A. Font monter la glycémie très rapidement B. Sont interdits aux diabétiques C. Ne contiennent aucun glucide D. Font monter la glycémie plus lentement ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Chez le diabétique, l'activité physique régulière : A. Fait toujours monter la glycémie B. Améliore l'équilibre glycémique ✓ bonne réponse C. N'a aucun effet D. Est contre-indiquée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le diabète de type 1 est principalement dû à : A. Une allergie B. Un excès de sucre uniquement C. Une absence de production d'insuline par le pancréas ✓ bonne réponse D. Une infection urinaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le diabète de type 2 est souvent associé à : A. Une grippe B. Une carence en vitamine C C. Une fracture D. Le surpoids, la sédentarité et l'hérédité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Les signes d'hyperglycémie importante : A. Soif intense, urines abondantes, fatigue, amaigrissement ✓ bonne réponse B. Sueurs froides et tremblements C. Fièvre isolée D. Toux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 L'objectif d'HbA1c chez beaucoup de diabétiques de type 2 est souvent : A. 15 % B. 2 % C. Il n'y a pas d'objectif D. Autour de 7 %, à individualiser ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 L'éducation thérapeutique du patient diabétique porte notamment sur : A. Uniquement le prix des médicaments B. L'autosurveillance, l'alimentation, l'activité physique et les signes d'alerte ✓ bonne réponse C. Rien D. La couleur des stylos	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les sites d'injection d'insuline doivent être : A. Toujours au même endroit B. Dans le muscle C. Alternés pour éviter les lipodystrophies ✓ bonne réponse D. Dans une veine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Le resucrage d'une hypoglycémie est suivi : A. D'un jeûne B. D'un contrôle de glycémie environ 15 minutes après ✓ bonne réponse C. D'aucune surveillance D. D'une injection d'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les pieds d'un patient diabétique doivent être : A. Examinés régulièrement, lavés, séchés et protégés ✓ bonne réponse B. Coupés avec des ciseaux pointus sans précaution C. Laissés pieds nus en permanence D. Trempés longuement dans l'eau chaude	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les aliments à éviter en grande quantité chez le diabétique : A. Les boissons sucrées et les sucreries ✓ bonne réponse B. L'eau C. Les légumes verts D. Les fibres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 L'acidocétose diabétique est : A. Un régime alimentaire B. Une hypoglycémie légère C. Une complication bénigne D. Une complication grave, surtout du diabète de type 1, nécessitant une prise en charge urgente ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Pendant le jeûne du Ramadan, un patient diabétique doit : A. Consulter avant pour adapter son traitement et sa surveillance ✓ bonne réponse B. Arrêter tous ses traitements sans avis C. Doubler ses doses D. Ne rien changer sans avis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'activité physique chez le diabétique traité par insuline peut provoquer : A. Aucun effet B. Une hypoglycémie : il faut adapter les apports ou les doses ✓ bonne réponse C. Une hyperglycémie systématique D. Une fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les complications chroniques du diabète touchent notamment : A. Aucun organe B. Uniquement les cheveux C. Les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et les vaisseaux ✓ bonne réponse D. Uniquement la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une alimentation équilibrée pour un diabétique répartit les glucides : A. Sur les différents repas, en privilégiant les féculents complets ✓ bonne réponse B. En supprimant tous les glucides C. Uniquement le soir D. En un seul repas par jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 L'autosurveillance glycémique se note :

- A. Nulle part
- B. Sur les murs
- C. Uniquement de mémoire
- D. Dans un carnet ou une application, pour adapter le traitement ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le fond d'œil est recommandé chez le diabétique pour dépister :

- A. La carie dentaire
- B. La rétinopathie diabétique ✓ **bonne réponse**
- C. La myopie uniquement
- D. L'otite

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Aide-soignant(e) / auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

Soins d'hygiène et de confort 20 questions

1 Lors d'une toilette au lit, on procède :

- A. Dans n'importe quel ordre
- B. Du plus sale vers le plus propre
- C. Du plus propre vers le plus sale ✓ **bonne réponse**
- D. Uniquement le visage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant la toilette d'un patient, il faut préserver :

- A. La fenêtre ouverte en hiver
- B. Son intimité (porte fermée, corps couvert) et son autonomie ✓ **bonne réponse**
- C. La présence de tous les visiteurs
- D. Uniquement la rapidité du soin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un patient qui peut faire une partie de sa toilette seul :

- A. Doit attendre sa famille
- B. Doit être encouragé à la faire pour préserver son autonomie ✓ **bonne réponse**
- C. Ne doit pas être lavé
- D. Doit être lavé entièrement pour gagner du temps

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pendant la toilette, vous remarquez une rougeur au sacrum. Que faites-vous ?

- A. Vous la massez énergiquement
- B. Vous le signalez à l'infirmier et le notez dans les transmissions ✓ **bonne réponse**
- C. Vous appliquez de l'alcool
- D. Vous n'en parlez pas

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5	Les soins de bouche chez un patient alité permettent de prévenir : A. L'hypertension B. Les fractures C. Les escarres du talon D. Les infections buccales et l'inconfort ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La température de l'eau pour une toilette est vérifiée : A. Avec le coude ou un thermomètre, pour éviter les brûlures ✓ bonne réponse B. Uniquement au toucher de la main C. Elle n'a pas d'importance D. En demandant au patient après coup	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Pour la toilette intime, on utilise : A. Un gant d'un autre patient B. Un gant et une serviette dédiés, du haut vers le bas (de l'avant vers l'arrière) ✓ bonne réponse C. De l'alcool D. Le même gant que pour le visage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Les soins de bouche d'un patient porteur d'une prothèse dentaire comprennent : A. Le nettoyage de la prothèse et de la bouche ✓ bonne réponse B. Le rangement de la prothèse dans un mouchoir C. Le port de la prothèse jour et nuit sans nettoyage D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Le shampoing au lit nécessite : A. Une protection du lit et une installation confortable du patient ✓ bonne réponse B. Aucune préparation C. De faire asseoir un patient qui ne peut pas D. De mouiller tout le lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La réfection d'un lit occupé se fait : A. En secouant les draps B. En faisant lever un patient qui ne le peut pas C. En tournant le patient de côté, avec deux soignants si besoin ✓ bonne réponse D. Sans prévenir le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le linge sale est : A. Secoué dans le couloir B. Déposé directement dans le sac à linge, sans le poser au sol ni le secouer ✓ bonne réponse C. Jeté par terre D. Posé sur le lit d'à côté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Un patient incontinent doit bénéficier : A. De changes réguliers et d'une toilette pour préserver la peau ✓ bonne réponse B. D'aucun soin particulier C. D'un change une fois par jour D. D'une limitation des boissons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le rasage d'un patient sous anticoagulant se fait de préférence : A. Au rasoir à lame B. Avec des ciseaux C. Au rasoir électrique ✓ bonne réponse D. Ce n'est jamais possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pendant la toilette, l'aide-soignant observe notamment : A. L'état de la peau, l'autonomie, l'humeur et la douleur ✓ bonne réponse B. Rien C. Uniquement l'heure D. Uniquement la couleur des draps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les ongles d'un patient diabétique : A. Sont limés avec une lime métallique agressive B. Ne nécessitent aucune attention C. Sont coupés très court avec des ciseaux pointus D. Ne sont pas coupés par l'aide-soignant sans avis (risque de plaie) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'installation au fauteuil d'un patient comprend : A. Le laisser plusieurs heures sans changer de position B. Une position confortable, des pieds bien posés et la sonnette à portée ✓ bonne réponse C. Le laisser glisser D. Le laisser sans sonnette	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La pudeur d'un patient pendant le change est respectée en : A. Faisant le soin devant les visiteurs B. Ne lui parlant pas C. Fermant la porte, en tirant le rideau et en couvrant le corps ✓ bonne réponse D. Laisant la porte ouverte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un patient en fin de vie a besoin en priorité : A. D'une toilette complète toutes les heures B. De soins de confort, de soins de bouche et d'une présence ✓ bonne réponse C. D'être réveillé souvent D. De rester seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'hygiène des mains de l'aide-soignant est réalisée : A. Uniquement en fin de journée B. Avant et après chaque soin, et après avoir retiré les gants ✓ bonne réponse C. Jamais avec des gants D. Uniquement si les mains sont sales	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Un bain ou une douche chez un patient âgé fragile impose :

- A. De le laisser seul
- B. Une surveillance pour prévenir les chutes et les malaises ✓ bonne réponse
- C. Une eau très chaude
- D. Une durée la plus longue possible

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Prévention des escarres 20 questions

1 Quelles sont les zones les plus à risque d'escarre chez un patient alité sur le dos ?

- A. Ventre et cuisses
- B. Sacrum, talons, coudes, omoplates, arrière de la tête ✓ bonne réponse
- C. Mains et doigts
- D. Genoux uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pour prévenir les escarres, il faut changer la position d'un patient à risque :

- A. Régulièrement, environ toutes les 2 à 3 heures selon le plan de soins ✓ bonne réponse
- B. Une fois par jour
- C. Uniquement la nuit
- D. Jamais pour ne pas le réveiller

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quel facteur favorise l'apparition d'une escarre ?

- A. Une marche régulière
- B. Une bonne hydratation
- C. Une dénutrition et une immobilité prolongée ✓ bonne réponse
- D. Un matelas adapté

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Quel outil sert à évaluer le risque d'escarre ?

- A. L'échelle de Braden ou de Norton ✓ bonne réponse
- B. Le score d'Apgar
- C. L'échelle EVA de la douleur
- D. Le score de Glasgow

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une escarre est due principalement à :

- A. Un manque de soleil
- B. Une pression prolongée sur une zone d'appui ✓ bonne réponse
- C. Une infection virale
- D. Une allergie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un matelas anti-escarres :

- A. Répartit les pressions mais ne remplace pas les changements de position ✓ bonne réponse
- B. Est inutile
- C. Supprime le besoin de surveiller la peau
- D. Doit être recouvert de plusieurs couches de draps

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Pour un patient assis au fauteuil, la zone la plus exposée est : A. Les ischions (fesses) ✓ bonne réponse B. Les mains C. Les genoux D. Le front	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La position semi-latérale à 30° est recommandée car : A. Elle empêche de respirer B. Elle évite l'appui direct sur le trochanter et le sacrum ✓ bonne réponse C. Elle est plus rapide à installer D. Elle augmente la pression sur la hanche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'humidité (urine, transpiration) favorise les escarres car : A. Elle n'a aucun effet B. Elle fragilise la peau ✓ bonne réponse C. Elle hydrate la peau D. Elle protège la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les frottements et le cisaillement surviennent notamment quand : A. On fait glisser le patient sur le drap au lieu de le soulever ✓ bonne réponse B. Le patient marche C. On utilise un drap de glisse D. On soulève le patient à deux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Masser une rougeur persistante au niveau d'un point d'appui : A. Se fait avec de l'alcool B. Est obligatoire C. Est recommandé fortement D. Est déconseillé : cela peut aggraver les lésions ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Une bonne alimentation et une hydratation suffisante : A. Font partie de la prévention des escarres ✓ bonne réponse B. Augmentent le risque C. N'ont aucun rôle D. Sont réservées aux sportifs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Les talons d'un patient alité peuvent être protégés en : A. Les entourant de bandes serrées B. Les mettant en décharge (coussin sous les mollets) ✓ bonne réponse C. Les laissant hors du lit D. Les posant directement sur le matelas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	L'évaluation du risque d'escarre se fait : A. Dès l'admission puis régulièrement ✓ bonne réponse B. Uniquement si une plaie apparaît C. Une seule fois à la sortie D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Les changements de position doivent être : A. Évités la nuit dans tous les cas B. Faits sans noter C. Faits une fois par semaine D. Planifiés, réalisés et notés (traçabilité) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le drap du lit doit être : A. Bien tendu, sans plis ni miettes ✓ bonne réponse B. Mouillé pour rafraîchir C. Rugueux D. Plié en plusieurs épaisseurs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient très maigre a un risque d'escarre : A. Identique à tous B. Diminué C. Augmenté (saillies osseuses plus exposées) ✓ bonne réponse D. Nul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'aide-soignant qui découvre une phlyctène au talon : A. N'en parle pas B. Applique du talc C. La signale à l'infirmier et met le talon en décharge ✓ bonne réponse D. La perce avec une aiguille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'immobilité prolongée favorise : A. Uniquement la perte de poids B. Une meilleure circulation C. Les escarres, mais aussi les phlébites et l'enraidissement ✓ bonne réponse D. La guérison rapide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un coussin en forme de « bouée » au fauteuil : A. Est déconseillé car il crée une zone de compression ✓ bonne réponse B. Est obligatoire C. Est le meilleur dispositif D. Préviendrait toutes les escarres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Manutention des patients 20 questions

1 Pour soulever une charge ou aider un patient, il faut : A. Garder le dos droit et plier les genoux ✓ bonne réponse B. Porter seul, loin du corps C. Plier le dos jambes tendues D. Faire une torsion du tronc	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Avant de lever un patient, la première chose à faire est : A. Lui expliquer le soin et évaluer ce qu'il peut faire lui-même ✓ bonne réponse B. Le lever rapidement sans prévenir C. Appeler sa famille D. Retirer les freins du lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Lors d'un transfert lit-fauteuil, le fauteuil doit être : A. Sans repose-pieds réglés B. Placé loin du lit C. Placé près du lit, freins serrés ✓ bonne réponse D. Freins desserrés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un lève-personne (soulève-malade) est utilisé : A. Jamais en établissement B. Pour tous les patients autonomes C. Pour les patients qui ne peuvent pas participer au transfert ✓ bonne réponse D. Uniquement pour les enfants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Avant de mobiliser un patient lourd seul(e), il faut : A. Le porter seul(e) rapidement B. Évaluer la situation et demander de l'aide ou utiliser une aide technique ✓ bonne réponse C. Le tirer par les bras D. Attendre qu'il tombe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le drap de glisse sert à : A. Faire la toilette B. Couvrir le patient C. Protéger le matelas de l'urine D. Remonter ou tourner un patient dans le lit en limitant les frottements ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le lit doit être réglé, pour un soin, à une hauteur : A. La plus haute possible B. La plus basse possible C. Permettant au soignant de travailler le dos droit ✓ bonne réponse D. Peu importe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Pour aider un patient à se lever du lit, on l'encourage d'abord à : A. S'asseoir au bord du lit, pieds au sol, quelques instants ✓ bonne réponse B. Se lever les yeux fermés C. Se lever brusquement D. Sauter du lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Un patient qui fait un malaise lors du lever doit être : A. Recouché ou assis en sécurité et surveillé ✓ bonne réponse B. Laissé debout C. Laissé seul D. Tiré par le bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le verticalisateur est utile pour un patient : A. Qui peut prendre appui sur ses jambes mais pas se lever seul ✓ bonne réponse B. Totalement autonome C. Qui marche seul D. Qui ne peut pas du tout porter son poids	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Pendant un transfert, il est important de : A. Le surprendre B. Expliquer chaque étape au patient et le faire participer ✓ bonne réponse C. Faire vite sans parler D. Le tirer par le cou	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le fauteuil roulant est approché du lit : A. Freins desserrés B. Repose-pieds baissés pendant le transfert C. Le plus loin possible D. Freins serrés, repose-pieds relevés ou retirés ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les troubles musculo-squelettiques du soignant sont favorisés par : A. L'utilisation d'aides techniques B. Le lit à bonne hauteur C. Les postures penchées et le port de charges lourdes répété ✓ bonne réponse D. Le travail à deux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pour tourner un patient sur le côté, on : A. Le tire par un bras B. Le pousse loin de soi en bout de lit C. Le fait rouler vers soi en plaçant ses bras et jambes, après avoir prévenu ✓ bonne réponse D. Le soulève seul à bout de bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Avant d'utiliser un lève-personne, on vérifie : A. Rien B. Que le patient est debout C. La sangle adaptée, la charge maximale et le bon fonctionnement ✓ bonne réponse D. Uniquement la couleur de la sangle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un patient opéré de la hanche doit être mobilisé : A. En lui croisant les jambes B. Jamais C. Comme n'importe quel patient D. En respectant les consignes de mouvements interdits données par le chirurgien ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La marche accompagnée d'un patient fragile se fait : A. En le laissant seul B. À côté de lui, légèrement en retrait, du côté le plus faible ✓ bonne réponse C. En le tenant par la main tendue devant lui D. Derrière lui à plusieurs mètres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Le chariot de soins ou de linge se pousse plutôt : A. En gardant le dos droit, bras près du corps ✓ bonne réponse B. En le tirant penché en avant C. D'une seule main D. En courant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La mobilisation précoce des patients sert à prévenir : A. L'appétit B. L'autonomie C. Les complications de l'immobilité (phlébite, escarre, pneumopathie) ✓ bonne réponse D. La guérison	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient au sol après une chute ne doit être relevé : A. Immédiatement en le tirant par les bras B. Par un seul soignant sans évaluation C. Qu'après évaluation de son état (douleur, conscience) et avec des moyens adaptés ✓ bonne réponse D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide aux repas et hydratation 20 questions

1 Pour aider un patient présentant des troubles de la déglutition à manger, il faut l'installer : A. Assis, tête légèrement fléchie vers l'avant ✓ bonne réponse B. Couché sur le ventre C. Allongé à plat sur le dos D. Tête en arrière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un patient tousse et s'étouffe à chaque gorgée d'eau. Vous devez : A. Arrêter, le signaler à l'infirmier (risque de fausse route) et adapter les textures selon la prescription ✓ bonne réponse B. Lui donner plus vite à boire C. Ne rien signaler D. Lui donner de l'eau gazeuse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quels signes peuvent évoquer une déshydratation chez une personne âgée ? A. Œdèmes des jambes uniquement B. Prise de poids rapide C. Bouche sèche, urines foncées, confusion ✓ bonne réponse D. Hypersalivation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 La surveillance des repas consiste notamment à : A. Supprimer les collations B. Noter les quantités consommées et signaler une baisse d'appétit ✓ bonne réponse C. Forcer le patient à finir D. Débarrasser sans regarder	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5 Avant le repas, on installe le patient : A. Assis, confortablement, mains lavées, prothèses dentaires et lunettes en place ✓ bonne réponse B. Sans lui laver les mains C. Sans ses lunettes D. Allongé à plat	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le régime alimentaire prescrit (sans sel, diabétique, mixé) doit être : A. Changé selon les goûts du soignant B. Vérifié pour chaque plateau ✓ bonne réponse C. Remplacé par le régime du voisin D. Ignoré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Une personne qui a des difficultés pour couper ses aliments : A. Est aidée en favorisant son autonomie (couverts adaptés, aide partielle) ✓ bonne réponse B. Doit attendre la famille C. Ne mange pas D. Est nourrie entièrement sans lui demander	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Aider un patient à manger se fait : A. En le pressant B. Assis à sa hauteur, à son rythme, par petites quantités ✓ bonne réponse C. En parlant au téléphone D. Debout, rapidement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les signes de fausse route sont : A. Somnolence après le repas uniquement B. Bon appétit C. Sourire D. Toux, voix mouillée, gêne respiratoire pendant le repas ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Pour une personne âgée qui boit peu, on peut : A. Supprimer les boissons B. Proposer régulièrement des boissons variées, gélifiées si besoin ✓ bonne réponse C. Attendre qu'elle réclame D. Lui donner un seul grand verre le soir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le relevé des ingesta consiste à : A. Noter ce que le patient a bu et mangé ✓ bonne réponse B. Noter le menu affiché C. Noter le nom du cuisinier D. Peser le plateau vide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un patient à jeun pour un examen : A. Peut boire un café B. Ne reçoit ni repas ni boisson, selon la consigne médicale ✓ bonne réponse C. Peut manger léger D. Peut manger s'il a faim	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Après le repas, le patient qui a des troubles de la déglutition reste : A. Assis ou demi-assis environ 30 minutes ✓ bonne réponse B. Debout pendant 2 heures C. Allongé à plat immédiatement D. Sur le ventre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une alimentation enrichie consiste à : A. Ajouter de l'eau B. Supprimer les protéines C. Augmenter les calories et protéines sans augmenter le volume (fromage, œuf, poudre de lait) ✓ bonne réponse D. Diminuer les portions sans compenser	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient qui ne mange pas plusieurs repas de suite : A. Est laissé tranquille sans rien dire B. Est forcé à manger C. Est signalé à l'infirmier et à la diététicienne ✓ bonne réponse D. Est privé de dessert	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'eau gélifiée est utile pour : A. Les nourrissons de moins d'un mois B. Les patients qui font des fausses routes aux liquides ✓ bonne réponse C. Les patients qui ont soif après le sport D. Remplacer les repas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les plateaux repas sont distribués : A. En respectant les règles d'hygiène et en vérifiant le nom et le régime ✓ bonne réponse B. Au hasard C. Après les avoir posés au sol D. Sans se laver les mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le respect des habitudes et des convictions alimentaires du patient : A. N'a aucune importance B. Est réservé aux enfants C. Fait partie d'une prise en charge de qualité ✓ bonne réponse D. Est interdit à l'hôpital	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Une bouche sèche chez un patient en fin de vie se soulage par : A. Rien B. Un jeûne C. Une perfusion systématique D. Des soins de bouche fréquents et une humidification ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La surveillance de l'hydratation chez la personne âgée inclut : A. La diurèse, l'aspect des urines et des muqueuses, le comportement ✓ bonne réponse B. Uniquement le poids annuel C. Rien D. Uniquement la couleur des cheveux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil et secrétariat médical

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e)

Accueil et relation patient 20 questions

1 Un patient s'énervé à l'accueil après une longue attente. La meilleure attitude est :

A. Rester calme, l'écouter, reconnaître son attente et l'informer du délai ✓

bonne réponse

B. L'ignorer jusqu'à ce qu'il se calme

C. Appeler immédiatement la sécurité

D. Lui répondre sur le même ton

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

2 Au téléphone, un appelant décrit une douleur thoracique intense. Que faire ?

A. Lui conseiller de patienter

B. Le réorienter immédiatement vers les urgences (SAMU 190) et prévenir un soignant ✓ **bonne réponse**

C. Lui donner un rendez-vous la semaine suivante

D. Raccrocher

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

3 L'écoute active consiste à :

A. Reformuler et poser des questions pour bien comprendre la demande ✓

bonne réponse

B. Écouter en faisant autre chose

C. Couper la parole pour gagner du temps

D. Préparer sa réponse pendant que la personne parle

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

4 Pour accueillir une personne malentendante, il est préférable de :

A. S'adresser uniquement à l'accompagnant

B. Crier

C. Parler en tournant le dos

D. Se placer face à elle, parler lentement et distinctement, écrire si besoin ✓

bonne réponse

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

5 Au téléphone, la première phrase professionnelle comprend :

A. Le numéro de téléphone

B. Uniquement « Allô ? »

C. Rien, on attend que l'appelant parle

D. Le nom de l'établissement ou du service, son prénom et une formule de politesse ✓ **bonne réponse**

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

6 Un patient ne parle ni arabe ni français. Vous :

A. Refusez de le recevoir

B. Parlez plus fort

C. Cherchez une solution (collègue, interprète, outil de traduction) en restant courtois ✓ **bonne réponse**

D. Le faites attendre jusqu'à la fermeture

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

7 Pour une personne en fauteuil roulant à l'accueil, on veille à : A. Se pencher au-dessus d'elle B. La laisser derrière le comptoir haut C. Se placer à sa hauteur et lui faciliter l'accès ✓ bonne réponse D. Parler uniquement à l'accompagnant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un appel concerne une urgence vitale (enfant qui ne respire plus). Vous : A. Prenez un rendez-vous B. Demandez de rappeler plus tard C. Orientez immédiatement vers le SAMU (190) et alertez un soignant ✓ bonne réponse D. Raccrochez	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La gestion de la salle d'attente comprend : A. L'ignorance des patients B. Le tri selon la tenue vestimentaire C. La fermeture des fenêtres en permanence D. L'information des patients sur le temps d'attente et l'attention aux personnes fragiles ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un patient mécontent menace de porter plainte. Vous : A. Ignorez sa demande B. L'insultez C. Restez calme, l'écoutez et l'orientez vers la procédure de réclamation ✓ bonne réponse D. Le menacez à votre tour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Une bonne posture d'accueil inclut : A. Tourner le dos B. Rester sur son téléphone personnel C. Regarder la personne, sourire, se présenter et rester disponible ✓ bonne réponse D. Mâcher un chewing-gum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Lorsqu'on doit faire patienter quelqu'un au téléphone : A. On raccroche B. On le prévient et on reprend l'appel rapidement ✓ bonne réponse C. On continue une autre conversation sans le dire D. On le met en attente sans prévenir pendant longtemps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les informations médicales données à l'accueil : A. Sont données par téléphone à n'importe qui B. Sont affichées publiquement C. Sont limitées : seuls les soignants donnent des informations médicales ✓ bonne réponse D. Peuvent être données à tout le monde	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Un patient âgé désorienté arrive seul. Vous : A. L'ignorez B. Le laissez repartir seul C. Le mettez en sécurité, le rassurez et prévenez l'équipe soignante ✓ bonne réponse D. Lui demandez de revenir avec quelqu'un	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La prise de rendez-vous doit tenir compte : A. Du hasard B. Uniquement de l'heure de pause C. Uniquement de vos préférences D. De l'urgence, des contraintes du patient et des consignes du médecin ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 En cas de retard important du médecin, l'accueil : A. Ne dit rien B. Informe les patients et propose si besoin un autre rendez-vous ✓ bonne réponse C. Annule tous les rendez-vous sans prévenir D. Ferme le cabinet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une réclamation écrite d'un patient doit être : A. Enregistrée et transmise au responsable selon la procédure ✓ bonne réponse B. Rendue au patient C. Jetée D. Cachée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le vouvoiement avec les patients est : A. Inutile B. Interdit C. Réservé aux médecins D. La règle par défaut, par respect ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Pour expliquer un trajet dans l'hôpital, il est utile de : A. Donner des repères simples ou accompagner la personne si elle est perdue ✓ bonne réponse B. Refuser de répondre C. Dire « c'est par là » sans préciser D. Donner un plan illisible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un appelant agressif au téléphone insulte la secrétaire. Elle peut : A. Donner des informations confidentielles pour le calmer B. Rester polie, poser une limite et mettre fin à l'appel si les insultes continuent, puis le signaler ✓ bonne réponse C. Insulter en retour D. Pleurer au téléphone	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Le dossier patient doit être : A. Laissé sur le bureau d'accueil B. Confidentiel, à jour et accessible uniquement aux personnes habilitées ✓ bonne réponse C. Communiqué à toute personne qui le demande D. Détruit après chaque consultation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Deux patients portent le même nom et prénom. Pour éviter une erreur, vous vérifiez : A. Uniquement le prénom B. La date de naissance et un autre identifiant (numéro de dossier) ✓ bonne réponse C. La couleur des vêtements D. Rien, ils sont identiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Votre session sur le logiciel du cabinet doit être : A. Ouverte en permanence B. Partagée avec un mot de passe commun affiché C. Verrouillée dès que vous quittez votre poste ✓ bonne réponse D. Laissée ouverte pour les collègues	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un résultat d'analyse arrive pour un patient. Vous pouvez le communiquer par téléphone : A. À toute personne qui appelle B. Non, sauf procédure prévue : les résultats sont remis au patient ou au médecin de façon sécurisée ✓ bonne réponse C. Au voisin D. À l'employeur du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 À l'admission, les documents demandés au patient sont notamment : A. Une pièce d'identité et les documents de prise en charge (assurance, carte de soins) ✓ bonne réponse B. Aucun document C. Uniquement son numéro de téléphone D. Son diplôme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le numéro de dossier unique permet : A. De calculer l'âge B. Rien C. De fixer le prix D. D'éviter les doublons et les erreurs d'identité ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un doublon de dossier (même patient avec deux dossiers) doit être : A. Signalé pour être fusionné selon la procédure ✓ bonne réponse B. Supprimé sans vérification C. Laissé tel quel D. Utilisé alternativement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Les documents papier contenant des données médicales sont : A. Laissés sur le comptoir B. Jetés à la poubelle ordinaire C. Recyclés comme brouillon D. Rangés sous clé et détruits de façon sécurisée (broyeur) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Envoyer un compte rendu médical par email nécessite : A. N'importe quelle adresse email B. Une messagerie sécurisée et la vérification du destinataire ✓ bonne réponse C. Une copie à tout le service D. Aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un mot de passe de logiciel médical doit être : A. Le même pour tout le service B. Personnel, robuste et jamais partagé ✓ bonne réponse C. Votre date de naissance D. Écrit sur un post-it sur l'écran	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La facturation d'un acte nécessite : A. Le bon code de l'acte, l'identité exacte du patient et les justificatifs ✓ bonne réponse B. Aucune information C. Le nom d'un autre patient D. Une estimation au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un patient demande une copie de son dossier : A. On refuse toujours B. La demande est traitée selon la procédure légale de l'établissement, avec vérification de son identité ✓ bonne réponse C. On donne le dossier à la personne qui appelle D. On envoie le dossier sans vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La saisie de l'identité du patient se fait : A. Phonétiquement, à l'oreille B. Avec un surnom C. Sans date de naissance D. À partir d'une pièce d'identité, en respectant l'orthographe exacte ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un courrier médical arrivé au secrétariat est : A. Ouvert par n'importe qui et commenté B. Laissé dans une pile C. Jeté D. Enregistré, transmis au médecin puis classé dans le bon dossier ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	La sauvegarde des données informatiques sert à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Éviter la perte des dossiers en cas de panne ✓ bonne réponse B. Rien C. Ralentir l'ordinateur D. Partager les données sur internet	
16	Les résultats d'examens sont classés :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Dans le dossier d'un homonyme B. Au hasard C. Dans le dossier du bon patient après vérification de l'identité ✓ bonne réponse D. Dans un tiroir sans nom	
17	Un écran affichant un dossier patient à l'accueil doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Laisse ouvert pendant la pause B. Orienté pour ne pas être visible du public et verrouillé en cas d'absence ✓ bonne réponse C. Sans importance D. Tourné vers la salle d'attente	
18	La durée de conservation des dossiers médicaux :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Est d'un jour B. Est libre C. Est fixée par la réglementation et doit être respectée ✓ bonne réponse D. Est d'une semaine	
19	La planification des rendez-vous dans un agenda partagé exige :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Des informations exactes (motif, durée, coordonnées) et sa mise à jour ✓ bonne réponse B. Aucune mise à jour C. Uniquement le prénom D. Des rendez-vous en double volontairement	
20	Une fuite de données (dossier envoyé à une mauvaise personne) doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Corrigée en envoyant d'autres dossiers B. Ignorée si personne ne s'en rend compte C. Cachée D. Signalée immédiatement au responsable ✓ bonne réponse	

Terminologie médicale 20 questions

1	Le suffixe « -ite » signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Inflammation (ex. : appendicite) ✓ bonne réponse B. Ablation chirurgicale C. Tumeur bénigne D. Douleur	

2	Le suffixe « -ectomie » signifie : A. Ablation (ex. : appendicectomie) ✓ bonne réponse B. Suture C. Inflammation D. Examen visuel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	« Tachycardie » signifie : A. Tension élevée B. Arrêt du cœur C. Rythme cardiaque rapide ✓ bonne réponse D. Rythme cardiaque lent	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le préfixe « hyper- » signifie : A. Au-dessus, excès ✓ bonne réponse B. À l'intérieur C. En dessous, insuffisance D. Autour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un « ORL » est spécialiste : A. Des oreilles, du nez et de la gorge ✓ bonne réponse B. De la peau C. Du cœur D. Des os et des articulations	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	« Hypotension » signifie : A. Tension artérielle basse ✓ bonne réponse B. Tension artérielle élevée C. Fièvre D. Rythme cardiaque rapide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	« Dyspnée » signifie : A. Trouble du sommeil B. Difficulté à avaler C. Douleur abdominale D. Difficulté à respirer ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	« Dysphagie » signifie : A. Difficulté à avaler ✓ bonne réponse B. Perte de mémoire C. Trouble de la vue D. Difficulté à respirer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Le suffixe « -algie » signifie : A. Inflammation B. Écoulement C. Douleur (ex. : névralgie) ✓ bonne réponse D. Ablation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10	Le suffixe « -scopie » signifie : A. Douleur B. Ablation C. Suture D. Examen visuel à l'aide d'un instrument (ex. : endoscopie) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le suffixe « -tomie » signifie : A. Inflammation B. Examen du sang C. Ablation totale D. Incision (ex. : laparotomie) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	« Hématurie » signifie : A. Urines abondantes B. Présence de sang dans les urines ✓ bonne réponse C. Absence d'urines D. Présence de sucre dans les urines	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	« Anurie » signifie : A. Douleur en urinant B. Absence d'urines ✓ bonne réponse C. Urines abondantes D. Sang dans les urines	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Le préfixe « hémi- » signifie : A. Moitié (ex. : hémiplégie) ✓ bonne réponse B. Sang C. Autour D. Double	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	« Néphrologie » est la spécialité : A. Du cœur B. Du cerveau C. Des reins ✓ bonne réponse D. De la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	« Gastro-entérologie » concerne : A. Les poumons B. Les yeux C. Le tube digestif ✓ bonne réponse D. Les os	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	« Pneumologie » concerne : A. Les nerfs B. Les poumons et la respiration ✓ bonne réponse C. Les dents D. Les reins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 « IV » sur une prescription signifie :

- A. Quatre fois par jour
- B. Intraveineuse ✓ **bonne réponse**
- C. Par la bouche
- D. Intramusculaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 « ATCD » dans un dossier signifie :

- A. Analyse
- B. Attestation
- C. Antécédents ✓ **bonne réponse**
- D. Autorisation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 « Bradypnée » signifie :

- A. Respiration lente ✓ **bonne réponse**
- B. Respiration rapide
- C. Cœur lent
- D. Cœur rapide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Transport sanitaire

Postes concernés : Ambulancier(ère)

Transport sanitaire 20 questions

1 Quel est le numéro du SAMU en Tunisie ?

- A. 190 ✓ **bonne réponse**
- B. 198
- C. 197
- D. 1 899

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant le transport, un patient devient pâle, en sueurs et ne répond plus. Que faire ?

- A. Accélérer sans rien vérifier
- B. Ouvrir les fenêtres et continuer
- C. Arrêter le véhicule en sécurité, évaluer conscience et respiration, alerter et débiter les gestes d'urgence ✓ **bonne réponse**
- D. Attendre l'arrivée à l'hôpital

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Après un transport de patient contagieux, l'ambulance doit être :

- A. Utilisée immédiatement
- B. Lavée une fois par mois
- C. Nettoyée et désinfectée selon le protocole avant un autre transport ✓ **bonne réponse**
- D. Aérée seulement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Lors du transport, le brancard doit être :

- A. Sans sangles
- B. Verrouillé dans son système de fixation, patient sanglé ✓ **bonne réponse**
- C. Libre pour plus de confort
- D. Retiré du véhicule

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Avant de partir en intervention, l'ambulancier vérifie : A. Le véhicule, l'oxygène, le matériel de soins et de communication ✓ bonne réponse B. Rien C. Uniquement le carburant D. La radio musicale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La position demi-assise pendant le transport convient : A. À un traumatisé du rachis B. À un patient qui a du mal à respirer (selon l'état et l'avis médical) ✓ bonne réponse C. À un patient en état de choc avec tension effondrée D. À une victime inconsciente	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Une femme enceinte au 3e trimestre est transportée de préférence : A. Assise penchée en avant B. Sur le ventre C. Sur le dos à plat D. En position latérale gauche (ou inclinée à gauche) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un patient en état de choc est souvent installé : A. Sur le ventre B. Allongé, jambes éventuellement surélevées selon le contexte, et surveillé ✓ bonne réponse C. Assis sur une chaise D. Debout	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La bouteille d'oxygène doit être : A. Fixée, manipulée sans graisse et éloignée de toute flamme ✓ bonne réponse B. Posée libre sur le brancard C. Graissée pour faciliter l'ouverture D. Placée près du chauffage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le bilan transmis au médecin régulateur comprend : A. Conscience, respiration, circulation, plaintes et circonstances ✓ bonne réponse B. Uniquement l'adresse C. Uniquement le nom du patient D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Pendant le transport, l'ambulancier : A. Écoute de la musique forte B. Laisse le patient seul à l'arrière C. Reste dans la cabine sans regarder D. Surveille en permanence le patient et rend compte de toute aggravation ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 L'usage des avertisseurs lumineux et sonores est : A. Permanent B. Réservé aux situations d'urgence, avec prudence ✓ bonne réponse C. Interdit en toutes circonstances D. Utilisé pour éviter les bouchons sans urgence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La ceinture de sécurité du patient et de l'accompagnant : A. Est interdite B. Gêne la surveillance donc on l'enlève C. Est facultative D. Doit être attachée pendant le transport ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient sous oxygène refuse son masque pendant le transport. On : A. Explique, rassure, propose une lunette nasale si prescrite et informe le médecin ✓ bonne réponse B. Force le masque sur le visage C. Débranche le patient D. Arrête l'oxygène sans rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La fiche d'intervention ou de transport doit être : A. Jetée B. Remplie le lendemain de mémoire C. Remplie et transmise à l'équipe qui accueille le patient ✓ bonne réponse D. Remise à un passant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le nettoyage du brancard et de la cellule sanitaire se fait : A. Jamais B. Une fois par mois C. Après chaque transport ✓ bonne réponse D. Uniquement s'il est très sale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient dialysé transporté régulièrement : on veille surtout à : A. Ne pas comprimer ni prendre la tension sur le bras de la fistule ✓ bonne réponse B. Le transporter debout C. Prendre la tension sur la fistule D. Ne rien vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 En arrivant sur un accident de la route, l'ambulancier commence par : A. Courir vers la première victime sans regarder B. Déplacer les véhicules impliqués C. Sécuriser les lieux (balisage) pour éviter un sur-accident ✓ bonne réponse D. Prendre des photos	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le secret professionnel s'applique aux ambulanciers : A. Seulement pour les enfants B. Seulement la nuit C. Non, jamais D. Oui, comme à tous les professionnels de santé ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Un patient agité risque de se blesser pendant le transport. On :

- A. Le laisse seul
- B. Le laisse se lever dans le véhicule
- C. Accélère pour arriver plus vite
- D. Sécurise l'installation, rassure et demande un renfort médical si besoin ✓
bonne réponse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Immobilisation et relevage 20 questions

1 Chez un blessé suspect de traumatisme du rachis, il faut :

- A. Maintenir la tête dans l'axe tête-cou-tronc et limiter les mouvements ✓
bonne réponse
- B. Le soulever par les bras
- C. Le faire asseoir rapidement
- D. Lui tourner la tête pour le faire parler

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le matelas immobilisateur à dépression (coquille) sert à :

- A. Mesurer la tension
- B. Immobiliser l'ensemble du corps lors du transport d'un traumatisé ✓ **bonne réponse**
- C. Réchauffer le patient
- D. Réanimer le patient

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une attelle doit immobiliser :

- A. Uniquement le foyer de fracture
- B. Tout le corps
- C. Les articulations situées au-dessus et au-dessous de la fracture ✓ **bonne réponse**
- D. Aucune articulation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Avant de poser une attelle sur un membre, on vérifie :

- A. Rien
- B. Uniquement la douleur
- C. La sensibilité, la motricité et la circulation (pouls, coloration) en aval ✓ **bonne réponse**
- D. La température corporelle

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le collier cervical est posé :

- A. Sans maintien de la tête
- B. Après maintien manuel de la tête dans l'axe, avec une taille adaptée ✓
bonne réponse
- C. Uniquement si le patient le demande
- D. Avant tout examen, en tournant la tête pour l'ajuster

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Le relevage d'une victime suspecte de traumatisme du rachis nécessite :

- A. Un seul sauveteur qui la soulève
- B. De la tirer par les pieds
- C. De la faire marcher
- D. Plusieurs sauveteurs coordonnés et un matériel adapté (brancard cuillère, plan dur) ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Le brancard cuillère permet : A. De soulever une victime en limitant ses mouvements ✓ bonne réponse B. De mesurer sa tension C. De la réanimer D. De la réchauffer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un membre fracturé avec déformation doit être : A. Massé B. Laissé sans immobilisation C. Immobilisé dans la position où il se trouve, sauf consigne médicale ✓ bonne réponse D. Remis en place par l'ambulancier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Après l'immobilisation d'un membre, on vérifie à nouveau : A. La circulation, la sensibilité et la motricité en dessous ✓ bonne réponse B. Rien C. L'heure D. La couleur du matériel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une victime casquée (moto) consciente et qui respire : A. Doit être secourée B. Ne se voit retirer le casque que selon une technique à deux, si nécessaire ✓ bonne réponse C. Doit retirer elle-même son casque rapidement D. Doit garder le casque en toutes circonstances même si elle vomit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le chef d'équipe lors d'un relevage : A. Ne parle pas B. Coordonne les gestes et donne les ordres de mouvement ✓ bonne réponse C. Porte seul la victime D. Filme l'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Une écharpe (bras en écharpe) est utilisée pour immobiliser : A. Une fracture de la jambe B. Une blessure de la colonne C. Une blessure du membre supérieur (épaule, bras, avant-bras) ✓ bonne réponse D. Une plaie du crâne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	L'attelle à dépression se moule : A. Après l'arrivée à l'hôpital B. Autour du membre, puis l'air est retiré pour la rigidifier ✓ bonne réponse C. En gonflant fortement D. Avec de l'eau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Une fracture ouverte (os visible) nécessite : A. De la laisser à l'air B. De remettre l'os dans la plaie C. De laver la plaie au savon D. De protéger la plaie avec un pansement stérile, sans remettre l'os en place ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La position latérale de sécurité est contre-indiquée chez : A. Une victime qui vomit B. Une victime inconsciente qui respire sans traumatisme C. Une victime suspecte de traumatisme du rachis sans technique adaptée ✓ bonne réponse D. Une victime intoxiquée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le plan dur (planche) est utilisé : A. Pour transporter du matériel uniquement B. Pour immobiliser et déplacer une victime traumatisée de façon rigide ✓ bonne réponse C. Pour faire la toilette D. Pour réchauffer la victime	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Avant de soulever une victime, les sauveteurs : A. Se placent jambes fléchies, dos droit, et soulèvent au signal ✓ bonne réponse B. Soulèvent chacun à leur rythme C. Tirent la victime par les vêtements D. Soulèvent dos courbé jambes tendues	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'immobilisation du bassin (ceinture pelvienne) est indiquée : A. En cas de suspicion de fracture grave du bassin avec risque hémorragique ✓ bonne réponse B. Jamais C. Pour une plaie du doigt D. Pour une entorse de la cheville	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le dégagement d'urgence d'une victime (sans immobilisation préalable) est réservé : A. Aux victimes âgées B. À un danger réel, immédiat et non contrôlable (incendie, risque d'explosion) ✓ bonne réponse C. À toutes les situations D. Aux victimes conscientes uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une victime en hypothermie doit être manipulée : A. Plongée dans un bain chaud B. Avec douceur, protégée du froid et isolée du sol ✓ bonne réponse C. Brusquement D. Massée énergiquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Pédiatrie

Postes concernés : Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie

Soins pédiatriques 20 questions

1	Chez l'enfant, la dose d'un médicament est généralement calculée : A. Selon la taille seulement B. Comme chez l'adulte, divisée par deux C. Uniquement selon l'âge en années D. En fonction du poids (mg/kg) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Le paracétamol chez l'enfant se donne habituellement à la dose de : A. 1 g par prise quel que soit l'âge B. 5 mg/kg par jour C. 15 mg/kg toutes les 6 heures (60 mg/kg/jour au maximum) ✓ bonne réponse D. 50 mg/kg par prise	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un nourrisson a une diarrhée, la fontanelle déprimée et les yeux creux. Il faut suspecter : A. Une otite simple B. Une déshydratation ✓ bonne réponse C. Une poussée dentaire D. Une constipation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, on le couche : A. Dans le lit des parents avec un oreiller B. Sur le côté calé par des coussins C. Sur le ventre D. Sur le dos, sur un matelas ferme, sans oreiller ni couverture ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un enfant fait une convulsion avec de la fièvre. Que faire en premier ? A. Lui mettre un objet entre les dents B. Le protéger des chocs, ne rien mettre dans sa bouche, le placer en position latérale de sécurité après la crise et alerter ✓ bonne réponse C. Le maintenir fermement pour arrêter les mouvements D. Le plonger dans un bain d'eau froide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La fréquence cardiaque normale d'un nourrisson au repos est d'environ : A. 100 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 60 à 80 battements/min C. 200 à 240 battements/min D. 40 à 60 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La fréquence respiratoire normale d'un enfant de 1 à 5 ans est d'environ : A. 100 cycles/min B. 20 à 30 cycles/min ✓ bonne réponse C. 60 à 80 cycles/min D. 5 à 10 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8	Le calcul d'une dose pédiatrique : 15 mg/kg pour un enfant de 12 kg donne :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 120 mg B. 180 mg ✓ bonne réponse C. 15 mg D. 1 800 mg	
9	La bronchiolite du nourrisson est le plus souvent due :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. À une carence en fer B. À un virus (souvent le VRS) ✓ bonne réponse C. À une allergie D. À une bactérie systématiquement	
10	Les signes de gravité d'une bronchiolite incluent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Difficulté à s'alimenter, signes de lutte respiratoire, pauses respiratoires ✓ bonne réponse B. Une toux légère sans gêne C. Un simple nez qui coule D. Un bon appétit	
11	Pour réhydrater un enfant atteint de diarrhée sans signe de gravité, on utilise :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Un jeûne complet B. Une solution de réhydratation orale (SRO), par petites quantités fréquentes ✓ bonne réponse C. De l'eau très sucrée D. Des boissons gazeuses	
12	La douleur chez l'enfant de moins de 4 ans s'évalue avec :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une échelle comportementale adaptée à l'âge (type FLACC, EVENDOL) ✓ bonne réponse B. La tension artérielle seule C. Aucune échelle D. Une échelle numérique de 0 à 10 qu'il remplit seul	
13	Le calendrier vaccinal de l'enfant doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Vérifié uniquement à 18 ans B. Ignoré à l'hôpital C. Rempli par la famille seule D. Vérifié à chaque consultation ou hospitalisation ✓ bonne réponse	
14	La présence des parents lors des soins chez l'enfant :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Est toujours interdite B. Est en général favorable et rassurante pour l'enfant ✓ bonne réponse C. N'a aucun intérêt D. Augmente systématiquement la douleur	
15	Une fièvre chez un nourrisson de moins de 3 mois :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Impose un avis médical rapide ✓ bonne réponse B. Est toujours bénigne C. Se traite par un bain froid D. Ne nécessite aucune surveillance	

16	La déshydratation sévère chez l'enfant se manifeste par :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Des urines abondantes et claires B. Une somnolence, des yeux creux, une peau qui garde le pli et une diminution des urines ✓ bonne réponse C. Une prise de poids D. Une agitation joyeuse	
17	La sécurité d'un enfant hospitalisé impose notamment :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. De laisser les fenêtres grandes ouvertes B. Barrières de lit relevées et aucun médicament à sa portée ✓ bonne réponse C. De le laisser seul sans surveillance D. De lui laisser des petits objets	
18	Pour un enfant, les explications avant un soin doivent être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Adaptées à son âge, honnêtes et rassurantes ✓ bonne réponse B. Absentes pour ne pas l'effrayer C. Fausses (« ça ne fera rien ») systématiquement D. Données uniquement aux parents	
19	La crème anesthésiante locale avant une ponction veineuse chez l'enfant :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. S'applique après la ponction B. Doit être appliquée suffisamment longtemps avant le soin selon la notice ✓ bonne réponse C. Agit immédiatement D. Est contre-indiquée chez tous les enfants	
20	Les signes d'une détresse respiratoire chez le nourrisson incluent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Battement des ailes du nez, tirage, geignement, coloration grise ✓ bonne réponse B. Un sommeil calme C. Une respiration lente et régulière D. Une bonne prise des biberons	

Laboratoire de PMA

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire PMA

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Phase pré-analytique](#) (Laboratoire / biologie médicale).

Laboratoire de PMA 20 questions

1	L'ICSI consiste à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Mettre en contact ovocytes et spermatozoïdes dans une boîte sans micro-injection B. Congeler les ovocytes C. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus D. Injecter un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de l'ovocyte ✓ bonne réponse	

2	Les gamètes et les embryons sont cryoconservés dans : A. Un réfrigérateur à +4 °C B. L'azote liquide, à environ -196 °C ✓ bonne réponse C. L'incubateur à 37 °C D. Un congélateur à -20 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Règle essentielle à chaque manipulation de gamètes ou d'embryons au laboratoire de PMA : A. La vérification par une seule personne en fin de journée B. Le contrôle uniquement lors du transfert C. L'étiquetage des boîtes après la manipulation D. La double vérification de l'identité (second opérateur ou système d'identification) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le stade blastocyste est généralement atteint : A. Vers le 5e ou 6e jour de développement ✓ bonne réponse B. Au 10e jour C. Au 1er jour D. Au 2e jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Avant un spermogramme, la durée d'abstinence recommandée est généralement de : A. 15 jours au minimum B. 2 à 7 jours ✓ bonne réponse C. 12 heures D. 1 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Les incubateurs de culture embryonnaire sont réglés à : A. +4 °C B. Environ 37 °C, avec une atmosphère contrôlée en CO2 ✓ bonne réponse C. La température ambiante du laboratoire D. 42 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La FIV « classique » consiste à : A. Congeler l'embryon sans fécondation B. Mettre en contact ovocytes et spermatozoïdes dans un milieu de culture ✓ bonne réponse C. Injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte D. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	L'insémination intra-utérine consiste à : A. Prélever des ovocytes B. Déposer des spermatozoïdes préparés dans la cavité utérine ✓ bonne réponse C. Transférer un embryon D. Injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 La ponction ovocytaire se fait en général : A. Sans aucune préparation B. Par prise de sang C. Sous échographie, par voie vaginale, après stimulation ovarienne ✓ bonne réponse D. Par chirurgie abdominale systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le signe d'une fécondation normale observé vers 16–20 heures est : A. Un ovocyte sans changement B. Trois cellules C. La présence de deux pronucléi ✓ bonne réponse D. La présence d'un blastocyste	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La vitrification est : A. Une technique de coloration B. Une technique d'échographie C. Une technique de congélation ultra-rapide des ovocytes et embryons ✓ bonne réponse D. Un milieu de culture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La préparation du sperme avant une AMP vise à : A. Les congeler immédiatement B. Sélectionner les spermatozoïdes mobiles et éliminer le liquide séminal ✓ bonne réponse C. Colorer les spermatozoïdes D. Augmenter le volume de sperme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Dans un spermogramme, la mobilité progressive est : A. Le nombre de leucocytes B. Le pH C. Le pourcentage de spermatozoïdes qui avancent ✓ bonne réponse D. Le volume de l'éjaculat	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La qualité de l'air dans un laboratoire de FIV est importante car : A. Elle n'a aucune importance B. Elle concerne seulement le confort C. Les embryons sont sensibles aux polluants et composés volatils ✓ bonne réponse D. Elle sert à la congélation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le transfert embryonnaire est en général réalisé : A. À J2–J3 ou au stade blastocyste (J5–J6) ✓ bonne réponse B. Après un mois de culture C. À J15 D. Le jour de la ponction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La traçabilité au laboratoire de PMA permet de relier :

- A. Chaque gamète et embryon au couple concerné à chaque étape ✓ **bonne réponse**
- B. Les embryons à la facture
- C. Les patients au parking
- D. Rien de particulier

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Les cuves d'azote liquide nécessitent :

- A. Une manipulation à mains nues
- B. Un stockage au soleil
- C. Une surveillance du niveau et des alarmes, et des équipements de protection pour la manipulation ✓ **bonne réponse**
- D. Aucune surveillance

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Le risque principal lors de la manipulation de l'azote liquide est :

- A. Les brûlures par le froid et le risque d'asphyxie dans un local mal ventilé ✓ **bonne réponse**
- B. L'irradiation
- C. L'électrocution
- D. L'allergie alimentaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 La culture embryonnaire nécessite un contrôle précis :

- A. Du bruit uniquement
- B. De la couleur des boîtes
- C. De la température, du pH et de l'osmolarité des milieux ✓ **bonne réponse**
- D. De la luminosité maximale

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne est :

- A. Un résultat normal attendu
- B. Une complication du transfert de sperme
- C. Une maladie du nouveau-né
- D. Une complication possible de la stimulation de l'ovulation ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Stérilisation

Postes concernés : Agent(e) de stérilisation

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Instrumentation chirurgicale](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Panueur(se)

Postes concernés : Panueur(se)

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Pansements et soins des plaies](#) (Infirmier(ère)), [Prévention des escarres](#) (Aide-soignant(e) / auxiliaire).

Encadrement des soins

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Préparation et administration des médicaments](#) (Infirmier(ère)), [Surveillance des paramètres vitaux](#) (Infirmier(ère)).

1 Le planning de l'équipe soignante doit avant tout garantir : A. La continuité et la sécurité des soins 24 h/24, avec un effectif adapté à la charge de travail ✓ bonne réponse B. Un minimum de personnel la nuit, sans exception C. Les préférences de chacun avant les besoins du service D. Le même nombre de gardes pour tous, quelle que soit l'activité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un nouvel infirmier arrive dans le service. La bonne pratique est : A. Le laisser seul dès le premier jour pour le tester B. Attendre qu'il pose des questions C. Organiser son accueil et son intégration avec un tuteur et des objectifs progressifs ✓ bonne réponse D. Lui confier uniquement les nuits	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Deux soignants se disputent devant les patients. Que faites-vous en premier ? A. Laisser faire, ils finiront par se calmer B. Changer l'un d'eux de service sans discussion C. Sanctionner immédiatement les deux devant l'équipe D. Faire cesser la dispute, les recevoir à part, écouter chacun et rechercher une solution ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un infirmier peut confier un soin à un aide-soignant : A. Toujours, quel que soit le soin B. S'il relève du champ de compétences de l'aide-soignant, sous la responsabilité de l'infirmier ✓ bonne réponse C. Si le médecin est absent D. Uniquement la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Les transmissions lors de la relève servent avant tout à : A. Évaluer les soignants B. Remplir le temps de la relève C. Remplacer le dossier de soins D. Assurer la continuité des soins en communiquant les informations utiles sur chaque patient ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La fiche de poste d'un soignant décrit : A. Sa vie privée B. Ses congés C. Son salaire uniquement D. Ses missions, ses responsabilités et ses liens hiérarchiques ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 L'entretien annuel d'évaluation sert à : A. Faire le bilan de l'année, fixer des objectifs et identifier les besoins de formation ✓ bonne réponse B. Sanctionner C. Fixer les vacances uniquement D. Remplacer les transmissions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un absentéisme élevé dans une équipe doit faire rechercher : A. Rien B. Uniquement la paresse C. Un coupable unique D. Des causes liées aux conditions de travail, à la charge ou au climat d'équipe ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La délégation efficace suppose : A. De ne jamais déléguer B. De déléguer uniquement les tâches pénibles sans explication C. De tout déléguer sans contrôle D. De confier une tâche claire à une personne compétente et d'en assurer le suivi ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Une réunion de service efficace comprend : A. Une durée illimitée B. Uniquement des reproches C. Un ordre du jour, une durée maîtrisée et un compte rendu ✓ bonne réponse D. Aucune préparation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Lors d'un pic d'activité imprévu, le surveillant : A. Rentre chez lui B. Réorganise les priorités, mobilise des renforts si possible et informe sa hiérarchie ✓ bonne réponse C. Ferme le service D. Ne change rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La charge en soins d'un service se mesure notamment avec : A. Le nombre de visiteurs B. Le nombre de fenêtres C. Le budget de la cafétéria D. Des outils d'évaluation de la dépendance et de la gravité des patients ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le plan de formation d'un service doit : A. Concerner uniquement le surveillant B. Répondre aux besoins des patients, des protocoles et des agents ✓ bonne réponse C. Être fixé au hasard D. Être identique chaque année sans réflexion	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un conflit entre un soignant et un médecin doit être géré : A. Par un échange en privé, factuel, centré sur le patient, avec médiation si nécessaire ✓ bonne réponse B. En ignorant le problème C. Devant les patients D. Par mail collectif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Le tutorat d'un étudiant en stage comprend : A. Lui confier uniquement le ménage B. Aucun suivi C. L'accueil, des objectifs, l'accompagnement et l'évaluation ✓ bonne réponse D. Le laisser seul en autonomie totale dès le 1er jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La gestion du stock et du matériel du service relève : A. De l'organisation du surveillant, en lien avec la pharmacie et les services techniques ✓ bonne réponse B. Des visiteurs C. Uniquement des patients D. De personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La motivation d'une équipe est favorisée par : A. Les changements de planning sans prévenir B. La reconnaissance, la participation aux décisions et des objectifs clairs ✓ bonne réponse C. L'absence de communication D. Les reproches publics	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un nouveau protocole de soins est mis en place. Le surveillant : A. L'affiche sans explication B. Informe, forme l'équipe et vérifie son application ✓ bonne réponse C. Le garde dans son bureau D. Laisse chacun l'interpréter	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le surveillant de nuit est notamment responsable : A. Des admissions administratives uniquement B. Uniquement de la fermeture des portes C. De la cuisine D. De la continuité et de la sécurité des soins dans les services pendant la nuit ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Pour prévenir l'épuisement d'une équipe, l'encadrant peut : A. Équilibrer les plannings, être à l'écoute et organiser des temps d'échange ✓ bonne réponse B. Supprimer les pauses C. Ignorer les signes de fatigue D. Augmenter les heures supplémentaires sans limite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Qualité et gestion des risques 20 questions

1 Après un événement indésirable grave, l'encadrant doit : A. Mettre le patient en sécurité, déclarer l'événement et organiser l'analyse des causes sans chercher de coupable ✓ bonne réponse B. Ne rien déclarer si le patient va bien C. Rechercher le responsable pour le sanctionner D. Attendre une plainte de la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
--	--

2 Une revue de morbi-mortalité (RMM) a pour but : A. D'informer la presse B. D'analyser collectivement les causes d'un événement pour éviter qu'il se reproduise ✓ bonne réponse C. De calculer les primes D. De sanctionner un soignant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le chariot d'urgence du service doit être : A. Fermé à clé, clé chez le médecin chef B. Rangé dans une réserve éloignée C. Vérifié régulièrement (contenu, dates de péremption, défibrillateur), avec une vérification tracée ✓ bonne réponse D. Vérifié uniquement après une utilisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un audit montre une faible observance de l'hygiène des mains. L'action la plus pertinente est : A. Supprimer la solution hydro-alcoolique B. Former l'équipe, rendre la solution hydro-alcoolique accessible partout et refaire un audit ✓ bonne réponse C. Ne rien changer D. Imposer le port permanent de gants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 La traçabilité des soins dans le dossier patient permet : A. Uniquement de facturer B. De remplacer les transmissions orales urgentes C. Rien de particulier D. De prouver ce qui a été fait, d'assurer la continuité des soins et de protéger le patient et le soignant ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La démarche qualité repose sur le cycle : A. Acheter, stocker, jeter B. Punir, contrôler, sanctionner C. Commencer, abandonner, oublier D. Planifier, faire, vérifier, améliorer (roue de Deming) ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un indicateur qualité sert à : A. Fixer les salaires B. Décorer le service C. Remplacer les soins D. Mesurer un résultat ou une pratique pour suivre son évolution ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 L'analyse des causes d'un événement indésirable cherche : A. À cacher l'événement B. À accuser le patient C. Uniquement un coupable D. Les causes profondes liées à l'organisation, et pas seulement l'erreur individuelle ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	La méthode des « 5 pourquoi » sert à :	A. Remonter progressivement aux causes profondes d'un problème ✓ bonne réponse B. Compter les patients C. Évaluer la douleur D. Calculer une dose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un audit clinique consiste à :	A. Comparer les pratiques réelles à un référentiel pour les améliorer ✓ bonne réponse B. Évaluer les repas uniquement C. Contrôler les vestiaires D. Faire un inventaire de la pharmacie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La certification d'un établissement de santé vise à :	A. Construire de nouveaux bâtiments B. Fixer les prix des consultations C. Évaluer la qualité et la sécurité des soins selon un référentiel ✓ bonne réponse D. Recruter du personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un questionnaire de satisfaction des patients permet :	A. De remplacer les soins B. De sanctionner les patients C. De recueillir leur avis pour améliorer la prise en charge ✓ bonne réponse D. D'évaluer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	La cartographie des risques d'un service identifie :	A. Les congés B. L'emplacement des fenêtres C. Les risques principaux, leur fréquence et leur gravité, pour prioriser les actions ✓ bonne réponse D. Le menu de la semaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un protocole de soins validé doit être :	A. Valable sans limite de temps B. Gardé secret C. Daté, accessible, connu de l'équipe et révisé régulièrement ✓ bonne réponse D. Écrit à la main sans validation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Le signalement d'un événement indésirable doit être encouragé grâce :	A. Au silence B. À l'anonymat des fautes graves sans analyse C. À la menace de sanctions D. À une culture de sécurité non punitive ✓ bonne réponse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 L'identitovigilance, l'hygiène des mains et la check-list du bloc sont :

- A. Facultatifs
- B. Des tâches administratives inutiles
- C. Réservées aux médecins
- D. Des pratiques de sécurité des soins à évaluer régulièrement ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Après un événement grave, l'équipe peut bénéficier :

- A. D'un débriefing et d'un soutien (« seconde victime ») ✓ **bonne réponse**
- B. D'aucun soutien
- C. D'un changement de service immédiat
- D. D'une sanction collective

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Le plan d'actions qualité comprend :

- A. Uniquement des idées
- B. Des actions, des responsables, des échéances et un suivi ✓ **bonne réponse**
- C. Des actions sans responsable
- D. Aucune date

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 La gestion des plaintes et réclamations des patients :

- A. Doit être ignorée
- B. Sert à sanctionner le patient
- C. Est réservée au service juridique sans retour au service
- D. Est une source d'amélioration et doit être analysée ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a pour but :

- A. De noter les soignants pour la paie
- B. De réduire le nombre de soignants
- C. De remplacer la formation initiale
- D. D'améliorer la qualité des soins à partir de l'analyse des pratiques ✓ **bonne réponse**

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Encadrement du bloc opératoire

Postes concernés : Surveillant(e) de bloc opératoire

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Bloc opératoire](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Encadrement de l'imagerie

Postes concernés : Surveillant(e) de radiologie

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Radioprotection](#) (Imagerie médicale), [Scanner et IRM](#) (Imagerie médicale).

Annexe – Correspondance poste → questions

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Infirmier(ère) polyvalent(e)	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) de bloc opératoire	Soins infirmiers	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Infirmier(ère) en réanimation	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) aux urgences	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Technicien(ne) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Panseur(se)	Soins infirmiers	Panseur(se) : Pansements et soins des plaies, Prévention des escarres + tronc commun
Sage-femme	Sage-femme	Sage-femme : Suivi de grossesse, Accouchement eutocique, Soins néonataux, Allaitement maternel + tronc commun
Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation : Anesthésie générale, Intubation et ventilation, Monitoring hémodynamique, Surveillance post-interventionnelle + tronc commun
Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Imagerie médicale : Radioprotection, Radiologie conventionnelle, Scanner et IRM + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire / biologie médicale : Phase pré-analytique, Hématologie, Analyses biochimiques, Microbiologie + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire PMA	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire de PMA : Laboratoire de PMA, Phase pré-analytique + tronc commun
Kinésithérapeute	Rééducation et nutrition	Rééducation : Rééducation fonctionnelle, Kinésithérapie respiratoire, Bilan et évaluation + tronc commun
Diététicien(ne) / Nutritionniste	Rééducation et nutrition	Diététique et nutrition : Nutrition clinique, Prise en charge du diabète + tronc commun
Préparateur(trice) en pharmacie	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Pharmacie : Gestion des stocks pharmaceutiques, Délivrance et conseil, Conservation des médicaments + tronc commun
Aide-soignant(e)	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun
Auxiliaire de puériculture	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Technicien(ne) en hygiène hospitalière	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Technicien(ne) en instrumentation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Agent(e) de stérilisation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Stérilisation : Asepsie et stérilisation, Instrumentation chirurgicale + tronc commun
Surveillant(e) d'étage	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) général(e)	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de nuit	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de bloc opératoire	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement du bloc opératoire : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Bloc opératoire, Asepsie et stérilisation + tronc commun
Surveillant(e) de radiologie	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement de l'imagerie : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Radioprotection, Scanner et IRM + tronc commun
Assistant(e) dentaire	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Secrétaire médical(e)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Ambulancier(ère)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Transport sanitaire : Transport sanitaire, Immobilisation et relevage + tronc commun