

Questions de l'entretien IA et des QCM de compétences

Document de validation par des spécialistes – classé par poste · 8 octobre 2026

180

questions d'entretien
IA

48

compétences

961

questions de QCM

28

postes

Consignes aux relecteurs

Pour chaque question, cochez « **Validée** » ou « **À corriger** » et indiquez votre remarque (formulation, exactitude médicale, bonne réponse, distracteurs trop faciles ou ambigus, adaptation au contexte tunisien). Dans les QCM, la bonne réponse est signalée en **vert** ✓ ; les trois autres choix sont des distracteurs qui doivent être clairement faux. Une compétence partagée entre plusieurs métiers n'est détaillée qu'une seule fois (un renvoi est indiqué).

Point de vigilance : dans de nombreuses questions, la bonne réponse est aussi la plus longue ou la plus détaillée, ce qui peut aider un candidat à deviner. N'hésitez pas à proposer des distracteurs plus crédibles ou une bonne réponse plus courte.

1. Partie 1 – Entretien IA (communication), par famille de postes
2. Partie 2 – QCM de compétences : tronc commun puis familles de métiers
3. Annexe – Correspondance poste → questions

Nom du relecteur	Spécialité / fonction	Date et signature

Partie 1 – Entretien IA (communication)

Chaque entretien comporte 5 questions orales : 3 questions générales tirées au hasard et 2 questions propres au métier. La question est lue par une voix féminine puis le candidat répond à l'oral (2 minutes maximum), sans temps de préparation. L'IA évalue la clarté, la structure, l'empathie, le vocabulaire professionnel et l'adaptation à l'interlocuteur.

Questions générales tous les postes

1	Présentez-vous en quelques phrases et expliquez pourquoi vous avez choisi ce métier.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient anxieux refuse un soin. Que lui dites-vous pour le rassurer ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment annonceriez-vous un retard ou une mauvaise nouvelle à la famille d'un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Racontez une situation où vous avez dû gérer un désaccord avec un collègue. Comment l'avez-vous résolu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Comment transmettez-vous les informations importantes à l'équipe lors d'un changement de garde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un médecin vous donne une consigne qui vous semble incorrecte. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliqueriez-vous un traitement à une personne âgée qui entend mal et comprend difficilement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Décrivez une situation stressante vécue au travail et la façon dont vous avez communiqué pendant cette situation.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre un bon et un excellent soignant ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Racontez un moment de votre parcours dont vous êtes particulièrement fier ou fière.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment gérez-vous une situation où vous avez commis une erreur au travail ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un collègue est débordé et vous êtes vous-même très occupé. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment réagissez-vous lorsqu'un patient ou une famille vous parle de manière agressive ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment vous organisez-vous lorsque plusieurs patients ont besoin de vous en même temps ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Pourquoi souhaitez-vous travailler dans notre établissement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment expliquez-vous une information importante à un patient qui ne parle que l'arabe dialectal ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Un patient vous demande de garder un secret qui concerne sa santé. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment faites-vous pour rester bienveillant après une longue garde fatigante ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Décrivez une situation où vous avez dû vous adapter rapidement à un changement imprévu.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Quelles sont vos qualités et le point que vous cherchez à améliorer dans votre pratique ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins infirmiers

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) de bloc opératoire · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences · Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie · Panseur(se)

1	Expliquez à un patient, avec des mots simples, comment va se dérouler la pose de sa perfusion.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient se plaint que personne ne répond à sa sonnette. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rédigez-vous et présentez-vous une transmission ciblée à l'équipe de nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un patient vous demande pourquoi il doit prendre autant de médicaments. Que lui expliquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient diabétique refuse son injection d'insuline. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment annoncez-vous au médecin de garde l'aggravation de l'état d'un patient pendant la nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La famille d'un patient vous demande des informations sur son diagnostic. Que leur répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un patient âgé confus veut quitter le service en pleine nuit. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient les signes qui doivent l'alerter après sa sortie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment présentez-vous les soins de la journée à un patient qui vient d'arriver dans le service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Un patient se plaint d'une douleur que vous trouvez exagérée. Comment communiquez-vous avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Vous remarquez qu'un collègue n'a pas respecté le protocole d'hygiène. Comment lui en parlez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment expliquez-vous la préparation d'une intervention chirurgicale à un patient inquiet ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un enfant hospitalisé a peur de la prise de sang. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	Comment réagissez-vous lorsqu'un patient vous remercie ou vous offre un cadeau ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Aux urgences, une famille réclame d'être prise en charge avant les autres. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment accompagnez-vous un patient qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment éduquez-vous un patient à surveiller lui-même sa tension ou sa glycémie à domicile ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient refuse de rester allongé après son examen. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment travaillez-vous en équipe avec l'aide-soignante pendant une garde chargée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

1	Une future maman très inquiète vous demande si son accouchement va bien se passer. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliqueriez-vous les premiers gestes de l'allaitement à une jeune mère fatiguée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le conjoint s'énerve en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous à une patiente les signes qui doivent la faire venir à la maternité ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une femme enceinte refuse une échographie de contrôle. Comment abordez-vous ses réticences ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment annoncez-vous à un couple qu'une césarienne en urgence est nécessaire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une jeune mère pleure souvent depuis la naissance. Comment l'accompagnez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment expliquez-vous les différentes méthodes de soulagement de la douleur pendant le travail ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une patiente souhaite accoucher sans péridurale. Comment l'accompagnez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment donnez-vous les conseils de sortie à une maman qui rentre à domicile avec son bébé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Une famille insiste pour être nombreuse en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment expliquez-vous à une adolescente enceinte le suivi de sa grossesse ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13	Une maman ne parvient pas à allaiter et se sent coupable. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment présentez-vous les vaccins du nouveau-né aux parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment parlez-vous de contraception après l'accouchement avec une patiente ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Une patiente présente des signes de prééclampsie. Comment l'informez-vous sans l'affoler ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment transmettez-vous les informations sur une naissance difficile à l'équipe de suites de couches ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une patiente vous confie des violences de la part de son conjoint. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment accompagnez-vous des parents dont le bébé doit être transféré en néonatalogie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment expliquez-vous à un couple l'importance du peau-à-peau après la naissance ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

1	Un patient a peur de l'anesthésie générale. Comment le rassurez-vous avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment communiquez-vous avec le médecin anesthésiste lors d'une complication au bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Expliquez au patient ce qu'il va ressentir au réveil de l'anesthésie.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous à un patient pourquoi il doit être à jeun avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient vous dit qu'il a mangé ce matin alors qu'il est au bloc. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment présentez-vous la rachianesthésie à un patient qui a peur de la piqûre dans le dos ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment rassurez-vous un enfant et ses parents avant une anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment réalisez-vous la check-list de sécurité avec l'équipe du bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Un chirurgien vous presse de commencer alors qu'une vérification n'est pas faite. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment transmettez-vous les informations sur un patient à l'équipe de la salle de réveil ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Un patient se réveille agité et désorienté. Comment lui parlez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment expliquez-vous l'utilisation de la pompe à morphine à un patient opéré ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment signalez-vous un incident survenu pendant l'anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient vous demande s'il risque de se réveiller pendant l'opération. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment communiquez-vous avec un patient sourd ou malentendant avant l'induction ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment réagissez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec le choix d'un médecin anesthésiste ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	En réanimation, comment informez-vous la famille sur l'état d'un patient intubé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment accueillez-vous un patient qui arrive au bloc en urgence et très angoissé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment formez-vous un nouveau collègue à la préparation du poste d'anesthésie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Un patient âgé ne comprend pas bien les consignes de la salle de réveil. Comment vous adaptez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie) · Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale · Technicien(ne) de laboratoire PMA · Préparateur(trice) en pharmacie · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation · Agent(e) de stérilisation

1	Un patient demande le résultat de son examen avant que le médecin ne l'ait vu. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous la préparation nécessaire avant un examen à un patient qui ne parle pas bien français ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Vous constatez une erreur d'étiquetage sur un prélèvement. Comment le signalez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous le déroulement d'une IRM à un patient claustrophobe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient refuse de retirer ses bijoux avant l'examen. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment présentez-vous les risques d'une injection de produit de contraste au patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un patient se plaint du temps d'attente au laboratoire. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8	Comment informez-vous un médecin d'un résultat d'analyse très anormal ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient la façon de recueillir correctement ses urines ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une mère inquiète accompagne son enfant pour une radiographie. Comment la rassurez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment réagissez-vous si un collègue ne respecte pas les règles de radioprotection ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient pense que la radiographie est dangereuse et refuse l'examen. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment expliquez-vous la préparation de la stérilisation à un nouvel agent de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Au bloc, un chirurgien vous reproche qu'un instrument manque dans la boîte. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment donnez-vous les consignes de prise d'un médicament à un patient au comptoir de la pharmacie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un patient demande si son médicament générique est aussi efficace. Que lui expliquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment informez-vous un couple sur le déroulement d'une ponction ovocytaire ou d'un transfert d'embryon ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment signalez-vous une panne d'appareil qui retarde les examens de la journée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient vous demande de lui interpréter ses résultats. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment travaillez-vous avec les services de soins pour éviter les prélèvements non conformes ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Rééducation et nutrition

Postes concernés : Kinésithérapeute · Diététicien(ne) / Nutritionniste

1	Un patient découragé ne veut plus faire ses exercices de rééducation. Comment le motivez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous les objectifs d'une séance à un enfant et à ses parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rendez-vous compte de l'évolution d'un patient au médecin prescripteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment expliquez-vous l'intérêt des exercices à faire à domicile entre les séances ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient âgé a peur de tomber et refuse de marcher. Comment l'encouragez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

6	Comment adaptez-vous vos explications pour un patient qui a des troubles de la mémoire ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un patient vous demande quand il pourra reprendre le sport. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment fixez-vous des objectifs réalistes avec un patient très ambitieux ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment expliquez-vous à un patient diabétique les changements à apporter à son alimentation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient ne suit pas les conseils nutritionnels que vous lui avez donnés. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment présentez-vous un régime alimentaire à une famille qui cuisine pour le patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient a mal pendant la séance. Comment communiquez-vous avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment travaillez-vous avec l'équipe soignante pour la mobilisation d'un patient hospitalisé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment expliquez-vous les techniques de respiration à un patient essoufflé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Un patient se compare à un autre qui progresse plus vite. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment annoncez-vous à un patient que ses progrès seront plus lents que prévu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment expliquez-vous à un enfant pourquoi il doit porter son attelle ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Un patient arrive systématiquement en retard à ses séances. Comment abordez-vous le sujet ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment rendez-vous la séance motivante pour un patient déprimé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment présentez-vous votre bilan de fin de prise en charge au patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide-soignant(e) et auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

1	Une personne âgée refuse sa toilette ce matin. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment signalez-vous à l'infirmière un changement inquiétant chez un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un patient vous confie qu'il se sent seul. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Comment aidez-vous un patient à manger sans lui faire perdre son autonomie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient vous demande de l'aider à se lever alors que le médecin a prescrit le repos au lit. Que faites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment réagissez-vous si un patient vous fait des remarques déplacées pendant un soin ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment préservez-vous la pudeur d'un patient pendant sa toilette ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La famille d'un patient se plaint que son proche n'a pas été changé. Comment répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment accompagnez-vous un patient en fin de vie et sa famille ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un patient refuse de boire alors qu'il fait très chaud. Comment le convainquez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment expliquez-vous à un patient la nécessité de changer de position régulièrement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un enfant hospitalisé pleure et réclame ses parents. Comment le réconfortez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Comment travaillez-vous avec l'infirmière pour organiser les soins du matin ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient tombe dans sa chambre. Que faites-vous et comment l'expliquez-vous à l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment accueillez-vous un nouveau patient qui arrive dans le service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un patient âgé ne vous reconnaît pas et devient agité. Comment le calmez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Comment réagissez-vous lorsqu'un collègue manque de respect envers un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment expliquez-vous à une maman les gestes de soin de son nouveau-né ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient vous confie qu'il a peur de mourir. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment transmettez-vous vos observations de la journée à l'équipe suivante ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Encadrement (surveillant·e·s)

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit · Surveillant(e) de bloc opératoire · Surveillant(e) de radiologie

1	Un membre de votre équipe arrive régulièrement en retard. Comment abordez-vous la situation avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--	--

2	Comment annoncez-vous à votre équipe un changement d'organisation qui ne plaît pas à tout le monde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une famille se plaint de la qualité des soins dans le service. Comment la recevez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment accueillez-vous et intégrez-vous un nouveau soignant dans votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Deux membres de votre équipe sont en conflit. Comment intervenez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment organisez-vous le planning lorsqu'un soignant est absent au dernier moment ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un soignant commet une erreur de médicament. Comment réagissez-vous avec lui et avec l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Comment présentez-vous un nouveau protocole à une équipe réticente au changement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment repérez-vous et accompagnez-vous un soignant qui montre des signes d'épuisement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Comment menez-vous l'entretien annuel d'évaluation d'un membre de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La direction vous demande de réduire les heures supplémentaires. Comment l'annoncez-vous à l'équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Comment valorisez-vous le travail de votre équipe auprès de la direction ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un médecin se plaint régulièrement de votre équipe. Comment gérez-vous cette relation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Comment organisez-vous la continuité des soins pendant la nuit dans plusieurs services ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Comment animez-vous une réunion de service pour qu'elle soit utile et courte ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment réagissez-vous lorsqu'un événement indésirable grave survient dans votre service ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un soignant expérimenté refuse d'encadrer les stagiaires. Comment abordez-vous la question ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment gérez-vous une plainte écrite d'un patient contre un soignant de votre équipe ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Comment préparez-vous votre service à une visite de certification ou à un audit qualité ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Comment répartissez-vous les patients entre les soignants lors d'une journée très chargée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e) · Ambulancier(ère)

1	Un patient attend depuis longtemps et s'énerve à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous à un patient les documents à fournir pour son dossier ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un appel urgent arrive pendant que vous renseignez une famille. Comment gérez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Comment accueillez-vous un patient qui arrive pour la première fois dans l'établissement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un patient demande à voir le médecin immédiatement sans rendez-vous. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Comment répondez-vous au téléphone lorsqu'un appelant demande des informations sur un patient hospitalisé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliquez-vous à un patient les tarifs et les modalités de paiement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un patient ne comprend pas pourquoi sa prise en charge par l'assurance est refusée. Comment l'aidez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Comment gérez-vous un agenda de rendez-vous lorsque le médecin a un empêchement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une personne âgée ne retrouve pas son rendez-vous. Comment l'aidez-vous avec patience ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Comment réagissez-vous si un patient vous demande de modifier une date sur un document ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Au cabinet dentaire, un enfant a peur et refuse d'entrer. Comment aidez-vous les parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Pendant un transport sanitaire, comment rassurez-vous un patient angoissé ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	En ambulance, comment transmettez-vous les informations sur le patient à l'équipe des urgences ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Une famille veut monter dans l'ambulance alors qu'il n'y a pas de place. Que leur dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Comment présentez-vous l'établissement et ses services à un visiteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un patient mécontent publie un avis négatif et vient en parler à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Comment protégez-vous la confidentialité des patients dans une salle d'attente pleine ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Comment travaillez-vous avec les soignants pour réduire le temps d'attente des patients ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient arrive très en retard à son rendez-vous. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Partie 2 – QCM de compétences

Chaque QCM tire au hasard 5 compétences (celles du métier et du tronc commun) et 3 questions par compétence, soit 15 questions de 30 secondes. Une compétence est validée avec 3 bonnes réponses sur 3. Les 4 choix sont mélangés à l'écran : la **bonne réponse** est indiquée ici en vert (choix A dans ce document).

Tronc commun tous les postes

Hygiène et prévention des infections 20 questions

1 Quelle est la mesure la plus efficace pour prévenir les infections associées aux soins ?

- A. L'hygiène des mains ✓ **bonne réponse**
- B. Le port permanent de gants
- C. L'antibiothérapie préventive systématique
- D. Le changement quotidien de blouse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Combien de temps dure une friction hydro-alcoolique des mains correctement réalisée ?

- A. Environ 20 à 30 secondes ✓ **bonne réponse**
- B. 5 secondes
- C. 2 minutes
- D. 5 minutes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Dans quel cas la friction hydro-alcoolique ne suffit pas et un lavage des mains au savon est nécessaire ?

- A. Mains visiblement souillées ou contact avec un patient atteint de Clostridioides difficile ✓ **bonne réponse**
- B. Avant tout contact avec un patient
- C. Après avoir retiré des gants propres
- D. Avant une injection intramusculaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Après utilisation, une aiguille doit être :

- A. Jetée immédiatement, sans la recapuchonner, dans un collecteur pour objets piquants-coupants ✓ **bonne réponse**
- B. Recapuchonnée à deux mains puis jetée
- C. Jetée dans le sac à déchets ménagers
- D. Posée sur le plateau jusqu'à la fin du soin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Que faire en premier après une piqûre accidentelle avec une aiguille souillée ?

- A. Ne pas faire saigner, nettoyer à l'eau et au savon, rincer puis désinfecter (au moins 5 minutes), puis déclarer l'accident ✓ **bonne réponse**
- B. Faire saigner fortement la plaie en pressant
- C. Appliquer de l'alcool à 70° pendant 5 secondes et reprendre le travail
- D. Attendre la fin de la garde pour consulter

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Les précautions « standard » s'appliquent :	A. À tous les patients, quel que soit leur statut infectieux ✓ bonne réponse B. Uniquement aux patients infectés connus C. Uniquement en réanimation D. Uniquement au bloc opératoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Quelle tenue est recommandée pour les mains d'un soignant ?	A. Ongles courts, sans vernis ni bijoux aux mains et aux poignets ✓ bonne réponse B. Montre autorisée si elle est propre C. Alliance et bracelet tolérés en permanence D. Faux ongles autorisés s'ils sont courts	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Les gants à usage unique doivent être :	A. Changés entre deux patients et entre deux soins chez le même patient si nécessaire ✓ bonne réponse B. Gardés pour toute la tournée C. Lavés à la solution hydro-alcoolique entre deux patients D. Portés en permanence dans le couloir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Dans quelle poubelle jette-t-on des compresses souillées de sang ?	A. Le circuit des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) ✓ bonne réponse B. Les ordures ménagères C. Le tri sélectif du papier D. Le collecteur à verre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les précautions « contact » (patient porteur de bactérie multirésistante) comprennent notamment :	A. Hygiène des mains renforcée et tablier ou surblouse pour les soins rapprochés ✓ bonne réponse B. Le port d'un masque FFP2 par le patient uniquement C. Aucune mesure particulière D. L'interdiction de toute visite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Les précautions « gouttelettes » (grippe par exemple) imposent surtout :	A. Le port d'un masque chirurgical par le soignant à proximité du patient ✓ bonne réponse B. Le port de bottes C. Des gants stériles D. Un tablier plombé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La tuberculose pulmonaire contagieuse relève des précautions :	A. « Air », avec un masque FFP2 pour le soignant et une chambre porte fermée ✓ bonne réponse B. « Contact » uniquement C. Standard seulement D. Aucune, elle n'est pas transmissible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Avant d'entrer dans la chambre d'un patient en précautions complémentaires, il faut : A. Lire la signalétique et appliquer les mesures indiquées ✓ bonne réponse B. Attendre que le patient sorte C. Porter systématiquement une tenue stérile D. Demander au patient quelles mesures appliquer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les surfaces proches du patient (barrières de lit, adaptable) doivent être : A. Nettoyées et désinfectées régulièrement selon le protocole ✓ bonne réponse B. Nettoyées une fois par mois C. Laisser en l'état pour ne pas déranger D. Désinfectées uniquement à la sortie du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le masque chirurgical est efficace pendant environ : A. Quelques heures (en général 4 h) ; il doit être changé s'il est humide ou souillé ✓ bonne réponse B. Une semaine C. Toute la garde de 24 h sans changement D. Il n'a pas de durée limite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un soignant qui a de la fièvre et une toux doit : A. Le signaler et suivre la procédure de l'établissement (masque, avis médical, éviction si nécessaire) ✓ bonne réponse B. Venir travailler sans rien dire C. Prendre un antibiotique sans avis D. Retirer son masque pour mieux respirer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 L'antiseptique doit être appliqué : A. Sur une peau propre, en respectant le temps de séchage ✓ bonne réponse B. Sur une peau souillée, sans nettoyage préalable C. Mélangé à un autre antiseptique pour plus d'efficacité D. Puis essuyé immédiatement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le collecteur à objets piquants-coupants doit être fermé : A. Lorsqu'il atteint la limite de remplissage indiquée ✓ bonne réponse B. Uniquement lorsqu'il déborde C. Jamais D. Chaque heure, même vide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La vaccination recommandée en priorité pour les soignants exposés au sang est celle contre : A. L'hépatite B ✓ bonne réponse B. La rage C. La fièvre jaune D. Le choléra	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Quel est le rôle principal de la tenue professionnelle (blouse, pyjama) ?

- A. Protéger le patient et le soignant ; elle ne se porte pas en dehors de l'établissement ✓ **bonne réponse**
- B. Être portée aussi dans les transports en commun
- C. Remplacer l'hygiène des mains
- D. Être changée une fois par mois

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Gestes d'urgence 20 questions

1 Face à un adulte inconscient qui ne respire pas normalement, quel est le rythme des compressions thoraciques ?

- A. 100 à 120 compressions par minute ✓ **bonne réponse**
- B. 60 compressions par minute
- C. 150 à 180 compressions par minute
- D. 30 compressions par minute

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Chez l'adulte, quel est le rapport compressions / insufflations lors de la réanimation cardio-pulmonaire ?

- A. 30 compressions pour 2 insufflations ✓ **bonne réponse**
- B. 15 pour 2
- C. 5 pour 1
- D. 10 pour 1

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quelle est la profondeur recommandée des compressions thoraciques chez l'adulte ?

- A. Environ 5 cm (sans dépasser 6 cm) ✓ **bonne réponse**
- B. Environ 1 à 2 cm
- C. Environ 8 à 10 cm
- D. Aussi profond que possible

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une victime inconsciente qui respire normalement doit être placée :

- A. En position latérale de sécurité ✓ **bonne réponse**
- B. Assise
- C. Sur le dos, jambes surélevées, sans surveillance
- D. Sur le ventre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Face à une hémorragie externe importante, le premier geste est :

- A. La compression directe de la plaie ✓ **bonne réponse**
- B. La pose immédiate d'un garrot sur toute plaie
- C. La surélévation du membre uniquement
- D. L'application de glace

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un adulte conscient s'étouffe et ne peut plus parler ni tousser. Que faire en premier ?

- A. Jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis jusqu'à 5 compressions abdominales si besoin ✓ **bonne réponse**
- B. Le faire boire de l'eau
- C. Le coucher sur le dos et attendre
- D. Commencer immédiatement le bouche-à-bouche

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Quel est le numéro de la Protection civile en Tunisie ? A. 198 ✓ bonne réponse B. 190 C. 197 D. 193	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Dans la chaîne de survie, que faire dès qu'on constate un arrêt cardiaque ? A. Alerter, commencer le massage cardiaque et faire chercher un défibrillateur ✓ bonne réponse B. Attendre l'arrivée du médecin avant tout geste C. Donner à boire à la victime D. Mettre la victime en position assise	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Le défibrillateur automatisé externe (DAE) : A. Peut être utilisé par toute personne, en suivant les instructions vocales ✓ bonne réponse B. Est réservé aux médecins C. Ne doit jamais être utilisé sur une personne inconsciente D. Remplace le massage cardiaque	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Pendant l'analyse du rythme par le défibrillateur, il faut : A. Ne pas toucher la victime ✓ bonne réponse B. Continuer le massage C. Ventiler la victime D. Retirer les électrodes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Où place-t-on les mains pour le massage cardiaque chez l'adulte ? A. Au milieu du thorax, sur la moitié inférieure du sternum ✓ bonne réponse B. Sur le ventre C. Sur le côté gauche de la poitrine D. Sur le cou	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Pour libérer les voies aériennes d'une victime inconsciente, on : A. Bascule prudemment la tête en arrière et élève le menton ✓ bonne réponse B. Penche la tête en avant C. Met un oreiller sous la tête D. Fait boire la victime	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Signes évocateurs d'un accident vasculaire cérébral : A. Déformation de la bouche, faiblesse d'un bras, trouble de la parole ✓ bonne réponse B. Démangeaisons des jambes C. Fièvre isolée D. Toux grasse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14	Devant des signes d'AVC, la conduite à tenir est :	A. Alerter immédiatement les secours en notant l'heure de début des signes ✓ bonne réponse B. Attendre le lendemain C. Donner un comprimé d'aspirine sans avis médical D. Faire marcher la personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Une douleur thoracique serrant la poitrine et irradiant dans le bras gauche doit faire évoquer :	A. Un infarctus du myocarde ✓ bonne réponse B. Une entorse C. Une indigestion banale sans gravité D. Une crise d'angoisse uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Choc anaphylactique : quel médicament est le traitement d'urgence de référence ?	A. L'adrénaline (selon prescription / protocole) ✓ bonne réponse B. Le paracétamol C. L'insuline D. Un antibiotique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Une victime de brûlure thermique étendue récente : premier geste ?	A. Refroidir à l'eau tempérée (environ 15 à 25 °C) pendant une vingtaine de minutes, puis alerter ✓ bonne réponse B. Appliquer du beurre ou de l'huile C. Percer les cloques D. Mettre de la glace directement sur la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une personne fait une crise convulsive. Il faut :	A. Écarter les objets dangereux, ne pas la maintenir de force, puis la mettre en PLS ✓ bonne réponse B. Lui mettre une cuillère dans la bouche C. La maintenir fermement au sol D. Lui donner à boire pendant la crise	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Hypoglycémie chez une personne inconsciente : que ne faut-il PAS faire ?	A. Lui donner du sucre par la bouche ✓ bonne réponse B. La mettre en position latérale de sécurité C. Alerter les secours D. Surveiller sa respiration	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Pour un nourrisson en arrêt cardiaque, les compressions thoraciques se font :	A. Avec deux doigts (ou les deux pouces) sur le sternum ✓ bonne réponse B. Avec les deux mains superposées comme chez l'adulte C. Sur le ventre D. Avec le poing	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Avant tout soin ou administration d'un traitement, l'identité du patient se vérifie : A. En lui demandant de décliner ses nom, prénom et date de naissance et en contrôlant le bracelet ✓ bonne réponse B. En lisant le numéro de la chambre C. En lui demandant simplement « Vous êtes bien M. X ? » D. En se fiant au lit occupé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 La règle des « 5 B » de l'administration médicamenteuse vise à donner : A. Le bon médicament, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment, au bon patient ✓ bonne réponse B. Le médicament le moins cher au bon moment C. Le bon médicament au bon service D. Le bon traitement uniquement le matin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quelle mesure réduit le risque de chute d'un patient hospitalisé ? A. Lit en position basse, sonnette et objets usuels à portée de main ✓ bonne réponse B. Contention systématique de tous les patients âgés C. Barrières de lit relevées pour tous les patients D. Éclairage éteint la nuit dans toute la chambre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Vous découvrez une erreur d'administration d'un médicament. Que faites-vous ? A. Surveiller le patient, prévenir immédiatement le médecin et déclarer l'événement indésirable ✓ bonne réponse B. Ne rien dire si le patient va bien C. Corriger le dossier sans informer personne D. Attendre la visite du lendemain pour en parler	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Lors d'une transmission orale d'une prescription urgente, la bonne pratique est : A. Répéter la prescription à voix haute pour la faire confirmer, puis la faire tracer par écrit ✓ bonne réponse B. La mémoriser sans la répéter C. La noter sur un papier libre que l'on jette après D. Attendre la fin de la garde pour la noter	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le bracelet d'identification d'un patient hospitalisé doit être posé : A. Dès l'admission et vérifié avant chaque acte ✓ bonne réponse B. Uniquement avant un passage au bloc C. Uniquement si le patient est confus D. À la demande du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Que signifie le mot « identitovigilance » ? A. La surveillance et la prévention des erreurs d'identification des patients ✓ bonne réponse B. La vérification des badges du personnel C. Le contrôle des visiteurs D. La sécurité informatique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Deux patients ont le même nom dans le service. Que faire ? A. Signaler le risque (alerte homonymie) et renforcer les vérifications d'identité ✓ bonne réponse B. Les mettre dans la même chambre C. Utiliser seulement le numéro de chambre D. Ne rien faire de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Avant une transfusion sanguine, le contrôle ultime au lit du patient vérifie : A. La concordance entre l'identité du patient, la prescription et le produit sanguin, et la compatibilité ✓ bonne réponse B. Uniquement la date de péremption C. Uniquement le groupe du soignant D. Rien, le laboratoire l'a déjà fait	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les médicaments « à haut risque » (insuline, potassium injectable, anticoagulants...) nécessitent : A. Une vigilance renforcée et un double contrôle selon le protocole ✓ bonne réponse B. Aucune précaution particulière C. Un stockage avec les autres médicaments sans distinction D. Une préparation par le patient lui-même	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Une prescription médicale illisible doit être : A. Clarifiée avec le prescripteur avant toute administration ✓ bonne réponse B. Interprétée au mieux C. Ignorée D. Lue par un collègue qui devine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Quel facteur augmente le risque de chute d'un patient âgé ? A. La prise de somnifères ou de sédatifs ✓ bonne réponse B. Un éclairage suffisant C. Des chaussures fermées et adaptées D. Une sonnette à portée de main	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient tombe de son lit. Que faire en premier ? A. Évaluer son état et le sécuriser, prévenir le médecin, puis déclarer l'événement ✓ bonne réponse B. Le remettre au lit sans rien dire C. Attendre le lendemain D. Le laisser au sol jusqu'à la relève	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La contention physique d'un patient : A. Nécessite une prescription médicale, une surveillance régulière et une réévaluation ✓ bonne réponse B. Peut être décidée par n'importe quel soignant sans traçabilité C. Est toujours la première solution contre les chutes D. Ne demande aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	Pourquoi déclarer un événement indésirable même sans conséquence (« presque accident ») ?	A. Pour analyser les causes et éviter qu'il se reproduise avec des conséquences ✓ bonne réponse B. Pour sanctionner un collègue C. Ce n'est pas utile D. Pour remplir des statistiques sans suite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Avant de préparer un médicament injectable, il faut vérifier :	A. L'identité du patient, le médicament, la dose, la voie, l'heure et la date de péremption ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur du produit C. Uniquement le nom du patient D. Rien si le médicament est habituel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un patient signale une allergie à la pénicilline. Le soignant doit :	A. La noter clairement dans le dossier et la signaler, avant toute prescription ✓ bonne réponse B. L'ignorer si le patient ne se souvient pas de la réaction C. Attendre une réaction pour la noter D. La transmettre uniquement oralement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Les escarres, les chutes et les erreurs médicamenteuses sont des exemples de :	A. Risques liés aux soins que l'on peut prévenir ✓ bonne réponse B. Événements inévitables C. Maladies infectieuses D. Problèmes administratifs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	La méthode de communication SAED (ou SBAR) sert à :	A. Transmettre une information structurée sur un patient (situation, antécédents, évaluation, demande) ✓ bonne réponse B. Calculer une dose C. Classer les déchets D. Évaluer la douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Lors d'un transfert entre services, la sécurité du patient repose surtout sur :	A. Une transmission complète des informations et des documents ✓ bonne réponse B. La rapidité du brancardage uniquement C. Le bavardage avec le patient D. Le transfert sans dossier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Éthique et secret professionnel 20 questions

1	Le secret professionnel s'applique :	A. À toutes les informations apprises, vues ou comprises dans l'exercice de la profession ✓ bonne réponse B. Uniquement au diagnostic médical C. Uniquement pendant les heures de service D. Uniquement aux médecins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---	---	---

2 Un voisin du patient vous téléphone pour connaître son diagnostic. Que répondez-vous ? A. Vous ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse B. Vous donnez le diagnostic s'il connaît bien le patient C. Vous donnez seulement le nom du service D. Vous lui lisez le compte rendu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Avant un soin, le consentement du patient doit être : A. Libre et éclairé, après une information claire ✓ bonne réponse B. Obtenu uniquement pour les interventions chirurgicales C. Donné par la famille dans tous les cas D. Présumé pour tous les soins courants, sans information	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Publier sur un réseau social la photo d'un patient, même sans son nom : A. Est interdit sans son accord : cela porte atteinte à sa vie privée et au secret ✓ bonne réponse B. Est autorisé si le visage est flou C. Est autorisé si le compte est privé D. Est autorisé après sa sortie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Un patient majeur et lucide refuse un soin après avoir été informé. Que faire ? A. Respecter son refus, le réinformer des risques, prévenir le médecin et tracer le refus ✓ bonne réponse B. Réaliser le soin malgré tout C. Demander à la famille de signer à sa place D. Le sortir immédiatement du service	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le secret professionnel s'impose : A. À tous les professionnels de santé et au personnel de l'établissement ✓ bonne réponse B. Uniquement aux médecins C. Uniquement au service de psychiatrie D. Uniquement pendant l'hospitalisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le secret professionnel cesse-t-il après la mort du patient ? A. Non, il continue après le décès ✓ bonne réponse B. Oui, immédiatement C. Oui, après un an D. Oui, si la famille le demande oralement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un employeur appelle pour savoir pourquoi son salarié est hospitalisé. Vous : A. Ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse B. Donnez le diagnostic C. Lisez le dossier D. Confirmez seulement la maladie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	Dans un ascenseur avec des visiteurs, deux collègues parlent d'un patient par son nom. C'est : A. Une atteinte au secret professionnel ✓ bonne réponse B. Acceptable si le ton est bas C. Sans importance D. Recommandé pour gagner du temps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le dossier médical d'un patient peut être consulté : A. Par les professionnels qui participent à sa prise en charge ✓ bonne réponse B. Par tout le personnel de l'établissement C. Par les visiteurs avec l'accord d'un soignant D. Par les collègues curieux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La bientraitance consiste notamment à : A. Respecter la dignité, l'intimité et les choix du patient ✓ bonne réponse B. Faire les soins le plus vite possible sans expliquer C. Tutorer tous les patients D. Décider à la place du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un soignant constate qu'un collègue maltraite un patient âgé. Il doit : A. Protéger le patient et signaler les faits à sa hiérarchie ✓ bonne réponse B. Ne rien dire par solidarité C. En parler sur les réseaux sociaux D. Attendre que cela se reproduise	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Quand un patient mineur est hospitalisé, l'information et le consentement concernent : A. Ses représentants légaux, tout en associant l'enfant selon sa maturité ✓ bonne réponse B. Uniquement l'enfant C. Uniquement le médecin D. Aucune personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Le respect de la pudeur pendant un soin passe par : A. Une porte fermée, un paravent et le fait de ne découvrir que la zone nécessaire ✓ bonne réponse B. Une porte ouverte pour la surveillance C. La présence de tous les étudiants D. Le fait de ne pas prévenir le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Un patient demande à lire son dossier. En principe : A. Il a le droit d'accéder aux informations le concernant, selon la procédure de l'établissement ✓ bonne réponse B. C'est toujours interdit C. Il doit passer par un avocat D. Seule sa famille peut le lire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Accepter un cadeau important (argent) d'un patient :

- A. Est à éviter : cela peut créer une dépendance ou un conflit d'intérêts ✓ **bonne réponse**
- B. Est recommandé
- C. Est obligatoire par politesse
- D. Est sans conséquence

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Le principe de non-discrimination impose de soigner :

- A. Tous les patients avec la même qualité, quelles que soient leur origine, leur religion ou leur situation ✓ **bonne réponse**
- B. En priorité les patients qui paient plus
- C. Uniquement les patients de sa région
- D. Selon ses préférences personnelles

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Annoncer un diagnostic grave au patient relève :

- A. Du médecin ; le soignant accompagne et soutient le patient ✓ **bonne réponse**
- B. De l'aide-soignant de nuit
- C. De la famille uniquement
- D. Du secrétariat

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Le droit à l'information du patient signifie qu'il doit recevoir :

- A. Une information claire, loyale et adaptée sur son état et ses soins ✓ **bonne réponse**
- B. Une information uniquement écrite en latin
- C. Aucune information pour ne pas l'inquiéter
- D. Une information seulement à sa sortie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Photographier une plaie pour le dossier de soins nécessite :

- A. L'accord du patient et un appareil autorisé par l'établissement ✓ **bonne réponse**
- B. Un téléphone personnel et un partage dans un groupe de discussion
- C. Aucune précaution
- D. Une publication sur internet

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Infirmier(ère)

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences

Préparation et administration des médicaments 21 questions

1 Prescription : 500 mg d'un antibiotique. Le flacon contient 1 g à diluer dans 10 mL. Quel volume prélever ?

- A. 5 mL ✓ **bonne réponse**
- B. 2 mL
- C. 10 mL
- D. 0,5 mL

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2	Prescription : 1 000 mL de sérum en 8 heures avec un perfuseur standard (20 gouttes/mL). Quel débit régler ? A. Environ 42 gouttes/min ✓ bonne réponse B. Environ 21 gouttes/min C. Environ 125 gouttes/min D. Environ 8 gouttes/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une seringue électrique doit délivrer 48 mL en 24 heures. Quel débit programmer ? A. 2 mL/h ✓ bonne réponse B. 4 mL/h C. 0,5 mL/h D. 24 mL/h	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Combien de microgrammes y a-t-il dans 1 milligramme ? A. 1 000 µg ✓ bonne réponse B. 10 µg C. 100 µg D. 1 000 000 µg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le chlorure de potassium (KCl) concentré : A. Ne s'injecte jamais en intraveineuse directe : il doit être dilué et perfusé lentement ✓ bonne réponse B. S'injecte en IV directe rapide en cas d'hypokaliémie C. S'administre uniquement en sous-cutané D. Peut être injecté pur dans la tubulure	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un médicament prescrit « per os » s'administre : A. Par la bouche ✓ bonne réponse B. Par voie intraveineuse C. Par voie sous-cutanée D. Par voie rectale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Prescription : 1 g de paracétamol. Les comprimés sont dosés à 500 mg. Combien en donner ? A. 2 comprimés ✓ bonne réponse B. 1 comprimé C. 4 comprimés D. Un demi-comprimé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Une ampoule de 10 mL contient 20 mg de produit. Quelle est la concentration ? A. 2 mg/mL ✓ bonne réponse B. 20 mg/mL C. 0,5 mg/mL D. 200 mg/mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Prescription : 250 mL en 2 heures à la seringue ou à la pompe. Quel débit programmer ? A. 125 mL/h ✓ bonne réponse B. 250 mL/h C. 50 mL/h D. 500 mL/h	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Combien de milligrammes y a-t-il dans 1 gramme ? A. 1 000 mg ✓ bonne réponse B. 100 mg C. 10 mg D. 10 000 mg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La voie sous-cutanée (SC) correspond à une injection : A. Dans le tissu sous la peau (ventre, cuisse, bras) ✓ bonne réponse B. Dans une veine C. Dans un muscle profond D. Dans la peau superficielle seulement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 L'injection intramusculaire chez l'adulte se fait de préférence : A. Dans le quadrant supéro-externe de la fesse ou la face latérale de la cuisse ✓ bonne réponse B. Dans le pli du coude C. Dans le ventre autour du nombril D. Dans la face interne du poignet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un médicament reconstitué doit être : A. Étiqueté (nom, dose, date et heure) et utilisé dans le délai prévu ✓ bonne réponse B. Conservé sans étiquette C. Utilisé quelle que soit la date D. Mélangé avec d'autres produits restants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les héparines de bas poids moléculaire s'injectent : A. Par voie sous-cutanée, sans purger la bulle d'air de la seringue préremplie ✓ bonne réponse B. Par voie intramusculaire C. Par voie orale D. En intraveineuse directe rapide systématiquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient sous anticoagulant présente des saignements de gencives et des hématomes. Vous : A. Prévenez le médecin, car il peut s'agir d'un surdosage ✓ bonne réponse B. Augmentez la dose C. Attendez le prochain bilan dans un mois D. Arrêtez tous les traitements sans avis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'insuline rapide doit être administrée : A. Selon la prescription, en tenant compte de la glycémie et des repas ✓ bonne réponse B. Au hasard de la journée C. Uniquement la nuit D. Toujours en intramusculaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Écraser un comprimé à libération prolongée est : A. Déconseillé : cela modifie la libération du médicament ✓ bonne réponse B. Recommandé pour tous les comprimés C. Sans conséquence D. Obligatoire chez la personne âgée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La traçabilité de l'administration d'un médicament se fait : A. Immédiatement après l'administration, par la personne qui l'a administré ✓ bonne réponse B. En fin de garde, de mémoire C. Par un collègue qui n'a pas vu le soin D. Elle n'est pas nécessaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un patient refuse son traitement. Le soignant : A. Cherche la raison, l'informe, prévient le médecin et trace le refus ✓ bonne réponse B. Le cache dans son repas C. Le force à le prendre D. Ne le note pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Morphine : quel effet indésirable surveiller en priorité ? A. La dépression respiratoire (sédation, fréquence respiratoire basse) ✓ bonne réponse B. La chute de cheveux C. L'hypertension artérielle D. La toux sèche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
21 La règle d'or face à une prescription orale non urgente est : A. Demander une prescription écrite (ou informatisée) avant d'administrer ✓ bonne réponse B. Administrer et oublier C. Faire confiance à sa mémoire D. Demander à la famille de confirmer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Pose de perfusion 20 questions

1 Combien de temps peut-on laisser en place un garrot lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique ? A. Le moins longtemps possible, idéalement moins d'une minute ✓ bonne réponse B. 5 minutes minimum C. Jusqu'à la fin de la perfusion D. 15 minutes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quel site privilégier pour un cathéter veineux périphérique chez l'adulte ? A. L'avant-bras, sur le membre non dominant de préférence ✓ bonne réponse B. Le pli du coude en première intention C. Une veine du membre inférieur D. Le bras porteur d'une fistule artério-veineuse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Quel signe doit faire suspecter une extravasation (diffusion) au point de perfusion ? A. Gonflement, peau froide et pâle, douleur, ralentissement du débit ✓ bonne réponse B. Reflux de sang dans la tubulure C. Débit qui augmente D. Peau chaude et rouge le long de la veine sans gonflement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Rougeur, chaleur et cordon induré le long de la veine perfusée évoquent : A. Une phlébite ✓ bonne réponse B. Une hypoglycémie C. Une réaction allergique généralisée D. Un fonctionnement normal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Avant de brancher une perfusion, la tubulure doit être : A. Purgée afin d'en chasser tout l'air ✓ bonne réponse B. Remplie à moitié C. Laisée vide, l'air étant sans danger D. Rincée à l'alcool	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Quel est le premier geste avant de préparer le matériel de pose de cathéter ? A. Une friction hydro-alcoolique des mains ✓ bonne réponse B. Poser le garrot C. Piquer la veine D. Mettre des gants stériles sans hygiène des mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le cathéter veineux périphérique doit être réévalué : A. Chaque jour, et retiré dès qu'il n'est plus nécessaire ✓ bonne réponse B. Une fois par mois C. Jamais D. Uniquement s'il tombe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Le pansement d'un cathéter veineux périphérique doit être : A. Stérile, transparent de préférence, et refait s'il est décollé ou souillé ✓ bonne réponse B. Remplacé par un sparadrap simple non stérile C. Recouvert de coton D. Retiré pour la toilette	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Quel signe impose de retirer un cathéter veineux périphérique ? A. Douleur, rougeur, induration ou écoulement au point de ponction ✓ bonne réponse B. Un débit régulier C. Un pansement propre D. Un patient qui dort	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Où éviter de poser un cathéter veineux ? A. Sur un membre paralysé, une fistule de dialyse ou le côté d'un curage ganglionnaire axillaire ✓ bonne réponse B. Sur l'avant-bras C. Sur le dos de la main D. Sur le membre non dominant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le calibre « 18 G » par rapport au « 22 G » est : A. Plus gros ✓ bonne réponse B. Plus fin C. Identique D. Réservé aux nourrissons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Pour un remplissage rapide en urgence, on choisit un cathéter : A. De gros calibre (14 à 18 G) ✓ bonne réponse B. De très petit calibre (26 G) C. Sous-cutané D. Intramusculaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Avant de raccorder une perfusion, on vérifie : A. La prescription, le soluté, sa limpidité, la date de péremption et l'identité du patient ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur de la poche C. Uniquement le nom du médecin D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le reflux de sang dans le cathéter lors de la pose indique : A. Que le cathéter est bien dans la veine ✓ bonne réponse B. Une infection C. Une perforation de l'artère obligatoirement D. Un problème de pompe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une bulle d'air importante dans la tubulure doit être : A. Évacuée avant qu'elle n'atteigne le patient ✓ bonne réponse B. Laisse passer C. Ignorée D. Poussée rapidement dans la veine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La ligne de perfusion (tubulure) d'un soluté standard se change en général : A. Selon le protocole de l'établissement (souvent tous les 4 jours) et après les produits sanguins ou lipidiques ✓ bonne réponse B. Toutes les heures C. Jamais pendant le séjour D. Uniquement si le patient le demande	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Une perfusion ne coule plus. Que vérifier en premier ?

A. Le clamp, la position du membre, la tubulure coudée et le point de ponction

✓ bonne réponse

B. Changer immédiatement de veine sans vérifier

C. Augmenter la hauteur du lit

D. Secouer la poche

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

18 L'antisepsie de la peau avant la pose d'un cathéter se fait :

A. Avec un antiseptique alcoolique, en respectant le temps de séchage ✓

bonne réponse

B. Avec de l'eau du robinet

C. Avec de l'éther

D. Sans antisepsie

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

19 Après la pose, on note dans le dossier :

A. La date, le site, le calibre et le nom du soignant ✓

bonne réponse

B. Uniquement l'heure du repas

C. Rien

D. Seulement si le patient se plaint

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

20 Un patient perfusé présente frissons et fièvre brutale. Il faut suspecter :

A. Une infection liée au cathéter et prévenir le médecin ✓

bonne réponse

B. Une simple fatigue

C. Un effet de la météo

D. Un débit trop lent

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

Prélèvements sanguins 20 questions

1 Pour une hémoculture, la désinfection de la peau doit être :

A. Soigneuse, avec un antiseptique et un temps de séchage respecté avant la ponction ✓

bonne réponse

B. Inutile si le patient est propre

C. Réalisée après la ponction

D. Faite à l'eau uniquement

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

2 Le tube à bouchon violet (EDTA) est principalement utilisé pour :

A. La numération formule sanguine (NFS) ✓

bonne réponse

B. La glycémie

C. Le bilan d'hémostase (TP, TCA)

D. Les hémocultures

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

3 Le tube citraté (bouchon bleu) pour le bilan d'hémostase doit être :

A. Rempli jusqu'au trait de remplissage ✓

bonne réponse

B. Rempli à moitié

C. Prélevé en dernier impérativement après plusieurs tubes secs

D. Agité vigoureusement pendant une minute

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

4 Pour éviter une hémolyse lors d'un prélèvement, il faut : A. Éviter un garrot trop long et ne pas secouer les tubes ✓ bonne réponse B. Utiliser une aiguille la plus fine possible et aspirer fort C. Laisser le garrot en place plusieurs minutes D. Agiter énergiquement les tubes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Où réaliser un prélèvement sanguin chez un patient perfusé au bras droit ? A. Au bras opposé (ou en aval de la perfusion après arrêt, selon le protocole) ✓ bonne réponse B. Au-dessus de la perfusion, sur le même bras C. Directement dans la tubulure de la perfusion en cours D. Il n'y a aucune précaution particulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Quel matériel est le plus adapté pour un prélèvement veineux multiple ? A. Un système sous vide avec corps de pompe et tubes ✓ bonne réponse B. Une seringue de 50 mL pour tous les tubes C. Une lancette D. Un cathéter de 14 G	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le garrot pour une prise de sang se place : A. À quelques centimètres au-dessus du point de ponction ✓ bonne réponse B. Sur le poignet pour un prélèvement au coude C. Directement sur le point de ponction D. Sur l'autre bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les tubes doivent être étiquetés : A. Au lit du patient, immédiatement après le prélèvement ✓ bonne réponse B. Le lendemain au laboratoire C. Avant de voir le patient, pour gagner du temps, sans vérification D. Par le coursier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Après une prise de sang, on applique : A. Une compression du point de ponction, bras tendu ✓ bonne réponse B. Un massage énergique C. Un garrot serré D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le tube sec (bouchon rouge ou jaune avec gel) sert surtout à : A. La biochimie sur sérum (ionogramme, bilan hépatique...) ✓ bonne réponse B. La numération formule C. L'hémostase D. Les hémocultures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le tube à bouchon gris (fluorure) est souvent utilisé pour : A. La glycémie ✓ bonne réponse B. La NFS C. Le groupe sanguin D. La CRP en urgence uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Les hémocultures se prélèvent idéalement : A. Lors d'un pic fébrile ou de frissons, avant toute antibiothérapie ✓ bonne réponse B. Après plusieurs jours d'antibiotiques C. Uniquement le matin à jeun D. Uniquement la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour les hémocultures, on remplit en général : A. Un flacon aérobique et un flacon anaérobique ✓ bonne réponse B. Un seul tube sec C. Un tube EDTA D. Un tube citraté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient fait un malaise vagal pendant la prise de sang. Vous : A. Arrêtez le prélèvement, l'allongez jambes surélevées et surveillez ✓ bonne réponse B. Continuez rapidement C. Le faites lever D. Lui donnez un café pendant le prélèvement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le prélèvement de la gazométrie artérielle se fait habituellement : A. À l'artère radiale, après vérification de la circulation collatérale (test d'Allen) ✓ bonne réponse B. À la veine du pli du coude C. Au bout du doigt D. À la veine jugulaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La glycémie capillaire se fait de préférence : A. Sur le côté de la pulpe du doigt, mains propres et sèches ✓ bonne réponse B. Au centre du doigt avec de l'alcool encore humide C. Au lobe de l'oreille uniquement D. Sur la paume	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un hématome apparaît au point de ponction. La cause la plus fréquente est : A. Une compression insuffisante après le retrait de l'aiguille ✓ bonne réponse B. Un tube mal étiqueté C. Un patient à jeun D. Un garrot trop lâche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un bilan lipidique (cholestérol, triglycérides), le patient doit en général être : A. À jeun depuis environ 12 heures ✓ bonne réponse B. Après un repas copieux C. À jeun depuis 1 heure D. Sans précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Le transport des tubes vers le laboratoire doit se faire :

- A. Rapidement, dans un sachet adapté, avec la demande d'examen ✓ **bonne réponse**
- B. Dans la poche de la blouse jusqu'au lendemain
- C. Au soleil
- D. Sans demande d'examen

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 L'ordre de remplissage des tubes est important pour éviter :

- A. La contamination par les additifs d'un tube à l'autre ✓ **bonne réponse**
- B. Que le patient s'ennuie
- C. Une erreur de facturation
- D. Rien, il n'a aucune importance

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Surveillance des paramètres vitaux 20 questions

1 Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un adulte au repos ?

- A. 60 à 100 battements/min ✓ **bonne réponse**
- B. 40 à 50 battements/min
- C. 110 à 140 battements/min
- D. 20 à 40 battements/min

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quelle est la fréquence respiratoire normale d'un adulte au repos ?

- A. 12 à 20 cycles/min ✓ **bonne réponse**
- B. 4 à 8 cycles/min
- C. 25 à 35 cycles/min
- D. 40 à 50 cycles/min

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une saturation (SpO₂) de 85 % chez un adulte sans pathologie respiratoire chronique :

- A. Est une hypoxémie qui nécessite une prise en charge immédiate ✓ **bonne réponse**
- B. Est normale
- C. Est normale la nuit
- D. Ne nécessite qu'une nouvelle mesure le lendemain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 À partir de quelle température parle-t-on habituellement de fièvre ?

- A. 38 °C ✓ **bonne réponse**
- B. 37 °C
- C. 36,5 °C
- D. 39,5 °C

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une glycémie capillaire à 0,50 g/L (2,8 mmol/L) chez un patient diabétique correspond à :

- A. Une hypoglycémie ✓ **bonne réponse**
- B. Une glycémie normale
- C. Une hyperglycémie
- D. Une acidocétose

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Hypotension, tachycardie, pâleur et sueurs après une intervention doivent faire suspecter : A. Une hémorragie / un état de choc ✓ bonne réponse B. Une hypertension C. Un réveil normal D. Une hypothermie bénigne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une tension artérielle à 180/110 mmHg chez l'adulte est : A. Élevée : il faut contrôler et prévenir le médecin selon le protocole ✓ bonne réponse B. Normale C. Basse D. Normale après un repas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Une tension artérielle systolique inférieure à 90 mmHg chez l'adulte évoque : A. Une hypotension à signaler ✓ bonne réponse B. Une hypertension C. Une valeur normale chez tous D. Une fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Pour mesurer la tension, le brassard doit être : A. Adapté à la taille du bras, au niveau du cœur, patient au repos ✓ bonne réponse B. Le plus petit possible C. Posé sur les vêtements épais D. Placé au poignet opposé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La fréquence respiratoire se compte : A. Pendant une minute entière, sans que le patient s'en aperçoive si possible ✓ bonne réponse B. Pendant 5 secondes C. En demandant au patient de respirer fort D. Uniquement la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le score de Glasgow évalue : A. L'état de conscience (yeux, réponse verbale, réponse motrice) ✓ bonne réponse B. La douleur C. Le risque d'escarre D. La déshydratation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un score de Glasgow à 15 correspond à : A. Un patient conscient et orienté ✓ bonne réponse B. Un coma profond C. Un patient agité D. Un patient en arrêt cardiaque	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 La température normale du corps est d'environ : A. 36,5 à 37,5 °C ✓ bonne réponse B. 35 à 36 °C C. 38 à 39 °C D. 34 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une diurèse (urines) inférieure à environ 0,5 mL/kg/h chez l'adulte doit faire évoquer : A. Une oligurie à signaler ✓ bonne réponse B. Une diurèse normale C. Une polyurie D. Un diabète obligatoirement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 L'échelle numérique de la douleur va de : A. 0 (pas de douleur) à 10 (douleur maximale imaginable) ✓ bonne réponse B. 0 à 100 en degrés C. 1 à 3 D. A à E	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Une fréquence cardiaque à 130/min au repos chez l'adulte s'appelle : A. Une tachycardie ✓ bonne réponse B. Une bradycardie C. Une hypertension D. Une fréquence normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une fréquence cardiaque à 45/min chez un adulte non sportif s'appelle : A. Une bradycardie ✓ bonne réponse B. Une tachycardie C. Une tachypnée D. Une fréquence normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La saturation en oxygène (SpO2) normale chez un adulte sain est en général : A. Entre 95 et 100 % ✓ bonne réponse B. Entre 70 et 80 % C. Entre 50 et 60 % D. Toujours 85 %	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Quel facteur peut fausser la mesure de la SpO2 au doigt ? A. Des extrémités froides ou du vernis à ongles foncé ✓ bonne réponse B. La couleur des cheveux C. La taille du patient D. L'heure de la journée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les scores d'alerte précoce (type NEWS) servent à : A. Repérer tôt l'aggravation d'un patient à partir de ses paramètres vitaux ✓ bonne réponse B. Calculer les doses d'antibiotiques C. Évaluer l'autonomie D. Classer les dossiers	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Le nettoyage d'une plaie propre se fait : A. Du plus propre vers le plus sale ✓ bonne réponse B. Du plus sale vers le plus propre C. Par mouvements de va-et-vient D. Uniquement à l'alcool	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quel est le produit de première intention pour nettoyer une plaie chronique (ulcère, escarre) ? A. Sérum physiologique (ou eau et savon doux) ✓ bonne réponse B. Eau oxygénée pure C. Alcool à 90° D. Éosine aqueuse systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une escarre de stade I se caractérise par : A. Une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression, peau intacte ✓ bonne réponse B. Une plaie profonde avec os visible C. Une phlyctène ouverte D. Une nécrose noire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quels signes locaux évoquent l'infection d'une plaie ? A. Rougeur, chaleur, douleur, œdème, écoulement purulent ✓ bonne réponse B. Bourgeonnement rose et indolore C. Plaie qui se rétrécit D. Absence de douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un pansement doit être refait : A. Selon la prescription ou s'il est souillé, décollé ou mouillé ✓ bonne réponse B. Toutes les heures C. Jamais avant la sortie D. Uniquement si le patient le demande	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Une plaie chirurgicale propre et fermée est en général : A. Protégée par un pansement sec et peu manipulée les premiers jours ✓ bonne réponse B. Laisser à l'air dès la sortie du bloc dans tous les cas C. Désinfectée toutes les heures D. Massée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Un pansement hydrocolloïde est adapté : A. Aux plaies peu exsudatives en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation ✓ bonne réponse B. Aux plaies très infectées et purulentes C. Aux brûlures étendues du troisième degré D. Aux fractures ouvertes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un pansement à base d'alginate est surtout utilisé pour : A. Les plaies très exsudatives ou qui saignent un peu ✓ bonne réponse B. Les plaies sèches C. La peau saine D. Les plaies de la cornée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La détersion d'une plaie consiste à : A. Éliminer les tissus nécrosés et la fibrine ✓ bonne réponse B. Refermer la plaie avec des points C. Appliquer un antibiotique local systématiquement D. Sécher la plaie avec un sèche-cheveux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les ablations de fils ou d'agrafes se font : A. Sur prescription, selon le délai prévu, avec un matériel stérile ✓ bonne réponse B. Dès le lendemain de l'intervention dans tous les cas C. Par le patient lui-même D. Sans désinfection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Une escarre de stade 4 correspond à : A. Une perte de substance profonde atteignant le muscle, le tendon ou l'os ✓ bonne réponse B. Une rougeur qui blanchit à la pression C. Une ampoule intacte D. Une simple sécheresse cutanée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le mot « exsudat » désigne : A. Le liquide qui s'écoule d'une plaie ✓ bonne réponse B. Un type de pansement C. Un antiseptique D. Une suture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour un ulcère veineux de jambe, le traitement de base associe soins locaux et : A. Contention ou compression veineuse prescrite ✓ bonne réponse B. Immobilisation stricte au lit pendant des mois C. Chaleur locale D. Massages profonds de la plaie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le pied diabétique nécessite une surveillance attentive car : A. Une plaie peut passer inaperçue (perte de sensibilité) et s'infecter rapidement ✓ bonne réponse B. Les diabétiques ne font jamais de plaie C. La cicatrisation est toujours plus rapide D. La douleur y est toujours très forte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Avant de refaire un pansement douloureux, il est recommandé de : A. Prévenir et traiter la douleur (antalgique prescrit) avant le soin ✓ bonne réponse B. Faire le soin le plus vite possible sans prévenir C. Ne rien dire au patient D. Attendre que le patient s'endorme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Une plaie qui sent mauvais, avec un écoulement verdâtre, évoque : A. Une infection possible, à signaler au médecin ✓ bonne réponse B. Une cicatrisation normale C. Une allergie au pansement uniquement D. Un problème de régime	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le tissu de granulation (bourgeonnement) est : A. Rouge, humide et granuleux : signe de cicatrisation ✓ bonne réponse B. Noir et sec C. Jaune et collant D. Blanc et cartonné	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un pansement doit être changé avec une technique : A. Aseptique : mains désinfectées, matériel stérile, de la zone propre vers la zone sale ✓ bonne réponse B. Sans gants ni hygiène des mains C. Avec les mêmes compresses pour plusieurs patients D. En réutilisant l'ancien pansement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'évaluation d'une plaie dans le dossier comprend : A. La taille, l'aspect, l'exsudat, l'odeur, la douleur et la peau autour ✓ bonne réponse B. Uniquement la date C. Uniquement le nom du pansement D. Rien si la plaie est petite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Pour une brûlure superficielle peu étendue, on évite : A. Les produits gras, le coton et le percement des cloques ✓ bonne réponse B. Le refroidissement à l'eau C. Un pansement propre D. L'avis médical si la brûlure est au visage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Bloc opératoire et stérilisation

Postes concernés : Infirmier(ère) de bloc opératoire · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation

1	Le compte des compresses, aiguilles et instruments au bloc opératoire est réalisé : A. Avant l'incision, avant la fermeture et en fin d'intervention, et tracé ✓ bonne réponse B. Uniquement en fin de journée C. Uniquement si le chirurgien le demande D. Une seule fois en début de programme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un instrument stérile tombe au sol pendant l'intervention. Que faites-vous ? A. Il est considéré comme contaminé : il est retiré et remplacé ✓ bonne réponse B. Il est réutilisé après l'avoir essuyé C. Il est trempé dans l'alcool puis réutilisé D. Il est réutilisé si personne ne l'a vu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Quel instrument sert principalement à saisir et clamper un vaisseau ? A. Une pince hémostatique (type Kocher ou Pean) ✓ bonne réponse B. Un écarteur de Farabeuf C. Une curette D. Un porte-aiguille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le porte-aiguille sert à : A. Tenir l'aiguille lors de la suture ✓ bonne réponse B. Couper les fils C. Écarter les berges de la plaie D. Aspirer le sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Qui peut toucher la table d'instrumentation stérile ? A. Uniquement les personnes habillées stérilement ✓ bonne réponse B. Toute l'équipe du bloc C. L'infirmier circulant D. Le brancardier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'écarteur de Farabeuf sert à : A. Écarter les berges de l'incision ✓ bonne réponse B. Couper les tissus C. Clamper une artère D. Tenir l'aiguille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les ciseaux de Mayo sont plutôt utilisés pour : A. Couper les tissus résistants et les fils ✓ bonne réponse B. Saisir un vaisseau C. Écarter la paroi D. Aspirer le sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Les ciseaux de Metzenbaum sont des ciseaux : A. Fins, pour disséquer les tissus délicats ✓ bonne réponse B. Pour couper les os C. Pour couper les plâtres D. Pour couper les pansements	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Une pince à disséquer « à griffes » est utilisée pour : A. Saisir des tissus résistants comme la peau ✓ bonne réponse B. Saisir l'intestin fragile C. Clamper l'aorte D. Tenir une compresse dans l'abdomen	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le bistouri électrique en mode « coagulation » sert à : A. Arrêter les petits saignements ✓ bonne réponse B. Couper le fil de suture C. Écarter les tissus D. Aspirer la fumée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Quand le chirurgien tend la main ouverte, l'instrumentiste : A. Dépose fermement l'instrument dans la paume, prêt à l'emploi ✓ bonne réponse B. Lance l'instrument C. Pose l'instrument sur le patient D. Attend qu'il le prenne sur la table	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les lames de bistouri usagées sont : A. Retirées avec une pince ou un dispositif adapté et jetées dans le collecteur piquant-coupant ✓ bonne réponse B. Retirées avec les doigts C. Laissées sur la table D. Réutilisées pour le patient suivant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un fil résorbable est utilisé : A. Pour les plans profonds qui ne seront pas retirés ✓ bonne réponse B. Uniquement pour la peau du visage C. Jamais au bloc D. Pour fixer les drains de façon définitive	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La table d'instrumentation est préparée : A. Juste avant l'intervention, par une personne habillée stérilement ✓ bonne réponse B. La veille au soir C. Par le brancardier D. Sans champ stérile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un instrument défectueux (mors abîmés) découvert pendant l'intervention doit être : A. Écarté, remplacé et signalé à la stérilisation ✓ bonne réponse B. Utilisé quand même C. Réparé sur place avec du ruban adhésif D. Remis dans la boîte sans rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les compresses utilisées dans le champ opératoire sont : A. Radio-opaques et comptées ✓ bonne réponse B. Ordinaires et non comptées C. Découpées à la main D. Réutilisables	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Le porte-aiguille se tient en général avec l'aiguille montée : A. Au tiers postérieur de l'aiguille, à l'extrémité des mors ✓ bonne réponse B. Par la pointe C. Au milieu du chas D. N'importe comment	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	En fin d'intervention, les instruments souillés doivent être : A. Pré-désinfectés rapidement pour éviter que les salissures ne sèchent ✓ bonne réponse B. Laissés secs jusqu'au lendemain C. Rincés au lavabo des mains D. Jetés à la poubelle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Le comptage final ne correspond pas (une compresse manque). Il faut : A. Prévenir immédiatement le chirurgien et rechercher la compresse avant la fermeture ✓ bonne réponse B. Fermer quand même C. Noter un chiffre au hasard D. Ne rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Le rôle de l'infirmier « circulant » est notamment de : A. Servir l'équipe stérile en matériel et assurer la traçabilité ✓ bonne réponse B. Toucher le champ opératoire C. Instrumenter à la place du chirurgien D. Rester assis hors de la salle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Asepsie et stérilisation 20 questions

1	Avant la stérilisation, un dispositif médical réutilisable doit être : A. Pré-désinfecté, nettoyé, séché puis conditionné ✓ bonne réponse B. Directement mis dans l'autoclave sale C. Seulement rincé à l'eau D. Désinfecté à l'alcool et rangé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quel est le cycle de référence de l'autoclave pour les dispositifs médicaux en stérilisation hospitalière ? A. 134 °C pendant au moins 18 minutes ✓ bonne réponse B. 100 °C pendant 5 minutes C. 60 °C pendant 1 heure D. 200 °C pendant 2 minutes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le test de Bowie-Dick sert à vérifier : A. La bonne pénétration de la vapeur et l'évacuation de l'air dans l'autoclave ✓ bonne réponse B. La stérilité d'un instrument C. La propreté des mains D. La date de péremption des emballages	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Un sachet de stérilisation est déchiré ou humide : A. Le contenu est considéré comme non stérile ✓ bonne réponse B. Il peut être utilisé s'il est récent C. Il suffit de le scotcher D. Il peut être utilisé au bloc si l'intervention est courte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le lavage chirurgical des mains est réalisé : A. Avant d'enfiler la casaque et les gants stériles ✓ bonne réponse B. Après l'intervention uniquement C. Uniquement si les mains sont sales D. Avec une solution hydro-alcoolique sur des mains souillées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La différence entre désinfection et stérilisation : A. La stérilisation élimine tous les micro-organismes, y compris les spores ✓ bonne réponse B. Il n'y a aucune différence C. La désinfection est plus efficace D. La stérilisation ne concerne que les virus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un dispositif « critique » (qui pénètre un tissu stérile) doit être : A. Stérile ✓ bonne réponse B. Simplement propre C. Désinfecté à bas niveau D. Lavé à l'eau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 L'indicateur de passage sur un emballage indique : A. Que le paquet est passé dans un stérilisateur (et non qu'il est forcément stérile) ✓ bonne réponse B. Que l'objet est stérile pour toujours C. La date de fabrication D. Le nom du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La date de péremption d'un dispositif stérile dépend surtout : A. De l'emballage et des conditions de stockage ✓ bonne réponse B. De la couleur de l'instrument C. Du chirurgien D. De la saison	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les produits stériles sont stockés : A. Dans un endroit propre, sec, à l'abri de la lumière directe et de la poussière ✓ bonne réponse B. Au sol dans le couloir C. Près d'un évier D. Dans les vestiaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le principe « premier périmé, premier utilisé » s'applique aux stocks stériles pour : A. Éviter d'utiliser des produits périmés ✓ bonne réponse B. Ranger par couleur C. Faire des économies d'électricité D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Le nettoyage des instruments avant stérilisation est indispensable car : A. La vapeur ne stérilise pas correctement un instrument encore sale ✓ bonne réponse B. Il donne une belle couleur C. Il remplace la stérilisation D. Il n'est pas indispensable	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un laveur-désinfecteur sert à : A. Nettoyer et désinfecter les instruments avant le conditionnement ✓ bonne réponse B. Stériliser les implants C. Laver les blouses D. Laver les mains du personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les dispositifs à usage unique : A. Ne doivent jamais être restérilisés ni réutilisés ✓ bonne réponse B. Peuvent être restérilisés deux fois C. Peuvent être réutilisés pour le même patient le lendemain D. Sont toujours réutilisables	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La traçabilité en stérilisation permet de retrouver : A. Le cycle de stérilisation utilisé pour chaque dispositif et le patient concerné ✓ bonne réponse B. Le prix de l'instrument C. L'âge du chirurgien D. La marque de la blouse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un emballage stérile tombé au sol : A. Est considéré comme non stérile s'il est abîmé ou selon le protocole ✓ bonne réponse B. Est toujours stérile C. Doit être ouvert pour vérifier D. Peut être utilisé après avoir été essuyé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le lavage chirurgical des mains peut se faire par : A. Friction chirurgicale avec un produit hydro-alcoolique sur des mains propres et sèches ✓ bonne réponse B. Simple rinçage à l'eau froide C. Port de gants sans hygiène des mains D. Application de crème	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Dans la zone stérile, on évite : A. De tourner le dos au champ stérile et de passer entre deux zones stériles ✓ bonne réponse B. De parler à voix basse C. De porter un masque D. De garder les mains au-dessus de la taille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Les mains d'une personne habillée stérilement doivent rester :

- A. Au-dessus de la taille et devant soi ✓ **bonne réponse**
- B. Dans les poches
- C. Sous les aisselles
- D. Derrière le dos

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le contrôle de la stérilisation par vapeur comprend notamment :

- A. La vérification des paramètres du cycle (température, pression, durée) et des indicateurs ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement l'odeur
- C. Uniquement la couleur des instruments
- D. Aucun contrôle

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bloc opératoire 20 questions

1 La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » se déroule :

- A. Avant l'induction, avant l'incision et après l'intervention ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement à la sortie du bloc
- C. Seulement pour les urgences
- D. Le lendemain de l'intervention

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le « temps de pause » avant l'incision permet de vérifier :

- A. L'identité du patient, le côté et le site opératoire, l'intervention prévue ✓ **bonne réponse**
- B. Le nombre de lits disponibles
- C. Les horaires de l'équipe
- D. Le programme du lendemain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Lors de l'installation du patient sur la table, le principal risque à prévenir est :

- A. Les compressions et lésions cutanées ou nerveuses ✓ **bonne réponse**
- B. La fièvre
- C. L'hyperglycémie
- D. L'allergie au latex chez tous les patients

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La plaque neutre du bistouri électrique doit être placée :

- A. Sur une zone musculaire bien vascularisée, propre et sèche, proche du site opératoire ✓ **bonne réponse**
- B. Sur une saillie osseuse
- C. Sur une cicatrice
- D. Sur une zone humide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Dans la salle d'opération, les portes doivent rester :

- A. Fermées autant que possible pour limiter la contamination de l'air ✓ **bonne réponse**
- B. Ouvertes en permanence pour aérer
- C. Ouvertes pendant l'incision
- D. Sans importance

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Avant une intervention programmée, le patient doit en général : A. Avoir respecté le jeûne, la préparation cutanée et retiré bijoux et prothèses amovibles ✓ bonne réponse B. Avoir pris un repas copieux C. Garder ses bijoux D. Venir maquillé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le marquage du site opératoire (côté) est fait : A. Avant l'arrivée au bloc, en présence du patient conscient si possible ✓ bonne réponse B. Après l'incision C. Par le brancardier seul D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La position opératoire doit être : A. Vérifiée par l'équipe pour éviter compressions, étirements et brûlures ✓ bonne réponse B. Choisie par le patient C. Toujours la même pour toutes les interventions D. Modifiée sans prévenir l'anesthésiste	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Pourquoi protège-t-on les points d'appui (talons, coudes) au bloc ? A. Pour prévenir les lésions cutanées et nerveuses ✓ bonne réponse B. Pour réchauffer la salle C. Pour le confort du chirurgien D. Pour gagner du temps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	L'hypothermie au bloc opératoire est prévenue par : A. Le réchauffement du patient (couverture chauffante, solutés réchauffés) ✓ bonne réponse B. Une salle froide C. Un patient découvert D. La suppression des perfusions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le circuit propre/sale au bloc vise à : A. Éviter de croiser le matériel stérile et les déchets ou le matériel souillé ✓ bonne réponse B. Faire gagner du temps au personnel C. Séparer les hommes et les femmes D. Organiser les pauses	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La tenue de bloc comprend : A. Tenue dédiée, coiffe couvrant les cheveux, masque, chaussures réservées au bloc ✓ bonne réponse B. La tenue de ville sous une blouse C. Des bijoux sous la tenue D. Des chaussures de ville	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Le nombre de personnes et les allers-retours en salle d'opération doivent être : A. Limités pour réduire le risque infectieux ✓ bonne réponse B. Augmentés pour former les étudiants C. Sans importance D. Encouragés pendant l'incision	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les pièces opératoires (prélèvements) doivent être : A. Identifiées, placées dans un récipient adapté et accompagnées de la demande d'examen ✓ bonne réponse B. Jetées avec les déchets C. Gardées sans étiquette D. Remises à la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le bistouri électrique et les solutions alcooliques exposent au risque : A. D'incendie au bloc : il faut laisser sécher l'antiseptique ✓ bonne réponse B. D'hypoglycémie C. D'allergie alimentaire D. De fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le bionettoyage de la salle entre deux interventions sert à : A. Remettre la salle dans un état de propreté adapté pour le patient suivant ✓ bonne réponse B. Changer la décoration C. Stériliser l'air D. Remplacer la stérilisation des instruments	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient porteur d'un pacemaker opéré au bistouri électrique : A. Nécessite une vigilance particulière (avis de l'anesthésiste, position de la plaque) ✓ bonne réponse B. Ne pose aucun problème C. Ne peut jamais être opéré D. Doit retirer son pacemaker	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La feuille d'écologie ou de traçabilité du bloc recense : A. L'équipe, les horaires, les dispositifs implantés et les événements ✓ bonne réponse B. Le menu du jour C. Les congés du personnel D. Uniquement le nom du chirurgien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 En salle de surveillance post-interventionnelle, le patient est transféré : A. Avec les transmissions de l'équipe d'anesthésie et du bloc ✓ bonne réponse B. Seul, sans informations C. Directement à domicile D. Après avoir mangé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Une rupture d'asepsie constatée pendant l'intervention doit être :

- A. Signalée immédiatement pour être corrigée ✓ **bonne réponse**
- B. Cachée
- C. Corrigée après la fin de l'intervention
- D. Ignorée si elle est petite

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

Suivi de grossesse 20 questions

1 Quelle est la durée moyenne d'une grossesse en semaines d'aménorrhée (SA) ?

- A. Environ 41 SA ✓ **bonne réponse**
- B. Environ 36 SA
- C. Environ 45 SA
- D. Environ 32 SA

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 À partir de quel terme une naissance est-elle considérée « à terme » ?

- A. 37 SA révolues ✓ **bonne réponse**
- B. 32 SA
- C. 34 SA
- D. 40 SA uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une tension artérielle $\geq 140/90$ mmHg avec protéinurie après 20 SA évoque :

- A. Une prééclampsie ✓ **bonne réponse**
- B. Un diabète gestationnel
- C. Une grossesse normale
- D. Une anémie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Quelle supplémentation est recommandée en début de grossesse pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural ?

- A. Acide folique (vitamine B9) ✓ **bonne réponse**
- B. Vitamine A à forte dose
- C. Vitamine K
- D. Fer injectable systématique

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le dépistage du diabète gestationnel par HGPO 75 g se fait habituellement :

- A. Entre 24 et 28 SA ✓ **bonne réponse**
- B. À 8 SA
- C. À 38 SA
- D. Après l'accouchement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 La date présumée d'accouchement se calcule habituellement à partir :

- A. Du premier jour des dernières règles (ou de l'échographie de datation) ✓ **bonne réponse**
- B. Du dernier jour des règles
- C. De la date du mariage
- D. Du poids de la mère

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 L'échographie du premier trimestre (vers 11–14 SA) permet notamment : A. De dater la grossesse et de mesurer la clarté nucale ✓ bonne réponse B. De connaître le poids de naissance exact C. De déclencher l'accouchement D. De diagnostiquer le diabète gestationnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Quel signe doit faire consulter en urgence pendant la grossesse ? A. Des saignements vaginaux ou une diminution des mouvements du bébé ✓ bonne réponse B. Une envie fréquente d'uriner au premier trimestre C. Des nausées le matin D. Une légère fatigue	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les signes de prééclampsie peuvent associer : A. Maux de tête, troubles visuels, douleur en barre épigastrique, œdèmes brutaux ✓ bonne réponse B. Uniquement des démangeaisons C. Une faim excessive D. Une toux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La hauteur utérine mesurée en consultation sert à : A. Surveiller la croissance du fœtus ✓ bonne réponse B. Mesurer la tension C. Calculer la glycémie D. Prévoir le sexe du bébé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La toxoplasmose est surveillée chez la femme enceinte non immunisée car : A. Elle peut atteindre le fœtus ✓ bonne réponse B. Elle provoque toujours l'accouchement C. Elle est sans danger D. Elle protège le fœtus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Conseil hygiéno-diététique à une femme enceinte non immunisée contre la toxoplasmose : A. Bien cuire la viande et laver soigneusement fruits et légumes ✓ bonne réponse B. Manger la viande saignante C. Toucher la litière du chat sans gants D. Éviter de se laver les mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 L'alcool pendant la grossesse : A. Est à éviter totalement ✓ bonne réponse B. Est autorisé en petite quantité chaque jour C. Est recommandé au troisième trimestre D. Est sans risque pour le fœtus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Une femme Rhésus négatif avec un conjoint Rhésus positif nécessite : A. Une prévention de l'allo-immunisation (immunoglobulines anti-D selon le protocole) ✓ bonne réponse B. Aucune surveillance C. Une transfusion systématique D. Un arrêt de la grossesse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les mouvements actifs du fœtus sont en général perçus par la mère : A. Entre 16 et 22 SA environ ✓ bonne réponse B. Dès la 4e SA C. Seulement après 38 SA D. Jamais avant l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le diabète gestationnel expose surtout à : A. Une macrosomie fœtale et des complications à l'accouchement ✓ bonne réponse B. Une petite taille du bébé uniquement C. Aucune complication D. Une myopie maternelle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une menace d'accouchement prématuré se manifeste par : A. Des contractions régulières et des modifications du col avant 37 SA ✓ bonne réponse B. Des nausées au premier trimestre C. Une prise de poids régulière D. Des mouvements fœtaux actifs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La supplémentation en fer pendant la grossesse vise à prévenir : A. L'anémie ✓ bonne réponse B. La prééclampsie de façon certaine C. Le diabète D. L'hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'entretien prénatal précoce permet surtout : A. D'identifier les besoins, les difficultés et de préparer la naissance ✓ bonne réponse B. De réaliser l'accouchement C. De choisir le prénom D. De prescrire des antibiotiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une femme enceinte se plaint de brûlures en urinant. Il faut : A. Rechercher une infection urinaire (ECBU) car elle peut favoriser une prématurité ✓ bonne réponse B. Attendre l'accouchement C. Lui conseiller de boire moins D. Ne rien faire, c'est normal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1	Le travail actif est défini par une dilatation du col : A. À partir d'environ 5 à 6 cm avec des contractions régulières ✓ bonne réponse B. À partir de 1 cm C. Uniquement à 10 cm D. Dès la perte du bouchon muqueux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La délivrance correspond à : A. L'expulsion du placenta et des membranes ✓ bonne réponse B. La sortie de l'enfant C. La rupture de la poche des eaux D. Le début des contractions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une hémorragie du post-partum est définie par une perte sanguine d'au moins : A. 500 mL dans les 24 heures suivant l'accouchement ✓ bonne réponse B. 100 mL C. 200 mL D. 2 000 mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quel médicament est recommandé en prévention de l'hémorragie de la délivrance ? A. L'ocytocine ✓ bonne réponse B. L'insuline C. Le paracétamol D. Le salbutamol	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	La présentation la plus fréquente à l'accouchement est : A. La présentation céphalique (sommet) ✓ bonne réponse B. Le siège C. La présentation transverse D. La présentation de la face	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le premier stade du travail correspond à : A. La dilatation du col jusqu'à dilatation complète ✓ bonne réponse B. L'expulsion du bébé C. La délivrance du placenta D. La surveillance du post-partum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le deuxième stade du travail correspond à : A. L'expulsion du fœtus ✓ bonne réponse B. La dilatation du col C. La délivrance D. La consultation prénatale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un liquide amniotique teinté (méconial) doit faire : A. Renforcer la surveillance du rythme cardiaque fœtal et prévenir l'équipe ✓ bonne réponse B. Ignorer l'information C. Faire marcher la patiente D. Arrêter la surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Le rythme cardiaque fœtal normal se situe en général entre : A. 110 et 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 60 et 90 battements/min C. 180 et 220 battements/min D. 40 et 60 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le partogramme sert à : A. Suivre graphiquement l'évolution du travail et repérer les anomalies ✓ bonne réponse B. Calculer le prix de l'accouchement C. Noter le menu de la patiente D. Prévoir la date de sortie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Pendant le travail, une position verticale ou la mobilité de la patiente : A. Peut faciliter la descente du bébé et le confort ✓ bonne réponse B. Est toujours interdite C. Provoque systématiquement une hémorragie D. Empêche la surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Après la naissance, le clampage du cordon : A. Peut être retardé d'environ une minute chez un nouveau-né qui va bien ✓ bonne réponse B. Doit toujours être fait avant la sortie de la tête C. Est inutile D. Se fait au bout d'une heure obligatoirement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 L'examen du placenta après la délivrance vérifie : A. Qu'il est complet (cotylédons et membranes) ✓ bonne réponse B. Sa couleur uniquement C. Son poids pour la facture D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un globe utérin bien formé après la délivrance signifie : A. Que l'utérus est bien rétracté, ce qui limite le saignement ✓ bonne réponse B. Une hémorragie en cours C. Un placenta retenu certain D. Une infection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La surveillance en salle de naissance après l'accouchement dure en général : A. Environ 2 heures (saignements, tension, globe utérin) ✓ bonne réponse B. 5 minutes C. 24 heures en salle de naissance D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'épisiotomie : A. N'est pas systématique ; elle se décide selon la situation ✓ bonne réponse B. Est obligatoire à chaque accouchement C. Est interdite D. Se fait avant le début du travail	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17 Une procidence du cordon (cordon devant la présentation) est : A. Une urgence obstétricale ✓ bonne réponse B. Une situation normale C. Une complication sans gravité D. Un signe de fin de travail normale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une rupture des membranes sans contractions à terme impose : A. Une consultation à la maternité pour évaluation ✓ bonne réponse B. D'attendre une semaine à domicile C. Un bain chaud prolongé D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Une déchirure périnéale après l'accouchement : A. Est examinée et suturée si nécessaire ✓ bonne réponse B. Est toujours laissée sans soin C. Est une contre-indication à l'allaitement D. Nécessite une césarienne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le peau-à-peau à la naissance favorise : A. La régulation thermique du bébé, le lien mère-enfant et la première tétée ✓ bonne réponse B. L'hypothermie C. Les infections D. Le retard de l'allaitement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins néonataux 20 questions

1 Le score d'Apgar est évalué : A. À 1, 5 et 10 minutes de vie ✓ bonne réponse B. À 1 heure de vie C. Au 3e jour D. Uniquement si l'enfant est prématuré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quels éléments composent le score d'Apgar ? A. Fréquence cardiaque, respiration, tonus, réactivité, coloration ✓ bonne réponse B. Poids, taille, périmètre crânien C. Température, glycémie, bilirubine D. Pleurs, sommeil, alimentation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quelle vitamine est administrée au nouveau-né pour prévenir la maladie hémorragique ? A. Vitamine K ✓ bonne réponse B. Vitamine C C. Vitamine D à forte dose D. Vitamine B12	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un nouveau-né ? A. 120 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 60 à 80 battements/min C. 80 à 100 battements/min D. 200 à 240 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Pour prévenir l'hypothermie du nouveau-né, on privilégie : A. Le séchage immédiat et le peau-à-peau avec la mère ✓ bonne réponse B. Le bain immédiat C. Le laisser nu sur la table D. Une pièce non chauffée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le poids de naissance moyen d'un nouveau-né à terme est d'environ : A. 3 à 3,5 kg ✓ bonne réponse B. 1 kg C. 6 kg D. 500 g	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La perte de poids physiologique des premiers jours est en général : A. Inférieure à 10 % du poids de naissance, récupéré vers 10-15 jours ✓ bonne réponse B. Supérieure à 20 % C. Inexistante D. Définitive	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un ictère (jaunisse) apparaissant dans les 24 premières heures de vie est : A. Anormal et doit être signalé rapidement ✓ bonne réponse B. Toujours normal C. Un signe de bonne santé D. Sans aucune importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La fréquence respiratoire normale d'un nouveau-né est d'environ : A. 40 à 60 cycles/min ✓ bonne réponse B. 10 à 15 cycles/min C. 80 à 100 cycles/min D. 20 cycles/min exactement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les soins du cordon ombilical reposent sur : A. Une hygiène simple : garder le cordon propre et sec ✓ bonne réponse B. L'application de poudre ou de produits traditionnels C. Le recouvrir d'un pansement serré et humide D. Tirer dessus pour qu'il tombe vite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le cordon ombilical tombe en général : A. Entre 5 et 15 jours après la naissance ✓ bonne réponse B. Le jour de la naissance C. Après 2 mois D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12	Le dépistage néonatal par prélèvement de sang au talon permet de repérer : A. Certaines maladies rares (comme l'hypothyroïdie congénitale) selon le programme du pays ✓ bonne réponse B. La couleur des yeux C. La taille adulte D. Le groupe scolaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un nouveau-né à risque d'hypoglycémie (mère diabétique, petit poids) nécessite : A. Une surveillance de la glycémie et une alimentation précoce ✓ bonne réponse B. Un jeûne de 12 heures C. Un bain froid D. Aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Les premières selles du nouveau-né, noires et collantes, s'appellent : A. Le méconium ✓ bonne réponse B. Le colostrum C. Le vernix D. Le lanugo	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Le vernix caseosa est : A. Un enduit blanchâtre qui protège la peau du nouveau-né ✓ bonne réponse B. Une infection de la peau C. Une maladie du sang D. Un médicament	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	La température idéale d'une salle de naissance pour accueillir un nouveau-né est d'environ : A. 23 à 25 °C ✓ bonne réponse B. 15 °C C. 35 °C D. 10 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un nouveau-né qui ne respire pas à la naissance après séchage et stimulation nécessite : A. Une ventilation au masque immédiatement selon l'algorithme de réanimation néonatale ✓ bonne réponse B. Un bain C. Une pesée D. Une tétée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	La vaccination à la naissance en Tunisie comprend notamment : A. Le BCG et la première dose contre l'hépatite B, selon le calendrier national ✓ bonne réponse B. Aucun vaccin C. Le vaccin contre la grippe uniquement D. Le vaccin contre la rage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Le couchage recommandé du nouveau-né :

- A. Sur le dos, dans un lit sans oreiller ni tour de lit ✓ **bonne réponse**
B. Sur le ventre
C. Avec plusieurs couvertures épaisses
D. Dans le lit des parents entre deux oreillers

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Un nouveau-né fébrile (température $\geq 38^{\circ}\text{C}$) doit :

- A. Être examiné rapidement par un médecin ✓ **bonne réponse**
B. Être simplement déshabillé et surveillé une semaine
C. Recevoir de l'aspirine
D. Être baigné à l'eau froide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Allaitement maternel 20 questions

1 L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à :

- A. 6 mois ✓ **bonne réponse**
B. 1 mois
C. 3 mois
D. 12 mois

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quand débiter idéalement la première tétée ?

- A. Dans l'heure qui suit la naissance ✓ **bonne réponse**
B. Après 24 heures
C. Au 3e jour, à la montée de lait
D. Après le premier bain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Le colostrum est :

- A. Le premier lait, riche en anticorps ✓ **bonne réponse**
B. Un lait de mauvaise qualité à jeter
C. Un lait artificiel
D. Un signe d'infection

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une bonne prise du sein se reconnaît à :

- A. Une bouche grande ouverte, lèvres retroussées, menton contre le sein, aréole largement prise ✓ **bonne réponse**
B. Le bébé qui tète uniquement le bout du mamelon
C. Une douleur intense chez la mère
D. Des bruits de claquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Pendant les premières semaines, un nouveau-né allaité tète en général :

- A. Au moins 8 fois par 24 heures, à la demande ✓ **bonne réponse**
B. Deux fois par jour
C. Toutes les 6 heures exactement
D. Uniquement la nuit

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	Un signe que le bébé reçoit suffisamment de lait : A. Plusieurs couches mouillées par jour et une prise de poids régulière ✓ bonne réponse B. Il pleure tout le temps C. Il dort 12 heures sans téter D. Ses urines sont très foncées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Des crevasses du mamelon sont le plus souvent dues à : A. Une mauvaise position ou une mauvaise prise du sein ✓ bonne réponse B. Un lait de mauvaise qualité C. Une alimentation trop salée D. Un excès de tétées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un engorgement mammaire se soulage par : A. Des tétées fréquentes et efficaces, éventuellement de la chaleur avant et du froid après ✓ bonne réponse B. L'arrêt brutal de l'allaitement C. Un jeûne de la mère D. Un bandage serré des seins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Une mastite se manifeste par : A. Une zone du sein rouge, chaude, douloureuse, souvent avec de la fièvre ✓ bonne réponse B. Une simple fatigue C. Un lait plus sucré D. Une perte de cheveux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	En cas de mastite, l'allaitement : A. Peut en général être poursuivi, avec un avis médical ✓ bonne réponse B. Doit toujours être arrêté définitivement C. Est dangereux pour le bébé dans tous les cas D. Doit être remplacé par de l'eau sucrée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Les compléments d'eau ou de lait artificiel chez un nouveau-né allaité en bonne santé : A. Ne sont pas nécessaires sans indication médicale ✓ bonne réponse B. Sont obligatoires chaque jour C. Augmentent la lactation D. Remplacent le colostrum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La montée de lait survient généralement : A. Entre le 2^e et le 4^e jour après l'accouchement ✓ bonne réponse B. Le jour de l'accouchement C. Après un mois D. Pendant la grossesse uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le lait maternel exprimé peut être conservé au réfrigérateur (environ 4 °C) : A. Environ 48 heures selon les recommandations courantes ✓ bonne réponse B. 1 heure seulement C. 1 mois D. Indéfiniment	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14	Pour décongeler du lait maternel, on évite : A. Le four à micro-ondes ✓ bonne réponse B. Le réfrigérateur C. Le bain-marie tiède D. L'eau tiède	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Quel médicament prendre pendant l'allaitement ? A. Uniquement ceux validés par un médecin ou un pharmacien comme compatibles ✓ bonne réponse B. N'importe lequel sans avis C. Aucun traitement n'est jamais possible D. Les mêmes que pendant la grossesse sans vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	La position « ballon de rugby » est utile notamment : A. Après une césarienne ou pour des jumeaux ✓ bonne réponse B. Pour faire dormir la mère C. Uniquement pour les biberons D. Pour les bébés de plus de 2 ans	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Le réflexe d'éjection du lait est favorisé par : A. L'ocytocine, stimulée par la succion et la détente de la mère ✓ bonne réponse B. L'insuline C. Le stress D. Le froid	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Les avantages de l'allaitement pour le bébé incluent : A. Une protection contre certaines infections ✓ bonne réponse B. Une absence totale de maladies C. Une croissance plus rapide que la normale D. Aucun avantage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Une mère qui reprend le travail et veut poursuivre l'allaitement peut : A. Tirer son lait et le conserver selon les règles d'hygiène ✓ bonne réponse B. Arrêter forcément l'allaitement C. Donner du lait non conservé au froid D. Allaiter seulement une fois par semaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Les signes d'une bonne succion au sein : A. Succions lentes et profondes avec des déglutitions audibles ✓ bonne réponse B. Bruits de claquement de langue C. Joues creusées D. Douleur intense de la mère pendant toute la tétée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

1	Avant une anesthésie programmée, le jeûne habituel pour les solides est d'au moins : A. 6 heures ✓ bonne réponse B. 30 minutes C. 1 heure D. 24 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Les liquides clairs (eau, thé sans lait) sont généralement autorisés jusqu'à : A. 2 heures avant l'anesthésie ✓ bonne réponse B. 12 heures avant C. 24 heures avant D. Ils sont interdits dès la veille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le propofol est : A. Un hypnotique d'induction intraveineux ✓ bonne réponse B. Un curare C. Un antalgique morphinique D. Un antidote des benzodiazépines	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quel est l'antidote des morphiniques ? A. La naloxone ✓ bonne réponse B. Le flumazénil C. La néostigmine D. L'atropine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Quel est l'antidote des benzodiazépines ? A. Le flumazénil ✓ bonne réponse B. La naloxone C. La protamine D. La vitamine K	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La consultation d'anesthésie a lieu : A. Plusieurs jours avant une intervention programmée ✓ bonne réponse B. Uniquement après l'intervention C. Au bloc, juste avant l'induction D. Elle est facultative	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les trois composantes classiques de l'anesthésie générale sont : A. Hypnose (sommeil), analgésie et, si besoin, curarisation (relâchement musculaire) ✓ bonne réponse B. Fièvre, toux et douleur C. Hydratation, nutrition et marche D. Sédation, vomissement et hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un curare provoque : A. Une paralysie des muscles, nécessitant une ventilation ✓ bonne réponse B. Un sommeil sans effet sur la respiration C. Une analgésie seule D. Une augmentation de la vigilance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 L'induction en « séquence rapide » est indiquée chez un patient : A. À l'estomac plein (risque d'inhalation) ✓ bonne réponse B. À jeun depuis la veille sans risque C. Uniquement chez les enfants D. Uniquement pour une anesthésie locale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La vérification de l'appareil d'anesthésie se fait : A. Avant chaque programme opératoire, selon une check-list ✓ bonne réponse B. Une fois par an C. Uniquement en cas de panne D. Par le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 L'hyperthermie maligne est une complication rare déclenchée notamment par : A. Les halogénés et la succinylcholine ✓ bonne réponse B. Le paracétamol C. Le sérum physiologique D. L'oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le traitement spécifique de l'hyperthermie maligne est : A. Le dantrolène ✓ bonne réponse B. L'insuline C. La naloxone D. La vitamine K	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient à risque de nausées et vomissements postopératoires peut recevoir : A. Une prophylaxie antiémétique selon le protocole ✓ bonne réponse B. Un repas avant l'intervention C. Plus de morphine D. Aucune prévention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La sévoflurane est : A. Un agent anesthésique halogéné inhalé ✓ bonne réponse B. Un curare C. Un antibiotique D. Un anticoagulant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La kétamine a pour particularité de : A. Préserver en général la ventilation spontanée et la tension artérielle ✓ bonne réponse B. Bloquer la respiration de façon certaine C. Être un curare D. Être un antiémétique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le score ASA sert à évaluer : A. L'état de santé général du patient avant l'anesthésie (risque anesthésique) ✓ bonne réponse B. La douleur C. La profondeur du coma D. La durée de l'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

17	Avant l'induction, l'équipe vérifie notamment : A. Identité, jeûne, allergies, matériel d'intubation et d'aspiration ✓ bonne réponse B. La couleur de la blouse C. Le menu du soir D. Rien, tout a été vu en consultation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	L'anesthésie locorégionale (rachianesthésie, péridurale) consiste à : A. Anesthésier une région du corps en injectant un anesthésique local près des nerfs ✓ bonne réponse B. Endormir complètement le patient par inhalation C. Bloquer tous les muscles du corps D. Donner un antalgique par la bouche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Une complication possible de la rachianesthésie est : A. Une hypotension artérielle ✓ bonne réponse B. Une hyperglycémie systématique C. Une fracture D. Une perte de cheveux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	La toxicité des anesthésiques locaux peut se manifester par : A. Des signes neurologiques (goût métallique, convulsions) et cardiaques ✓ bonne réponse B. Une fièvre isolée C. Une diarrhée D. Une éruption sans gravité uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Intubation et ventilation 20 questions

1	La manœuvre de Sellick consiste à : A. Exercer une pression sur le cartilage cricoïde ✓ bonne réponse B. Surélever les jambes C. Tourner la tête du patient sur le côté D. Comprimer le thorax	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quel est le moyen le plus fiable pour confirmer la position de la sonde d'intubation dans la trachée ? A. La capnographie (présence de CO2 expiré) ✓ bonne réponse B. La buée dans la sonde C. La couleur de la peau D. Le nombre de centimètres seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Avant l'intubation, la pré-oxygénation se fait : A. Avec de l'oxygène pur au masque pendant environ 3 minutes ✓ bonne réponse B. À l'air ambiant C. Pendant 10 secondes D. Après l'intubation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) sert à : A. Ventiler manuellement un patient ✓ bonne réponse B. Aspirer les sécrétions C. Mesurer la tension artérielle D. Réchauffer le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Une désaturation brutale chez un patient intubé et ventilé doit faire rechercher en priorité : A. Un déplacement ou une obstruction de la sonde, un problème de ventilateur ✓ bonne réponse B. Une hypoglycémie C. Une hyperthermie D. Une erreur de la tension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La laryngoscopie permet de : A. Visualiser la glotte pour introduire la sonde d'intubation ✓ bonne réponse B. Mesurer la tension C. Aspirer l'estomac D. Prendre la température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Une intubation sélective dans la bronche souche droite se manifeste par : A. Une asymétrie du murmure vésiculaire (bruit respiratoire diminué à gauche) ✓ bonne réponse B. Une hypertension isolée C. Une fièvre D. Une bradycardie isolée sans autre signe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le ballonnet de la sonde d'intubation sert à : A. Assurer l'étanchéité et limiter l'inhalation ✓ bonne réponse B. Fixer la sonde à la joue C. Mesurer la température D. Humidifier l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La pression du ballonnet est contrôlée pour éviter : A. Les lésions de la trachée par une pression trop élevée ✓ bonne réponse B. Les allergies C. La fièvre D. L'hypoglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le masque laryngé est : A. Un dispositif supraglottique utilisé pour ventiler sans intubation trachéale ✓ bonne réponse B. Un masque à oxygène simple C. Un masque chirurgical D. Une sonde gastrique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Une intubation difficile imprévue nécessite : A. D'appeler de l'aide et de suivre l'algorithme du service (vidéolaryngoscope, masque laryngé...) ✓ bonne réponse B. De multiplier les tentatives seul C. D'arrêter l'oxygène D. De réveiller le chirurgien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le volume courant habituellement réglé chez l'adulte en ventilation protectrice est d'environ : A. 6 à 8 mL/kg de poids idéal ✓ bonne réponse B. 20 mL/kg C. 1 mL/kg D. 50 mL/kg	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La PEP (pression expiratoire positive) sert à : A. Maintenir les alvéoles ouvertes et améliorer l'oxygénation ✓ bonne réponse B. Augmenter la fréquence cardiaque C. Endormir le patient D. Faire tousser	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une alarme de pression haute sur le respirateur peut indiquer : A. Une sonde coudée, des sécrétions ou un bronchospasme ✓ bonne réponse B. Une déconnexion C. Une batterie chargée D. Un patient qui dort bien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une alarme de pression basse sur le respirateur évoque en premier : A. Une déconnexion ou une fuite du circuit ✓ bonne réponse B. Un bronchospasme C. Un patient trop sédaté D. Une fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'aspiration trachéale chez un patient intubé se fait : A. Avec une technique aseptique, une sonde adaptée et une durée courte ✓ bonne réponse B. Avec la même sonde pour plusieurs patients C. Pendant plusieurs minutes D. Sans oxygénation préalable même si le patient désature	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La position de la sonde d'intubation est notée en centimètres : A. Au niveau des dents ou de la commissure labiale ✓ bonne réponse B. Au niveau du nombril C. Au niveau de l'oreille D. Elle n'est jamais notée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Le bronchospasme se manifeste par :

- A. Des sifflements, une difficulté à ventiler et une baisse de la saturation ✓
bonne réponse
- B. Une hypertension isolée
- C. Une diarrhée
- D. Une augmentation de la diurèse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Avant l'extubation, on vérifie notamment :

- A. Le réveil, la ventilation spontanée efficace et la décurarisation ✓
bonne réponse
- B. Uniquement l'heure
- C. Que le patient a mangé
- D. Que le chirurgien est parti

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La fraction inspirée en oxygène (FiO2) de l'air ambiant est d'environ :

- A. 21 % ✓
bonne réponse
- B. 50 %
- C. 100 %
- D. 5 %

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Monitoring hémodynamique 20 questions

1 La pression artérielle moyenne (PAM) se calcule approximativement par :

- A. $(PAS + 2 \times PAD) / 3$ ✓
bonne réponse
- B. $(PAS + PAD) / 2$
- C. $PAS - PAD$
- D. $PAS \times 2$

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le monitoring minimal d'une anesthésie générale comprend :

- A. ECG, pression artérielle, SpO2, capnographie ✓
bonne réponse
- B. Uniquement la température
- C. Uniquement la SpO2
- D. Uniquement la diurèse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Sur l'ECG du scope, une ligne plate chez un patient inconscient doit d'abord faire :

- A. Vérifier le patient et les électrodes, et débiter la réanimation si arrêt cardiaque ✓
bonne réponse
- B. Attendre la fin de l'intervention
- C. Changer d'imprimante
- D. Diminuer le volume des alarmes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une bradycardie sévère au bloc peut être traitée en première intention par :

- A. L'atropine (selon prescription / protocole) ✓
bonne réponse
- B. Le propofol
- C. La morphine
- D. Le furosémide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5	La pression artérielle invasive est mesurée grâce à :	
	A. Un cathéter artériel relié à un capteur de pression ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. Un brassard au bras	☐ À corriger
	C. Un thermomètre	Remarque :
	D. Un oxymètre	
6	Le capteur de pression d'une ligne artérielle doit être placé :	
	A. Au niveau de l'oreillette droite (zéro de référence) ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. Au niveau du sol	☐ À corriger
	C. Au-dessus de la tête	Remarque :
	D. À n'importe quelle hauteur	
7	Une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mmHg chez l'adulte en réanimation est en général :	
	A. Insuffisante pour une bonne perfusion des organes ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. Idéale	☐ À corriger
	C. Élevée	Remarque :
	D. Sans importance	
8	La capnographie mesure :	
	A. Le CO2 dans l'air expiré ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. L'oxygène dans le sang veineux	☐ À corriger
	C. La glycémie	Remarque :
	D. La température	
9	Une chute brutale du CO2 expiré pendant une anesthésie peut signaler :	
	A. Une déconnexion, une embolie ou un arrêt circulatoire ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. Une amélioration de l'état du patient	☐ À corriger
	C. Une fièvre	Remarque :
	D. Un réveil normal	
10	Le monitoring de la curarisation (train de quatre) sert à :	
	A. Évaluer le relâchement musculaire et la décurarisation ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. Mesurer la tension	☐ À corriger
	C. Mesurer la douleur	Remarque :
	D. Mesurer la diurèse	
11	La pression veineuse centrale se mesure à l'aide :	
	A. D'un cathéter veineux central ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. D'un cathéter périphérique au pied	☐ À corriger
	C. D'un brassard	Remarque :
	D. D'une sonde urinaire	
12	Sur l'ECG, une fibrillation ventriculaire est :	
	A. Un rythme d'arrêt cardiaque nécessitant une défibrillation ✓ bonne réponse	☐ Validée
	B. Un rythme normal	☐ À corriger
	C. Une simple tachycardie sinusale	Remarque :
	D. Une bradycardie sans gravité	

13 Une asystolie est : A. Une absence d'activité électrique cardiaque (rythme non choquable) ✓ bonne réponse B. Une tachycardie C. Un rythme normal D. Une hypertension	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 La température centrale se surveille au bloc pour prévenir : A. L'hypothermie peropératoire ✓ bonne réponse B. Les allergies C. Le diabète D. La fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La diurèse horaire est un reflet : A. De la perfusion rénale ✓ bonne réponse B. De la douleur C. De la profondeur du sommeil D. De la fonction respiratoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'index bispectral (BIS) sert à évaluer : A. La profondeur de l'hypnose ✓ bonne réponse B. La saturation C. La fréquence respiratoire D. Le débit urinaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les alarmes du scope doivent être : A. Réglées selon le patient et jamais coupées sans surveillance ✓ bonne réponse B. Toujours désactivées pour le calme C. Réglées au maximum pour tous D. Ignorées la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une hypotension après l'induction est souvent traitée en première intention par : A. Un remplissage et/ou un vasopresseur selon la prescription ✓ bonne réponse B. Un arrêt de l'oxygène C. Un antibiotique D. Un diurétique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les électrodes de l'ECG à 3 brins se placent classiquement : A. Rouge à droite sous la clavicule, jaune à gauche sous la clavicule, verte en bas à gauche ✓ bonne réponse B. Toutes sur la jambe droite C. Sur le dos uniquement D. Sur le visage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une saturation qui chute alors que la courbe de pouls est de mauvaise qualité doit faire : A. Vérifier le capteur et l'état du patient avant de conclure ✓ bonne réponse B. Ignorer l'alarme C. Couper le moniteur D. Arrêter l'oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Le score d'Aldrete sert à : A. Évaluer la récupération et autoriser la sortie de salle de réveil ✓ bonne réponse B. Mesurer la douleur C. Évaluer le risque d'escarre D. Évaluer la profondeur de l'anesthésie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quel est le premier signe de dépression respiratoire liée aux morphiniques à surveiller ? A. La sédation (sommolence) et la baisse de la fréquence respiratoire ✓ bonne réponse B. La fièvre C. Une hypertension isolée D. Des démangeaisons uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 En salle de réveil, des frissons avec température à 35 °C nécessitent : A. Un réchauffement actif du patient ✓ bonne réponse B. Une sortie immédiate C. Un bain froid D. Aucune action	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Une échelle numérique de la douleur à 7/10 en SSPI signifie : A. Une douleur importante à traiter selon le protocole ✓ bonne réponse B. Une douleur absente C. Une douleur normale à ignorer D. Une erreur de mesure	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 En salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), la surveillance porte sur : A. Conscience, respiration, circulation, douleur, température et pansements ✓ bonne réponse B. Uniquement la douleur C. Uniquement la tension D. Uniquement le confort	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un patient ronfle bruyamment en SSPI avec une saturation qui baisse. Il faut penser à : A. Une obstruction des voies aériennes (subluxer la mâchoire, oxygène, alerter) ✓ bonne réponse B. Un sommeil réparateur sans risque C. Une hypertension D. Une diurèse abondante	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Des nausées et vomissements en SSPI exposent à : A. Un risque d'inhalation chez un patient encore somnolent ✓ bonne réponse B. Une meilleure récupération C. Aucun risque D. Une baisse de la douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un globe vésical en SSPI se manifeste par : A. Une agitation, une douleur et une masse au-dessus du pubis ✓ bonne réponse B. Une diarrhée C. Une toux D. Une baisse de la température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La morphine titrée en SSPI consiste à : A. Administrer de petites doses répétées en réévaluant la douleur et la vigilance ✓ bonne réponse B. Donner une forte dose unique sans surveillance C. Ne jamais traiter la douleur D. Donner la morphine par voie rectale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un saignement important sur le pansement en SSPI doit faire : A. Prévenir immédiatement l'anesthésiste et le chirurgien ✓ bonne réponse B. Changer simplement le pansement sans rien dire C. Attendre le lendemain D. Retirer les drains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La surveillance après une rachianesthésie comprend notamment : A. La récupération de la motricité et de la sensibilité des membres inférieurs ✓ bonne réponse B. Uniquement la température C. La vision des couleurs D. La glycémie uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le frisson postopératoire augmente : A. La consommation d'oxygène ✓ bonne réponse B. La glycémie uniquement C. La diurèse D. La vision	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les critères de sortie de SSPI reposent sur : A. Un score validé (par exemple Aldrete) et l'avis de l'anesthésiste ✓ bonne réponse B. L'heure de fin de garde C. La demande de la famille D. Le nombre de lits disponibles uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une décurarisation incomplète peut se manifester par : A. Une faiblesse musculaire et une difficulté respiratoire ✓ bonne réponse B. Une hyperactivité C. Une fièvre D. Une hypertension isolée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Un patient agité et confus au réveil : avant tout, on recherche : A. Une hypoxie, une douleur, un globe vésical ou une hypoglycémie ✓ bonne réponse B. Un manque de télévision C. Un problème administratif D. Rien, on le sédate sans chercher	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La surveillance de l'enfant en SSPI nécessite : A. Des valeurs normales adaptées à l'âge et la présence rassurante des parents si possible ✓ bonne réponse B. Les mêmes valeurs que l'adulte C. Aucune surveillance particulière D. Un jeûne prolongé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les drains chirurgicaux sont surveillés pour : A. La quantité et l'aspect de ce qui s'écoule ✓ bonne réponse B. Leur couleur décorative C. Leur prix D. Le bruit qu'ils font	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un patient opéré sous anesthésie générale peut en général boire : A. Lorsqu'il est bien réveillé, selon la prescription et l'intervention ✓ bonne réponse B. Immédiatement à l'arrivée en SSPI, encore endormi C. Jamais pendant 3 jours D. Uniquement de l'alcool	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les transmissions à la sortie de SSPI comprennent : A. Intervention, anesthésie, antalgiques donnés, constantes, consignes de surveillance ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du patient C. Uniquement l'heure D. Rien si tout s'est bien passé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une SpO2 à 88 % en SSPI chez un patient sans pathologie respiratoire impose : A. Stimuler le patient, oxygéner, vérifier les voies aériennes et alerter ✓ bonne réponse B. Couper l'alarme C. Attendre 30 minutes D. Faire sortir le patient de SSPI	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Imagerie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)

1 Les trois principes de la radioprotection sont : A. Justification, optimisation, limitation ✓ bonne réponse B. Rapidité, précision, efficacité C. Distance, lumière, silence D. Prévention, traitement, suivi	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quels sont les trois moyens de se protéger d'une source de rayonnement ? A. Temps, distance, écran ✓ bonne réponse B. Gants, masque, lunettes de soleil C. Lavage, désinfection, stérilisation D. Température, pression, humidité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Avant un examen radiologique chez une femme en âge de procréer, il faut : A. Rechercher une éventuelle grossesse ✓ bonne réponse B. Vérifier son groupe sanguin C. Prendre sa température D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le dosimètre individuel porté par le personnel sert à : A. Mesurer la dose de rayonnement reçue ✓ bonne réponse B. Mesurer la tension artérielle C. Mesurer le temps de travail D. Détecter les métaux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le principe ALARA signifie : A. Maintenir les doses aussi basses que raisonnablement possible ✓ bonne réponse B. Augmenter les doses pour une meilleure image C. Ne jamais faire de radiographie D. Utiliser toujours le même réglage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 L'unité de dose efficace utilisée en radioprotection est : A. Le sievert (Sv), souvent exprimé en millisievert (mSv) ✓ bonne réponse B. Le kilogramme C. Le watt D. Le décibel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Doubler la distance à une source de rayons X divise la dose reçue environ par : A. 4 (loi de l'inverse du carré de la distance) ✓ bonne réponse B. 2 C. 10 D. Elle ne change pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le tablier plombé protège : A. Le tronc et les organes sensibles du rayonnement diffusé ✓ bonne réponse B. Contre les infections C. Contre le bruit de l'appareil D. Contre le champ magnétique de l'IRM	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9 Le cache-thyroïde est utile car la thyroïde est : A. Un organe sensible aux rayonnements ✓ bonne réponse B. Insensible aux rayons C. Un organe de protection D. Sans lien avec l'imagerie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La zone contrôlée d'un service d'imagerie est : A. Signalée, à accès réglementé, où l'exposition peut dépasser certains seuils ✓ bonne réponse B. Une salle d'attente libre d'accès C. Le bureau administratif D. Un vestiaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La collimation du faisceau consiste à : A. Limiter le champ d'irradiation à la zone utile ✓ bonne réponse B. Augmenter la dose C. Refroidir le tube D. Mesurer la tension du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Chez l'enfant, la radioprotection est renforcée car : A. Ses tissus sont plus sensibles et son espérance de vie plus longue ✓ bonne réponse B. Il ne bouge jamais C. Les doses n'ont aucun effet D. Les appareils sont différents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le parent qui maintient un enfant pendant une radiographie doit : A. Porter un tablier de protection et ne pas être enceinte ✓ bonne réponse B. Se placer dans le faisceau C. Ne prendre aucune précaution D. Tenir l'enfant à mains nues dans le champ	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le principe de justification signifie : A. Qu'un examen irradiant doit apporter un bénéfice supérieur au risque ✓ bonne réponse B. Qu'on justifie la facture C. Qu'on refait toujours l'examen deux fois D. Qu'on choisit la dose la plus forte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le dosimètre passif doit être porté : A. Sur la poitrine, sous le tablier plombé selon les consignes ✓ bonne réponse B. Dans le vestiaire C. Sur le poignet du patient D. Seulement à la maison	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16	Un examen de remplacement non irradiant est à privilégier quand c'est possible, par exemple :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. L'échographie ou l'IRM ✓ bonne réponse B. Un scanner C. Une radiographie de plus D. Une scintigraphie	
17	Pendant une exposition en salle de radiologie, le manipulateur se place :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Derrière le paravent ou dans le pupitre protégé ✓ bonne réponse B. À côté du patient sans protection C. Dans le faisceau D. Dans le couloir porte ouverte	
18	Le voyant lumineux « rayons X en cours » à l'entrée de la salle signifie :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Qu'il ne faut pas entrer pendant l'émission ✓ bonne réponse B. Que la salle est libre C. Que le patient est sorti D. Que l'appareil est en panne	
19	L'effet des rayonnements ionisants à faible dose est surtout un risque :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Probabiliste (augmentation du risque de cancer à long terme) ✓ bonne réponse B. De brûlure immédiate systématique C. De fracture D. D'allergie	
20	Les doses reçues par le personnel exposé sont :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Suivies régulièrement et soumises à des limites réglementaires ✓ bonne réponse B. Sans limite C. Jamais contrôlées D. Mesurées une seule fois dans la carrière	

Radiologie conventionnelle 20 questions

1	Une radiographie pulmonaire de face standard se fait de préférence :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Debout, en inspiration profonde bloquée ✓ bonne réponse B. Couché, en expiration forcée C. Assis, en respirant normalement D. Debout, en toussant	
2	Pour la radiographie d'un membre traumatisé, on réalise habituellement :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Au moins deux incidences orthogonales (face et profil) ✓ bonne réponse B. Une seule incidence de face C. Uniquement un profil D. Une incidence oblique seule	

3	Avant une radiographie, on demande au patient de retirer : A. Les objets métalliques dans la zone examinée ✓ bonne réponse B. Ses chaussettes uniquement C. Ses lunettes pour toute radiographie D. Rien du tout	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Sur une radiographie standard, l'os apparaît : A. Blanc (radio-opaque) ✓ bonne réponse B. Noir C. Transparent D. Gris foncé comme l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	L'air apparaît sur une radiographie : A. Noir (radio-transparent) ✓ bonne réponse B. Blanc C. Gris clair comme l'os D. Invisible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Une radiographie de thorax « de profil » permet notamment : A. De mieux localiser une lésion vue de face ✓ bonne réponse B. De remplacer le scanner dans tous les cas C. De mesurer la tension D. D'étudier les dents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Avant une radiographie, le manipulateur vérifie : A. L'identité du patient, la prescription et la zone à radiographier ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur des vêtements C. Uniquement l'âge D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Pour une radiographie du bassin chez une femme jeune, on interroge sur : A. Une possible grossesse ✓ bonne réponse B. Son groupe sanguin C. Ses allergies alimentaires uniquement D. Ses horaires de travail	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La radiographie au lit du patient (mobile) est utilisée : A. Quand le patient ne peut pas être déplacé (réanimation, soins intensifs) ✓ bonne réponse B. Pour tous les patients ambulatoires C. Jamais D. Uniquement pour les dents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le flou cinétique sur une image est dû : A. Aux mouvements du patient pendant l'exposition ✓ bonne réponse B. À une dose trop faible uniquement C. À la couleur de la peau D. À la température de la salle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 L'incidence « face » d'une main se réalise : A. Main à plat, paume contre le détecteur ✓ bonne réponse B. Poing fermé C. Main dans le dos D. Main en l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les objets métalliques dans la zone examinée : A. Sont retirés car ils masquent les structures ✓ bonne réponse B. Améliorent l'image C. Sont obligatoires D. N'ont aucune influence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La mammographie est un examen utilisant : A. Des rayons X à faible énergie, avec compression du sein ✓ bonne réponse B. Des ultrasons uniquement C. Un champ magnétique D. Aucune radiation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) peut montrer : A. Des niveaux hydro-aériques en cas d'occlusion ✓ bonne réponse B. Le fonctionnement du cerveau C. La tension artérielle D. La vision	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le contrôle de qualité de l'image vérifie : A. Le bon centrage, la bonne exposition et l'absence d'artéfact ✓ bonne réponse B. La couleur de l'écran uniquement C. La signature du patient D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le PACS est : A. Le système d'archivage et de transmission des images ✓ bonne réponse B. Un produit de contraste C. Un tablier plombé D. Un type de scanner	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 En traumatologie du rachis cervical, le manipulateur : A. Mobilise le patient avec précaution, en maintenant l'axe, sur avis médical ✓ bonne réponse B. Fait tourner la tête du patient pour mieux voir C. Retire le collier cervical sans avis D. Fait asseoir le patient rapidement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une radiographie de thorax de face est réalisée de préférence : A. En incidence postéro-antérieure (dos au tube) ✓ bonne réponse B. Allongé sur le ventre C. De dos au détecteur systématiquement D. En expiration forcée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 Les clichés comparatifs (côté sain) sont parfois utiles :

- A. Chez l'enfant, pour interpréter les cartilages de croissance ✓ **bonne réponse**
B. Jamais
C. Pour la facturation
D. Pour remplacer l'examen clinique

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 L'identification de chaque image comprend :

- A. Le nom du patient, la date et le repère droite/gauche ✓ **bonne réponse**
B. Uniquement le nom du manipulateur
C. Rien
D. Le prix de l'examen

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Scanner et IRM 20 questions

1 Quelle est la principale contre-indication à l'IRM ?

- A. Certains dispositifs implantés (pacemaker non compatible, corps étranger métallique intraoculaire...) ✓ **bonne réponse**
B. Le diabète
C. Une prothèse dentaire en résine
D. Le port de lentilles

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Avant l'injection d'un produit de contraste iodé, on recherche notamment :

- A. Une allergie antérieure et une insuffisance rénale ✓ **bonne réponse**
B. Une myopie
C. Un groupe sanguin rare
D. Un antécédent d'appendicectomie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 L'IRM utilise :

- A. Un champ magnétique et des ondes radiofréquence ✓ **bonne réponse**
B. Des rayons X
C. Des ultrasons
D. Des rayons gamma

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Le scanner (tomodensitométrie) utilise :

- A. Des rayons X ✓ **bonne réponse**
B. Un champ magnétique
C. Des ultrasons
D. Aucun rayonnement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Chez un patient diabétique traité par metformine, l'injection d'iode impose surtout de :

- A. Vérifier la fonction rénale et suivre le protocole d'arrêt temporaire si nécessaire ✓ **bonne réponse**
B. Doubler la dose de metformine
C. Faire un jeûne de 48 h
D. Contre-indiquer définitivement l'examen

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Avant une IRM, le patient doit retirer : A. Tous les objets métalliques (bijoux, montre, cartes magnétiques, épingles) ✓ bonne réponse B. Uniquement ses chaussures C. Rien D. Ses lunettes de vue uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le questionnaire de sécurité avant IRM recherche notamment : A. Pacemaker, implants, éclats métalliques, clips vasculaires ✓ bonne réponse B. Les préférences alimentaires C. Le groupe sanguin D. Le niveau d'études	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le produit de contraste utilisé en IRM est le plus souvent : A. À base de gadolinium ✓ bonne réponse B. À base d'iode C. Du baryum D. De l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le bruit pendant une IRM impose de : A. Fournir des protections auditives au patient ✓ bonne réponse B. Augmenter le volume de la musique C. Ne rien prévoir D. Laisser la porte ouverte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un patient claustrophobe avant une IRM peut être aidé par : A. Des explications, un contact verbal et parfois une prémédication prescrite ✓ bonne réponse B. Une contention forcée C. Un examen sans le prévenir D. Le laisser seul sans information	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un objet métallique ferromagnétique introduit en salle d'IRM peut : A. Être violemment attiré par l'aimant (effet projectile) ✓ bonne réponse B. Améliorer les images C. Être sans danger D. Arrêter le champ magnétique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le champ magnétique d'une IRM est : A. Toujours actif, même quand aucun examen n'est en cours ✓ bonne réponse B. Actif uniquement pendant l'examen C. Coupé la nuit D. Inexistant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Pour un scanner avec injection d'iode, on demande souvent : A. Un bilan de la fonction rénale récent selon les facteurs de risque ✓ bonne réponse B. Un électroencéphalogramme C. Un test d'effort D. Un bilan ophtalmologique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Une réaction allergique à l'iode pendant l'injection se manifeste par : A. Urticaire, gêne respiratoire, chute de tension ✓ bonne réponse B. Une faim soudaine C. Une meilleure qualité d'image D. Une baisse de la fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Après une injection de produit de contraste iodé, on conseille en général : A. De bien s'hydrater ✓ bonne réponse B. De jeûner 3 jours C. De ne pas boire D. De faire du sport intense immédiatement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Une extravasation de produit de contraste au point d'injection impose : A. D'arrêter l'injection, surélever le membre et prévenir le médecin ✓ bonne réponse B. D'augmenter le débit C. De masser fortement D. De ne rien faire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le scanner est particulièrement utile en urgence pour : A. Rechercher un saignement intracrânien après un traumatisme ✓ bonne réponse B. Étudier un fœtus en première intention C. Remplacer l'échographie cardiaque D. Mesurer la glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le coroscanner ou l'angioscanner nécessitent souvent : A. Une voie veineuse de bon calibre pour l'injection rapide ✓ bonne réponse B. Aucune voie veineuse C. Un jeûne de 48 heures D. Une anesthésie générale systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Les patients diabétiques sous metformine doivent signaler leur traitement avant : A. Un examen avec injection d'iode ✓ bonne réponse B. Une radiographie du doigt C. Une prise de tension D. Une pesée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un implant « compatible IRM sous conditions » signifie : A. Que l'examen est possible en respectant les conditions du fabricant ✓ bonne réponse B. Que tout examen est interdit C. Que l'implant doit être retiré D. Qu'il n'y a aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Laboratoire / biologie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale

1	Un tube arrive au laboratoire sans étiquette d'identification. Que faire ? A. Le refuser et demander un nouveau prélèvement ✓ bonne réponse B. Le traiter et deviner le patient C. L'étiqueter avec le patient le plus probable D. Le conserver sans rien dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La glycémie à jeun se prélève après un jeûne d'au moins : A. 8 heures ✓ bonne réponse B. 1 heure C. 30 minutes D. 24 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une hémolyse de l'échantillon augmente faussement notamment : A. Le potassium ✓ bonne réponse B. Le sodium C. La glycémie D. Les plaquettes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un tube pour bilan d'hémostase (citrate) insuffisamment rempli : A. Fausse les résultats et doit être refusé ✓ bonne réponse B. Donne des résultats plus précis C. Est sans conséquence D. Peut être complété avec un autre tube	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un échantillon pour gazométrie artérielle doit être : A. Analysé rapidement, sans bulle d'air ✓ bonne réponse B. Laissé à l'air libre une heure C. Congelé avant analyse D. Agité à l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La phase pré-analytique comprend : A. Tout ce qui précède l'analyse : prescription, préparation du patient, prélèvement, transport ✓ bonne réponse B. Uniquement la validation des résultats C. Uniquement la facturation D. Le rendu du compte rendu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La majorité des erreurs de laboratoire surviennent : A. Pendant la phase pré-analytique ✓ bonne réponse B. Pendant l'analyse automatisée C. Après le rendu des résultats D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un échantillon de sang pour bilan d'hémostase doit être acheminé : A. Rapidement, à température ambiante, sans être agité ✓ bonne réponse B. Congelé C. Au soleil D. Après 48 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	Un tube coagulé alors qu'il devait rester liquide (EDTA) est le plus souvent dû à :	A. Une homogénéisation insuffisante après le prélèvement ✓ bonne réponse B. Un patient à jeun C. Une étiquette mal collée D. Un tube trop rempli de façon correcte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Pour un dosage de la kaliémie, un prélèvement fait avec un garrot prolongé et le poing serré peut :	A. Augmenter faussement le potassium ✓ bonne réponse B. Diminuer le sodium C. Fausser la couleur de l'urine D. N'avoir aucun effet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La recherche de sang dans les selles, les urines de 24 h ou certains dosages hormonaux nécessitent :	A. Des consignes de recueil précises remises au patient ✓ bonne réponse B. Aucune explication C. Un prélèvement au hasard D. Un jeûne de 3 jours	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Le recueil des urines de 24 heures commence :	A. Après avoir jeté les premières urines du matin, puis tout recueillir jusqu'au lendemain même heure ✓ bonne réponse B. En gardant les urines du matin et en jetant les autres C. Uniquement la nuit D. Sur une seule miction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un prélèvement destiné à un dosage d'ammoniémie doit être :	A. Transporté rapidement dans la glace ✓ bonne réponse B. Laisse à température ambiante plusieurs heures C. Congelé à -20 °C sans délai D. Agité fortement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	La feuille de demande d'examens doit comporter :	A. Identité du patient, prescripteur, examens demandés, date et heure de prélèvement ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du préleveur C. Uniquement le prix D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Un échantillon lipémique (sérum laiteux) peut :	A. Interférer avec certaines analyses ✓ bonne réponse B. Améliorer la précision C. Être sans conséquence D. Indiquer une hémolyse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Le délai entre prélèvement et centrifugation est important car : A. Certains paramètres évoluent dans le tube (glucose, potassium...) ✓ bonne réponse B. Le tube change de couleur C. Il n'a aucune importance D. Le patient doit attendre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le transport des prélèvements biologiques se fait : A. Dans un triple emballage adapté pour la sécurité ✓ bonne réponse B. Dans la poche du coursier sans protection C. Avec les repas D. Dans un sac poubelle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un dosage de médicament (taux résiduel), le prélèvement se fait : A. Juste avant la prise suivante du médicament ✓ bonne réponse B. Juste après la prise C. À n'importe quel moment D. Le lendemain de l'arrêt	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un échantillon non conforme (tube inadapté) est : A. Refusé ou traité selon la procédure, avec information du service ✓ bonne réponse B. Toujours analysé C. Jeté sans prévenir D. Remplacé par un autre tube du même patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le prélèvement pour une sérologie nécessite en général : A. Un tube sec (sérum) ✓ bonne réponse B. Un tube citraté C. Un flacon d'hémoculture D. Un pot à urine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Hématologie 20 questions

1 Le taux normal d'hémoglobine chez une femme adulte est d'environ : A. 12 à 16 g/dL ✓ bonne réponse B. 5 à 8 g/dL C. 18 à 22 g/dL D. 1 à 3 g/dL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Le nombre normal de plaquettes chez l'adulte est d'environ : A. 150 000 à 400 000 /mm³ ✓ bonne réponse B. 10 000 à 50 000 /mm³ C. 1 à 2 millions /mm³ D. 4 000 à 10 000 /mm³	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 Le nombre normal de leucocytes chez l'adulte est d'environ : A. 4 000 à 10 000 /mm³ ✓ bonne réponse B. 150 000 à 400 000 /mm³ C. 500 à 1 000 /mm³ D. 50 000 /mm³	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un VGM (volume globulaire moyen) bas évoque principalement : A. Une anémie microcytaire, souvent par carence en fer ✓ bonne réponse B. Une carence en vitamine B12 C. Une polyglobulie D. Une leucémie certaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le receveur universel en transfusion de globules rouges est de groupe : A. AB Rh+ ✓ bonne réponse B. O Rh- C. A Rh+ D. B Rh-	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le frottis sanguin permet de : A. Observer au microscope la forme et la répartition des cellules sanguines ✓ bonne réponse B. Doser le glucose C. Mesurer la créatinine D. Faire une culture bactérienne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 La coloration la plus utilisée pour le frottis sanguin est : A. May-Grünwald-Giemsa ✓ bonne réponse B. Gram C. Ziehl-Neelsen D. Encre de Chine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Une polynucléose neutrophile évoque souvent : A. Une infection bactérienne ✓ bonne réponse B. Une carence en fer C. Une allergie uniquement D. Une déshydratation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Une hyperéosinophilie peut évoquer : A. Une allergie ou une parasitose ✓ bonne réponse B. Une infection virale banale uniquement C. Une hémorragie D. Un diabète	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le taux de prothrombine (TP) explore : A. La voie extrinsèque de la coagulation (surveillance des AVK via l'INR) ✓ bonne réponse B. Les plaquettes uniquement C. La glycémie D. La fonction rénale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11	Le TCA est utilisé notamment pour surveiller : A. Un traitement par héparine non fractionnée ✓ bonne réponse B. Un traitement par insuline C. Un traitement antibiotique D. La grossesse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un INR cible entre 2 et 3 concerne en général : A. Les patients sous antivitamine K pour la plupart des indications ✓ bonne réponse B. Les patients sans traitement C. Les patients sous insuline D. Les nouveau-nés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le groupage sanguin ABO repose sur : A. La recherche des antigènes globulaires et des anticorps du plasma ✓ bonne réponse B. La mesure de l'hémoglobine C. La numération des plaquettes D. La culture du sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Le donneur universel de globules rouges est : A. O Rhésus négatif ✓ bonne réponse B. AB Rhésus positif C. A Rhésus positif D. B Rhésus négatif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	La recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) est réalisée : A. Avant une transfusion et pendant la grossesse ✓ bonne réponse B. Uniquement après une fracture C. Pour doser le cholestérol D. Pour mesurer la glycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Les réticulocytes reflètent : A. La production de globules rouges par la moelle osseuse ✓ bonne réponse B. La fonction du foie C. La coagulation D. Le taux de sucre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	La vitesse de sédimentation (VS) est un marqueur : A. D'inflammation, peu spécifique ✓ bonne réponse B. Spécifique d'un cancer C. De grossesse D. D'allergie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Une thrombopénie sévère expose surtout à : A. Un risque hémorragique ✓ bonne réponse B. Une thrombose C. Une hypertension D. Une hyperglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 L'hématocrite correspond à :

- A. Le pourcentage du volume sanguin occupé par les globules rouges ✓ **bonne réponse**
- B. Le nombre de plaquettes
- C. Le taux de fer
- D. La quantité de plasma uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Les automates d'hématologie doivent être soumis à :

- A. Des contrôles de qualité internes réguliers ✓ **bonne réponse**
- B. Aucun contrôle
- C. Un contrôle tous les dix ans
- D. Un nettoyage annuel seulement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Analyses biochimiques 20 questions

1 La glycémie à jeun normale est d'environ :

- A. 0,70 à 1,10 g/L ✓ **bonne réponse**
- B. 0,20 à 0,40 g/L
- C. 2 à 3 g/L
- D. 1,50 à 2 g/L

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La kaliémie (potassium) normale est d'environ :

- A. 3,5 à 5,0 mmol/L ✓ **bonne réponse**
- B. 135 à 145 mmol/L
- C. 0,5 à 1,0 mmol/L
- D. 8 à 10 mmol/L

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 La natrémie (sodium) normale est d'environ :

- A. 135 à 145 mmol/L ✓ **bonne réponse**
- B. 3,5 à 5 mmol/L
- C. 95 à 105 mmol/L
- D. 160 à 180 mmol/L

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La créatininémie est surtout utilisée pour évaluer :

- A. La fonction rénale ✓ **bonne réponse**
- B. La fonction hépatique
- C. La coagulation
- D. La thyroïde

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 L'HbA1c (hémoglobine glyquée) reflète l'équilibre glycémique des :

- A. 2 à 3 derniers mois ✓ **bonne réponse**
- B. 24 dernières heures
- C. 7 derniers jours
- D. 2 dernières années

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6	La CRP (protéine C réactive) est un marqueur : A. D'inflammation, qui augmente rapidement en cas d'infection bactérienne ✓ bonne réponse B. De la fonction thyroïdienne C. Du diabète D. De l'anémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les transaminases (ASAT, ALAT) explorent principalement : A. Le foie ✓ bonne réponse B. Les reins C. Le cœur uniquement D. Les os	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La troponine est dosée pour rechercher : A. Une atteinte du muscle cardiaque (infarctus) ✓ bonne réponse B. Une infection urinaire C. Une grossesse D. Une carence en fer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'urée et la créatinine augmentées évoquent : A. Une insuffisance rénale ✓ bonne réponse B. Une hépatite C. Une anémie D. Une allergie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La bilirubine augmentée provoque : A. Un ictère (jaunisse) ✓ bonne réponse B. Une hypertension C. Une toux D. Une hypoglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La TSH est dosée pour explorer : A. La thyroïde ✓ bonne réponse B. Le pancréas C. Le rein D. La moelle osseuse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La ferritine basse évoque : A. Une carence en fer ✓ bonne réponse B. Une infection C. Un excès de vitamine C D. Une hyperglycémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Le dosage des bêta-hCG sert notamment à : A. Diagnostiquer et suivre une grossesse ✓ bonne réponse B. Explorer le foie C. Mesurer le cholestérol D. Surveiller l'insuline	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 La calcémie normale chez l'adulte est d'environ : A. 2,2 à 2,6 mmol/L ✓ bonne réponse B. 0,2 à 0,5 mmol/L C. 5 à 10 mmol/L D. 135 à 145 mmol/L	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les lipases augmentées (plus de 3 fois la normale) avec douleur abdominale évoquent : A. Une pancréatite aiguë ✓ bonne réponse B. Une appendicite certaine C. Une infection urinaire D. Une fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le principe de la spectrophotométrie repose sur : A. La mesure de l'absorption de la lumière par une solution ✓ bonne réponse B. La culture des bactéries C. La coloration de Gram D. La centrifugation seule	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un contrôle de qualité hors limites sur un automate impose : A. De ne pas rendre les résultats et de rechercher la cause avant de reprendre ✓ bonne réponse B. De rendre les résultats quand même C. D'ignorer le contrôle D. De changer de patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une hyperkaliémie importante est dangereuse car elle peut provoquer : A. Des troubles du rythme cardiaque ✓ bonne réponse B. Une chute de cheveux C. Une fièvre D. Une myopie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un résultat critique (valeur d'alerte) doit être : A. Communiqué sans délai au médecin ou au service selon la procédure ✓ bonne réponse B. Rendu le lendemain C. Gardé pour la fin de la journée D. Envoyé par courrier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L (7 mmol/L) à deux reprises définit : A. Un diabète ✓ bonne réponse B. Une hypoglycémie C. Une valeur normale D. Une anémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 La coloration de Gram permet de distinguer : A. Les bactéries Gram positif (violette) et Gram négatif (roses) ✓ bonne réponse B. Les virus des bactéries C. Les groupes sanguins D. Les cellules cancéreuses	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Pour un ECBU, le recueil des urines se fait : A. Après toilette, en milieu de jet, dans un flacon stérile ✓ bonne réponse B. Au premier jet, sans toilette C. Dans n'importe quel récipient propre D. Sur 24 heures dans un bocal non stérile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Un échantillon pour culture bactériologique qui ne peut être analysé immédiatement est : A. Conservé selon le protocole (souvent au réfrigérateur à +4 °C pour les urines) ✓ bonne réponse B. Laissé à 37 °C au soleil C. Congelé systématiquement à -80 °C D. Jeté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Escherichia coli est : A. Un bacille Gram négatif ✓ bonne réponse B. Un coque Gram positif C. Un virus D. Un champignon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Un ECBU est considéré comme évocateur d'infection urinaire en présence de : A. Leucocyturie et bactériurie significatives, à interpréter selon le contexte ✓ bonne réponse B. Uniquement de cristaux C. Uniquement de mucus D. Urines limpides sans cellules	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 L'antibiogramme permet de : A. Déterminer la sensibilité d'une bactérie aux antibiotiques ✓ bonne réponse B. Compter les globules rouges C. Doser le sucre D. Identifier un virus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Staphylococcus aureus est : A. Un coque Gram positif en amas ✓ bonne réponse B. Un bacille Gram négatif C. Un champignon D. Un parasite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 La coloration de Ziehl-Neelsen est utilisée pour rechercher : A. Les mycobactéries (bacille de la tuberculose) ✓ bonne réponse B. Les levures C. Les streptocoques D. Les virus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Candida albicans est : A. Une levure (champignon) ✓ bonne réponse B. Une bactérie C. Un virus D. Un parasite intestinal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Les prélèvements pour recherche de germes anaérobies doivent être : A. Protégés de l'air et acheminés rapidement ✓ bonne réponse B. Laissés à l'air libre C. Congelés D. Séchés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le poste de sécurité microbiologique (PSM) protège : A. Le manipulateur, l'échantillon et l'environnement selon sa classe ✓ bonne réponse B. Uniquement contre le bruit C. Contre l'incendie D. Contre les rayons X	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Une bactérie multirésistante (BMR) est : A. Résistante à plusieurs familles d'antibiotiques ✓ bonne réponse B. Sensible à tous les antibiotiques C. Un virus D. Un champignon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le milieu gélose au sang permet notamment d'observer : A. L'hémolyse produite par certaines bactéries (streptocoques) ✓ bonne réponse B. Le groupe sanguin C. La glycémie D. Les virus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le résultat d'une hémoculture positive doit être : A. Transmis rapidement au clinicien (examen direct, puis identification) ✓ bonne réponse B. Rendu une semaine plus tard C. Ignoré D. Envoyé uniquement par courrier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15	La PCR est une technique :	A. D'amplification génétique permettant de détecter un micro-organisme ✓ bonne réponse B. De coloration C. De culture sur gélose D. De centrifugation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Un prélèvement de gorge pour recherche de streptocoque se fait avec :	A. Un écouvillon frotté sur les amygdales ✓ bonne réponse B. Une seringue intraveineuse C. Un tube EDTA D. Un pot à selles	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	La recherche de parasites dans les selles (examen parasitologique) nécessite souvent :	A. Plusieurs prélèvements à quelques jours d'intervalle ✓ bonne réponse B. Un seul prélèvement congelé C. Du sang D. Un jeûne de 48 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Les déchets contaminés du laboratoire de microbiologie sont :	A. Éliminés selon la filière des déchets infectieux, après inactivation si prévu ✓ bonne réponse B. Jetés dans les ordures ménagères C. Lavés et réutilisés D. Versés dans l'évier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Les cultures bactériennes sont en général incubées à :	A. Environ 35 à 37 °C ✓ bonne réponse B. 4 °C C. 60 °C D. -20 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	La mise en évidence d'Escherichia coli dans une eau de boisson indique :	A. Une contamination fécale ✓ bonne réponse B. Une eau parfaitement potable C. Un excès de calcium D. Une eau trop froide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Pharmacie

Postes concernés : Préparateur(trice) en pharmacie

Gestion des stocks pharmaceutiques 20 questions

1	La règle de rotation des stocks recommandée pour les médicaments est :	A. Premier périmé, premier sorti (FEFO) ✓ bonne réponse B. Dernier entré, premier sorti C. Au hasard D. Le plus cher en premier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--	--	---

2 Un médicament périmé trouvé en rayon doit être : A. Retiré, isolé et éliminé selon la filière dédiée ✓ bonne réponse B. Délivré en priorité C. Remis en rayon D. Jeté à la poubelle ménagère	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le stock de sécurité correspond à : A. La quantité minimale gardée pour faire face aux retards ou à une hausse de consommation ✓ bonne réponse B. Le stock de médicaments périmés C. Le stock du concurrent D. La quantité commandée chaque jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 L'inventaire permet de : A. Comparer le stock réel au stock théorique ✓ bonne réponse B. Fixer les prix de vente C. Remplacer les ordonnances D. Calculer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le point de commande correspond : A. Au niveau de stock à partir duquel il faut passer commande ✓ bonne réponse B. Au jour de l'inventaire C. Au prix d'achat D. Au stock maximal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Une rupture de stock d'un médicament essentiel doit être : A. Signalée rapidement et une solution de remplacement recherchée avec le pharmacien ✓ bonne réponse B. Ignorée C. Cachée au prescripteur D. Compensée par un médicament au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 À la réception d'une commande, on vérifie : A. La conformité (produits, quantités, lots, dates de péremption) et l'état des colis ✓ bonne réponse B. Uniquement le nombre de cartons C. La couleur des boîtes D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les médicaments de la chaîne du froid reçus en livraison doivent être : A. Rangés immédiatement au réfrigérateur ✓ bonne réponse B. Laissés dans le carton jusqu'au lendemain C. Mis au congélateur D. Rangés sur l'étagère ordinaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les stupéfiants sont stockés : A. Dans une armoire sécurisée fermée à clé, avec un registre ✓ bonne réponse B. Avec les autres médicaments C. Dans le bureau de l'accueil D. En libre accès	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Le registre des stupéfiants permet : A. De tracer chaque entrée et sortie ✓ bonne réponse B. De calculer les salaires C. De noter les congés D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un écart entre stock réel et stock informatique doit être : A. Analysé et corrigé selon la procédure ✓ bonne réponse B. Ignoré C. Modifié sans explication D. Caché	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La rotation des stocks permet notamment : A. De limiter les périmés et l'immobilisation financière ✓ bonne réponse B. D'augmenter les pertes C. De garder des produits plus longtemps D. D'éviter les inventaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le rangement d'une pharmacie se fait souvent : A. Par ordre logique (alphabétique, forme galénique ou classe), avec les dates courtes devant ✓ bonne réponse B. Au hasard C. Par couleur de boîte D. Par prix décroissant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un médicament rappelé par le fabricant (rappel de lot) doit être : A. Retiré immédiatement des stocks et isolé ✓ bonne réponse B. Délivré jusqu'à épuisement C. Remis en rayon D. Donné au personnel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Le numéro de lot d'un médicament sert à : A. Assurer la traçabilité en cas de problème de qualité ✓ bonne réponse B. Indiquer le prix C. Indiquer la posologie D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La consommation moyenne mensuelle sert à : A. Calculer les besoins et les quantités à commander ✓ bonne réponse B. Fixer les horaires C. Déterminer les congés D. Choisir les fournisseurs au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les produits inflammables (alcool, éther) sont stockés : A. Dans un local ou une armoire adaptés, loin des sources de chaleur ✓ bonne réponse B. Près d'un radiateur C. Dans le réfrigérateur alimentaire D. Au soleil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Les médicaments non utilisés rapportés par les patients sont : A. Éliminés par la filière dédiée, jamais remis en stock ✓ bonne réponse B. Revendus C. Remis en rayon D. Jetés dans l'évier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Un inventaire tournant consiste à : A. Compter régulièrement une partie du stock tout au long de l'année ✓ bonne réponse B. Tout compter une fois tous les dix ans C. Ne jamais compter D. Compter uniquement les produits chers	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La dotation d'un service hospitalier est : A. La liste et les quantités de médicaments disponibles en permanence dans le service ✓ bonne réponse B. Le budget du personnel C. Le nombre de lits D. La liste des patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Délivrance et conseil 20 questions

1 Avant de délivrer un médicament, il faut vérifier sur l'ordonnance : A. L'identité du patient, le prescripteur, la date, la posologie et la durée ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du médicament C. Uniquement la signature D. Uniquement le prix	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un médicament « générique » est : A. Une copie du médicament de référence, avec le même principe actif et la même efficacité ✓ bonne réponse B. Un médicament moins efficace C. Un médicament sans principe actif D. Un médicament réservé à l'hôpital	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 La posologie « 1 cp 3 fois par jour pendant 7 jours » correspond à : A. 21 comprimés ✓ bonne réponse B. 7 comprimés C. 10 comprimés D. 3 comprimés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un patient sous anticoagulant (AVK) demande de l'aspirine pour un mal de tête. Que conseiller ? A. Éviter l'aspirine (risque hémorragique) et orienter vers le pharmacien / médecin, le paracétamol étant généralement préféré ✓ bonne réponse B. Délivrer de l'aspirine à forte dose C. Doubler l'anticoagulant D. Aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5 Une ordonnance dont la date de prescription est trop ancienne : A. Doit être vérifiée selon la réglementation avant toute délivrance ✓ bonne réponse B. Peut toujours être délivrée C. Doit être déchirée D. N'a pas de durée de validité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Un patient demande un antibiotique sans ordonnance. Vous : A. Refusez et l'orientez vers un médecin : les antibiotiques nécessitent une prescription ✓ bonne réponse B. Délivrez la boîte la plus grande C. Délivrez un antibiotique au hasard D. Lui donnez les restes d'un autre patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 « 1 cp matin et soir » signifie : A. Un comprimé deux fois par jour ✓ bonne réponse B. Deux comprimés le matin C. Un comprimé par semaine D. Un comprimé tous les deux jours	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Le conseil associé à un antibiotique comprend : A. Respecter la durée prescrite même si les symptômes disparaissent ✓ bonne réponse B. Arrêter dès qu'on se sent mieux C. Doubler la dose en cas d'oubli D. Le partager avec la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Une interaction médicamenteuse est : A. Une modification de l'effet d'un médicament par un autre ✓ bonne réponse B. Une erreur de prix C. Une allergie alimentaire D. Un changement d'emballage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Chez la femme enceinte, avant de délivrer un médicament sans ordonnance : A. On vérifie qu'il est compatible avec la grossesse et on oriente si besoin ✓ bonne réponse B. On délivre comme pour tout le monde C. On propose de l'aspirine à forte dose D. On ne pose aucune question	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) sont à éviter notamment : A. En fin de grossesse et en cas d'ulcère ou d'insuffisance rénale ✓ bonne réponse B. Chez tous les adultes en bonne santé C. En cas de rhume simple uniquement D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12	Le paracétamol en automédication chez l'adulte ne doit pas dépasser en général : A. 3 à 4 g par jour selon le poids et le terrain ✓ bonne réponse B. 10 g par jour C. 500 mg par semaine D. Il n'y a pas de limite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Une forme « gastro-résistante » : A. Ne doit pas être croquée ni écrasée ✓ bonne réponse B. Doit être dissoute dans l'eau chaude C. Se prend uniquement en suppositoire D. Peut être coupée sans conséquence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un patient âgé polymédiqué présente un risque accru : A. D'interactions et d'effets indésirables ✓ bonne réponse B. De guérison plus rapide C. D'aucun effet D. De meilleure tolérance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Les collyres ouverts se conservent en général : A. Pendant une durée limitée après ouverture (souvent 15 à 30 jours, selon la notice) ✓ bonne réponse B. Indéfiniment C. Un an après ouverture dans tous les cas D. Uniquement au congélateur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16	Lors de la délivrance d'un inhalateur pour l'asthme, on explique : A. La technique d'inhalation et le rinçage de la bouche pour les corticoïdes ✓ bonne réponse B. Qu'il faut l'avaler C. Qu'il s'utilise une fois par mois D. Qu'il ne faut jamais le secouer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17	Un générique peut remplacer le médicament de référence : A. Selon la réglementation, sauf mention contraire du prescripteur ✓ bonne réponse B. Jamais C. Uniquement pour les enfants D. Uniquement si le patient paie plus	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18	Un sirop pour enfant se dose avec : A. Le dispositif doseur fourni avec le médicament ✓ bonne réponse B. Une cuillère à soupe de cuisine au hasard C. Un verre D. Le bouchon d'une autre bouteille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	Un patient décrit une éruption cutanée après un nouveau médicament. Vous : A. L'orientez vers son médecin et signalez l'effet indésirable ✓ bonne réponse B. Lui conseillez de doubler la dose C. Ignorez sa plainte D. Lui vendez un autre médicament au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Le secret professionnel au comptoir impose :

- A. De parler discrètement et de respecter la confidentialité des traitements ✓
bonne réponse
- B. D'annoncer les traitements à voix haute
- C. De commenter l'ordonnance devant les autres clients
- D. De photocopier l'ordonnance pour les voisins

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Conservation des médicaments 20 questions

1 La plupart des vaccins et insulines non entamées se conservent :

- A. Au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C ✓
bonne réponse
- B. Au congélateur
- C. À température ambiante au soleil
- D. À plus de 30 °C

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La « chaîne du froid » signifie :

- A. Le maintien de la température de conservation sans interruption, de la fabrication à l'administration ✓
bonne réponse
- B. Le stockage des médicaments au congélateur
- C. Une méthode de livraison rapide
- D. Le refroidissement du patient

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un flacon d'insuline en cours d'utilisation peut généralement être conservé :

- A. À température ambiante (moins de 25-30 °C) pendant environ 4 semaines, selon la notice ✓
bonne réponse
- B. Au congélateur
- C. Indéfiniment
- D. Au soleil

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La température du réfrigérateur à médicaments doit être :

- A. Contrôlée et tracée régulièrement ✓
bonne réponse
- B. Vérifiée une fois par an
- C. Jamais vérifiée
- D. Réglée sur la position la plus froide (négative)

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 La mention « à conserver à une température ne dépassant pas 25 °C » signifie :

- A. Un stockage à température ambiante contrôlée, à l'abri de la chaleur ✓
bonne réponse
- B. Un stockage au réfrigérateur obligatoire
- C. Un stockage au congélateur
- D. Aucune précaution

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un vaccin congelé par erreur :

- A. Ne doit pas être utilisé et doit être signalé ✓
bonne réponse
- B. Peut être utilisé après décongélation
- C. Est plus efficace
- D. Peut être donné à moitié dose

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 Un réfrigérateur à médicaments ne doit pas contenir : A. De la nourriture ou des boissons ✓ bonne réponse B. Des vaccins C. De l'insuline non entamée D. Un thermomètre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 En cas de panne du réfrigérateur à médicaments, il faut : A. Transférer les produits dans un autre réfrigérateur, noter la durée et la température, et demander l'avis du pharmacien ✓ bonne réponse B. Ne rien dire C. Jeter tout sans évaluer D. Mettre les produits au soleil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Les médicaments photosensibles doivent être : A. Conservés à l'abri de la lumière, dans leur emballage ✓ bonne réponse B. Exposés au soleil C. Sortis de leur boîte D. Mis sous une lampe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Une solution buvable ouverte se conserve : A. Selon la durée indiquée après ouverture sur la notice ✓ bonne réponse B. Toujours un an C. Toujours 24 heures D. Indéfiniment	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Un médicament qui a changé d'aspect (couleur, odeur, dépôt) : A. Ne doit pas être utilisé ✓ bonne réponse B. Peut être utilisé normalement C. Est plus actif D. Doit être dilué	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le relevé de température d'un réfrigérateur doit être : A. Fait régulièrement (au moins quotidiennement) et enregistré ✓ bonne réponse B. Fait une fois par an C. Fait uniquement en été D. Inutile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 L'humidité est néfaste pour : A. Les comprimés et gélules (dégradation) ✓ bonne réponse B. Aucun médicament C. Uniquement les seringues D. Les étiquettes uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le transport de médicaments thermosensibles nécessite : A. Une glacière adaptée avec contrôle de la température ✓ bonne réponse B. Un sac plastique ordinaire au soleil C. Le coffre d'une voiture chaude D. Aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 La date « EXP 06/2027 » signifie que le médicament : A. Peut être utilisé jusqu'à la fin de juin 2027 s'il est bien conservé ✓ bonne réponse B. Est périmé depuis 2026 C. Est fabriqué en 2027 D. N'a pas de date limite	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les multidoses injectables entamées (flacons) doivent être : A. Datées à l'ouverture et utilisées selon le délai prévu, avec asepsie ✓ bonne réponse B. Utilisées sans limite de temps C. Gardées ouvertes à l'air D. Partagées sans précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un stylo à insuline en cours d'utilisation se conserve en général : A. À température ambiante (sans dépasser environ 25–30 °C selon la notice), à l'abri de la lumière ✓ bonne réponse B. Au congélateur C. Au soleil sur le tableau de bord D. Dans l'eau chaude	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Les suppositoires se conservent : A. Au frais, à l'abri de la chaleur pour éviter qu'ils ne fondent ✓ bonne réponse B. Près d'un radiateur C. Au soleil D. Au congélateur obligatoirement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La température d'une pièce de stockage des médicaments doit être : A. Surveillée, surtout en été ✓ bonne réponse B. Ignorée C. La plus chaude possible D. Toujours inférieure à 0 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les médicaments périmés d'un service sont : A. Retournés à la pharmacie pour élimination selon la filière ✓ bonne réponse B. Jetés à la poubelle ordinaire C. Gardés pour l'année suivante D. Donnés aux patients	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Rééducation

Postes concernés : Kinésithérapeute

1 Après une prothèse totale de hanche par voie postérieure, quel mouvement est à éviter en début de rééducation ? A. L'association flexion, adduction et rotation interne (risque de luxation) ✓ bonne réponse B. La marche avec aide technique C. La contraction du quadriceps D. La respiration profonde	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Le testing musculaire coté de 0 à 5 : la cote 3 correspond à : A. Un mouvement complet contre la pesanteur, sans résistance ✓ bonne réponse B. Aucune contraction C. Une force normale D. Une contraction sans mouvement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Pour un patient hémiplégique, la canne se tient : A. Du côté sain ✓ bonne réponse B. Du côté atteint C. Avec les deux mains D. Elle est déconseillée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 La mobilisation précoce après une chirurgie vise notamment à prévenir : A. La phlébite, les escarres et l'enraidissement ✓ bonne réponse B. La fièvre C. L'hypoglycémie D. Les allergies	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Une entorse récente de la cheville se prend en charge initialement par : A. Repos relatif, glace, compression, surélévation ✓ bonne réponse B. Massage profond immédiat C. Chaleur intense D. Course à pied	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Après une ligamentoplastie du genou, la rééducation précoce vise d'abord à : A. Contrôler la douleur et l'œdème, récupérer l'extension et le verrouillage du quadriceps ✓ bonne réponse B. Reprendre la course dès le 3e jour C. Immobiliser le genou pendant 3 mois D. Masser la cicatrice profondément le premier jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Une contraction isométrique est : A. Une contraction sans mouvement de l'articulation ✓ bonne réponse B. Une contraction avec un grand mouvement C. Un étirement passif D. Un massage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 La mobilisation passive est réalisée : A. Par le thérapeute, sans contraction active du patient ✓ bonne réponse B. Par le patient seul contre résistance C. Avec des poids lourds D. Uniquement en piscine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Un patient hémiplegique : pour l'aider à s'habiller, on commence par : A. Le côté atteint (et on déshabille d'abord le côté sain) ✓ bonne réponse B. Le côté sain C. Indifféremment D. Les chaussures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La rééducation de l'équilibre chez la personne âgée a pour objectif principal : A. De prévenir les chutes ✓ bonne réponse B. De faire maigrir C. D'améliorer la vue D. De traiter le diabète	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 L'utilisation de béquilles pour monter un escalier : on monte d'abord : A. La jambe saine, puis les béquilles et la jambe opérée ✓ bonne réponse B. La jambe opérée C. Les béquilles seules D. En sautant à pieds joints	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Une entorse grave du ligament croisé antérieur se teste notamment par : A. Le test de Lachman ✓ bonne réponse B. Le score de Glasgow C. Le test d'Allen D. Le score d'Apgar	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le renforcement musculaire progressif repose sur : A. Une augmentation graduelle de la charge et des répétitions ✓ bonne réponse B. Des charges maximales dès la première séance C. Le repos complet D. Des étirements uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une douleur qui augmente fortement et persiste après les séances doit faire : A. Adapter le programme et en informer le médecin ✓ bonne réponse B. Augmenter l'intensité C. Ignorer la douleur D. Arrêter de boire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Après une fracture du poignet plâtrée, on surveille : A. La couleur, la chaleur, la sensibilité et la mobilité des doigts ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur du plâtre C. La tension artérielle seule D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La cryothérapie (froid) est utilisée pour : A. Diminuer la douleur et l'œdème en phase aiguë ✓ bonne réponse B. Réchauffer les muscles avant l'effort C. Traiter une plaie infectée D. Augmenter l'inflammation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 L'ergothérapie vise surtout à : A. Favoriser l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne ✓ bonne réponse B. Traiter les caries C. Réaliser des radiographies D. Prescrire des médicaments	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La lombalgie commune aiguë : la recommandation actuelle est : A. De maintenir les activités autant que possible, le repos strict prolongé étant déconseillé ✓ bonne réponse B. Un repos strict au lit pendant 3 semaines C. Une chirurgie immédiate D. Le port permanent d'un corset	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le bilan articulaire d'un genou en extension complète correspond à : A. 0° ✓ bonne réponse B. 90° C. 180° D. 45°	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un patient sous anticoagulants en rééducation : on évite : A. Les techniques traumatisantes (massages profonds intenses) sans avis ✓ bonne réponse B. La marche C. Les exercices respiratoires D. Les explications	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Kinésithérapie respiratoire 20 questions

1 Le désencombrement bronchique vise à : A. Faciliter l'évacuation des sécrétions bronchiques ✓ bonne réponse B. Augmenter la tension artérielle C. Diminuer la fréquence cardiaque D. Traiter une fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Chez le patient BPCO, la ventilation lèvres pincées permet de : A. Freiner l'expiration et limiter le piégeage de l'air ✓ bonne réponse B. Accélérer la respiration C. Bloquer la respiration D. Augmenter la toux sèche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	La spirométrie incitative après chirurgie abdominale sert à : A. Prévenir les atélectasies en encourageant les inspirations profondes ✓ bonne réponse B. Mesurer la glycémie C. Traiter la douleur D. Faire maigrir le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pendant une séance, une SpO2 qui chute à 86 % impose de : A. Interrompre l'effort et surveiller / alerter selon la prescription d'oxygène ✓ bonne réponse B. Augmenter l'intensité C. Ignorer la valeur D. Retirer l'oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le drainage bronchique chez le nourrisson est indiqué : A. Selon la prescription et les recommandations en vigueur, avec prudence ✓ bonne réponse B. Systématiquement pour toute toux C. Jamais sur prescription D. Uniquement la nuit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	L'augmentation du flux expiratoire (AFE) vise à : A. Mobiliser les sécrétions vers les grosses bronches ✓ bonne réponse B. Bloquer la respiration C. Augmenter la tension D. Diminuer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La toux dirigée sert à : A. Évacuer les sécrétions arrivées dans les voies proximales ✓ bonne réponse B. Provoquer des vomissements C. Calmer la douleur D. Mesurer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Après une chirurgie thoracique ou abdominale, la kinésithérapie respiratoire prévient : A. Les atélectasies et les infections pulmonaires ✓ bonne réponse B. Les fractures C. Le diabète D. Les allergies	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	La réhabilitation respiratoire chez le patient BPCO comprend : A. Réentraînement à l'effort, éducation et techniques respiratoires ✓ bonne réponse B. Uniquement du repos C. Uniquement des antibiotiques D. Une chirurgie systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Avant une séance de désencombrement, il est préférable que le patient : A. Ne vienne pas de manger (risque de vomissement) ✓ bonne réponse B. Ait mangé un repas copieux C. Soit allongé à plat ventre sans surveillance D. Ait arrêté son oxygène	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le débit expiratoire de pointe (peak-flow) est utile pour suivre : A. L'asthme ✓ bonne réponse B. La glycémie C. La fonction rénale D. La vision	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La ventilation dirigée abdomino-diaphragmatique vise à : A. Améliorer l'efficacité de la respiration et diminuer l'essoufflement ✓ bonne réponse B. Augmenter le travail respiratoire C. Bloquer le diaphragme D. Provoquer une apnée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Un patient sous oxygène pendant la séance : on surveille : A. La saturation, la fréquence respiratoire et la tolérance ✓ bonne réponse B. Uniquement la température C. Uniquement la tension D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Les signes de détresse respiratoire incluent : A. Tirage, battement des ailes du nez, cyanose, polypnée ✓ bonne réponse B. Une respiration calme et lente C. Une bonne coloration D. Un sommeil paisible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les aérosols (nébulisations) prescrits avant la séance servent souvent à : A. Fluidifier ou dilater les bronches pour faciliter le désencombrement ✓ bonne réponse B. Endormir le patient C. Remplacer l'oxygène D. Mesurer la saturation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le spiromètre incitatif doit être utilisé : A. Régulièrement, avec des inspirations lentes et profondes ✓ bonne réponse B. Une fois par semaine C. En soufflant le plus fort possible dedans D. Uniquement en position couchée à plat	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Le positionnement du patient (drainage postural) utilise : A. La gravité pour aider à drainer certains segments pulmonaires ✓ bonne réponse B. Le froid C. Le bruit D. La lumière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 Chez un patient atteint de mucoviscidose, la kinésithérapie respiratoire est :

- A. Quotidienne et essentielle au traitement ✓ **bonne réponse**
- B. Contre-indiquée
- C. Inutile
- D. Réservée aux adultes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 L'hygiène du matériel de kinésithérapie respiratoire (embouts, spiromètres) impose :

- A. Un usage individuel ou une désinfection adaptée entre deux patients ✓ **bonne réponse**
- B. Le partage sans nettoyage
- C. Un rinçage à l'eau seule entre patients
- D. Aucune précaution

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 La saturation qui chute pendant l'effort chez un patient BPCO :

- A. Impose d'adapter l'intensité et l'oxygène selon la prescription ✓ **bonne réponse**
- B. Est sans importance
- C. Justifie d'augmenter l'effort
- D. Doit être ignorée

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bilan et évaluation 20 questions

1 Le bilan initial en rééducation sert à :

- A. Établir un diagnostic fonctionnel et fixer des objectifs mesurables ✓ **bonne réponse**
- B. Remplacer la prescription médicale
- C. Facturer la séance
- D. Choisir les horaires

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La goniométrie mesure :

- A. Les amplitudes articulaires ✓ **bonne réponse**
- B. La force musculaire
- C. La fréquence respiratoire
- D. La sensibilité

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 L'échelle visuelle analogique (EVA) évalue :

- A. L'intensité de la douleur ✓ **bonne réponse**
- B. L'équilibre
- C. La force de préhension
- D. Le niveau d'études

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Un objectif de rééducation bien formulé est :

- A. Précis, mesurable et daté ✓ **bonne réponse**
- B. Vague pour pouvoir s'adapter
- C. Fixé uniquement par la famille
- D. Le même pour tous les patients

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 L'échelle de Berg ou le test « Timed Up and Go » évaluent : A. L'équilibre et le risque de chute ✓ bonne réponse B. La fonction rénale C. La mémoire uniquement D. La douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La mesure de Barthel évalue : A. L'autonomie dans les activités de la vie quotidienne ✓ bonne réponse B. La force de préhension seule C. La saturation D. La vision	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Le périmètre de marche correspond à : A. La distance que le patient peut parcourir avant de devoir s'arrêter ✓ bonne réponse B. Le tour de taille C. La longueur des jambes D. La taille du couloir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un bilan de rééducation doit être : A. Daté, chiffré et répété pour suivre l'évolution ✓ bonne réponse B. Fait une seule fois C. Uniquement oral D. Fait par la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 L'œdème d'un membre peut se mesurer : A. Par des mesures de périmètre (centimétriques) répétées aux mêmes repères ✓ bonne réponse B. À l'œil seulement C. Avec une balance D. Avec un thermomètre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le test des 6 minutes de marche évalue : A. La capacité fonctionnelle à l'effort ✓ bonne réponse B. La vision C. La mémoire D. L'équilibre assis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La douleur chez une personne âgée non communicante peut être évaluée par : A. Une échelle d'hétéro-évaluation comportementale (type Algoplus, Doloplus) ✓ bonne réponse B. Une échelle visuelle analogique uniquement C. Aucune échelle D. Le poids	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le dynamomètre de préhension mesure : A. La force de la main ✓ bonne réponse B. La tension C. La fréquence respiratoire D. La température	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Les objectifs de rééducation sont fixés : A. Avec le patient, en tenant compte de son projet de vie ✓ bonne réponse B. Sans le patient C. Par l'administration D. Au hasard	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le bilan initial doit rechercher aussi : A. Les contre-indications et les précautions (fractures, anticoagulants, cardiopathie...) ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du médecin C. Les préférences musicales uniquement D. Rien d'autre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Une évaluation de la spasticité peut utiliser : A. L'échelle d'Ashworth modifiée ✓ bonne réponse B. Le score d'Apgar C. Le score de Glasgow D. L'IMC	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le bilan de sortie de rééducation sert à : A. Comparer les résultats aux objectifs et transmettre les informations utiles ✓ bonne réponse B. Facturer uniquement C. Rien D. Remplacer le bilan initial	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une mesure fiable nécessite : A. Les mêmes conditions et la même méthode à chaque évaluation ✓ bonne réponse B. Un appareil différent à chaque fois C. Des positions différentes D. L'avis du patient seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le testing musculaire coté 0 correspond à : A. Aucune contraction perceptible ✓ bonne réponse B. Une force normale C. Un mouvement contre résistance D. Un mouvement complet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le testing musculaire coté 5 correspond à : A. Une force normale ✓ bonne réponse B. Aucune contraction C. Un mouvement sans pesanteur D. Une contraction sans mouvement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Le compte rendu de bilan est transmis : A. Au médecin prescripteur et dans le dossier du patient ✓ bonne réponse B. Uniquement à la famille C. Sur les réseaux sociaux D. À personne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Diététique et nutrition

Postes concernés : Diététicien(ne) / Nutritionniste

Nutrition clinique 20 questions

1 L'indice de masse corporelle (IMC) se calcule ainsi :

- A. Poids (kg) divisé par la taille (m) au carré ✓ bonne réponse
- B. Taille divisée par le poids
- C. Poids multiplié par la taille
- D. Poids moins la taille en cm

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Chez l'adulte, un IMC entre 18,5 et 25 correspond à :

- A. Une corpulence normale ✓ bonne réponse
- B. Une obésité
- C. Une dénutrition sévère
- D. Un surpoids

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ?

- A. Environ 9 kcal ✓ bonne réponse
- B. Environ 4 kcal
- C. Environ 7 kcal
- D. Environ 1 kcal

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Combien de kilocalories apporte 1 g de protéines ou de glucides ?

- A. Environ 4 kcal ✓ bonne réponse
- B. Environ 9 kcal
- C. Environ 12 kcal
- D. Environ 0,5 kcal

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une perte de poids involontaire de plus de 5 % en un mois doit faire évoquer :

- A. Une dénutrition ✓ bonne réponse
- B. Un régime réussi
- C. Une situation normale
- D. Une déshydratation bénigne uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un aliment riche en protéines de bonne qualité :

- A. Les œufs, le poisson, la viande, les produits laitiers ✓ bonne réponse
- B. Le sucre blanc
- C. L'huile
- D. Les boissons sucrées

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7 Les fibres alimentaires se trouvent surtout dans :

- A. Les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes ✓ bonne réponse
- B. La viande
- C. L'huile
- D. Le sucre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

8	L'albumine basse peut être un marqueur : A. De dénutrition (à interpréter selon l'inflammation) ✓ bonne réponse B. D'obésité certaine C. De déshydratation uniquement D. De diabète	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Les besoins hydriques d'un adulte sont en moyenne d'environ : A. 1,5 à 2 litres de boisson par jour, à adapter ✓ bonne réponse B. 0,2 litre par jour C. 6 litres par jour pour tous D. Aucun besoin si on mange	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	La nutrition entérale est : A. Une alimentation par sonde dans le tube digestif ✓ bonne réponse B. Une alimentation par voie veineuse C. Une alimentation par la bouche uniquement D. Un régime sans sel	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La nutrition parentérale est : A. Une alimentation administrée par voie veineuse ✓ bonne réponse B. Une alimentation par sonde gastrique C. Un régime riche en fibres D. Une boisson enrichie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Le syndrome de renutrition inappropriée survient surtout : A. Lors d'une réalimentation trop rapide chez un patient très dénutri ✓ bonne réponse B. Chez un patient en surpoids C. Après un repas normal D. Chez le sportif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Un régime pauvre en sel est souvent prescrit en cas : A. D'hypertension ou d'insuffisance cardiaque ✓ bonne réponse B. D'anémie C. De fracture D. De rhume	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Chez l'insuffisant rénal chronique, on surveille souvent les apports en : A. Potassium, phosphore et protéines selon le stade ✓ bonne réponse B. Vitamine C uniquement C. Eau minérale uniquement D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Les compléments nutritionnels oraux sont utilisés : A. Chez les patients dénutris ou à risque, en complément des repas ✓ bonne réponse B. Pour remplacer tous les repas d'une personne en bonne santé C. Pour maigrir D. Uniquement chez l'enfant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 Un patient âgé dénutri doit être pesé :

- A. Régulièrement (au moins à l'entrée puis chaque semaine selon le protocole) ✓ **bonne réponse**
- B. Jamais
- C. Une fois par an
- D. Uniquement à la sortie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 La maladie cœliaque nécessite un régime :

- A. Sans gluten ✓ **bonne réponse**
- B. Sans sucre
- C. Sans protéines
- D. Sans eau

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 L'évaluation nutritionnelle comprend :

- A. Poids, perte de poids, IMC, apports alimentaires et parfois des dosages biologiques ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la taille
- C. Uniquement la tension
- D. Uniquement la couleur de peau

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 Les besoins énergétiques sont augmentés en cas :

- A. D'infection, de brûlure étendue ou de chirurgie lourde ✓ **bonne réponse**
- B. De repos complet
- C. De sommeil
- D. De jeûne volontaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Un régime adapté aux troubles de la déglutition utilise :

- A. Des textures modifiées (mixée, hachée) et des boissons épaissies selon l'évaluation ✓ **bonne réponse**
- B. Des aliments durs et secs
- C. De l'eau plate rapidement
- D. Aucune adaptation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Prise en charge du diabète 20 questions

1 Quels sont les signes typiques d'une hypoglycémie ?

- A. Sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion ✓ **bonne réponse**
- B. Soif intense et urines abondantes
- C. Fièvre et toux
- D. Démangeaisons

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Face à une hypoglycémie chez un patient conscient, on donne :

- A. Environ 15 g de sucre rapide (ex. 3 morceaux de sucre), puis contrôle ✓ **bonne réponse**
- B. Un repas riche en graisses
- C. De l'insuline
- D. Rien, cela passera

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3	Les aliments à index glycémique bas : A. Font monter la glycémie plus lentement ✓ bonne réponse B. Font monter la glycémie très rapidement C. Ne contiennent aucun glucide D. Sont interdits aux diabétiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Chez le diabétique, l'activité physique régulière : A. Améliore l'équilibre glycémique ✓ bonne réponse B. Est contre-indiquée C. Fait toujours monter la glycémie D. N'a aucun effet	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le diabète de type 1 est principalement dû à : A. Une absence de production d'insuline par le pancréas ✓ bonne réponse B. Un excès de sucre uniquement C. Une infection urinaire D. Une allergie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le diabète de type 2 est souvent associé à : A. Le surpoids, la sédentarité et l'hérédité ✓ bonne réponse B. Une fracture C. Une carence en vitamine C D. Une grippe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Les signes d'hyperglycémie importante : A. Soif intense, urines abondantes, fatigue, amaigrissement ✓ bonne réponse B. Sueurs froides et tremblements C. Fièvre isolée D. Toux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	L'objectif d'HbA1c chez beaucoup de diabétiques de type 2 est souvent : A. Autour de 7 %, à individualiser ✓ bonne réponse B. 15 % C. 2 % D. Il n'y a pas d'objectif	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'éducation thérapeutique du patient diabétique porte notamment sur : A. L'autosurveillance, l'alimentation, l'activité physique et les signes d'alerte ✓ bonne réponse B. Uniquement le prix des médicaments C. La couleur des stylos D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les sites d'injection d'insuline doivent être : A. Alternés pour éviter les lipodystrophies ✓ bonne réponse B. Toujours au même endroit C. Dans le muscle D. Dans une veine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Le resucrage d'une hypoglycémie est suivi : A. D'un contrôle de glycémie environ 15 minutes après ✓ bonne réponse B. D'une injection d'insuline C. D'un jeûne D. D'aucune surveillance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Les pieds d'un patient diabétique doivent être : A. Examinés régulièrement, lavés, séchés et protégés ✓ bonne réponse B. Trempés longuement dans l'eau chaude C. Laissés pieds nus en permanence D. Coupés avec des ciseaux pointus sans précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les aliments à éviter en grande quantité chez le diabétique : A. Les boissons sucrées et les sucreries ✓ bonne réponse B. Les légumes verts C. L'eau D. Les fibres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 L'acidocétose diabétique est : A. Une complication grave, surtout du diabète de type 1, nécessitant une prise en charge urgente ✓ bonne réponse B. Une complication bénigne C. Un régime alimentaire D. Une hypoglycémie légère	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Pendant le jeûne du Ramadan, un patient diabétique doit : A. Consulter avant pour adapter son traitement et sa surveillance ✓ bonne réponse B. Arrêter tous ses traitements sans avis C. Doubler ses doses D. Ne rien changer sans avis	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'activité physique chez le diabétique traité par insuline peut provoquer : A. Une hypoglycémie : il faut adapter les apports ou les doses ✓ bonne réponse B. Une hyperglycémie systématique C. Aucun effet D. Une fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les complications chroniques du diabète touchent notamment : A. Les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et les vaisseaux ✓ bonne réponse B. Uniquement les cheveux C. Uniquement la peau D. Aucun organe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Une alimentation équilibrée pour un diabétique répartit les glucides : A. Sur les différents repas, en privilégiant les féculents complets ✓ bonne réponse B. En un seul repas par jour C. Uniquement le soir D. En supprimant tous les glucides	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

19 L'autosurveillance glycémique se note :

- A. Dans un carnet ou une application, pour adapter le traitement ✓ **bonne réponse**
- B. Nulle part
- C. Uniquement de mémoire
- D. Sur les murs

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le fond d'œil est recommandé chez le diabétique pour dépister :

- A. La rétinopathie diabétique ✓ **bonne réponse**
- B. La myopie uniquement
- C. L'otite
- D. La carie dentaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Aide-soignant(e) / auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

Soins d'hygiène et de confort 20 questions

1 Lors d'une toilette au lit, on procède :

- A. Du plus propre vers le plus sale ✓ **bonne réponse**
- B. Du plus sale vers le plus propre
- C. Dans n'importe quel ordre
- D. Uniquement le visage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant la toilette d'un patient, il faut préserver :

- A. Son intimité (porte fermée, corps couvert) et son autonomie ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la rapidité du soin
- C. La présence de tous les visiteurs
- D. La fenêtre ouverte en hiver

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un patient qui peut faire une partie de sa toilette seul :

- A. Doit être encouragé à la faire pour préserver son autonomie ✓ **bonne réponse**
- B. Doit être lavé entièrement pour gagner du temps
- C. Ne doit pas être lavé
- D. Doit attendre sa famille

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pendant la toilette, vous remarquez une rougeur au sacrum. Que faites-vous ?

- A. Vous le signalez à l'infirmier et le notez dans les transmissions ✓ **bonne réponse**
- B. Vous la massez énergiquement
- C. Vous n'en parlez pas
- D. Vous appliquez de l'alcool

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Les soins de bouche chez un patient alité permettent de prévenir : A. Les infections buccales et l'inconfort ✓ bonne réponse B. Les fractures C. L'hypertension D. Les escarres du talon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La température de l'eau pour une toilette est vérifiée : A. Avec le coude ou un thermomètre, pour éviter les brûlures ✓ bonne réponse B. Uniquement au toucher de la main C. En demandant au patient après coup D. Elle n'a pas d'importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Pour la toilette intime, on utilise : A. Un gant et une serviette dédiés, du haut vers le bas (de l'avant vers l'arrière) ✓ bonne réponse B. Le même gant que pour le visage C. De l'alcool D. Un gant d'un autre patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Les soins de bouche d'un patient porteur d'une prothèse dentaire comprennent : A. Le nettoyage de la prothèse et de la bouche ✓ bonne réponse B. Le port de la prothèse jour et nuit sans nettoyage C. Le rangement de la prothèse dans un mouchoir D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le shampoing au lit nécessite : A. Une protection du lit et une installation confortable du patient ✓ bonne réponse B. De mouiller tout le lit C. De faire asseoir un patient qui ne peut pas D. Aucune préparation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 La réfection d'un lit occupé se fait : A. En tournant le patient de côté, avec deux soignants si besoin ✓ bonne réponse B. En faisant lever un patient qui ne le peut pas C. Sans prévenir le patient D. En secouant les draps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le linge sale est : A. Déposé directement dans le sac à linge, sans le poser au sol ni le secouer ✓ bonne réponse B. Posé sur le lit d'à côté C. Jeté par terre D. Secoué dans le couloir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 Un patient incontinent doit bénéficier : A. De changes réguliers et d'une toilette pour préserver la peau ✓ bonne réponse B. D'une limitation des boissons C. D'un change une fois par jour D. D'aucun soin particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le rasage d'un patient sous anticoagulant se fait de préférence : A. Au rasoir électrique ✓ bonne réponse B. Au rasoir à lame C. Avec des ciseaux D. Ce n'est jamais possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pendant la toilette, l'aide-soignant observe notamment : A. L'état de la peau, l'autonomie, l'humeur et la douleur ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur des draps C. Uniquement l'heure D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Les ongles d'un patient diabétique : A. Ne sont pas coupés par l'aide-soignant sans avis (risque de plaie) ✓ bonne réponse B. Sont coupés très court avec des ciseaux pointus C. Sont limés avec une lime métallique agressive D. Ne nécessitent aucune attention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'installation au fauteuil d'un patient comprend : A. Une position confortable, des pieds bien posés et la sonnette à portée ✓ bonne réponse B. Le laisser glisser C. Le laisser sans sonnette D. Le laisser plusieurs heures sans changer de position	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La pudeur d'un patient pendant le change est respectée en : A. Fermant la porte, en tirant le rideau et en couvrant le corps ✓ bonne réponse B. Laissant la porte ouverte C. Faisant le soin devant les visiteurs D. Ne lui parlant pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un patient en fin de vie a besoin en priorité : A. De soins de confort, de soins de bouche et d'une présence ✓ bonne réponse B. D'une toilette complète toutes les heures C. De rester seul D. D'être réveillé souvent	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'hygiène des mains de l'aide-soignant est réalisée : A. Avant et après chaque soin, et après avoir retiré les gants ✓ bonne réponse B. Uniquement en fin de journée C. Uniquement si les mains sont sales D. Jamais avec des gants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Un bain ou une douche chez un patient âgé fragile impose :

- A. Une surveillance pour prévenir les chutes et les malaises ✓ **bonne réponse**
- B. De le laisser seul
- C. Une eau très chaude
- D. Une durée la plus longue possible

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Prévention des escarres 20 questions

1 Quelles sont les zones les plus à risque d'escarre chez un patient alité sur le dos ?

- A. Sacrum, talons, coudes, omoplates, arrière de la tête ✓ **bonne réponse**
- B. Ventre et cuisses
- C. Mains et doigts
- D. Genoux uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pour prévenir les escarres, il faut changer la position d'un patient à risque :

- A. Régulièrement, environ toutes les 2 à 3 heures selon le plan de soins ✓ **bonne réponse**
- B. Une fois par jour
- C. Uniquement la nuit
- D. Jamais pour ne pas le réveiller

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quel facteur favorise l'apparition d'une escarre ?

- A. Une dénutrition et une immobilité prolongée ✓ **bonne réponse**
- B. Une marche régulière
- C. Une bonne hydratation
- D. Un matelas adapté

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Quel outil sert à évaluer le risque d'escarre ?

- A. L'échelle de Braden ou de Norton ✓ **bonne réponse**
- B. Le score de Glasgow
- C. L'échelle EVA de la douleur
- D. Le score d'Apgar

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Une escarre est due principalement à :

- A. Une pression prolongée sur une zone d'appui ✓ **bonne réponse**
- B. Une allergie
- C. Une infection virale
- D. Un manque de soleil

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un matelas anti-escarres :

- A. Répartit les pressions mais ne remplace pas les changements de position ✓ **bonne réponse**
- B. Supprime le besoin de surveiller la peau
- C. Est inutile
- D. Doit être recouvert de plusieurs couches de draps

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Pour un patient assis au fauteuil, la zone la plus exposée est : A. Les ischions (fesses) ✓ bonne réponse B. Le front C. Les mains D. Les genoux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	La position semi-latérale à 30° est recommandée car : A. Elle évite l'appui direct sur le trochanter et le sacrum ✓ bonne réponse B. Elle augmente la pression sur la hanche C. Elle empêche de respirer D. Elle est plus rapide à installer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	L'humidité (urine, transpiration) favorise les escarres car : A. Elle fragilise la peau ✓ bonne réponse B. Elle hydrate la peau C. Elle n'a aucun effet D. Elle protège la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Les frottements et le cisaillement surviennent notamment quand : A. On fait glisser le patient sur le drap au lieu de le soulever ✓ bonne réponse B. On utilise un drap de glisse C. On soulève le patient à deux D. Le patient marche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Masser une rougeur persistante au niveau d'un point d'appui : A. Est déconseillé : cela peut aggraver les lésions ✓ bonne réponse B. Est recommandé fortement C. Est obligatoire D. Se fait avec de l'alcool	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Une bonne alimentation et une hydratation suffisante : A. Font partie de la prévention des escarres ✓ bonne réponse B. N'ont aucun rôle C. Augmentent le risque D. Sont réservées aux sportifs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Les talons d'un patient alité peuvent être protégés en : A. Les mettant en décharge (coussin sous les mollets) ✓ bonne réponse B. Les posant directement sur le matelas C. Les entourant de bandes serrées D. Les laissant hors du lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	L'évaluation du risque d'escarre se fait : A. Dès l'admission puis régulièrement ✓ bonne réponse B. Une seule fois à la sortie C. Jamais D. Uniquement si une plaie apparaît	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Les changements de position doivent être : A. Planifiés, réalisés et notés (traçabilité) ✓ bonne réponse B. Faits sans noter C. Faits une fois par semaine D. Évités la nuit dans tous les cas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le drap du lit doit être : A. Bien tendu, sans plis ni miettes ✓ bonne réponse B. Plié en plusieurs épaisseurs C. Rugueux D. Mouillé pour rafraîchir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient très maigre a un risque d'escarre : A. Augmenté (saillies osseuses plus exposées) ✓ bonne réponse B. Diminué C. Nul D. Identique à tous	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'aide-soignant qui découvre une phlyctène au talon : A. La signale à l'infirmier et met le talon en décharge ✓ bonne réponse B. La perce avec une aiguille C. Applique du talc D. N'en parle pas	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 L'immobilité prolongée favorise : A. Les escarres, mais aussi les phlébites et l'enraidissement ✓ bonne réponse B. Uniquement la perte de poids C. Une meilleure circulation D. La guérison rapide	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un coussin en forme de « bouée » au fauteuil : A. Est déconseillé car il crée une zone de compression ✓ bonne réponse B. Est le meilleur dispositif C. Est obligatoire D. Préviendrait toutes les escarres	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Manutention des patients 20 questions

1 Pour soulever une charge ou aider un patient, il faut : A. Garder le dos droit et plier les genoux ✓ bonne réponse B. Plier le dos jambes tendues C. Faire une torsion du tronc D. Porter seul, loin du corps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Avant de lever un patient, la première chose à faire est : A. Lui expliquer le soin et évaluer ce qu'il peut faire lui-même ✓ bonne réponse B. Le lever rapidement sans prévenir C. Appeler sa famille D. Retirer les freins du lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Lors d'un transfert lit-fauteuil, le fauteuil doit être : A. Placé près du lit, freins serrés ✓ bonne réponse B. Placé loin du lit C. Freins desserrés D. Sans repose-pieds réglés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un lève-personne (soulève-malade) est utilisé : A. Pour les patients qui ne peuvent pas participer au transfert ✓ bonne réponse B. Uniquement pour les enfants C. Pour tous les patients autonomes D. Jamais en établissement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Avant de mobiliser un patient lourd seul(e), il faut : A. Évaluer la situation et demander de l'aide ou utiliser une aide technique ✓ bonne réponse B. Le porter seul(e) rapidement C. Le tirer par les bras D. Attendre qu'il tombe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le drap de glisse sert à : A. Remonter ou tourner un patient dans le lit en limitant les frottements ✓ bonne réponse B. Couvrir le patient C. Faire la toilette D. Protéger le matelas de l'urine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Le lit doit être réglé, pour un soin, à une hauteur : A. Permettant au soignant de travailler le dos droit ✓ bonne réponse B. La plus basse possible C. La plus haute possible D. Peu importe	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Pour aider un patient à se lever du lit, on l'encourage d'abord à : A. S'asseoir au bord du lit, pieds au sol, quelques instants ✓ bonne réponse B. Se lever brusquement C. Sauter du lit D. Se lever les yeux fermés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Un patient qui fait un malaise lors du lever doit être : A. Recouché ou assis en sécurité et surveillé ✓ bonne réponse B. Laissé debout C. Tiré par le bras D. Laissé seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le verticalisateur est utile pour un patient : A. Qui peut prendre appui sur ses jambes mais pas se lever seul ✓ bonne réponse B. Totalelement autonome C. Qui ne peut pas du tout porter son poids D. Qui marche seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

11 Pendant un transfert, il est important de : A. Expliquer chaque étape au patient et le faire participer ✓ bonne réponse B. Faire vite sans parler C. Le surprendre D. Le tirer par le cou	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Le fauteuil roulant est approché du lit : A. Freins serrés, repose-pieds relevés ou retirés ✓ bonne réponse B. Freins desserrés C. Repose-pieds baissés pendant le transfert D. Le plus loin possible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les troubles musculo-squelettiques du soignant sont favorisés par : A. Les postures penchées et le port de charges lourdes répété ✓ bonne réponse B. L'utilisation d'aides techniques C. Le travail à deux D. Le lit à bonne hauteur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Pour tourner un patient sur le côté, on : A. Le fait rouler vers soi en plaçant ses bras et jambes, après avoir prévenu ✓ bonne réponse B. Le pousse loin de soi en bout de lit C. Le tire par un bras D. Le soulève seul à bout de bras	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Avant d'utiliser un lève-personne, on vérifie : A. La sangle adaptée, la charge maximale et le bon fonctionnement ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur de la sangle C. Rien D. Que le patient est debout	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Un patient opéré de la hanche doit être mobilisé : A. En respectant les consignes de mouvements interdits données par le chirurgien ✓ bonne réponse B. Comme n'importe quel patient C. Jamais D. En lui croisant les jambes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La marche accompagnée d'un patient fragile se fait : A. À côté de lui, légèrement en retrait, du côté le plus faible ✓ bonne réponse B. En le tenant par la main tendue devant lui C. Derrière lui à plusieurs mètres D. En le laissant seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18	Le chariot de soins ou de linge se pousse plutôt : A. En gardant le dos droit, bras près du corps ✓ bonne réponse B. En le tirant penché en avant C. D'une seule main D. En courant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19	La mobilisation précoce des patients sert à prévenir : A. Les complications de l'immobilité (phlébite, escarre, pneumopathie) ✓ bonne réponse B. La guérison C. L'autonomie D. L'appétit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20	Un patient au sol après une chute ne doit être relevé : A. Qu'après évaluation de son état (douleur, conscience) et avec des moyens adaptés ✓ bonne réponse B. Immédiatement en le tirant par les bras C. Jamais D. Par un seul soignant sans évaluation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide aux repas et hydratation 20 questions

1	Pour aider un patient présentant des troubles de la déglutition à manger, il faut l'installer : A. Assis, tête légèrement fléchie vers l'avant ✓ bonne réponse B. Allongé à plat sur le dos C. Tête en arrière D. Couché sur le ventre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient tousse et s'étouffe à chaque gorgée d'eau. Vous devez : A. Arrêter, le signaler à l'infirmier (risque de fausse route) et adapter les textures selon la prescription ✓ bonne réponse B. Lui donner plus vite à boire C. Lui donner de l'eau gazeuse D. Ne rien signaler	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Quels signes peuvent évoquer une déshydratation chez une personne âgée ? A. Bouche sèche, urines foncées, confusion ✓ bonne réponse B. Prise de poids rapide C. Œdèmes des jambes uniquement D. Hypersalivation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	La surveillance des repas consiste notamment à : A. Noter les quantités consommées et signaler une baisse d'appétit ✓ bonne réponse B. Débarrasser sans regarder C. Forcer le patient à finir D. Supprimer les collations	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5	Avant le repas, on installe le patient : A. Assis, confortablement, mains lavées, prothèses dentaires et lunettes en place ✓ bonne réponse B. Allongé à plat C. Sans ses lunettes D. Sans lui laver les mains	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le régime alimentaire prescrit (sans sel, diabétique, mixé) doit être : A. Vérifié pour chaque plateau ✓ bonne réponse B. Changé selon les goûts du soignant C. Ignoré D. Remplacé par le régime du voisin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Une personne qui a des difficultés pour couper ses aliments : A. Est aidée en favorisant son autonomie (couverts adaptés, aide partielle) ✓ bonne réponse B. Ne mange pas C. Est nourrie entièrement sans lui demander D. Doit attendre la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Aider un patient à manger se fait : A. Assis à sa hauteur, à son rythme, par petites quantités ✓ bonne réponse B. Debout, rapidement C. En parlant au téléphone D. En le pressant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Les signes de fausse route sont : A. Toux, voix mouillée, gêne respiratoire pendant le repas ✓ bonne réponse B. Bon appétit C. Sourire D. Somnolence après le repas uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Pour une personne âgée qui boit peu, on peut : A. Proposer régulièrement des boissons variées, gélifiées si besoin ✓ bonne réponse B. Attendre qu'elle réclame C. Lui donner un seul grand verre le soir D. Supprimer les boissons	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le relevé des ingesta consiste à : A. Noter ce que le patient a bu et mangé ✓ bonne réponse B. Peser le plateau vide C. Noter le menu affiché D. Noter le nom du cuisinier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un patient à jeun pour un examen : A. Ne reçoit ni repas ni boisson, selon la consigne médicale ✓ bonne réponse B. Peut manger léger C. Peut boire un café D. Peut manger s'il a faim	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

13 Après le repas, le patient qui a des troubles de la déglutition reste : A. Assis ou demi-assis environ 30 minutes ✓ bonne réponse B. Allongé à plat immédiatement C. Debout pendant 2 heures D. Sur le ventre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Une alimentation enrichie consiste à : A. Augmenter les calories et protéines sans augmenter le volume (fromage, œuf, poudre de lait) ✓ bonne réponse B. Ajouter de l'eau C. Supprimer les protéines D. Diminuer les portions sans compenser	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 Un patient qui ne mange pas plusieurs repas de suite : A. Est signalé à l'infirmier et à la diététicienne ✓ bonne réponse B. Est laissé tranquille sans rien dire C. Est forcé à manger D. Est privé de dessert	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 L'eau gélifiée est utile pour : A. Les patients qui font des fausses routes aux liquides ✓ bonne réponse B. Les patients qui ont soif après le sport C. Remplacer les repas D. Les nourrissons de moins d'un mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Les plateaux repas sont distribués : A. En respectant les règles d'hygiène et en vérifiant le nom et le régime ✓ bonne réponse B. Au hasard C. Sans se laver les mains D. Après les avoir posés au sol	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le respect des habitudes et des convictions alimentaires du patient : A. Fait partie d'une prise en charge de qualité ✓ bonne réponse B. N'a aucune importance C. Est interdit à l'hôpital D. Est réservé aux enfants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Une bouche sèche chez un patient en fin de vie se soulage par : A. Des soins de bouche fréquents et une humidification ✓ bonne réponse B. Une perfusion systématique C. Rien D. Un jeûne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 La surveillance de l'hydratation chez la personne âgée inclut : A. La diurèse, l'aspect des urines et des muqueuses, le comportement ✓ bonne réponse B. Uniquement la couleur des cheveux C. Uniquement le poids annuel D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil et secrétariat médical

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e)

Accueil et relation patient 20 questions

1 Un patient s'énervé à l'accueil après une longue attente. La meilleure attitude est :

A. Rester calme, l'écouter, reconnaître son attente et l'informer du délai ✓

bonne réponse

B. Lui répondre sur le même ton

C. L'ignorer jusqu'à ce qu'il se calme

D. Appeler immédiatement la sécurité

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

2 Au téléphone, un appelant décrit une douleur thoracique intense. Que faire ?

A. Le réorienter immédiatement vers les urgences (SAMU 190) et prévenir un soignant ✓ **bonne réponse**

B. Lui donner un rendez-vous la semaine suivante

C. Lui conseiller de patienter

D. Raccrocher

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

3 L'écoute active consiste à :

A. Reformuler et poser des questions pour bien comprendre la demande ✓

bonne réponse

B. Préparer sa réponse pendant que la personne parle

C. Couper la parole pour gagner du temps

D. Écouter en faisant autre chose

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

4 Pour accueillir une personne malentendante, il est préférable de :

A. Se placer face à elle, parler lentement et distinctement, écrire si besoin ✓

bonne réponse

B. Crier

C. Parler en tournant le dos

D. S'adresser uniquement à l'accompagnant

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

5 Au téléphone, la première phrase professionnelle comprend :

A. Le nom de l'établissement ou du service, son prénom et une formule de politesse ✓ **bonne réponse**

B. Uniquement « Allô ? »

C. Le numéro de téléphone

D. Rien, on attend que l'appelant parle

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

6 Un patient ne parle ni arabe ni français. Vous :

A. Cherchez une solution (collègue, interprète, outil de traduction) en restant courtois ✓ **bonne réponse**

B. Refusez de le recevoir

C. Parlez plus fort

D. Le faites attendre jusqu'à la fermeture

☐ Validée

☐ À corriger

Remarque :

7 Pour une personne en fauteuil roulant à l'accueil, on veille à : A. Se placer à sa hauteur et lui faciliter l'accès ✓ bonne réponse B. Parler uniquement à l'accompagnant C. La laisser derrière le comptoir haut D. Se pencher au-dessus d'elle	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un appel concerne une urgence vitale (enfant qui ne respire plus). Vous : A. Orientez immédiatement vers le SAMU (190) et alertez un soignant ✓ bonne réponse B. Prenez un rendez-vous C. Demandez de rappeler plus tard D. Raccrochez	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La gestion de la salle d'attente comprend : A. L'information des patients sur le temps d'attente et l'attention aux personnes fragiles ✓ bonne réponse B. L'ignorance des patients C. La fermeture des fenêtres en permanence D. Le tri selon la tenue vestimentaire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un patient mécontent menace de porter plainte. Vous : A. Restez calme, l'écoutez et l'orientez vers la procédure de réclamation ✓ bonne réponse B. Le menacez à votre tour C. L'insultez D. Ignorez sa demande	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Une bonne posture d'accueil inclut : A. Regarder la personne, sourire, se présenter et rester disponible ✓ bonne réponse B. Rester sur son téléphone personnel C. Tourner le dos D. Mâcher un chewing-gum	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Lorsqu'on doit faire patienter quelqu'un au téléphone : A. On le prévient et on reprend l'appel rapidement ✓ bonne réponse B. On le met en attente sans prévenir pendant longtemps C. On raccroche D. On continue une autre conversation sans le dire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Les informations médicales données à l'accueil : A. Sont limitées : seuls les soignants donnent des informations médicales ✓ bonne réponse B. Peuvent être données à tout le monde C. Sont affichées publiquement D. Sont données par téléphone à n'importe qui	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Un patient âgé désorienté arrive seul. Vous : A. Le mettez en sécurité, le rassurez et prévenez l'équipe soignante ✓ bonne réponse B. Le laissez repartir seul C. Lui demandez de revenir avec quelqu'un D. L'ignorez	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La prise de rendez-vous doit tenir compte : A. De l'urgence, des contraintes du patient et des consignes du médecin ✓ bonne réponse B. Uniquement de vos préférences C. Du hasard D. Uniquement de l'heure de pause	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 En cas de retard important du médecin, l'accueil : A. Informe les patients et propose si besoin un autre rendez-vous ✓ bonne réponse B. Ne dit rien C. Ferme le cabinet D. Annule tous les rendez-vous sans prévenir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Une réclamation écrite d'un patient doit être : A. Enregistrée et transmise au responsable selon la procédure ✓ bonne réponse B. Jetée C. Cachée D. Rendue au patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Le vouvoiement avec les patients est : A. La règle par défaut, par respect ✓ bonne réponse B. Interdit C. Réservé aux médecins D. Inutile	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Pour expliquer un trajet dans l'hôpital, il est utile de : A. Donner des repères simples ou accompagner la personne si elle est perdue ✓ bonne réponse B. Dire « c'est par là » sans préciser C. Refuser de répondre D. Donner un plan illisible	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Un appelant agressif au téléphone insulte la secrétaire. Elle peut : A. Rester polie, poser une limite et mettre fin à l'appel si les insultes continuent, puis le signaler ✓ bonne réponse B. Insulter en retour C. Pleurer au téléphone D. Donner des informations confidentielles pour le calmer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

1 Le dossier patient doit être : A. Confidentiel, à jour et accessible uniquement aux personnes habilitées ✓ bonne réponse B. Laissé sur le bureau d'accueil C. Communiqué à toute personne qui le demande D. Détruit après chaque consultation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Deux patients portent le même nom et prénom. Pour éviter une erreur, vous vérifiez : A. La date de naissance et un autre identifiant (numéro de dossier) ✓ bonne réponse B. Uniquement le prénom C. La couleur des vêtements D. Rien, ils sont identiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Votre session sur le logiciel du cabinet doit être : A. Verrouillée dès que vous quittez votre poste ✓ bonne réponse B. Laissée ouverte pour les collègues C. Partagée avec un mot de passe commun affiché D. Ouverte en permanence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un résultat d'analyse arrive pour un patient. Vous pouvez le communiquer par téléphone : A. Non, sauf procédure prévue : les résultats sont remis au patient ou au médecin de façon sécurisée ✓ bonne réponse B. À toute personne qui appelle C. À l'employeur du patient D. Au voisin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 À l'admission, les documents demandés au patient sont notamment : A. Une pièce d'identité et les documents de prise en charge (assurance, carte de soins) ✓ bonne réponse B. Uniquement son numéro de téléphone C. Son diplôme D. Aucun document	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Le numéro de dossier unique permet : A. D'éviter les doublons et les erreurs d'identité ✓ bonne réponse B. De calculer l'âge C. De fixer le prix D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un doublon de dossier (même patient avec deux dossiers) doit être : A. Signalé pour être fusionné selon la procédure ✓ bonne réponse B. Laissé tel quel C. Supprimé sans vérification D. Utilisé alternativement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Les documents papier contenant des données médicales sont : A. Rangés sous clé et détruits de façon sécurisée (broyeur) ✓ bonne réponse B. Jetés à la poubelle ordinaire C. Laissés sur le comptoir D. Recyclés comme brouillon	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Envoyer un compte rendu médical par email nécessite : A. Une messagerie sécurisée et la vérification du destinataire ✓ bonne réponse B. N'importe quelle adresse email C. Une copie à tout le service D. Aucune précaution	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Un mot de passe de logiciel médical doit être : A. Personnel, robuste et jamais partagé ✓ bonne réponse B. Écrit sur un post-it sur l'écran C. Le même pour tout le service D. Votre date de naissance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 La facturation d'un acte nécessite : A. Le bon code de l'acte, l'identité exacte du patient et les justificatifs ✓ bonne réponse B. Une estimation au hasard C. Le nom d'un autre patient D. Aucune information	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 Un patient demande une copie de son dossier : A. La demande est traitée selon la procédure légale de l'établissement, avec vérification de son identité ✓ bonne réponse B. On refuse toujours C. On donne le dossier à la personne qui appelle D. On envoie le dossier sans vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La saisie de l'identité du patient se fait : A. À partir d'une pièce d'identité, en respectant l'orthographe exacte ✓ bonne réponse B. Phonétiquement, à l'oreille C. Avec un surnom D. Sans date de naissance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un courrier médical arrivé au secrétariat est : A. Enregistré, transmis au médecin puis classé dans le bon dossier ✓ bonne réponse B. Laissé dans une pile C. Ouvert par n'importe qui et commenté D. Jeté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 La sauvegarde des données informatiques sert à : A. Éviter la perte des dossiers en cas de panne ✓ bonne réponse B. Ralentir l'ordinateur C. Partager les données sur internet D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Les résultats d'examens sont classés : A. Dans le dossier du bon patient après vérification de l'identité ✓ bonne réponse B. Au hasard C. Dans le dossier d'un homonyme D. Dans un tiroir sans nom	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un écran affichant un dossier patient à l'accueil doit être : A. Orienté pour ne pas être visible du public et verrouillé en cas d'absence ✓ bonne réponse B. Tourné vers la salle d'attente C. Laissé ouvert pendant la pause D. Sans importance	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 La durée de conservation des dossiers médicaux : A. Est fixée par la réglementation et doit être respectée ✓ bonne réponse B. Est d'une semaine C. Est libre D. Est d'un jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La planification des rendez-vous dans un agenda partagé exige : A. Des informations exactes (motif, durée, coordonnées) et sa mise à jour ✓ bonne réponse B. Uniquement le prénom C. Des rendez-vous en double volontairement D. Aucune mise à jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une fuite de données (dossier envoyé à une mauvaise personne) doit être : A. Signalée immédiatement au responsable ✓ bonne réponse B. Cachée C. Ignorée si personne ne s'en rend compte D. Corrigée en envoyant d'autres dossiers	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Terminologie médicale 20 questions

1 Le suffixe « -ite » signifie : A. Inflammation (ex. : appendicite) ✓ bonne réponse B. Ablation chirurgicale C. Douleur D. Tumeur bénigne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---

2 Le suffixe « -ectomie » signifie : A. Ablation (ex. : appendicectomie) ✓ bonne réponse B. Inflammation C. Examen visuel D. Suture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 « Tachycardie » signifie : A. Rythme cardiaque rapide ✓ bonne réponse B. Rythme cardiaque lent C. Arrêt du cœur D. Tension élevée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le préfixe « hyper- » signifie : A. Au-dessus, excès ✓ bonne réponse B. En dessous, insuffisance C. Autour D. À l'intérieur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Un « ORL » est spécialiste : A. Des oreilles, du nez et de la gorge ✓ bonne réponse B. Des os et des articulations C. Du cœur D. De la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 « Hypotension » signifie : A. Tension artérielle basse ✓ bonne réponse B. Tension artérielle élevée C. Rythme cardiaque rapide D. Fièvre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 « Dyspnée » signifie : A. Difficulté à respirer ✓ bonne réponse B. Difficulté à avaler C. Douleur abdominale D. Trouble du sommeil	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 « Dysphagie » signifie : A. Difficulté à avaler ✓ bonne réponse B. Difficulté à respirer C. Trouble de la vue D. Perte de mémoire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 Le suffixe « -algie » signifie : A. Douleur (ex. : névralgie) ✓ bonne réponse B. Inflammation C. Ablation D. Écoulement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

10 Le suffixe « -scopie » signifie : A. Examen visuel à l'aide d'un instrument (ex. : endoscopie) ✓ bonne réponse B. Ablation C. Douleur D. Suture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Le suffixe « -tomie » signifie : A. Incision (ex. : laparotomie) ✓ bonne réponse B. Ablation totale C. Inflammation D. Examen du sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 « Hématurie » signifie : A. Présence de sang dans les urines ✓ bonne réponse B. Présence de sucre dans les urines C. Absence d'urines D. Urines abondantes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 « Anurie » signifie : A. Absence d'urines ✓ bonne réponse B. Urines abondantes C. Sang dans les urines D. Douleur en urinant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Le préfixe « héli- » signifie : A. Moitié (ex. : hémiplégie) ✓ bonne réponse B. Sang C. Double D. Autour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 « Néphrologie » est la spécialité : A. Des reins ✓ bonne réponse B. Du cœur C. Du cerveau D. De la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 « Gastro-entérologie » concerne : A. Le tube digestif ✓ bonne réponse B. Les poumons C. Les os D. Les yeux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 « Pneumologie » concerne : A. Les poumons et la respiration ✓ bonne réponse B. Les reins C. Les dents D. Les nerfs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

18 « IV » sur une prescription signifie :

- A. Intraveineuse ✓ bonne réponse
- B. Intramusculaire
- C. Quatre fois par jour
- D. Par la bouche

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 « ATCD » dans un dossier signifie :

- A. Antécédents ✓ bonne réponse
- B. Analyse
- C. Attestation
- D. Autorisation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 « Bradypnée » signifie :

- A. Respiration lente ✓ bonne réponse
- B. Respiration rapide
- C. Cœur rapide
- D. Cœur lent

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Transport sanitaire

Postes concernés : Ambulancier(ère)

Transport sanitaire 20 questions

1 Quel est le numéro du SAMU en Tunisie ?

- A. 190 ✓ bonne réponse
- B. 197
- C. 198
- D. 1 899

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant le transport, un patient devient pâle, en sueurs et ne répond plus. Que faire ?

- A. Arrêter le véhicule en sécurité, évaluer conscience et respiration, alerter et débiter les gestes d'urgence ✓ bonne réponse
- B. Accélérer sans rien vérifier
- C. Ouvrir les fenêtres et continuer
- D. Attendre l'arrivée à l'hôpital

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Après un transport de patient contagieux, l'ambulance doit être :

- A. Nettoyée et désinfectée selon le protocole avant un autre transport ✓ bonne réponse
- B. Utilisée immédiatement
- C. Aérée seulement
- D. Lavée une fois par mois

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Lors du transport, le brancard doit être :

- A. Verrouillé dans son système de fixation, patient sanglé ✓ bonne réponse
- B. Libre pour plus de confort
- C. Retiré du véhicule
- D. Sans sangles

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Avant de partir en intervention, l'ambulancier vérifie : A. Le véhicule, l'oxygène, le matériel de soins et de communication ✓ bonne réponse B. Uniquement le carburant C. La radio musicale D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La position demi-assise pendant le transport convient : A. À un patient qui a du mal à respirer (selon l'état et l'avis médical) ✓ bonne réponse B. À un patient en état de choc avec tension effondrée C. À un traumatisé du rachis D. À une victime inconsciente	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Une femme enceinte au 3e trimestre est transportée de préférence : A. En position latérale gauche (ou inclinée à gauche) ✓ bonne réponse B. Sur le dos à plat C. Sur le ventre D. Assise penchée en avant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 Un patient en état de choc est souvent installé : A. Allongé, jambes éventuellement surélevées selon le contexte, et surveillé ✓ bonne réponse B. Assis sur une chaise C. Debout D. Sur le ventre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La bouteille d'oxygène doit être : A. Fixée, manipulée sans graisse et éloignée de toute flamme ✓ bonne réponse B. Posée libre sur le brancard C. Graissée pour faciliter l'ouverture D. Placée près du chauffage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Le bilan transmis au médecin régulateur comprend : A. Conscience, respiration, circulation, plaintes et circonstances ✓ bonne réponse B. Uniquement l'adresse C. Uniquement le nom du patient D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Pendant le transport, l'ambulancier : A. Surveille en permanence le patient et rend compte de toute aggravation ✓ bonne réponse B. Reste dans la cabine sans regarder C. Laisse le patient seul à l'arrière D. Écoute de la musique forte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

12 L'usage des avertisseurs lumineux et sonores est : A. Réservé aux situations d'urgence, avec prudence ✓ bonne réponse B. Permanent C. Interdit en toutes circonstances D. Utilisé pour éviter les bouchons sans urgence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 La ceinture de sécurité du patient et de l'accompagnant : A. Doit être attachée pendant le transport ✓ bonne réponse B. Est facultative C. Est interdite D. Gêne la surveillance donc on l'enlève	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un patient sous oxygène refuse son masque pendant le transport. On : A. Explique, rassure, propose une lunette nasale si prescrite et informe le médecin ✓ bonne réponse B. Force le masque sur le visage C. Arrête l'oxygène sans rien dire D. Débranche le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La fiche d'intervention ou de transport doit être : A. Remplie et transmise à l'équipe qui accueille le patient ✓ bonne réponse B. Remplie le lendemain de mémoire C. Jetée D. Remise à un passant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le nettoyage du brancard et de la cellule sanitaire se fait : A. Après chaque transport ✓ bonne réponse B. Une fois par mois C. Jamais D. Uniquement s'il est très sale	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Un patient dialysé transporté régulièrement : on veille surtout à : A. Ne pas comprimer ni prendre la tension sur le bras de la fistule ✓ bonne réponse B. Prendre la tension sur la fistule C. Le transporter debout D. Ne rien vérifier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 En arrivant sur un accident de la route, l'ambulancier commence par : A. Sécuriser les lieux (balisage) pour éviter un sur-accident ✓ bonne réponse B. Courir vers la première victime sans regarder C. Prendre des photos D. Déplacer les véhicules impliqués	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le secret professionnel s'applique aux ambulanciers : A. Oui, comme à tous les professionnels de santé ✓ bonne réponse B. Non, jamais C. Seulement la nuit D. Seulement pour les enfants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

20 Un patient agité risque de se blesser pendant le transport. On :

- A. Sécurise l'installation, rassure et demande un renfort médical si besoin ✓
bonne réponse
- B. Le laisse se lever dans le véhicule
- C. Accélère pour arriver plus vite
- D. Le laisse seul

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Immobilisation et relevage 20 questions

1 Chez un blessé suspect de traumatisme du rachis, il faut :

- A. Maintenir la tête dans l'axe tête-cou-tronc et limiter les mouvements ✓
bonne réponse
- B. Le faire asseoir rapidement
- C. Lui tourner la tête pour le faire parler
- D. Le soulever par les bras

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le matelas immobilisateur à dépression (coquille) sert à :

- A. Immobiliser l'ensemble du corps lors du transport d'un traumatisé ✓ **bonne réponse**
- B. Réchauffer le patient
- C. Réanimer le patient
- D. Mesurer la tension

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une attelle doit immobiliser :

- A. Les articulations situées au-dessus et au-dessous de la fracture ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement le foyer de fracture
- C. Tout le corps
- D. Aucune articulation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Avant de poser une attelle sur un membre, on vérifie :

- A. La sensibilité, la motricité et la circulation (pouls, coloration) en aval ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la douleur
- C. La température corporelle
- D. Rien

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Le collier cervical est posé :

- A. Après maintien manuel de la tête dans l'axe, avec une taille adaptée ✓
bonne réponse
- B. Avant tout examen, en tournant la tête pour l'ajuster
- C. Sans maintien de la tête
- D. Uniquement si le patient le demande

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Le relevage d'une victime suspecte de traumatisme du rachis nécessite :

- A. Plusieurs sauveteurs coordonnés et un matériel adapté (brancard cuillère, plan dur) ✓ **bonne réponse**
- B. Un seul sauveteur qui la soulève
- C. De la faire marcher
- D. De la tirer par les pieds

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

7	Le brancard cuillère permet : A. De soulever une victime en limitant ses mouvements ✓ bonne réponse B. De la réanimer C. De mesurer sa tension D. De la réchauffer	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Un membre fracturé avec déformation doit être : A. Immobilisé dans la position où il se trouve, sauf consigne médicale ✓ bonne réponse B. Remis en place par l'ambulancier C. Massé D. Laissé sans immobilisation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9	Après l'immobilisation d'un membre, on vérifie à nouveau : A. La circulation, la sensibilité et la motricité en dessous ✓ bonne réponse B. La couleur du matériel C. L'heure D. Rien	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Une victime casquée (moto) consciente et qui respire : A. Ne se voit retirer le casque que selon une technique à deux, si nécessaire ✓ bonne réponse B. Doit retirer elle-même son casque rapidement C. Doit garder le casque en toutes circonstances même si elle vomit D. Doit être secouée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	Le chef d'équipe lors d'un relevage : A. Coordonne les gestes et donne les ordres de mouvement ✓ bonne réponse B. Ne parle pas C. Porte seul la victime D. Filme l'intervention	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Une écharpe (bras en écharpe) est utilisée pour immobiliser : A. Une blessure du membre supérieur (épaule, bras, avant-bras) ✓ bonne réponse B. Une fracture de la jambe C. Une blessure de la colonne D. Une plaie du crâne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	L'attelle à dépression se moule : A. Autour du membre, puis l'air est retiré pour la rigidifier ✓ bonne réponse B. En gonflant fortement C. Avec de l'eau D. Après l'arrivée à l'hôpital	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

14 Une fracture ouverte (os visible) nécessite : A. De protéger la plaie avec un pansement stérile, sans remettre l'os en place ✓ bonne réponse B. De remettre l'os dans la plaie C. De laver la plaie au savon D. De la laisser à l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15 La position latérale de sécurité est contre-indiquée chez : A. Une victime suspecte de traumatisme du rachis sans technique adaptée ✓ bonne réponse B. Une victime inconsciente qui respire sans traumatisme C. Une victime qui vomit D. Une victime intoxiquée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 Le plan dur (planche) est utilisé : A. Pour immobiliser et déplacer une victime traumatisée de façon rigide ✓ bonne réponse B. Pour faire la toilette C. Pour réchauffer la victime D. Pour transporter du matériel uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 Avant de soulever une victime, les sauveteurs : A. Se placent jambes fléchies, dos droit, et soulèvent au signal ✓ bonne réponse B. Soulèvent dos courbé jambes tendues C. Soulèvent chacun à leur rythme D. Tirent la victime par les vêtements	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 L'immobilisation du bassin (ceinture pelvienne) est indiquée : A. En cas de suspicion de fracture grave du bassin avec risque hémorragique ✓ bonne réponse B. Pour une entorse de la cheville C. Pour une plaie du doigt D. Jamais	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le dégagement d'urgence d'une victime (sans immobilisation préalable) est réservé : A. À un danger réel, immédiat et non contrôlable (incendie, risque d'explosion) ✓ bonne réponse B. À toutes les situations C. Aux victimes conscientes uniquement D. Aux victimes âgées	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Une victime en hypothermie doit être manipulée : A. Avec douceur, protégée du froid et isolée du sol ✓ bonne réponse B. Brusquement C. Plongée dans un bain chaud D. Massée énergiquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Pédiatrie

Postes concernés : Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie

Soins pédiatriques 20 questions

1	Chez l'enfant, la dose d'un médicament est généralement calculée : A. En fonction du poids (mg/kg) ✓ bonne réponse B. Uniquement selon l'âge en années C. Comme chez l'adulte, divisée par deux D. Selon la taille seulement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Le paracétamol chez l'enfant se donne habituellement à la dose de : A. 15 mg/kg toutes les 6 heures (60 mg/kg/jour au maximum) ✓ bonne réponse B. 50 mg/kg par prise C. 1 g par prise quel que soit l'âge D. 5 mg/kg par jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un nourrisson a une diarrhée, la fontanelle déprimée et les yeux creux. Il faut suspecter : A. Une déshydratation ✓ bonne réponse B. Une constipation C. Une poussée dentaire D. Une otite simple	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, on le couche : A. Sur le dos, sur un matelas ferme, sans oreiller ni couverture ✓ bonne réponse B. Sur le ventre C. Sur le côté calé par des coussins D. Dans le lit des parents avec un oreiller	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un enfant fait une convulsion avec de la fièvre. Que faire en premier ? A. Le protéger des chocs, ne rien mettre dans sa bouche, le placer en position latérale de sécurité après la crise et alerter ✓ bonne réponse B. Lui mettre un objet entre les dents C. Le plonger dans un bain d'eau froide D. Le maintenir fermement pour arrêter les mouvements	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La fréquence cardiaque normale d'un nourrisson au repos est d'environ : A. 100 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 40 à 60 battements/min C. 60 à 80 battements/min D. 200 à 240 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	La fréquence respiratoire normale d'un enfant de 1 à 5 ans est d'environ : A. 20 à 30 cycles/min ✓ bonne réponse B. 5 à 10 cycles/min C. 60 à 80 cycles/min D. 100 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8	Le calcul d'une dose pédiatrique : 15 mg/kg pour un enfant de 12 kg donne :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 180 mg ✓ bonne réponse B. 15 mg C. 120 mg D. 1 800 mg	
9	La bronchiolite du nourrisson est le plus souvent due :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. À un virus (souvent le VRS) ✓ bonne réponse B. À une bactérie systématiquement C. À une allergie D. À une carence en fer	
10	Les signes de gravité d'une bronchiolite incluent :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Difficulté à s'alimenter, signes de lutte respiratoire, pauses respiratoires ✓ bonne réponse B. Un simple nez qui coule C. Une toux légère sans gêne D. Un bon appétit	
11	Pour réhydrater un enfant atteint de diarrhée sans signe de gravité, on utilise :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une solution de réhydratation orale (SRO), par petites quantités fréquentes ✓ bonne réponse B. De l'eau très sucrée C. Des boissons gazeuses D. Un jeûne complet	
12	La douleur chez l'enfant de moins de 4 ans s'évalue avec :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une échelle comportementale adaptée à l'âge (type FLACC, EVENDOL) ✓ bonne réponse B. Une échelle numérique de 0 à 10 qu'il remplit seul C. Aucune échelle D. La tension artérielle seule	
13	Le calendrier vaccinal de l'enfant doit être :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Vérifié à chaque consultation ou hospitalisation ✓ bonne réponse B. Ignoré à l'hôpital C. Rempli par la famille seule D. Vérifié uniquement à 18 ans	
14	La présence des parents lors des soins chez l'enfant :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Est en général favorable et rassurante pour l'enfant ✓ bonne réponse B. Est toujours interdite C. Augmente systématiquement la douleur D. N'a aucun intérêt	
15	Une fièvre chez un nourrisson de moins de 3 mois :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Impose un avis médical rapide ✓ bonne réponse B. Est toujours bénigne C. Se traite par un bain froid D. Ne nécessite aucune surveillance	

16 La déshydratation sévère chez l'enfant se manifeste par : A. Une somnolence, des yeux creux, une peau qui garde le pli et une diminution des urines ✓ bonne réponse B. Une agitation joyeuse C. Une prise de poids D. Des urines abondantes et claires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La sécurité d'un enfant hospitalisé impose notamment : A. Barrières de lit relevées et aucun médicament à sa portée ✓ bonne réponse B. De le laisser seul sans surveillance C. De lui laisser des petits objets D. De laisser les fenêtres grandes ouvertes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Pour un enfant, les explications avant un soin doivent être : A. Adaptées à son âge, honnêtes et rassurantes ✓ bonne réponse B. Absentes pour ne pas l'effrayer C. Fausses (« ça ne fera rien ») systématiquement D. Données uniquement aux parents	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 La crème anesthésiante locale avant une ponction veineuse chez l'enfant : A. Doit être appliquée suffisamment longtemps avant le soin selon la notice ✓ bonne réponse B. Agit immédiatement C. Est contre-indiquée chez tous les enfants D. S'applique après la ponction	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Les signes d'une détresse respiratoire chez le nourrisson incluent : A. Battement des ailes du nez, tirage, geignement, coloration grise ✓ bonne réponse B. Un sommeil calme C. Une bonne prise des biberons D. Une respiration lente et régulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Laboratoire de PMA

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire PMA

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Phase pré-analytique](#) (Laboratoire / biologie médicale).

Laboratoire de PMA 20 questions

1 L'ICSI consiste à : A. Injecter un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de l'ovocyte ✓ bonne réponse B. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus C. Congeler les ovocytes D. Mettre en contact ovocytes et spermatozoïdes dans une boîte sans micro-injection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
--	--

2 Les gamètes et les embryons sont cryoconservés dans : A. L'azote liquide, à environ -196 °C ✓ bonne réponse B. Un congélateur à -20 °C C. Un réfrigérateur à +4 °C D. L'incubateur à 37 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Règle essentielle à chaque manipulation de gamètes ou d'embryons au laboratoire de PMA : A. La double vérification de l'identité (second opérateur ou système d'identification) ✓ bonne réponse B. La vérification par une seule personne en fin de journée C. L'étiquetage des boîtes après la manipulation D. Le contrôle uniquement lors du transfert	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le stade blastocyste est généralement atteint : A. Vers le 5e ou 6e jour de développement ✓ bonne réponse B. Au 1er jour C. Au 2e jour D. Au 10e jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Avant un spermogramme, la durée d'abstinence recommandée est généralement de : A. 2 à 7 jours ✓ bonne réponse B. 12 heures C. 15 jours au minimum D. 1 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Les incubateurs de culture embryonnaire sont réglés à : A. Environ 37 °C, avec une atmosphère contrôlée en CO2 ✓ bonne réponse B. +4 °C C. La température ambiante du laboratoire D. 42 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 La FIV « classique » consiste à : A. Mettre en contact ovocytes et spermatozoïdes dans un milieu de culture ✓ bonne réponse B. Injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte C. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus D. Congeler l'embryon sans fécondation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 L'insémination intra-utérine consiste à : A. Déposer des spermatozoïdes préparés dans la cavité utérine ✓ bonne réponse B. Prélever des ovocytes C. Transférer un embryon D. Injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	La ponction ovocytaire se fait en général : A. Sous échographie, par voie vaginale, après stimulation ovarienne ✓ bonne réponse B. Par chirurgie abdominale systématique C. Par prise de sang D. Sans aucune préparation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Le signe d'une fécondation normale observé vers 16–20 heures est : A. La présence de deux pronucléi ✓ bonne réponse B. La présence d'un blastocyste C. Un ovocyte sans changement D. Trois cellules	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La vitrification est : A. Une technique de congélation ultra-rapide des ovocytes et embryons ✓ bonne réponse B. Une technique de coloration C. Un milieu de culture D. Une technique d'échographie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	La préparation du sperme avant une AMP vise à : A. Sélectionner les spermatozoïdes mobiles et éliminer le liquide séminal ✓ bonne réponse B. Augmenter le volume de sperme C. Colorer les spermatozoïdes D. Les congeler immédiatement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	Dans un spermogramme, la mobilité progressive est : A. Le pourcentage de spermatozoïdes qui avancent ✓ bonne réponse B. Le volume de l'éjaculat C. Le pH D. Le nombre de leucocytes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	La qualité de l'air dans un laboratoire de FIV est importante car : A. Les embryons sont sensibles aux polluants et composés volatils ✓ bonne réponse B. Elle n'a aucune importance C. Elle concerne seulement le confort D. Elle sert à la congélation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Le transfert embryonnaire est en général réalisé : A. À J2–J3 ou au stade blastocyste (J5–J6) ✓ bonne réponse B. Le jour de la ponction C. À J15 D. Après un mois de culture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 La traçabilité au laboratoire de PMA permet de relier :

- A. Chaque gamète et embryon au couple concerné à chaque étape ✓ **bonne réponse**
- B. Les embryons à la facture
- C. Les patients au parking
- D. Rien de particulier

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Les cuves d'azote liquide nécessitent :

- A. Une surveillance du niveau et des alarmes, et des équipements de protection pour la manipulation ✓ **bonne réponse**
- B. Aucune surveillance
- C. Un stockage au soleil
- D. Une manipulation à mains nues

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Le risque principal lors de la manipulation de l'azote liquide est :

- A. Les brûlures par le froid et le risque d'asphyxie dans un local mal ventilé ✓ **bonne réponse**
- B. L'électrocution
- C. L'irradiation
- D. L'allergie alimentaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 La culture embryonnaire nécessite un contrôle précis :

- A. De la température, du pH et de l'osmolarité des milieux ✓ **bonne réponse**
- B. De la couleur des boîtes
- C. De la luminosité maximale
- D. Du bruit uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne est :

- A. Une complication possible de la stimulation de l'ovulation ✓ **bonne réponse**
- B. Une complication du transfert de sperme
- C. Un résultat normal attendu
- D. Une maladie du nouveau-né

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Stérilisation

Postes concernés : Agent(e) de stérilisation

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Instrumentation chirurgicale](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Panueur(se)

Postes concernés : Panueur(se)

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Pansements et soins des plaies](#) (Infirmier(ère)), [Prévention des escarres](#) (Aide-soignant(e) / auxiliaire).

Encadrement des soins

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Préparation et administration des médicaments](#) (Infirmier(ère)), [Surveillance des paramètres vitaux](#) (Infirmier(ère)).

1 Le planning de l'équipe soignante doit avant tout garantir : A. La continuité et la sécurité des soins 24 h/24, avec un effectif adapté à la charge de travail ✓ bonne réponse B. Le même nombre de gardes pour tous, quelle que soit l'activité C. Les préférences de chacun avant les besoins du service D. Un minimum de personnel la nuit, sans exception	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Un nouvel infirmier arrive dans le service. La bonne pratique est : A. Organiser son accueil et son intégration avec un tuteur et des objectifs progressifs ✓ bonne réponse B. Le laisser seul dès le premier jour pour le tester C. Lui confier uniquement les nuits D. Attendre qu'il pose des questions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Deux soignants se disputent devant les patients. Que faites-vous en premier ? A. Faire cesser la dispute, les recevoir à part, écouter chacun et rechercher une solution ✓ bonne réponse B. Laisser faire, ils finiront par se calmer C. Sanctionner immédiatement les deux devant l'équipe D. Changer l'un d'eux de service sans discussion	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un infirmier peut confier un soin à un aide-soignant : A. S'il relève du champ de compétences de l'aide-soignant, sous la responsabilité de l'infirmier ✓ bonne réponse B. Toujours, quel que soit le soin C. Uniquement la nuit D. Si le médecin est absent	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Les transmissions lors de la relève servent avant tout à : A. Assurer la continuité des soins en communiquant les informations utiles sur chaque patient ✓ bonne réponse B. Remplir le temps de la relève C. Évaluer les soignants D. Remplacer le dossier de soins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La fiche de poste d'un soignant décrit : A. Ses missions, ses responsabilités et ses liens hiérarchiques ✓ bonne réponse B. Son salaire uniquement C. Ses congés D. Sa vie privée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 L'entretien annuel d'évaluation sert à : A. Faire le bilan de l'année, fixer des objectifs et identifier les besoins de formation ✓ bonne réponse B. Sanctionner C. Fixer les vacances uniquement D. Remplacer les transmissions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

8 Un absentéisme élevé dans une équipe doit faire rechercher : A. Des causes liées aux conditions de travail, à la charge ou au climat d'équipe ✓ bonne réponse B. Uniquement la paresse C. Rien D. Un coupable unique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
9 La délégation efficace suppose : A. De confier une tâche claire à une personne compétente et d'en assurer le suivi ✓ bonne réponse B. De tout déléguer sans contrôle C. De ne jamais déléguer D. De déléguer uniquement les tâches pénibles sans explication	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10 Une réunion de service efficace comprend : A. Un ordre du jour, une durée maîtrisée et un compte rendu ✓ bonne réponse B. Aucune préparation C. Uniquement des reproches D. Une durée illimitée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11 Lors d'un pic d'activité imprévu, le surveillant : A. Réorganise les priorités, mobilise des renforts si possible et informe sa hiérarchie ✓ bonne réponse B. Ne change rien C. Ferme le service D. Rentre chez lui	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12 La charge en soins d'un service se mesure notamment avec : A. Des outils d'évaluation de la dépendance et de la gravité des patients ✓ bonne réponse B. Le nombre de fenêtres C. Le nombre de visiteurs D. Le budget de la cafétéria	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13 Le plan de formation d'un service doit : A. Répondre aux besoins des patients, des protocoles et des agents ✓ bonne réponse B. Concerner uniquement le surveillant C. Être fixé au hasard D. Être identique chaque année sans réflexion	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14 Un conflit entre un soignant et un médecin doit être géré : A. Par un échange en privé, factuel, centré sur le patient, avec médiation si nécessaire ✓ bonne réponse B. Devant les patients C. Par mail collectif D. En ignorant le problème	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

15 Le tutorat d'un étudiant en stage comprend : A. L'accueil, des objectifs, l'accompagnement et l'évaluation ✓ bonne réponse B. Le laisser seul en autonomie totale dès le 1er jour C. Lui confier uniquement le ménage D. Aucun suivi	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
16 La gestion du stock et du matériel du service relève : A. De l'organisation du surveillant, en lien avec la pharmacie et les services techniques ✓ bonne réponse B. Uniquement des patients C. De personne D. Des visiteurs	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
17 La motivation d'une équipe est favorisée par : A. La reconnaissance, la participation aux décisions et des objectifs clairs ✓ bonne réponse B. Les reproches publics C. L'absence de communication D. Les changements de planning sans prévenir	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
18 Un nouveau protocole de soins est mis en place. Le surveillant : A. Informe, forme l'équipe et vérifie son application ✓ bonne réponse B. L'affiche sans explication C. Le garde dans son bureau D. Laisse chacun l'interpréter	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
19 Le surveillant de nuit est notamment responsable : A. De la continuité et de la sécurité des soins dans les services pendant la nuit ✓ bonne réponse B. Uniquement de la fermeture des portes C. De la cuisine D. Des admissions administratives uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
20 Pour prévenir l'épuisement d'une équipe, l'encadrant peut : A. Équilibrer les plannings, être à l'écoute et organiser des temps d'échange ✓ bonne réponse B. Augmenter les heures supplémentaires sans limite C. Supprimer les pauses D. Ignorer les signes de fatigue	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Qualité et gestion des risques 20 questions

1 Après un événement indésirable grave, l'encadrant doit : A. Mettre le patient en sécurité, déclarer l'événement et organiser l'analyse des causes sans chercher de coupable ✓ bonne réponse B. Rechercher le responsable pour le sanctionner C. Ne rien déclarer si le patient va bien D. Attendre une plainte de la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---

2 Une revue de morbi-mortalité (RMM) a pour but : A. D'analyser collectivement les causes d'un événement pour éviter qu'il se reproduise ✓ bonne réponse B. De sanctionner un soignant C. De calculer les primes D. D'informer la presse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le chariot d'urgence du service doit être : A. Vérifié régulièrement (contenu, dates de péremption, défibrillateur), avec une vérification tracée ✓ bonne réponse B. Vérifié uniquement après une utilisation C. Fermé à clé, clé chez le médecin chef D. Rangé dans une réserve éloignée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un audit montre une faible observance de l'hygiène des mains. L'action la plus pertinente est : A. Former l'équipe, rendre la solution hydro-alcoolique accessible partout et refaire un audit ✓ bonne réponse B. Supprimer la solution hydro-alcoolique C. Ne rien changer D. Imposer le port permanent de gants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 La traçabilité des soins dans le dossier patient permet : A. De prouver ce qui a été fait, d'assurer la continuité des soins et de protéger le patient et le soignant ✓ bonne réponse B. Uniquement de facturer C. De remplacer les transmissions orales urgentes D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 La démarche qualité repose sur le cycle : A. Planifier, faire, vérifier, améliorer (roue de Deming) ✓ bonne réponse B. Commencer, abandonner, oublier C. Punir, contrôler, sanctionner D. Acheter, stocker, jeter	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7 Un indicateur qualité sert à : A. Mesurer un résultat ou une pratique pour suivre son évolution ✓ bonne réponse B. Remplacer les soins C. Décorer le service D. Fixer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8 L'analyse des causes d'un événement indésirable cherche : A. Les causes profondes liées à l'organisation, et pas seulement l'erreur individuelle ✓ bonne réponse B. Uniquement un coupable C. À cacher l'événement D. À accuser le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

9	La méthode des « 5 pourquoi » sert à : A. Remonter progressivement aux causes profondes d'un problème ✓ bonne réponse B. Compter les patients C. Évaluer la douleur D. Calculer une dose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
10	Un audit clinique consiste à : A. Comparer les pratiques réelles à un référentiel pour les améliorer ✓ bonne réponse B. Contrôler les vestiaires C. Faire un inventaire de la pharmacie D. Évaluer les repas uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
11	La certification d'un établissement de santé vise à : A. Évaluer la qualité et la sécurité des soins selon un référentiel ✓ bonne réponse B. Fixer les prix des consultations C. Recruter du personnel D. Construire de nouveaux bâtiments	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
12	Un questionnaire de satisfaction des patients permet : A. De recueillir leur avis pour améliorer la prise en charge ✓ bonne réponse B. De sanctionner les patients C. De remplacer les soins D. D'évaluer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
13	La cartographie des risques d'un service identifie : A. Les risques principaux, leur fréquence et leur gravité, pour prioriser les actions ✓ bonne réponse B. L'emplacement des fenêtres C. Les congés D. Le menu de la semaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
14	Un protocole de soins validé doit être : A. Daté, accessible, connu de l'équipe et révisé régulièrement ✓ bonne réponse B. Gardé secret C. Valable sans limite de temps D. Écrit à la main sans validation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
15	Le signalement d'un événement indésirable doit être encouragé grâce : A. À une culture de sécurité non punitive ✓ bonne réponse B. À la menace de sanctions C. À l'anonymat des fautes graves sans analyse D. Au silence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

16 L'identitovigilance, l'hygiène des mains et la check-list du bloc sont :

- A. Des pratiques de sécurité des soins à évaluer régulièrement ✓ **bonne réponse**
- B. Des tâches administratives inutiles
- C. Facultatives
- D. Réservées aux médecins

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

17 Après un événement grave, l'équipe peut bénéficier :

- A. D'un débriefing et d'un soutien (« seconde victime ») ✓ **bonne réponse**
- B. D'aucun soutien
- C. D'une sanction collective
- D. D'un changement de service immédiat

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

18 Le plan d'actions qualité comprend :

- A. Des actions, des responsables, des échéances et un suivi ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement des idées
- C. Aucune date
- D. Des actions sans responsable

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

19 La gestion des plaintes et réclamations des patients :

- A. Est une source d'amélioration et doit être analysée ✓ **bonne réponse**
- B. Doit être ignorée
- C. Sert à sanctionner le patient
- D. Est réservée au service juridique sans retour au service

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

20 L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a pour but :

- A. D'améliorer la qualité des soins à partir de l'analyse des pratiques ✓ **bonne réponse**
- B. De noter les soignants pour la paie
- C. De remplacer la formation initiale
- D. De réduire le nombre de soignants

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Encadrement du bloc opératoire

Postes concernés : Surveillant(e) de bloc opératoire

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Bloc opératoire](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Encadrement de l'imagerie

Postes concernés : Surveillant(e) de radiologie

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Radioprotection](#) (Imagerie médicale), [Scanner et IRM](#) (Imagerie médicale).

Annexe – Correspondance poste → questions

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Infirmier(ère) polyvalent(e)	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) de bloc opératoire	Soins infirmiers	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Infirmier(ère) en réanimation	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) aux urgences	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Technicien(ne) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Panseur(se)	Soins infirmiers	Panseur(se) : Pansements et soins des plaies, Prévention des escarres + tronc commun
Sage-femme	Sage-femme	Sage-femme : Suivi de grossesse, Accouchement eutocique, Soins néonataux, Allaitement maternel + tronc commun
Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation : Anesthésie générale, Intubation et ventilation, Monitoring hémodynamique, Surveillance post-interventionnelle + tronc commun
Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Imagerie médicale : Radioprotection, Radiologie conventionnelle, Scanner et IRM + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire / biologie médicale : Phase pré-analytique, Hématologie, Analyses biochimiques, Microbiologie + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire PMA	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire de PMA : Laboratoire de PMA, Phase pré-analytique + tronc commun
Kinésithérapeute	Rééducation et nutrition	Rééducation : Rééducation fonctionnelle, Kinésithérapie respiratoire, Bilan et évaluation + tronc commun
Diététicien(ne) / Nutritionniste	Rééducation et nutrition	Diététique et nutrition : Nutrition clinique, Prise en charge du diabète + tronc commun
Préparateur(trice) en pharmacie	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Pharmacie : Gestion des stocks pharmaceutiques, Délivrance et conseil, Conservation des médicaments + tronc commun
Aide-soignant(e)	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun
Auxiliaire de puériculture	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Technicien(ne) en hygiène hospitalière	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Technicien(ne) en instrumentation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Agent(e) de stérilisation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Stérilisation : Asepsie et stérilisation, Instrumentation chirurgicale + tronc commun
Surveillant(e) d'étage	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) général(e)	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de nuit	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de bloc opératoire	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement du bloc opératoire : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Bloc opératoire, Asepsie et stérilisation + tronc commun
Surveillant(e) de radiologie	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement de l'imagerie : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Radioprotection, Scanner et IRM + tronc commun
Assistant(e) dentaire	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Secrétaire médical(e)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Ambulancier(ère)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Transport sanitaire : Transport sanitaire, Immobilisation et relevage + tronc commun