

Questions de l'entretien IA et des QCM de compétences

Document de validation par des spécialistes – classé par poste · 8 octobre 2026

32

questions d'entretien
IA

48

compétences

230

questions de QCM

28

postes

Consignes aux relecteurs

Pour chaque question, cochez « **Validée** » ou « **À corriger** » et indiquez votre remarque (formulation, exactitude médicale, bonne réponse, distracteurs trop faciles ou ambigus, adaptation au contexte tunisien). Dans les QCM, la bonne réponse est signalée en **vert** ✓ ; les trois autres choix sont des distracteurs qui doivent être clairement faux. Une compétence partagée entre plusieurs métiers n'est détaillée qu'une seule fois (un renvoi est indiqué).

1. Partie 1 – Entretien IA (communication), par famille de postes
2. Partie 2 – QCM de compétences : tronc commun puis familles de métiers
3. Annexe – Correspondance poste → questions

Nom du relecteur	Spécialité / fonction	Date et signature
------------------	-----------------------	-------------------

Partie 1 – Entretien IA (communication)

Chaque entretien comporte 5 questions orales : 3 questions générales tirées au hasard et 2 questions propres au métier. La question est lue par une voix féminine puis le candidat répond à l'oral (2 minutes maximum), sans temps de préparation. L'IA évalue la clarté, la structure, l'empathie, le vocabulaire professionnel et l'adaptation à l'interlocuteur.

Questions générales tous les postes

1	Présentez-vous en quelques phrases et expliquez pourquoi vous avez choisi ce métier.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient anxieux refuse un soin. Que lui dites-vous pour le rassurer ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment annonceriez-vous un retard ou une mauvaise nouvelle à la famille d'un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Racontez une situation où vous avez dû gérer un désaccord avec un collègue. Comment l'avez-vous résolu ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Comment transmettez-vous les informations importantes à l'équipe lors d'un changement de garde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Un médecin vous donne une consigne qui vous semble incorrecte. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
7	Comment expliqueriez-vous un traitement à une personne âgée qui entend mal et comprend difficilement ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
8	Décrivez une situation stressante vécue au travail et la façon dont vous avez communiqué pendant cette situation.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins infirmiers

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) de bloc opératoire · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences · Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie · Panseur(se)

1	Expliquez à un patient, avec des mots simples, comment va se dérouler la pose de sa perfusion.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient se plaint que personne ne répond à sa sonnette. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rédigez-vous et présentez-vous une transmission ciblée à l'équipe de nuit ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

1	Une future maman très inquiète vous demande si son accouchement va bien se passer. Que lui dites-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---	--

2	Comment expliqueriez-vous les premiers gestes de l'allaitement à une jeune mère fatiguée ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le conjoint s'énervé en salle de naissance. Comment gérez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

1	Un patient a peur de l'anesthésie générale. Comment le rassurez-vous avant l'intervention ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment communiquez-vous avec le médecin anesthésiste lors d'une complication au bloc ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Expliquez au patient ce qu'il va ressentir au réveil de l'anesthésie.	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie) · Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale · Technicien(ne) de laboratoire PMA · Préparateur(trice) en pharmacie · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation · Agent(e) de stérilisation

1	Un patient demande le résultat de son examen avant que le médecin ne l'ait vu. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous la préparation nécessaire avant un examen à un patient qui ne parle pas bien français ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Vous constatez une erreur d'étiquetage sur un prélèvement. Comment le signalez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Rééducation et nutrition

Postes concernés : Kinésithérapeute · Diététicien(ne) / Nutritionniste

1	Un patient découragé ne veut plus faire ses exercices de rééducation. Comment le motivez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous les objectifs d'une séance à un enfant et à ses parents ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Comment rendez-vous compte de l'évolution d'un patient au médecin prescripteur ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide-soignant(e) et auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

1	Une personne âgée refuse sa toilette ce matin. Comment abordez-vous la situation ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	--	--

2	Comment signalez-vous à l'infirmière un changement inquiétant chez un patient ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un patient vous confie qu'il se sent seul. Que lui répondez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Encadrement (surveillant·e·s)

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit · Surveillant(e) de bloc opératoire · Surveillant(e) de radiologie

1	Un membre de votre équipe arrive régulièrement en retard. Comment abordez-vous la situation avec lui ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment annoncez-vous à votre équipe un changement d'organisation qui ne plaît pas à tout le monde ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une famille se plaint de la qualité des soins dans le service. Comment la recevez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e) · Ambulancier(ère)

1	Un patient attend depuis longtemps et s'énerve à l'accueil. Comment réagissez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Comment expliquez-vous à un patient les documents à fournir pour son dossier ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un appel urgent arrive pendant que vous renseignez une famille. Comment gérez-vous ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Partie 2 – QCM de compétences

Chaque QCM tire au hasard 5 compétences (celles du métier et du tronc commun) et 3 questions par compétence, soit 15 questions de 30 secondes. Une compétence est validée avec 3 bonnes réponses sur 3. Les 4 choix sont mélangés à l'écran : la **bonne réponse** est indiquée ici en vert (choix A dans ce document).

Tronc commun tous les postes

Hygiène et prévention des infections 6 questions

1 Quelle est la mesure la plus efficace pour prévenir les infections associées aux soins ?

- A. L'hygiène des mains ✓ **bonne réponse**
- B. Le port permanent de gants
- C. L'antibiothérapie préventive systématique
- D. Le changement quotidien de blouse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Combien de temps dure une friction hydro-alcoolique des mains correctement réalisée ?

- A. Environ 20 à 30 secondes ✓ **bonne réponse**
- B. 5 secondes
- C. 2 minutes
- D. 5 minutes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Dans quel cas la friction hydro-alcoolique ne suffit pas et un lavage des mains au savon est nécessaire ?

- A. Mains visiblement souillées ou contact avec un patient atteint de Clostridioides difficile ✓ **bonne réponse**
- B. Avant tout contact avec un patient
- C. Après avoir retiré des gants propres
- D. Avant une injection intramusculaire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Après utilisation, une aiguille doit être :

- A. Jetée immédiatement, sans la recapuchonner, dans un collecteur pour objets piquants-coupants ✓ **bonne réponse**
- B. Recapuchonnée à deux mains puis jetée
- C. Jetée dans le sac à déchets ménagers
- D. Posée sur le plateau jusqu'à la fin du soin

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Que faire en premier après une piqûre accidentelle avec une aiguille souillée ?

- A. Ne pas faire saigner, nettoyer à l'eau et au savon, rincer puis désinfecter (au moins 5 minutes), puis déclarer l'accident ✓ **bonne réponse**
- B. Faire saigner fortement la plaie en pressant
- C. Appliquer de l'alcool à 70° pendant 5 secondes et reprendre le travail
- D. Attendre la fin de la garde pour consulter

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Les précautions « standard » s'appliquent :

- A. À tous les patients, quel que soit leur statut infectieux ✓ **bonne réponse**
B. Uniquement aux patients infectés connus
C. Uniquement en réanimation
D. Uniquement au bloc opératoire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Gestes d'urgence 6 questions

1 Face à un adulte inconscient qui ne respire pas normalement, quel est le rythme des compressions thoraciques ?

- A. 100 à 120 compressions par minute ✓ **bonne réponse**
B. 60 compressions par minute
C. 150 à 180 compressions par minute
D. 30 compressions par minute

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Chez l'adulte, quel est le rapport compressions / insufflations lors de la réanimation cardio-pulmonaire ?

- A. 30 compressions pour 2 insufflations ✓ **bonne réponse**
B. 15 pour 2
C. 5 pour 1
D. 10 pour 1

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Quelle est la profondeur recommandée des compressions thoraciques chez l'adulte ?

- A. Environ 5 cm (sans dépasser 6 cm) ✓ **bonne réponse**
B. Environ 1 à 2 cm
C. Environ 8 à 10 cm
D. Aussi profond que possible

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une victime inconsciente qui respire normalement doit être placée :

- A. En position latérale de sécurité ✓ **bonne réponse**
B. Assise
C. Sur le dos, jambes surélevées, sans surveillance
D. Sur le ventre

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Face à une hémorragie externe importante, le premier geste est :

- A. La compression directe de la plaie ✓ **bonne réponse**
B. La pose immédiate d'un garrot sur toute plaie
C. La surélévation du membre uniquement
D. L'application de glace

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

6 Un adulte conscient s'étouffe et ne peut plus parler ni tousser. Que faire en premier ?

- A. Jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis jusqu'à 5 compressions abdominales si besoin ✓ **bonne réponse**
B. Le faire boire de l'eau
C. Le coucher sur le dos et attendre
D. Commencer immédiatement le bouche-à-bouche

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Sécurité du patient 6 questions

1	Avant tout soin ou administration d'un traitement, l'identité du patient se vérifie : A. En lui demandant de décliner ses nom, prénom et date de naissance et en contrôlant le bracelet ✓ bonne réponse B. En lisant le numéro de la chambre C. En lui demandant simplement « Vous êtes bien M. X ? » D. En se fiant au lit occupé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La règle des « 5 B » de l'administration médicamenteuse vise à donner : A. Le bon médicament, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment, au bon patient ✓ bonne réponse B. Le médicament le moins cher au bon moment C. Le bon médicament au bon service D. Le bon traitement uniquement le matin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Quelle mesure réduit le risque de chute d'un patient hospitalisé ? A. Lit en position basse, sonnette et objets usuels à portée de main ✓ bonne réponse B. Contention systématique de tous les patients âgés C. Barrières de lit relevées pour tous les patients D. Éclairage éteint la nuit dans toute la chambre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Vous découvrez une erreur d'administration d'un médicament. Que faites-vous ? A. Surveiller le patient, prévenir immédiatement le médecin et déclarer l'événement indésirable ✓ bonne réponse B. Ne rien dire si le patient va bien C. Corriger le dossier sans informer personne D. Attendre la visite du lendemain pour en parler	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Lors d'une transmission orale d'une prescription urgente, la bonne pratique est : A. Répéter la prescription à voix haute pour la faire confirmer, puis la faire tracer par écrit ✓ bonne réponse B. La mémoriser sans la répéter C. La noter sur un papier libre que l'on jette après D. Attendre la fin de la garde pour la noter	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Le bracelet d'identification d'un patient hospitalisé doit être posé : A. Dès l'admission et vérifié avant chaque acte ✓ bonne réponse B. Uniquement avant un passage au bloc C. Uniquement si le patient est confus D. À la demande du patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Éthique et secret professionnel 5 questions

1	Le secret professionnel s'applique : A. À toutes les informations apprises, vues ou comprises dans l'exercice de la profession ✓ bonne réponse B. Uniquement au diagnostic médical C. Uniquement pendant les heures de service D. Uniquement aux médecins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---	---

2 Un voisin du patient vous téléphone pour connaître son diagnostic. Que répondez-vous ? A. Vous ne donnez aucune information médicale ✓ bonne réponse B. Vous donnez le diagnostic s'il connaît bien le patient C. Vous donnez seulement le nom du service D. Vous lui lisez le compte rendu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Avant un soin, le consentement du patient doit être : A. Libre et éclairé, après une information claire ✓ bonne réponse B. Obtenu uniquement pour les interventions chirurgicales C. Donné par la famille dans tous les cas D. Présumé pour tous les soins courants, sans information	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Publier sur un réseau social la photo d'un patient, même sans son nom : A. Est interdit sans son accord : cela porte atteinte à sa vie privée et au secret ✓ bonne réponse B. Est autorisé si le visage est flou C. Est autorisé si le compte est privé D. Est autorisé après sa sortie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Un patient majeur et lucide refuse un soin après avoir été informé. Que faire ? A. Respecter son refus, le réinformer des risques, prévenir le médecin et tracer le refus ✓ bonne réponse B. Réaliser le soin malgré tout C. Demander à la famille de signer à sa place D. Le sortir immédiatement du service	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Infirmier(ère)

Postes concernés : Infirmier(ère) polyvalent(e) · Infirmier(ère) en réanimation · Infirmier(ère) aux urgences

Préparation et administration des médicaments 6 questions

1 Prescription : 500 mg d'un antibiotique. Le flacon contient 1 g à diluer dans 10 mL. Quel volume prélever ? A. 5 mL ✓ bonne réponse B. 2 mL C. 10 mL D. 0,5 mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Prescription : 1 000 mL de sérum en 8 heures avec un perfuseur standard (20 gouttes/mL). Quel débit régler ? A. Environ 42 gouttes/min ✓ bonne réponse B. Environ 21 gouttes/min C. Environ 125 gouttes/min D. Environ 8 gouttes/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3	Une seringue électrique doit délivrer 48 mL en 24 heures. Quel débit programmer ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 2 mL/h ✓ bonne réponse B. 4 mL/h C. 0,5 mL/h D. 24 mL/h	
4	Combien de microgrammes y a-t-il dans 1 milligramme ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. 1 000 µg ✓ bonne réponse B. 10 µg C. 100 µg D. 1 000 000 µg	
5	Le chlorure de potassium (KCl) concentré :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Ne s'injecte jamais en intraveineuse directe : il doit être dilué et perfusé lentement ✓ bonne réponse B. S'injecte en IV directe rapide en cas d'hypokaliémie C. S'administre uniquement en sous-cutané D. Peut être injecté pur dans la tubulure	
6	Un médicament prescrit « per os » s'administre :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Par la bouche ✓ bonne réponse B. Par voie intraveineuse C. Par voie sous-cutanée D. Par voie rectale	

Pose de perfusion 5 questions

1	Combien de temps peut-on laisser en place un garrot lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Le moins longtemps possible, idéalement moins d'une minute ✓ bonne réponse B. 5 minutes minimum C. Jusqu'à la fin de la perfusion D. 15 minutes	
2	Quel site privilégier pour un cathéter veineux périphérique chez l'adulte ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. L'avant-bras, sur le membre non dominant de préférence ✓ bonne réponse B. Le pli du coude en première intention C. Une veine du membre inférieur D. Le bras porteur d'une fistule artério-veineuse	
3	Quel signe doit faire suspecter une extravasation (diffusion) au point de perfusion ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Gonflement, peau froide et pâle, douleur, ralentissement du débit ✓ bonne réponse B. Reflux de sang dans la tubulure C. Débit qui augmente D. Peau chaude et rouge le long de la veine sans gonflement	

4 Rougeur, chaleur et cordon induré le long de la veine perfusée évoquent : A. Une phlébite ✓ bonne réponse B. Une hypoglycémie C. Une réaction allergique généralisée D. Un fonctionnement normal	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Avant de brancher une perfusion, la tubulure doit être : A. Purgée afin d'en chasser tout l'air ✓ bonne réponse B. Remplie à moitié C. Laisée vide, l'air étant sans danger D. Rincée à l'alcool	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Prélèvements sanguins 5 questions

1 Pour une hémoculture, la désinfection de la peau doit être : A. Soigneuse, avec un antiseptique et un temps de séchage respecté avant la ponction ✓ bonne réponse B. Inutile si le patient est propre C. Réalisée après la ponction D. Faite à l'eau uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Le tube à bouchon violet (EDTA) est principalement utilisé pour : A. La numération formule sanguine (NFS) ✓ bonne réponse B. La glycémie C. Le bilan d'hémostase (TP, TCA) D. Les hémocultures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le tube citraté (bouchon bleu) pour le bilan d'hémostase doit être : A. Rempli jusqu'au trait de remplissage ✓ bonne réponse B. Rempli à moitié C. Prélevé en dernier impérativement après plusieurs tubes secs D. Agiter vigoureusement pendant une minute	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Pour éviter une hémolyse lors d'un prélèvement, il faut : A. Éviter un garrot trop long et ne pas secouer les tubes ✓ bonne réponse B. Utiliser une aiguille la plus fine possible et aspirer fort C. Laisser le garrot en place plusieurs minutes D. Agiter énergiquement les tubes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Où réaliser un prélèvement sanguin chez un patient perfusé au bras droit ? A. Au bras opposé (ou en aval de la perfusion après arrêt, selon le protocole) ✓ bonne réponse B. Au-dessus de la perfusion, sur le même bras C. Directement dans la tubulure de la perfusion en cours D. Il n'y a aucune précaution particulière	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Surveillance des paramètres vitaux 6 questions

1	Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un adulte au repos ? A. 60 à 100 battements/min ✓ bonne réponse B. 40 à 50 battements/min C. 110 à 140 battements/min D. 20 à 40 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quelle est la fréquence respiratoire normale d'un adulte au repos ? A. 12 à 20 cycles/min ✓ bonne réponse B. 4 à 8 cycles/min C. 25 à 35 cycles/min D. 40 à 50 cycles/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une saturation (SpO2) de 85 % chez un adulte sans pathologie respiratoire chronique : A. Est une hypoxémie qui nécessite une prise en charge immédiate ✓ bonne réponse B. Est normale C. Est normale la nuit D. Ne nécessite qu'une nouvelle mesure le lendemain	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	À partir de quelle température parle-t-on habituellement de fièvre ? A. 38 °C ✓ bonne réponse B. 37 °C C. 36,5 °C D. 39,5 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une glycémie capillaire à 0,50 g/L (2,8 mmol/L) chez un patient diabétique correspond à : A. Une hypoglycémie ✓ bonne réponse B. Une glycémie normale C. Une hyperglycémie D. Une acidocétose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	Hypotension, tachycardie, pâleur et sueurs après une intervention doivent faire suspecter : A. Une hémorragie / un état de choc ✓ bonne réponse B. Une hypertension C. Un réveil normal D. Une hypothermie bénigne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Pansements et soins des plaies 5 questions

1	Le nettoyage d'une plaie propre se fait : A. Du plus propre vers le plus sale ✓ bonne réponse B. Du plus sale vers le plus propre C. Par mouvements de va-et-vient D. Uniquement à l'alcool	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---	---

2	Quel est le produit de première intention pour nettoyer une plaie chronique (ulcère, escarre) ?	A. Sérum physiologique (ou eau et savon doux) ✓ bonne réponse B. Eau oxygénée pure C. Alcool à 90° D. Éosine aqueuse systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une escarre de stade I se caractérise par :	A. Une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression, peau intacte ✓ bonne réponse B. Une plaie profonde avec os visible C. Une phlyctène ouverte D. Une nécrose noire	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quels signes locaux évoquent l'infection d'une plaie ?	A. Rougeur, chaleur, douleur, œdème, écoulement purulent ✓ bonne réponse B. Bourgeonnement rose et indolore C. Plaie qui se rétrécit D. Absence de douleur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un pansement doit être refait :	A. Selon la prescription ou s'il est souillé, décollé ou mouillé ✓ bonne réponse B. Toutes les heures C. Jamais avant la sortie D. Uniquement si le patient le demande	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Bloc opératoire et stérilisation

Postes concernés : Infirmier(ère) de bloc opératoire · Technicien(ne) en hygiène hospitalière · Technicien(ne) en instrumentation

Instrumentation chirurgicale 5 questions

1	Le compte des compresses, aiguilles et instruments au bloc opératoire est réalisé :	A. Avant l'incision, avant la fermeture et en fin d'intervention, et tracé ✓ bonne réponse B. Uniquement en fin de journée C. Uniquement si le chirurgien le demande D. Une seule fois en début de programme	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un instrument stérile tombe au sol pendant l'intervention. Que faites-vous ?	A. Il est considéré comme contaminé : il est retiré et remplacé ✓ bonne réponse B. Il est réutilisé après l'avoir essuyé C. Il est trempé dans l'alcool puis réutilisé D. Il est réutilisé si personne ne l'a vu	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 Quel instrument sert principalement à saisir et clamper un vaisseau ? A. Une pince hémostatique (type Kocher ou Pean) ✓ bonne réponse B. Un écarteur de Farabeuf C. Une curette D. Un porte-aiguille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le porte-aiguille sert à : A. Tenir l'aiguille lors de la suture ✓ bonne réponse B. Couper les fils C. Écarter les berges de la plaie D. Aspirer le sang	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Qui peut toucher la table d'instrumentation stérile ? A. Uniquement les personnes habillées stérilement ✓ bonne réponse B. Toute l'équipe du bloc C. L'infirmier circulant D. Le brancardier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Asepsie et stérilisation 5 questions

1 Avant la stérilisation, un dispositif médical réutilisable doit être : A. Pré-désinfecté, nettoyé, séché puis conditionné ✓ bonne réponse B. Directement mis dans l'autoclave sale C. Seulement rincé à l'eau D. Désinfecté à l'alcool et rangé	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quel est le cycle de référence de l'autoclave pour les dispositifs médicaux en stérilisation hospitalière ? A. 134 °C pendant au moins 18 minutes ✓ bonne réponse B. 100 °C pendant 5 minutes C. 60 °C pendant 1 heure D. 200 °C pendant 2 minutes	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le test de Bowie-Dick sert à vérifier : A. La bonne pénétration de la vapeur et l'évacuation de l'air dans l'autoclave ✓ bonne réponse B. La stérilité d'un instrument C. La propreté des mains D. La date de péremption des emballages	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un sachet de stérilisation est déchiré ou humide : A. Le contenu est considéré comme non stérile ✓ bonne réponse B. Il peut être utilisé s'il est récent C. Il suffit de le scotcher D. Il peut être utilisé au bloc si l'intervention est courte	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5 Le lavage chirurgical des mains est réalisé :

- A. Avant d'enfiler la casaque et les gants stériles ✓ **bonne réponse**
- B. Après l'intervention uniquement
- C. Uniquement si les mains sont sales
- D. Avec une solution hydro-alcoolique sur des mains souillées

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bloc opératoire 5 questions

1 La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » se déroule :

- A. Avant l'induction, avant l'incision et après l'intervention ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement à la sortie du bloc
- C. Seulement pour les urgences
- D. Le lendemain de l'intervention

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le « temps de pause » avant l'incision permet de vérifier :

- A. L'identité du patient, le côté et le site opératoire, l'intervention prévue ✓ **bonne réponse**
- B. Le nombre de lits disponibles
- C. Les horaires de l'équipe
- D. Le programme du lendemain

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Lors de l'installation du patient sur la table, le principal risque à prévenir est :

- A. Les compressions et lésions cutanées ou nerveuses ✓ **bonne réponse**
- B. La fièvre
- C. L'hyperglycémie
- D. L'allergie au latex chez tous les patients

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La plaque neutre du bistouri électrique doit être placée :

- A. Sur une zone musculaire bien vascularisée, propre et sèche, proche du site opératoire ✓ **bonne réponse**
- B. Sur une saillie osseuse
- C. Sur une cicatrice
- D. Sur une zone humide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Dans la salle d'opération, les portes doivent rester :

- A. Fermées autant que possible pour limiter la contamination de l'air ✓ **bonne réponse**
- B. Ouvertes en permanence pour aérer
- C. Ouvertes pendant l'incision
- D. Sans importance

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Sage-femme

Postes concernés : Sage-femme

Suivi de grossesse 5 questions

1	Quelle est la durée moyenne d'une grossesse en semaines d'aménorrhée (SA) ?	A. Environ 41 SA ✓ bonne réponse B. Environ 36 SA C. Environ 45 SA D. Environ 32 SA	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	À partir de quel terme une naissance est-elle considérée « à terme » ?	A. 37 SA révolues ✓ bonne réponse B. 32 SA C. 34 SA D. 40 SA uniquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Une tension artérielle $\geq 140/90$ mmHg avec protéinurie après 20 SA évoque :	A. Une prééclampsie ✓ bonne réponse B. Un diabète gestationnel C. Une grossesse normale D. Une anémie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Quelle supplémentation est recommandée en début de grossesse pour prévenir les anomalies de fermeture du tube neural ?	A. Acide folique (vitamine B9) ✓ bonne réponse B. Vitamine A à forte dose C. Vitamine K D. Fer injectable systématique	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le dépistage du diabète gestationnel par HGPO 75 g se fait habituellement :	A. Entre 24 et 28 SA ✓ bonne réponse B. À 8 SA C. À 38 SA D. Après l'accouchement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accouchement eutocique 5 questions

1	Le travail actif est défini par une dilatation du col :	A. À partir d'environ 5 à 6 cm avec des contractions régulières ✓ bonne réponse B. À partir de 1 cm C. Uniquement à 10 cm D. Dès la perte du bouchon muqueux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La délivrance correspond à :	A. L'expulsion du placenta et des membranes ✓ bonne réponse B. La sortie de l'enfant C. La rupture de la poche des eaux D. Le début des contractions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 Une hémorragie du post-partum est définie par une perte sanguine d'au moins : A. 500 mL dans les 24 heures suivant l'accouchement ✓ bonne réponse B. 100 mL C. 200 mL D. 2 000 mL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Quel médicament est recommandé en prévention de l'hémorragie de la délivrance ? A. L'ocytocine ✓ bonne réponse B. L'insuline C. Le paracétamol D. Le salbutamol	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 La présentation la plus fréquente à l'accouchement est : A. La présentation céphalique (sommet) ✓ bonne réponse B. Le siège C. La présentation transverse D. La présentation de la face	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Soins néonataux 5 questions

1 Le score d'Apgar est évalué : A. À 1, 5 et 10 minutes de vie ✓ bonne réponse B. À 1 heure de vie C. Au 3e jour D. Uniquement si l'enfant est prématuré	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quels éléments composent le score d'Apgar ? A. Fréquence cardiaque, respiration, tonus, réactivité, coloration ✓ bonne réponse B. Poids, taille, périmètre crânien C. Température, glycémie, bilirubine D. Pleurs, sommeil, alimentation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quelle vitamine est administrée au nouveau-né pour prévenir la maladie hémorragique ? A. Vitamine K ✓ bonne réponse B. Vitamine C C. Vitamine D à forte dose D. Vitamine B12	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Quelle est la fréquence cardiaque normale d'un nouveau-né ? A. 120 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 60 à 80 battements/min C. 80 à 100 battements/min D. 200 à 240 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Pour prévenir l'hypothermie du nouveau-né, on privilégie : A. Le séchage immédiat et le peau-à-peau avec la mère ✓ bonne réponse B. Le bain immédiat C. Le laisser nu sur la table D. Une pièce non chauffée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Allaitement maternel 4 questions

1	L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à : A. 6 mois ✓ bonne réponse B. 1 mois C. 3 mois D. 12 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quand débiter idéalement la première tétée ? A. Dans l'heure qui suit la naissance ✓ bonne réponse B. Après 24 heures C. Au 3e jour, à la montée de lait D. Après le premier bain	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le colostrum est : A. Le premier lait, riche en anticorps ✓ bonne réponse B. Un lait de mauvaise qualité à jeter C. Un lait artificiel D. Un signe d'infection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Une bonne prise du sein se reconnaît à : A. Une bouche grande ouverte, lèvres retroussées, menton contre le sein, aréole largement prise ✓ bonne réponse B. Le bébé qui tète uniquement le bout du mamelon C. Une douleur intense chez la mère D. Des bruits de claquement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Anesthésie-réanimation

Postes concernés : Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation

Anesthésie générale 6 questions

1	Avant une anesthésie programmée, le jeûne habituel pour les solides est d'au moins : A. 6 heures ✓ bonne réponse B. 30 minutes C. 1 heure D. 24 heures	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Les liquides clairs (eau, thé sans lait) sont généralement autorisés jusqu'à : A. 2 heures avant l'anesthésie ✓ bonne réponse B. 12 heures avant C. 24 heures avant D. Ils sont interdits dès la veille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le propofol est : A. Un hypnotique d'induction intraveineux ✓ bonne réponse B. Un curare C. Un antalgique morphinique D. Un antidote des benzodiazépines	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4	Quel est l'antidote des morphiniques ? A. La naloxone ✓ bonne réponse B. Le flumazénil C. La néostigmine D. L'atropine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Quel est l'antidote des benzodiazépines ? A. Le flumazénil ✓ bonne réponse B. La naloxone C. La protamine D. La vitamine K	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La consultation d'anesthésie a lieu : A. Plusieurs jours avant une intervention programmée ✓ bonne réponse B. Uniquement après l'intervention C. Au bloc, juste avant l'induction D. Elle est facultative	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Intubation et ventilation 5 questions

1	La manœuvre de Sellick consiste à : A. Exercer une pression sur le cartilage cricoïde ✓ bonne réponse B. Surélever les jambes C. Tourner la tête du patient sur le côté D. Comprimer le thorax	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Quel est le moyen le plus fiable pour confirmer la position de la sonde d'intubation dans la trachée ? A. La capnographie (présence de CO2 expiré) ✓ bonne réponse B. La buée dans la sonde C. La couleur de la peau D. Le nombre de centimètres seul	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Avant l'intubation, la pré-oxygénation se fait : A. Avec de l'oxygène pur au masque pendant environ 3 minutes ✓ bonne réponse B. À l'air ambiant C. Pendant 10 secondes D. Après l'intubation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) sert à : A. Ventiler manuellement un patient ✓ bonne réponse B. Aspirer les sécrétions C. Mesurer la tension artérielle D. Réchauffer le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

5 Une désaturation brutale chez un patient intubé et ventilé doit faire rechercher en priorité :

- A. Un déplacement ou une obstruction de la sonde, un problème de ventilateur ✓ **bonne réponse**
- B. Une hypoglycémie
- C. Une hyperthermie
- D. Une erreur de la tension

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Monitoring hémodynamique 4 questions

1 La pression artérielle moyenne (PAM) se calcule approximativement par :

- A. $(PAS + 2 \times PAD) / 3$ ✓ **bonne réponse**
- B. $(PAS + PAD) / 2$
- C. $PAS - PAD$
- D. $PAS \times 2$

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le monitoring minimal d'une anesthésie générale comprend :

- A. ECG, pression artérielle, SpO₂, capnographie ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la température
- C. Uniquement la SpO₂
- D. Uniquement la diurèse

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Sur l'ECG du scope, une ligne plate chez un patient inconscient doit d'abord faire :

- A. Vérifier le patient et les électrodes, et débiter la réanimation si arrêt cardiaque ✓ **bonne réponse**
- B. Attendre la fin de l'intervention
- C. Changer d'imprimante
- D. Diminuer le volume des alarmes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Une bradycardie sévère au bloc peut être traitée en première intention par :

- A. L'atropine (selon prescription / protocole) ✓ **bonne réponse**
- B. Le propofol
- C. La morphine
- D. Le furosémide

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Surveillance post-interventionnelle 4 questions

1 Le score d'Aldrete sert à :

- A. Évaluer la récupération et autoriser la sortie de salle de réveil ✓ **bonne réponse**
- B. Mesurer la douleur
- C. Évaluer le risque d'escarre
- D. Évaluer la profondeur de l'anesthésie

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Quel est le premier signe de dépression respiratoire liée aux morphiniques à surveiller ?

- A. La sédation (sommolence) et la baisse de la fréquence respiratoire ✓ **bonne réponse**
- B. La fièvre
- C. Une hypertension isolée
- D. Des démangeaisons uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 En salle de réveil, des frissons avec température à 35 °C nécessitent : A. Un réchauffement actif du patient ✓ bonne réponse B. Une sortie immédiate C. Un bain froid D. Aucune action	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Une échelle numérique de la douleur à 7/10 en SSPI signifie : A. Une douleur importante à traiter selon le protocole ✓ bonne réponse B. Une douleur absente C. Une douleur normale à ignorer D. Une erreur de mesure	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Imagerie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)

Radioprotection 5 questions

1 Les trois principes de la radioprotection sont : A. Justification, optimisation, limitation ✓ bonne réponse B. Rapidité, précision, efficacité C. Distance, lumière, silence D. Prévention, traitement, suivi	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Quels sont les trois moyens de se protéger d'une source de rayonnement ? A. Temps, distance, écran ✓ bonne réponse B. Gants, masque, lunettes de soleil C. Lavage, désinfection, stérilisation D. Température, pression, humidité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Avant un examen radiologique chez une femme en âge de procréer, il faut : A. Rechercher une éventuelle grossesse ✓ bonne réponse B. Vérifier son groupe sanguin C. Prendre sa température D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le dosimètre individuel porté par le personnel sert à : A. Mesurer la dose de rayonnement reçue ✓ bonne réponse B. Mesurer la tension artérielle C. Mesurer le temps de travail D. Détecter les métaux	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Le principe ALARA signifie : A. Maintenir les doses aussi basses que raisonnablement possible ✓ bonne réponse B. Augmenter les doses pour une meilleure image C. Ne jamais faire de radiographie D. Utiliser toujours le même réglage	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Radiologie conventionnelle 4 questions

1	Une radiographie pulmonaire de face standard se fait de préférence : A. Debout, en inspiration profonde bloquée ✓ bonne réponse B. Couché, en expiration forcée C. Assis, en respirant normalement D. Debout, en toussant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Pour la radiographie d'un membre traumatisé, on réalise habituellement : A. Au moins deux incidences orthogonales (face et profil) ✓ bonne réponse B. Une seule incidence de face C. Uniquement un profil D. Une incidence oblique seule	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Avant une radiographie, on demande au patient de retirer : A. Les objets métalliques dans la zone examinée ✓ bonne réponse B. Ses chaussettes uniquement C. Ses lunettes pour toute radiographie D. Rien du tout	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Sur une radiographie standard, l'os apparaît : A. Blanc (radio-opaque) ✓ bonne réponse B. Noir C. Transparent D. Gris foncé comme l'air	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Scanner et IRM 5 questions

1	Quelle est la principale contre-indication à l'IRM ? A. Certains dispositifs implantés (pacemaker non compatible, corps étranger métallique intraoculaire...) ✓ bonne réponse B. Le diabète C. Une prothèse dentaire en résine D. Le port de lentilles	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Avant l'injection d'un produit de contraste iodé, on recherche notamment : A. Une allergie antérieure et une insuffisance rénale ✓ bonne réponse B. Une myopie C. Un groupe sanguin rare D. Un antécédent d'appendicectomie	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	L'IRM utilise : A. Un champ magnétique et des ondes radiofréquence ✓ bonne réponse B. Des rayons X C. Des ultrasons D. Des rayons gamma	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Le scanner (tomodensitométrie) utilise :

- A. Des rayons X ✓ **bonne réponse**
B. Un champ magnétique
C. Des ultrasons
D. Aucun rayonnement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Chez un patient diabétique traité par metformine, l'injection d'iode impose surtout de :

- A. Vérifier la fonction rénale et suivre le protocole d'arrêt temporaire si nécessaire ✓ **bonne réponse**
B. Doubler la dose de metformine
C. Faire un jeûne de 48 h
D. Contre-indiquer définitivement l'examen

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Laboratoire / biologie médicale

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale

Phase pré-analytique 5 questions

1 Un tube arrive au laboratoire sans étiquette d'identification. Que faire ?

- A. Le refuser et demander un nouveau prélèvement ✓ **bonne réponse**
B. Le traiter et deviner le patient
C. L'étiqueter avec le patient le plus probable
D. Le conserver sans rien dire

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La glycémie à jeun se prélève après un jeûne d'au moins :

- A. 8 heures ✓ **bonne réponse**
B. 1 heure
C. 30 minutes
D. 24 heures

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une hémolyse de l'échantillon augmente faussement notamment :

- A. Le potassium ✓ **bonne réponse**
B. Le sodium
C. La glycémie
D. Les plaquettes

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Un tube pour bilan d'hémostase (citrate) insuffisamment rempli :

- A. Fausse les résultats et doit être refusé ✓ **bonne réponse**
B. Donne des résultats plus précis
C. Est sans conséquence
D. Peut être complété avec un autre tube

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Un échantillon pour gazométrie artérielle doit être :

- A. Analysé rapidement, sans bulle d'air ✓ **bonne réponse**
B. Laissé à l'air libre une heure
C. Congelé avant analyse
D. Agité à l'air

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Hématologie 5 questions

1	Le taux normal d'hémoglobine chez une femme adulte est d'environ : A. 12 à 16 g/dL ✓ bonne réponse B. 5 à 8 g/dL C. 18 à 22 g/dL D. 1 à 3 g/dL	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Le nombre normal de plaquettes chez l'adulte est d'environ : A. 150 000 à 400 000 /mm ³ ✓ bonne réponse B. 10 000 à 50 000 /mm ³ C. 1 à 2 millions /mm ³ D. 4 000 à 10 000 /mm ³	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le nombre normal de leucocytes chez l'adulte est d'environ : A. 4 000 à 10 000 /mm ³ ✓ bonne réponse B. 150 000 à 400 000 /mm ³ C. 500 à 1 000 /mm ³ D. 50 000 /mm ³	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un VGM (volume globulaire moyen) bas évoque principalement : A. Une anémie microcytaire, souvent par carence en fer ✓ bonne réponse B. Une carence en vitamine B12 C. Une polyglobulie D. Une leucémie certaine	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Le receveur universel en transfusion de globules rouges est de groupe : A. AB Rh+ ✓ bonne réponse B. O Rh- C. A Rh+ D. B Rh-	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Analyses biochimiques 5 questions

1	La glycémie à jeun normale est d'environ : A. 0,70 à 1,10 g/L ✓ bonne réponse B. 0,20 à 0,40 g/L C. 2 à 3 g/L D. 1,50 à 2 g/L	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	La kaliémie (potassium) normale est d'environ : A. 3,5 à 5,0 mmol/L ✓ bonne réponse B. 135 à 145 mmol/L C. 0,5 à 1,0 mmol/L D. 8 à 10 mmol/L	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	La natrémie (sodium) normale est d'environ : A. 135 à 145 mmol/L ✓ bonne réponse B. 3,5 à 5 mmol/L C. 95 à 105 mmol/L D. 160 à 180 mmol/L	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 La créatininémie est surtout utilisée pour évaluer :

- A. La fonction rénale ✓ **bonne réponse**
B. La fonction hépatique
C. La coagulation
D. La thyroïde

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 L'HbA1c (hémoglobine glyquée) reflète l'équilibre glycémique des :

- A. 2 à 3 derniers mois ✓ **bonne réponse**
B. 24 dernières heures
C. 7 derniers jours
D. 2 dernières années

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Microbiologie 4 questions

1 La coloration de Gram permet de distinguer :

- A. Les bactéries Gram positif (violettes) et Gram négatif (roses) ✓ **bonne réponse**
B. Les virus des bactéries
C. Les groupes sanguins
D. Les cellules cancéreuses

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pour un ECBU, le recueil des urines se fait :

- A. Après toilette, en milieu de jet, dans un flacon stérile ✓ **bonne réponse**
B. Au premier jet, sans toilette
C. Dans n'importe quel récipient propre
D. Sur 24 heures dans un bocal non stérile

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un échantillon pour culture bactériologique qui ne peut être analysé immédiatement est :

- A. Conservé selon le protocole (souvent au réfrigérateur à +4 °C pour les urines) ✓ **bonne réponse**
B. Laissé à 37 °C au soleil
C. Congelé systématiquement à -80 °C
D. Jeté

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Escherichia coli est :

- A. Un bacille Gram négatif ✓ **bonne réponse**
B. Un coque Gram positif
C. Un virus
D. Un champignon

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Pharmacie

Postes concernés : Préparateur(trice) en pharmacie

Gestion des stocks pharmaceutiques 4 questions

1	La règle de rotation des stocks recommandée pour les médicaments est : A. Premier périmé, premier sorti (FEFO) ✓ bonne réponse B. Dernier entré, premier sorti C. Au hasard D. Le plus cher en premier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un médicament périmé trouvé en rayon doit être : A. Retiré, isolé et éliminé selon la filière dédiée ✓ bonne réponse B. Délivré en priorité C. Remis en rayon D. Jeté à la poubelle ménagère	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Le stock de sécurité correspond à : A. La quantité minimale gardée pour faire face aux retards ou à une hausse de consommation ✓ bonne réponse B. Le stock de médicaments périmés C. Le stock du concurrent D. La quantité commandée chaque jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	L'inventaire permet de : A. Comparer le stock réel au stock théorique ✓ bonne réponse B. Fixer les prix de vente C. Remplacer les ordonnances D. Calculer les salaires	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Délivrance et conseil 4 questions

1	Avant de délivrer un médicament, il faut vérifier sur l'ordonnance : A. L'identité du patient, le prescripteur, la date, la posologie et la durée ✓ bonne réponse B. Uniquement le nom du médicament C. Uniquement la signature D. Uniquement le prix	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un médicament « générique » est : A. Une copie du médicament de référence, avec le même principe actif et la même efficacité ✓ bonne réponse B. Un médicament moins efficace C. Un médicament sans principe actif D. Un médicament réservé à l'hôpital	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	La posologie « 1 cp 3 fois par jour pendant 7 jours » correspond à : A. 21 comprimés ✓ bonne réponse B. 7 comprimés C. 10 comprimés D. 3 comprimés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Un patient sous anticoagulant (AVK) demande de l'aspirine pour un mal de tête. Que conseiller ?

- A. Éviter l'aspirine (risque hémorragique) et orienter vers le pharmacien / médecin, le paracétamol étant généralement préféré ✓ bonne réponse
- B. Délivrer de l'aspirine à forte dose
- C. Doubler l'anticoagulant
- D. Aucune précaution

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Conservation des médicaments 4 questions

1 La plupart des vaccins et insulines non entamées se conservent :

- A. Au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C ✓ bonne réponse
- B. Au congélateur
- C. À température ambiante au soleil
- D. À plus de 30 °C

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La « chaîne du froid » signifie :

- A. Le maintien de la température de conservation sans interruption, de la fabrication à l'administration ✓ bonne réponse
- B. Le stockage des médicaments au congélateur
- C. Une méthode de livraison rapide
- D. Le refroidissement du patient

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un flacon d'insuline en cours d'utilisation peut généralement être conservé :

- A. À température ambiante (moins de 25-30 °C) pendant environ 4 semaines, selon la notice ✓ bonne réponse
- B. Au congélateur
- C. Indéfiniment
- D. Au soleil

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 La température du réfrigérateur à médicaments doit être :

- A. Contrôlée et tracée régulièrement ✓ bonne réponse
- B. Vérifiée une fois par an
- C. Jamais vérifiée
- D. Réglée sur la position la plus froide (négative)

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Rééducation

Postes concernés : Kinésithérapeute

Rééducation fonctionnelle 5 questions

1 Après une prothèse totale de hanche par voie postérieure, quel mouvement est à éviter en début de rééducation ?

- A. L'association flexion, adduction et rotation interne (risque de luxation) ✓ bonne réponse
- B. La marche avec aide technique
- C. La contraction du quadriceps
- D. La respiration profonde

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2	Le testing musculaire coté de 0 à 5 : la cote 3 correspond à : A. Un mouvement complet contre la pesanteur, sans résistance ✓ bonne réponse B. Aucune contraction C. Une force normale D. Une contraction sans mouvement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Pour un patient hémiparétique, la canne se tient : A. Du côté sain ✓ bonne réponse B. Du côté atteint C. Avec les deux mains D. Elle est déconseillée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	La mobilisation précoce après une chirurgie vise notamment à prévenir : A. La phlébite, les escarres et l'enraidissement ✓ bonne réponse B. La fièvre C. L'hypoglycémie D. Les allergies	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Une entorse récente de la cheville se prend en charge initialement par : A. Repos relatif, glace, compression, surélévation ✓ bonne réponse B. Massage profond immédiat C. Chaleur intense D. Course à pied	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Kinésithérapie respiratoire 4 questions

1	Le désencombrement bronchique vise à : A. Faciliter l'évacuation des sécrétions bronchiques ✓ bonne réponse B. Augmenter la tension artérielle C. Diminuer la fréquence cardiaque D. Traiter une fracture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Chez le patient BPCO, la ventilation lèvres pincées permet de : A. Freiner l'expiration et limiter le piégeage de l'air ✓ bonne réponse B. Accélérer la respiration C. Bloquer la respiration D. Augmenter la toux sèche	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	La spirométrie incitative après chirurgie abdominale sert à : A. Prévenir les atelectasies en encourageant les inspirations profondes ✓ bonne réponse B. Mesurer la glycémie C. Traiter la douleur D. Faire maigrir le patient	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Pendant une séance, une SpO2 qui chute à 86 % impose de :

- A. Interrompre l'effort et surveiller / alerter selon la prescription d'oxygène ✓
bonne réponse
- B. Augmenter l'intensité
- C. Ignorer la valeur
- D. Retirer l'oxygène

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Bilan et évaluation 4 questions

1 Le bilan initial en rééducation sert à :

- A. Établir un diagnostic fonctionnel et fixer des objectifs mesurables ✓
bonne réponse
- B. Remplacer la prescription médicale
- C. Facturer la séance
- D. Choisir les horaires

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 La goniométrie mesure :

- A. Les amplitudes articulaires ✓
bonne réponse
- B. La force musculaire
- C. La fréquence respiratoire
- D. La sensibilité

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 L'échelle visuelle analogique (EVA) évalue :

- A. L'intensité de la douleur ✓
bonne réponse
- B. L'équilibre
- C. La force de préhension
- D. Le niveau d'études

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Un objectif de rééducation bien formulé est :

- A. Précis, mesurable et daté ✓
bonne réponse
- B. Vague pour pouvoir s'adapter
- C. Fixé uniquement par la famille
- D. Le même pour tous les patients

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Diététique et nutrition

Postes concernés : Diététicien(ne) / Nutritionniste

Nutrition clinique 5 questions

1 L'indice de masse corporelle (IMC) se calcule ainsi :

- A. Poids (kg) divisé par la taille (m) au carré ✓
bonne réponse
- B. Taille divisée par le poids
- C. Poids multiplié par la taille
- D. Poids moins la taille en cm

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2	Chez l'adulte, un IMC entre 18,5 et 25 correspond à :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une corpulence normale ✓ bonne réponse B. Une obésité C. Une dénutrition sévère D. Un surpoids	
3	Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Environ 9 kcal ✓ bonne réponse B. Environ 4 kcal C. Environ 7 kcal D. Environ 1 kcal	
4	Combien de kilocalories apporte 1 g de protéines ou de glucides ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Environ 4 kcal ✓ bonne réponse B. Environ 9 kcal C. Environ 12 kcal D. Environ 0,5 kcal	
5	Une perte de poids involontaire de plus de 5 % en un mois doit faire évoquer :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Une dénutrition ✓ bonne réponse B. Un régime réussi C. Une situation normale D. Une déshydratation bénigne uniquement	

Prise en charge du diabète 4 questions

1	Quels sont les signes typiques d'une hypoglycémie ?	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion ✓ bonne réponse B. Soif intense et urines abondantes C. Fièvre et toux D. Démangeaisons	
2	Face à une hypoglycémie chez un patient conscient, on donne :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Environ 15 g de sucre rapide (ex. 3 morceaux de sucre), puis contrôle ✓ bonne réponse B. Un repas riche en graisses C. De l'insuline D. Rien, cela passera	
3	Les aliments à index glycémique bas :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Font monter la glycémie plus lentement ✓ bonne réponse B. Font monter la glycémie très rapidement C. Ne contiennent aucun glucide D. Sont interdits aux diabétiques	
4	Chez le diabétique, l'activité physique régulière :	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
	A. Améliore l'équilibre glycémique ✓ bonne réponse B. Est contre-indiquée C. Fait toujours monter la glycémie D. N'a aucun effet	

Aide-soignant(e) / auxiliaire

Postes concernés : Aide-soignant(e) · Auxiliaire de puériculture

Soins d'hygiène et de confort 5 questions

1 Lors d'une toilette au lit, on procède :

- A. Du plus propre vers le plus sale ✓ **bonne réponse**
- B. Du plus sale vers le plus propre
- C. Dans n'importe quel ordre
- D. Uniquement le visage

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pendant la toilette d'un patient, il faut préserver :

- A. Son intimité (porte fermée, corps couvert) et son autonomie ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la rapidité du soin
- C. La présence de tous les visiteurs
- D. La fenêtre ouverte en hiver

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Un patient qui peut faire une partie de sa toilette seul :

- A. Doit être encouragé à la faire pour préserver son autonomie ✓ **bonne réponse**
- B. Doit être lavé entièrement pour gagner du temps
- C. Ne doit pas être lavé
- D. Doit attendre sa famille

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Pendant la toilette, vous remarquez une rougeur au sacrum. Que faites-vous ?

- A. Vous le signalez à l'infirmier et le notez dans les transmissions ✓ **bonne réponse**
- B. Vous la massez énergiquement
- C. Vous n'en parlez pas
- D. Vous appliquez de l'alcool

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

5 Les soins de bouche chez un patient alité permettent de prévenir :

- A. Les infections buccales et l'inconfort ✓ **bonne réponse**
- B. Les fractures
- C. L'hypertension
- D. Les escarres du talon

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Prévention des escarres 4 questions

1 Quelles sont les zones les plus à risque d'escarre chez un patient alité sur le dos ?

- A. Sacrum, talons, coudes, omoplates, arrière de la tête ✓ **bonne réponse**
- B. Ventre et cuisses
- C. Mains et doigts
- D. Genoux uniquement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Pour prévenir les escarres, il faut changer la position d'un patient à risque : A. Régulièrement, environ toutes les 2 à 3 heures selon le plan de soins ✓ bonne réponse B. Une fois par jour C. Uniquement la nuit D. Jamais pour ne pas le réveiller	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Quel facteur favorise l'apparition d'une escarre ? A. Une dénutrition et une immobilité prolongée ✓ bonne réponse B. Une marche régulière C. Une bonne hydratation D. Un matelas adapté	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Quel outil sert à évaluer le risque d'escarre ? A. L'échelle de Braden ou de Norton ✓ bonne réponse B. Le score de Glasgow C. L'échelle EVA de la douleur D. Le score d'Apgar	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Manutention des patients 4 questions

1 Pour soulever une charge ou aider un patient, il faut : A. Garder le dos droit et plier les genoux ✓ bonne réponse B. Plier le dos jambes tendues C. Faire une torsion du tronc D. Porter seul, loin du corps	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Avant de lever un patient, la première chose à faire est : A. Lui expliquer le soin et évaluer ce qu'il peut faire lui-même ✓ bonne réponse B. Le lever rapidement sans prévenir C. Appeler sa famille D. Retirer les freins du lit	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Lors d'un transfert lit-fauteuil, le fauteuil doit être : A. Placé près du lit, freins serrés ✓ bonne réponse B. Placé loin du lit C. Freins desserrés D. Sans repose-pieds réglés	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un lève-personne (soulève-malade) est utilisé : A. Pour les patients qui ne peuvent pas participer au transfert ✓ bonne réponse B. Uniquement pour les enfants C. Pour tous les patients autonomes D. Jamais en établissement	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Aide aux repas et hydratation 4 questions

1	Pour aider un patient présentant des troubles de la déglutition à manger, il faut l'installer : A. Assis, tête légèrement fléchie vers l'avant ✓ bonne réponse B. Allongé à plat sur le dos C. Tête en arrière D. Couché sur le ventre	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un patient tousse et s'étouffe à chaque gorgée d'eau. Vous devez : A. Arrêter, le signaler à l'infirmier (risque de fausse route) et adapter les textures selon la prescription ✓ bonne réponse B. Lui donner plus vite à boire C. Lui donner de l'eau gazeuse D. Ne rien signaler	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Quels signes peuvent évoquer une déshydratation chez une personne âgée ? A. Bouche sèche, urines foncées, confusion ✓ bonne réponse B. Prise de poids rapide C. Œdèmes des jambes uniquement D. Hypersalivation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	La surveillance des repas consiste notamment à : A. Noter les quantités consommées et signaler une baisse d'appétit ✓ bonne réponse B. Débarrasser sans regarder C. Forcer le patient à finir D. Supprimer les collations	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Accueil et secrétariat médical

Postes concernés : Assistant(e) dentaire · Secrétaire médical(e)

Accueil et relation patient 4 questions

1	Un patient s'énervé à l'accueil après une longue attente. La meilleure attitude est : A. Rester calme, l'écouter, reconnaître son attente et l'informer du délai ✓ bonne réponse B. Lui répondre sur le même ton C. L'ignorer jusqu'à ce qu'il se calme D. Appeler immédiatement la sécurité	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Au téléphone, un appelant décrit une douleur thoracique intense. Que faire ? A. Le réorienter immédiatement vers les urgences (SAMU 190) et prévenir un soignant ✓ bonne réponse B. Lui donner un rendez-vous la semaine suivante C. Lui conseiller de patienter D. Raccrocher	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

3 L'écoute active consiste à : A. Reformuler et poser des questions pour bien comprendre la demande ✓ bonne réponse B. Préparer sa réponse pendant que la personne parle C. Couper la parole pour gagner du temps D. Écouter en faisant autre chose	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Pour accueillir une personne malentendante, il est préférable de : A. Se placer face à elle, parler lentement et distinctement, écrire si besoin ✓ bonne réponse B. Crier C. Parler en tournant le dos D. S'adresser uniquement à l'accompagnant	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Gestion du dossier patient 4 questions

1 Le dossier patient doit être : A. Confidentiel, à jour et accessible uniquement aux personnes habilitées ✓ bonne réponse B. Laissé sur le bureau d'accueil C. Communiqué à toute personne qui le demande D. Détruit après chaque consultation	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2 Deux patients portent le même nom et prénom. Pour éviter une erreur, vous vérifiez : A. La date de naissance et un autre identifiant (numéro de dossier) ✓ bonne réponse B. Uniquement le prénom C. La couleur des vêtements D. Rien, ils sont identiques	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Votre session sur le logiciel du cabinet doit être : A. Verrouillée dès que vous quittez votre poste ✓ bonne réponse B. Laissée ouverte pour les collègues C. Partagée avec un mot de passe commun affiché D. Ouverte en permanence	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un résultat d'analyse arrive pour un patient. Vous pouvez le communiquer par téléphone : A. Non, sauf procédure prévue : les résultats sont remis au patient ou au médecin de façon sécurisée ✓ bonne réponse B. À toute personne qui appelle C. À l'employeur du patient D. Au voisin	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Terminologie médicale 5 questions

1 Le suffixe « -ite » signifie : A. Inflammation (ex. : appendicite) ✓ bonne réponse B. Ablation chirurgicale C. Douleur D. Tumeur bénigne	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
--	--

2	Le suffixe « -ectomie » signifie : A. Ablation (ex. : appendicectomie) ✓ bonne réponse B. Inflammation C. Examen visuel D. Suture	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	« Tachycardie » signifie : A. Rythme cardiaque rapide ✓ bonne réponse B. Rythme cardiaque lent C. Arrêt du cœur D. Tension élevée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Le préfixe « hyper- » signifie : A. Au-dessus, excès ✓ bonne réponse B. En dessous, insuffisance C. Autour D. À l'intérieur	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un « ORL » est spécialiste : A. Des oreilles, du nez et de la gorge ✓ bonne réponse B. Des os et des articulations C. Du cœur D. De la peau	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Transport sanitaire

Postes concernés : Ambulancier(ère)

Transport sanitaire 4 questions

1	Quel est le numéro du SAMU en Tunisie ? A. 190 ✓ bonne réponse B. 197 C. 198 D. 1 899	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Pendant le transport, un patient devient pâle, en sueurs et ne répond plus. Que faire ? A. Arrêter le véhicule en sécurité, évaluer conscience et respiration, alerter et débiter les gestes d'urgence ✓ bonne réponse B. Accélérer sans rien vérifier C. Ouvrir les fenêtres et continuer D. Attendre l'arrivée à l'hôpital	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Après un transport de patient contagieux, l'ambulance doit être : A. Nettoyée et désinfectée selon le protocole avant un autre transport ✓ bonne réponse B. Utilisée immédiatement C. Aérée seulement D. Lavée une fois par mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

4 Lors du transport, le brancard doit être :

- A. Verrouillé dans son système de fixation, patient sanglé ✓ **bonne réponse**
- B. Libre pour plus de confort
- C. Retiré du véhicule
- D. Sans sangles

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Immobilisation et relevage 4 questions

1 Chez un blessé suspect de traumatisme du rachis, il faut :

- A. Maintenir la tête dans l'axe tête-cou-tronc et limiter les mouvements ✓ **bonne réponse**
- B. Le faire asseoir rapidement
- C. Lui tourner la tête pour le faire parler
- D. Le soulever par les bras

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2 Le matelas immobilisateur à dépression (coquille) sert à :

- A. Immobiliser l'ensemble du corps lors du transport d'un traumatisé ✓ **bonne réponse**
- B. Réchauffer le patient
- C. Réanimer le patient
- D. Mesurer la tension

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

3 Une attelle doit immobiliser :

- A. Les articulations situées au-dessus et au-dessous de la fracture ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement le foyer de fracture
- C. Tout le corps
- D. Aucune articulation

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

4 Avant de poser une attelle sur un membre, on vérifie :

- A. La sensibilité, la motricité et la circulation (pouls, coloration) en aval ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement la douleur
- C. La température corporelle
- D. Rien

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

Pédiatrie

Postes concernés : Infirmier(ère) en pédiatrie · Technicien(ne) en pédiatrie

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Soins néonataux](#) (Sage-femme),
[Préparation et administration des médicaments](#) (Infirmier(ère)).

Soins pédiatriques 6 questions

1 Chez l'enfant, la dose d'un médicament est généralement calculée :

- A. En fonction du poids (mg/kg) ✓ **bonne réponse**
- B. Uniquement selon l'âge en années
- C. Comme chez l'adulte, divisée par deux
- D. Selon la taille seulement

☐ Validée
☐ À corriger
Remarque :

2	Le paracétamol chez l'enfant se donne habituellement à la dose de : A. 15 mg/kg toutes les 6 heures (60 mg/kg/jour au maximum) ✓ bonne réponse B. 50 mg/kg par prise C. 1 g par prise quel que soit l'âge D. 5 mg/kg par jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Un nourrisson a une diarrhée, la fontanelle déprimée et les yeux creux. Il faut suspecter : A. Une déshydratation ✓ bonne réponse B. Une constipation C. Une poussée dentaire D. Une otite simple	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, on le couche : A. Sur le dos, sur un matelas ferme, sans oreiller ni couverture ✓ bonne réponse B. Sur le ventre C. Sur le côté calé par des coussins D. Dans le lit des parents avec un oreiller	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Un enfant fait une convulsion avec de la fièvre. Que faire en premier ? A. Le protéger des chocs, ne rien mettre dans sa bouche, le placer en position latérale de sécurité après la crise et alerter ✓ bonne réponse B. Lui mettre un objet entre les dents C. Le plonger dans un bain d'eau froide D. Le maintenir fermement pour arrêter les mouvements	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6	La fréquence cardiaque normale d'un nourrisson au repos est d'environ : A. 100 à 160 battements/min ✓ bonne réponse B. 40 à 60 battements/min C. 60 à 80 battements/min D. 200 à 240 battements/min	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Laboratoire de PMA

Postes concernés : Technicien(ne) de laboratoire PMA

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Phase pré-analytique](#) (Laboratoire / biologie médicale).

Laboratoire de PMA 6 questions

1	L'ICSI consiste à : A. Injecter un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de l'ovocyte ✓ bonne réponse B. Déposer les spermatozoïdes dans l'utérus C. Congeler les ovocytes D. Mettre en contact ovocytes et spermatozoïdes dans une boîte sans micro-injection	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
---	---	---

2 Les gamètes et les embryons sont cryoconservés dans : A. L'azote liquide, à environ -196 °C ✓ bonne réponse B. Un congélateur à -20 °C C. Un réfrigérateur à +4 °C D. L'incubateur à 37 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Règle essentielle à chaque manipulation de gamètes ou d'embryons au laboratoire de PMA : A. La double vérification de l'identité (second opérateur ou système d'identification) ✓ bonne réponse B. La vérification par une seule personne en fin de journée C. L'étiquetage des boîtes après la manipulation D. Le contrôle uniquement lors du transfert	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Le stade blastocyste est généralement atteint : A. Vers le 5e ou 6e jour de développement ✓ bonne réponse B. Au 1er jour C. Au 2e jour D. Au 10e jour	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 Avant un spermogramme, la durée d'abstinence recommandée est généralement de : A. 2 à 7 jours ✓ bonne réponse B. 12 heures C. 15 jours au minimum D. 1 mois	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
6 Les incubateurs de culture embryonnaire sont réglés à : A. Environ 37 °C, avec une atmosphère contrôlée en CO2 ✓ bonne réponse B. +4 °C C. La température ambiante du laboratoire D. 42 °C	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Stérilisation

Postes concernés : Agent(e) de stérilisation

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Instrumentation chirurgicale](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Panseur(se)

Postes concernés : Panseur(se)

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Pansements et soins des plaies](#) (Infirmier(ère)), [Prévention des escarres](#) (Aide-soignant(e) / auxiliaire).

Encadrement des soins

Postes concernés : Surveillant(e) d'étage · Surveillant(e) général(e) · Surveillant(e) de nuit

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Préparation et administration des médicaments](#) (Infirmier(ère)), [Surveillance des paramètres vitaux](#) (Infirmier(ère)).

Encadrement et organisation des soins 5 questions

1	Le planning de l'équipe soignante doit avant tout garantir : A. La continuité et la sécurité des soins 24 h/24, avec un effectif adapté à la charge de travail ✓ bonne réponse B. Le même nombre de gardes pour tous, quelle que soit l'activité C. Les préférences de chacun avant les besoins du service D. Un minimum de personnel la nuit, sans exception	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
2	Un nouvel infirmier arrive dans le service. La bonne pratique est : A. Organiser son accueil et son intégration avec un tuteur et des objectifs progressifs ✓ bonne réponse B. Le laisser seul dès le premier jour pour le tester C. Lui confier uniquement les nuits D. Attendre qu'il pose des questions	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3	Deux soignants se disputent devant les patients. Que faites-vous en premier ? A. Faire cesser la dispute, les recevoir à part, écouter chacun et rechercher une solution ✓ bonne réponse B. Laisser faire, ils finiront par se calmer C. Sanctionner immédiatement les deux devant l'équipe D. Changer l'un d'eux de service sans discussion	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4	Un infirmier peut confier un soin à un aide-soignant : A. S'il relève du champ de compétences de l'aide-soignant, sous la responsabilité de l'infirmier ✓ bonne réponse B. Toujours, quel que soit le soin C. Uniquement la nuit D. Si le médecin est absent	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5	Les transmissions lors de la relève servent avant tout à : A. Assurer la continuité des soins en communiquant les informations utiles sur chaque patient ✓ bonne réponse B. Remplir le temps de la relève C. Évaluer les soignants D. Remplacer le dossier de soins	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Qualité et gestion des risques 5 questions

1	Après un événement indésirable grave, l'encadrant doit : A. Mettre le patient en sécurité, déclarer l'événement et organiser l'analyse des causes sans chercher de coupable ✓ bonne réponse B. Rechercher le responsable pour le sanctionner C. Ne rien déclarer si le patient va bien D. Attendre une plainte de la famille	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
----------	--	---

2 Une revue de morbi-mortalité (RMM) a pour but : A. D'analyser collectivement les causes d'un événement pour éviter qu'il se reproduise ✓ bonne réponse B. De sanctionner un soignant C. De calculer les primes D. D'informer la presse	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
3 Le chariot d'urgence du service doit être : A. Vérifié régulièrement (contenu, dates de péremption, défibrillateur), avec une vérification tracée ✓ bonne réponse B. Vérifié uniquement après une utilisation C. Fermé à clé, clé chez le médecin chef D. Rangé dans une réserve éloignée	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
4 Un audit montre une faible observance de l'hygiène des mains. L'action la plus pertinente est : A. Former l'équipe, rendre la solution hydro-alcoolique accessible partout et refaire un audit ✓ bonne réponse B. Supprimer la solution hydro-alcoolique C. Ne rien changer D. Imposer le port permanent de gants	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :
5 La traçabilité des soins dans le dossier patient permet : A. De prouver ce qui a été fait, d'assurer la continuité des soins et de protéger le patient et le soignant ✓ bonne réponse B. Uniquement de facturer C. De remplacer les transmissions orales urgentes D. Rien de particulier	☐ Validée ☐ À corriger Remarque :

Encadrement du bloc opératoire

Postes concernés : Surveillant(e) de bloc opératoire

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Bloc opératoire](#) (Bloc opératoire et stérilisation), [Asepsie et stérilisation](#) (Bloc opératoire et stérilisation).

Encadrement de l'imagerie

Postes concernés : Surveillant(e) de radiologie

Compétences également évaluées pour ce métier, détaillées plus haut : [Encadrement et organisation des soins](#) (Encadrement des soins), [Qualité et gestion des risques](#) (Encadrement des soins), [Radioprotection](#) (Imagerie médicale), [Scanner et IRM](#) (Imagerie médicale).

Annexe – Correspondance poste → questions

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Infirmier(ère) polyvalent(e)	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) de bloc opératoire	Soins infirmiers	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Infirmier(ère) en réanimation	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) aux urgences	Soins infirmiers	Infirmier(ère) : Préparation et administration des médicaments, Pose de perfusion, Prélèvements sanguins, Surveillance des paramètres vitaux, Pansements et soins des plaies + tronc commun
Infirmier(ère) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Technicien(ne) en pédiatrie	Soins infirmiers	Pédiatrie : Soins pédiatriques, Soins néonataux, Préparation et administration des médicaments + tronc commun
Panseur(se)	Soins infirmiers	Panseur(se) : Pansements et soins des plaies, Prévention des escarres + tronc commun
Sage-femme	Sage-femme	Sage-femme : Suivi de grossesse, Accouchement eutocique, Soins néonataux, Allaitement maternel + tronc commun
Technicien(ne) supérieur(e) en anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation	Anesthésie-réanimation : Anesthésie générale, Intubation et ventilation, Monitoring hémodynamique, Surveillance post-interventionnelle + tronc commun
Technicien(ne) en imagerie médicale (radiologie)	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Imagerie médicale : Radioprotection, Radiologie conventionnelle, Scanner et IRM + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire / biologie médicale	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire / biologie médicale : Phase pré-analytique, Hématologie, Analyses biochimiques, Microbiologie + tronc commun
Technicien(ne) de laboratoire PMA	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Laboratoire de PMA : Laboratoire de PMA, Phase pré-analytique + tronc commun
Kinésithérapeute	Rééducation et nutrition	Rééducation : Rééducation fonctionnelle, Kinésithérapie respiratoire, Bilan et évaluation + tronc commun
Diététicien(ne) / Nutritionniste	Rééducation et nutrition	Diététique et nutrition : Nutrition clinique, Prise en charge du diabète + tronc commun
Préparateur(trice) en pharmacie	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Pharmacie : Gestion des stocks pharmaceutiques, Délivrance et conseil, Conservation des médicaments + tronc commun
Aide-soignant(e)	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun
Auxiliaire de puériculture	Aide-soignant(e) et auxiliaire	Aide-soignant(e) / auxiliaire : Soins d'hygiène et de confort, Prévention des escarres, Manutention des patients, Aide aux repas et hydratation + tronc commun

Poste	Entretien IA (questions métier)	QCM de compétences
Technicien(ne) en hygiène hospitalière	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Technicien(ne) en instrumentation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Bloc opératoire et stérilisation : Instrumentation chirurgicale, Asepsie et stérilisation, Bloc opératoire + tronc commun
Agent(e) de stérilisation	Métiers techniques (imagerie, laboratoire, stérilisation, pharmacie...)	Stérilisation : Asepsie et stérilisation, Instrumentation chirurgicale + tronc commun
Surveillant(e) d'étage	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) général(e)	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de nuit	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement des soins : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Préparation et administration des médicaments, Surveillance des paramètres vitaux + tronc commun
Surveillant(e) de bloc opératoire	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement du bloc opératoire : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Bloc opératoire, Asepsie et stérilisation + tronc commun
Surveillant(e) de radiologie	Encadrement (surveillant-es)	Encadrement de l'imagerie : Encadrement et organisation des soins, Qualité et gestion des risques, Radioprotection, Scanner et IRM + tronc commun
Assistant(e) dentaire	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Secrétaire médical(e)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Accueil et secrétariat médical : Accueil et relation patient, Gestion du dossier patient, Terminologie médicale + tronc commun
Ambulancier(ère)	Accueil, secrétariat, assistance dentaire, transport sanitaire	Transport sanitaire : Transport sanitaire, Immobilisation et relevage + tronc commun