



Cartilha **Bem-Estar em Ação**



Guia Prático para Identificação e Registro de Indicadores

Olá, Supervisor(a)! Esta cartilha foi desenhada para guiar suas visitas presenciais e o preenchimento correto da **Caderneta Digital Be.Animal**. O objetivo é padronizar a forma como você observa, mensura e registra os dados nas fazendas parceiras, garantindo a evolução do produtor rumo ao "Caso de Sucesso".

A ciência do bem-estar animal avalia o estado físico e psicológico de um animal em relação às condições em que vive. Na criação de bezerras leiteiras, isso significa ir além da mera sobrevivência, focando em proporcionar qualidade de vida desde o nascimento. A avaliação baseia-se no modelo dos **5 Domínios de Bem-Estar Animal** (Nutrição, Ambiente, Saúde, Comportamento e Estados Mentais). A saúde e a nutrição (como a correta colostragem e a cura do umbigo) afetam diretamente o estado mental do animal, impactando a presença de dor, estresse ou vitalidade. Esta cartilha integra os itens de checagem obrigatórios da Caderneta Digital Be.animal com os conceitos estipulados pelo Padrão Ouro. O objetivo é padronizar a forma como você, supervisor, observa, mensura e registra os dados nas fazendas parceiras, garantindo a evolução do produtor rumo ao "Caso de Sucesso".

Abaixo, detalhamos os 5 Domínios de Bem-Estar Animal avaliados na jornada e como mensurá-los com padrão de excelência.

1. DOMÍNIO DA SAÚDE

A saúde é o reflexo direto dos manejos iniciais. Toda bezerra avaliada deve ter seus dados de saúde registrados criteriosamente.

a) Transferência de Imunidade Passiva (TIP)

- **Como identificar/mensurar:** Colete o sangue das bezerras entre 24 horas e 3 dias de vida usando tubos secos (tampa vermelha) sem anticoagulante. Deixe o tubo descansar na estante por 30 a 60 minutos em temperatura ambiente para dessorar. Utilize o Refratômetro Brix no soro.

- **O que registrar:** Anote a porcentagem (%) do Brix sérico de cada bezerra na Caderneta Digital.
- **Referência Padrão Ouro:** O alvo para a categoria "Excelente" é um Brix sérico $\geq 9,4\%$. Bezerras com Brix $< 8,1\%$ apresentam falha na imunidade (ruim) e maior risco de mortalidade.

b) Cura e Infecção de Umbigo

- **Como identificar/mensurar:** O umbigo deve ser curado imediatamente após o nascimento com tintura de iodo a 10%. No primeiro dia de vida, a cura de umbigo deve ser realizada duas vezes, com intervalo mínimo de 6 horas entre as aplicações. Após este período, a cura deve ser feita 1 vez ao dia, até a sua completa secagem. Faça a **apalpação do umbigo**. O escore para detectar infecção é:
 - *Escore 0:* Curado, sem dor, diâmetro de um lápis.
 - *Escore 1 ou 2:* Interno ou externo com alterações, presença de dor à palpação, vasos grossos, podendo drenar pus.
- **O que registrar:** Anote o produto e horário da cura. Registre se o bezerro sente dor à palpação (sim/não), com quantos dias o cordão caiu (3-4, 5-7 ou >8 dias), o número de bezerros com infecção, se precisou de antibiótico e se há uso preventivo de injetáveis.

c) Diarreia

- **Como identificar/mensurar:** Avalie o Escore de Fezes.
 - *Escore 0 e 1:* Consistência firme ou pastosa (normal).
 - *Escore 2 e 3:* Pastosa com muita água ou totalmente líquida, com fezes aderidas no períneo e cauda. **Isso significa que o animal está com diarreia.**
- **O que registrar:** O número de bezerras com diarreia separado por faixa etária (até 30 dias, de 31 a 60 dias, e acima de 60 dias). Avalie esta frequência no dia da sua visita. Para melhor controle, peça ao banco de dados da fazenda os registros do último mês.

d) Doença Respiratória (Pneumonia)

- **Como identificar/mensurar:** Avalie os sinais clínicos. Temperatura retal $\geq 39,4^{\circ}\text{C}$, tosse repetida e espontânea, secreção nasal abundante/mucopurulenta, secreção ocular excessiva e orelhas pendentes (Escore 2 ou 3) indicam quadro de doença respiratória. O Padrão Ouro recomenda também a ultrassonografia pulmonar precoce (aos 7 dias).
- **O que registrar:** O número de bezerras com pneumonia por faixa etária (até 30 dias, 31 a 60 dias, acima de 60 dias), no dia da visita. Para melhor controle, peça ao banco de dados da fazenda os registros do último mês.

e) Pesagem e Mortalidade

- **Como mensurar e registrar:** Registre o peso ao nascimento (idealmente usando balança calibrada com a bezerra em superfície plana), aos 30 dias, 60 dias e ao desmame. Registre a taxa de mortalidade e casos de Tristeza Parasitária Bovina nas respectivas faixas etárias.

2. DOMÍNIO DO AMBIENTE

Avalie onde a bezerra dorme, se protege e os níveis de higiene. A severidade das doenças é proporcional à carga bacteriana do ambiente.

a) Instalações e Conforto (Cama e Microclima)

- **Como avaliar:** Verifique as dimensões. O mínimo exigido é $\geq 3 \text{ m}^2/\text{animal}$ em baias individuais/casinhas e $\geq 4 \text{ m}^2/\text{animal}$ em coletivas. A cama (palha, feno ou maravalha) deve ter pelo menos 30 cm de profundidade.
- **O que registrar:**
 - *Tipo de berçário e alojamento* (individual, coletivo, suspenso, chão, etc.).
 - *Score de Sujidade da Cama:* Muito limpo (100%), Limpo (75%), Suja (50%) ou Muito suja (<50%).

- *Microclima*: Presença de aquecimento, cortinas/quebra-ventos (importante: >45cm para conter ventos), sombra (ex: tela de 80% de retenção) e ventiladores.

b) Higiene e Desinfecção de Utensílios

- **Como identificar o padrão**: Padrão ouro exige lavagem e enxágue morno (32°C), uso de detergente alcalino clorado (>60°C), desinfetante adequado e escovas. Utensílios não devem secar direto no chão. Deve haver limpeza ácida semanalmente.
- **O que registrar**: A frequência de lavagem das mamadeiras, sondas (e se desmonta bicos) e bebedouros. O produto utilizado (desinfetante, alcalino, ácido, neutro). Informe também se há POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado e treinamento da equipe atual.

3. DOMÍNIO DA NUTRIÇÃO

O sucesso do aleitamento começa nas primeiras 2 horas de vida.

a) Colostragem

- **Como identificar/mensurar**: Meça o colostro fresco com o Refratômetro Brix; a qualidade excelente é atingida com Brix $\geq 22\%$. A meta de volume é fornecer 10% do peso do bezerro na 1ª mamada (até 2h de vida) e mais 5% na 2ª mamada (até 12h de vida).
- **O que registrar**: Se foi ofertado em até 2h, via de fornecimento (mamadeira), volume da 1ª e 2ª mamada, % Brix do colostro, método de descongelamento (banho-maria com ou sem controle de temperatura) e oferta de leite de transição.

b) Aleitamento e Dieta Sólida

- **Como avaliar o padrão**: O desaleitamento deve ser gradual (pelo menos 10 dias) e nunca abrupto. Para bom desempenho, bezerras de grande porte devem consumir ≥ 7 L/dia no primeiro mês, e estar comendo pelo menos 1,2 kg a 1,5kg de concentrado (ração) ao desmame.

- **O que registrar:**

- *Dieta Líquida:* Tipo de leite, correção de sólidos, volume (ex: >7L, 6L, <4L) e frequência (1x a 3x ou à vontade) divididos por faixas etárias.
- *Dieta Sólida:* Dia de início (deve ser no 1º dia de vida), frequência de abastecimento, tipo de feno/silagem e consumo estimado de ração.
- *Água:* Dia do início do fornecimento (deve ser ofertada fresca desde o 1º dia) e tipo de bebedouro.

4. DOMÍNIO DE COMPORTAMENTO E ESTADOS MENTAIS

Garantir interações positivas e evitar sofrimento durante manejos pontuais.

a) Estímulo Tátil e Socialização

- **Como avaliar:** Os primeiros meses são vitais para a modulação de comportamento e interação positiva.
- **O que registrar:** Marque se ocorre estímulo tátil nas primeiras 6 horas de vida e se isso se mantém diariamente durante o aleitamento. Informe em que idade as bezerras são alocadas em pares/grupos e se possuem enriquecimento ambiental.

b) Manejos Dolorosos (Mochação e Remoção de Tetas)

- **Como avaliar o padrão:** A mochação deve ser feita idealmente entre 3 e 4 semanas de idade. O Padrão Ouro dita que o método recomendado é ferro quente (em brasa ou elétrico) ou remoção de tetas supranumerárias **exige, obrigatoriamente, supressão da dor através de anestesia e analgesia.**
- **O que registrar:** Idade da mochação, método utilizado e qual o protocolo de mitigação de dor adotado (ex: anestesia + analgesia + sedação; somente anestesia; não realiza) tanto para cornos quanto para tetas supranumerárias.

ATENÇÃO SUPERVISOR: EVIDÊNCIAS

Não se esqueça de que todas as etapas acima precisam gerar **evidências visuais**. Registre fotos e vídeos com o consentimento do produtor, documentando os utensílios limpos, alojamentos e instalações, o Refratômetro em uso e o aspecto dos animais. Essas imagens, aliadas aos dados inseridos rigorosamente na *Caderneta Digital Be.animal*, serão os pilares para construir e apresentar o **Caso de Sucesso** no final do desafio!