

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
 Escola de Pós-Graduação em Economia
 Teoria Macroeconômica III
 Professor: Ricardo de Oliveira Cavalcanti
 Monitora: Kátia Aiko Nishiyama Alves
 Alunos: Gustavo Bulhões e Samuel Barbosa

Exercício 02

Neste exercício temos o modelo clássico de crescimento econômico, cujo problema do planejador é escolher sequências de consumo $\{c_t\}_{t=0}^{\infty}$ e de capital $\{k_t\}_{t=0}^{\infty}$ que resolvem

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \\ \text{s.a.} \quad & c_t + k_{t+1} \leq f(k_t) + (1 - \delta)k_t \\ & k_{t+1} \geq 0, c_t \geq 0 \quad \forall t \geq 0 \\ & k_0 \text{ dado} \end{aligned} \tag{1}$$

$$\text{com } f(k) = k^\alpha \text{ e } u(c) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma}.$$

Item (i)

Observe que $u(c)$ é monótona crescente em c e, portanto satisfaz a propriedade de não saciedade local. Logo vale a Lei de Walras, e podemos reescrever a primeira restrição com igualdade, resolver para c_t e substituir na função objetivo. Desta forma o problema se torna

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(f(k_t) + (1 - \delta)k_t - k_{t+1}) \\ \text{s.a.} \quad & k_{t+1} \geq 0, c_t \geq 0 \quad \forall t \geq 0 \\ & k_0 \text{ dado} \end{aligned} \tag{2}$$

Item (ii)

Reescrevemos o problema sequencial na forma recursiva, transformando-o na equação funcional

$$\begin{aligned} V(k) = \max_{k'} \quad & u(c) + \beta V(k') \\ \text{s.a.} \quad & c + k' = f(k) + (1 - \delta)k \\ & k' \geq 0, c \geq 0 \quad \forall k \geq 0 \end{aligned} \tag{3}$$

Item (iii)

O operador de Bellman associado à equação funcional obtida no item anterior é justamente

$$\begin{aligned} T(V)(k) = \max_{k'} \quad & u(c) + \beta V(k') \\ \text{s.a.} \quad & c + k' = f(k) + (1 - \delta)k \\ & k' \geq 0, c \geq 0 \quad \forall t \geq 0 \end{aligned} \tag{4}$$

Item (iv)

Vamos criar um grid para a variável de estado k no intervalo $[0, 1.25k_{ss}]$, em que k_{ss} é o nível de capital de estado estacionário.

Resolvendo o lado direito da equação funcional (3), já substituindo as funções dadas $u()$ e $f()$, obtemos a equação de Euler

$$c^{-\gamma} = \beta c'^{-\gamma} [\alpha k'^{\alpha-1} + 1 - \delta].$$

No estado estacionário temos que $c' = c$ e $k' = k$. Substituindo na equação anterior obtemos

$$k_{ss} = \left(\frac{1 + \beta(\delta - 1)}{\alpha\beta} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$