

## MENGAKHIRI DIALYSIS PASIEN

No. Dokumen  
DIR.01.07.01.015

No. Revisi  
00

Halaman  
1 / 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
17 November 2022

Ditetapkan  
Direktur



dr. Indra Maryunif, MARS

#### Pengertian

- Tindakan mengakhiri proses hemodialisa.

#### Tujuan

- Untuk menghentikan/menyelesaikan proses dialysis.

#### Kebijakan

- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-038/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisa

#### Prosedur

1. Persiapan Alat :
  - a. Bengkok.
  - b. Kassa steril.
  - c. Povidon iodine.
  - d. Sarung tangan *disposable*.
  - e. Perban gulung.
  - f. Plester
  - g. Gunting.
  - h. Nebacetin powder antibiotik.
  - i. Hansaplast.
  - j. Termometer.
  - k. *Micropore*.
  - l. Perawat memakai kaca mata, apron, masker.
2. Prosedur:
  - a. Sebelum 5 menit selesai, perawat mengobservasi tanda-tanda vital pasien (suhu, nadi, TD, pernafasan).
  - b. Perawat mengecilkan kecepatan aliran darah (pompa darah) sampai 100 rpm.
  - c. Perawat mencuci tangan.
  - d. Perawat memakai apron, masker, kaca mata, sarung tangan *disposable*.
  - e. Mesin menunjukkan *UFG reached* = UFG sudah tercapai (angka UF volume = angka UFG).
  - f. Jika proses HD sudah selesai, posisi mesin akan terbaca

## MENGAKHIRI DIALYSIS PASIEN

No. Dokumen  
DIR.01.07.01.015

No. Revisi  
00

Halaman  
2 / 2

"Reinfusion" tekan *confirm* (pompa darah mati secara otomatis).

- g. Perawat menekan tombol *dialysis start*.
- h. Untuk mengakhiri *dialysis*, perawat mematikan pompa darah (*blood pump*).
- i. Perawat meng-klem fistula arteri dan selang darah arteri.
- j. Perawat mencabut *fistula inlet* (arteri), menekan bekas tusukan dengan kassa povidon iodine.
- k. Perawat membilas fistula, selang darah dan *dialyzer* dengan normal saline 0,9 % sampai bersih dan menggunakan Qb 100 Rpm. Jika *bubble trap outlet* sudah bersih, mesin akan tertulis "*Dialysis END*" dan *empty bi-Bag* lalu tekan tombol *confirm*.
- l. Perawat mencabut *fistula outlet* (venous), menekan bekas tusukan dengan kassa povidon iodine.
- m. Jika tidak ada darah pada bekas tusukan, maka perawat memberi *nebacetin powder* dan menutup dengan *band aid*/plester.
- n. Perawat memberi perban gulung pada luka tusukan dan memfiksasi jika diperlukan.
- o. Perawat mengobservasi tanda-tanda vital pasien (suhu, TD, nadi, pernafasan) dan menimbang berat badan pasien.
- p. Perawat mengembalikan alat-alat ke tempat semula, perawat mencuci tangan.

Unit Terkait

- Unit Hemodialisa