
	CARA PEMBERIAN EPO IV DENGAN PRE FILLED		
	No. Dokumen 2.01.01.3.01.034	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Cara pemberian epo IV dengan <i>pre filled</i> adalah suatu tata cara pemberian obat epo kepada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis melalui port-vena AVBL pada akhir dialisis.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai cara pemberian epo IV dengan <i>pre filled</i>.</li><li>– Pasien mendapat pelayanan yang baik, cepat dan tepat sesuai dengan prosedur.</li><li>– Pasien merasa aman, nyaman terhindar dari cidera/komplikasi.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-038/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisa		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat mengeluarkan obat epo dari kulkas 15-30 menit sebelum diberikan, agar epo mencapai suhu kamar secara perlahan.</li><li>2. Perawat membawa obat ke tempat pasien, pasien diinformasikan, desinfeksi port-vena AVBL dengan kapas alkohol.</li><li>3. Perawat memberikan obat atau memberikan informasi obat akan disuntikan.</li><li>4. Perawat meletakkan dua jari pada kedua sisi port-vena karet untuk mencegah tertusuknya jarum secara tidak sengaja.</li><li>5. Perawat mengarahkan jarum epo pada tengah-tengah port vena untuk membantu penetrasi, dengan memperhatikan bahwa jarum tegak lurus.</li><li>6. Perawat menyuntikan epo sampai habis dari <i>syringe</i>, sementara <i>syringe</i> tetap ditekan kuat saat mencabut <i>syringe</i> untuk mencegah terhisapnya kembali epo dan darah ke dalam <i>syringe</i>.</li><li>7. Perawat merapikan peralatan dan menginformasikan pasien bahwa obat sudah dimasukkan.</li><li>8. Hal-hal yang harus diperhatikan tekanan darah :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Systole &lt; 180 mmHg</li><li>b. Diastole &lt; 100mmHg</li></ol></li></ol>		
Unit Terkait	–		

TERKENDAL

TERKENDALI