



<div>RUMAH SAKIT HAMORI</div>	TERAPI BESI PADA PASIEN HEMODIALISA		
	No. Dokumen 2.01.01.3.01.032	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Terapi besi pada pasien hemodialisa adalah salah satu tatalaksana anemia yang diberikan pada pasien penyakit ginjal kronis.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan untuk tatalaksana terapi besi pada pasein Hemodialisa.– Mengurangi kebutuhan transfusi darah– Menghilangkan gejala yang ditimbulkan akibat anémia– Mencegah komplikasi kardiovaskuler– Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat anemia– Meningkatkan kualitas hidup		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-038/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisa		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat Dialisis melakukan pengecekan laboratorium <i>serum iron</i>, <i>TIBC</i>, serum feritin dan saturasi transferin pada pasien.2. Jika saturasi >50% maka tunda terapi besi3. Jika saturasi pasien 20-50% :<ol style="list-style-type: none">a. serum feritin >500ng/ml, tunda terapi besib. serum feritin <200ng/ml, berikan <i>iron sucrose/iron dextran</i> 100mg/2 mingguc. serum feritin 200-300ng/ml, berikan <i>iron sucrose/iron dextran</i> 100mg/4 minggud. serum feritin 301-500ng/ml, berikan <i>iron sucrose/iron dextran</i> 100mg/6 minggue. evaluasi serum feritin dan saturasi transferin setelah 3 bulan4. Jika saturasi transferin <20 % :<ol style="list-style-type: none">a. serum feritin <200ng/ml, maka berikan <i>iron sucrose/iron dextran</i> 100mg 2x/minggu selama 10x pemberian. Evaluasi serum feritin dan saturasi transferin 1 minggu setelah pemberian terakhir.		

TERKENDALI

TERAPI BESI PADA PASIEN HEMODIALISA

No. Dokumen
2.01.01.3.01.032

No. Revisi
01

Halaman
2 / 2

- b. serum feritin 200-300ng/ml, maka berikan *iron sucrose/iron dextran* 100mg /minggu.
- c. serum feritin 301-500ng/ml, maka berikan *iron sucrose/iron dextran* 100mg/2 minggu.
- d. serum feritin 501-800 ng/ml, maka berikan tunda terapi besi dan lanjutkan terapi ESA, observasi 1 bulan. Bila Hb tidak naik, dapat diberikan *iron sucrose/iron dextran* 100mg 1x/4 minggu.
- e. Serum feritin >800 ng/ml, terapi besi ditunda. Cari penyebab lain keadaan inflamasi atau infeksi

Unit Terkait

-

TERKENDALI