JHAMORI	PENATALAKSANAAN TINDAKAN PENCABUTAN GIGI SULUNG		
	No. Dokumen DIR.01.02.01.011	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur dr. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penatalaksanaan tindakan pencabutan gigi sulung adalah pencabutan gigi sulung yang sudah tereksfoliasi atau goyang fisiologis derajat 2 atau lebih, persistensi dan sisa akar		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penatalaksanaan tindakan pencabutan gigi sulung		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 034/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Jalan		
Prosedur	1. Terapis gigi mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut : a. Alat 1) Diagnostic set 2) Nier bekken 3) Tang cabut gigi anak 4) Bein 5) Spuit 3cc 6) Citoject b. Bahan 1) Cotton roll, cotton pellet, tampon 2) APD (masker, sarung tangan, haircup, apron) 3) Povidone iodine 4) Chloretyl spray 5) Pehacaine 6) Gel anastesi 2. Langkah-langkah tindakan sebagai berikut : a. Dokter gigi dan terapis gigi mencuci tangan sebelum tindakan dan menggunakan APD. b. Terapis gigi melakukan anamnesa pasien di nurse station. Kemudian		



PENATALAKSANAAN TINDAKAN PENCABUTAN GIGI SULUNG

No. Dokumen DIR.01.02.01.011 No. Revisi 00 Halaman 2/2

pasien diarahkan untuk masuk ke poli gigi sesuai dengan nomor antrian.

- c. Terapis gigi memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian.
- d. Terapis gigi mempersilahkan pasien untuk duduk di kursi dental unit.
- e. Terapis gigi memasangkan polibib kepada pasien.
- f. Terapis gigi mempersilahkan pasien untuk berkumur terlebih dahulu.
- g. Dokter gigi memeriksa kondisi gigi pasien. Pada gigi sulung yang telah mengalami mobility derajat >2, anastesi menggunakan chloretyl dengan cara disemprotkan ke kapas yang ditempelkan ke gusi dari gigi yang akan dicabut.
- h. Dokter gigi meminta persetujuan tindakan medis melalui *informed* consent.
- i. Dokter gigi mengatur posisi pasien.
- Dokter gigi melakukan anastesi pada daerah gigi yang akan dicabut dan tunggu hingga pasien terasa kebas.
- k. Dokter gigi membuka *socket gingiva* menggunakan bein (jika diperlukan).
- Dokter gigi melakukan pencabutan gigi dengan menggunakan tang dan memberikan tampon yang sudah diberikan povidone iodine.
- m. Dokter gigi memberikan instruksi pasca pencabutan kepada pasien atau keluarga untuk menggigit tampon selama 30 menit.
- n. Dokter gigi memberikan resep jika diperlukan.
- o. Dokter gigi dan terapis gigi mencuci tangan setelah tindakan.
- p. Dokter gigi mendokumentasikan tindakan pada rekam medis pasien.
- q. Terapis gigi merapihkan kembali alat dan bahan yang sudah digunakan

Unit Terkait

-