

# PS Algorithmen für verteilte Systeme

EINGEREICHT VON

BAUMGARTNER DOMINIK, DAFIR SAMY

GRUPPE 1(16:00)

**Aufgabe 9:**

Betrachte ein beliebiges Entscheidungsproblem  $P$  (d.h. es gibt nur Ausgaben der Form YES oder NO). Angenommen, wir haben einen randomisierten Algorithmus  $A$  für  $P$  mit der folgenden Eigenschaft:

- Für alle Eingaben  $x \in P$  gilt  $\Pr[A(x) = NO] \leq \frac{1}{3}$  und
- für alle Eingaben  $x \notin P$  gilt  $\Pr[A(x) = YES] \leq \frac{1}{3}$ .

Zeigen Sie, dass man durch Mehrfachausführung von  $A$  die Fehlerwahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{3}$  auf  $\frac{1}{3^n}$  drücken kann.

Wir wissen, nach einmaligem ausführen ist die Fehlerwahrscheinlichkeit gleich  $\frac{1}{3}$  ( $x$  in  $P$  und NO,  $x$  nicht in  $P$  und YES). Wenn dieser Algorithmus mehrfach hintereinander ausgeführt wird, dann hat man für die erste Ausführung eine Fehlerwahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{3}$ , beim 2. Mal ausführen ebenfalls eine Fehlerwahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{3}$ , und so weiter. Aufgrund der Unabhängigkeit der Ausführungen können die Fehlerwahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert werden (ähnlich zum mehrmaligen werfen eines Würfels). Somit ergibt sich nach  $n$ -maligem ausführen des Algorithmus eine Fehlerwahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{3^n}$ .

**Aufgabe 10:**

Ein Kasino testet einen neuen Typen von Spielautomaten. Für jedes Spiel muss der Spieler eine 1e-Münze einwerfen. Der Automat soll laut Herstellerangaben mit Wahrscheinlichkeit  $\frac{4}{13}$  Münzen im Wert von 3 Euro ausspucken. Die Spiele seien unabhängig voneinander. Das Kasino stellte überrascht fest, dass die Maschinen während den ersten  $n = 10^5$  Spielen insgesamt  $v = 10.000$  Euro verloren hatten. Leiten Sie eine Chernoff-Schranke für dieses Ereignis her.

10)

- Schranke über Anzahl Gewinner ermittelt

X: gewinnen/verlieren

$$P[X=1] = \frac{4}{13} \quad P[X=0] = \frac{9}{13}$$

$$E(X) = 1 \cdot \frac{4}{13} + 0 \cdot \frac{9}{13} = \frac{4}{13}$$

- Gewinnwahrscheinlichkeit für gegebenes Beispiel:

$$\# \text{ Gewinner } 10000 = 2 \cdot a - (100000 - a) \cdot 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{110000}{3} \approx 36667$$

- Erwartete # Gewinner

$$\Rightarrow \text{Gewinnwahrscheinlichkeit} \cdot \frac{36667}{100000} = 0,36667$$

$$E(Y) = n \cdot E(X) \quad (\text{hier } 100000 \cdot \frac{4}{13} = 30769)$$

- Chernoff Schranke für Anzahl Gewinner:

$$P[Y \geq 0,36667 n] \leq \left( \frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}} \right)^{\mu} \leq e^{-\frac{\delta^2 \mu}{3}} = e^{-\frac{\delta^2 E(X) \cdot n}{3}}$$

$$(1+\delta) \cdot \mu = 0,36667 n$$

$$(1+\delta) \cdot 0,30769 n = 0,36667 n$$

$$\delta = \frac{0,36667}{0,30769} - 1 = 0,19$$

- Schranke Abhängig von Anzahl Spiele

$$P[Y \geq 0,36667 n] \leq e^{-\frac{0,19^2 \cdot \frac{4}{13} \cdot n}{3}} \\ \leq e^{-3,7 \cdot 10^{-3} \cdot n}$$

- Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl d. Gewinner so von den Erwarteten abweicht, dass ein Verlust wie im Bsp entsteht sinkt mit steigender # Spiele.

z.B. 1 Spiel: obere Schranke: 99,6%

10000 Spiele: obere Schranke:  $\rightarrow 0$

Es ist also unmöglich, dass die vom Hersteller angegebene Gewinnwahrscheinlichkeit stimmt.