b) $F(w,x,y,z) = y'z + wxy' + wxz' + w'x'z$

$= y'z\cdot 1 + wxy'\cdot 1 + wxz'\cdot 1 + w'x'z\cdot 1$ (Postulate 2(b))

$= y'z\cdot(x+x') + wxy'\cdot(z+z') + wxz'\cdot(y+y') + w'x'z\cdot(y+y')$ (Postulate 5(a))

$= y'z\cdot x + y'z\cdot x' + wxy'\cdot z + wxy'\cdot z' + wxz'\cdot y + wxz'\cdot y' + w'x'z\cdot y + w'x'z\cdot y'$ (Postulate 4(a))

$= x\cdot y'z + x'\cdot y'z + wxy'z + wxy'z' + wxz'\cdot y + wxz'\cdot y' + w'x'z\cdot y + w'x'z\cdot y'$ (Postulate 3(b))

$= (xy')\cdot z + (x'y')z + wxy'z + wxy'z' + wx\cdot(z'y) + wx\cdot(z'y') + w'x'\cdot(zy) + w'x'\cdot(zy')$ (Theorem 4(b))

$= (xy')\cdot z + (x'y')\cdot z + wxy'z + wxy'z' + wx\cdot(yz') + wx\cdot(y'z') + w'x'(yz) + w'x'\cdot(y'z)$ (Theorem 4(b))

$= xy'\cdot z + x'y'z + wxy'z + wxy'z' + wxyz' + wxy'z' + w'x'yz + w'x'y'z$ (Theorem 4(b))

$= xy'z\cdot 1 + x'y'z\cdot 1 + wxy'z + wxy'z' + wxyz' + wxy'z' + w'x'yz + w'x'y'z$ (Postulate 2(b))

$= xy'z\cdot(w+w') + x'y'z\cdot(w+w') + wxy'z + wxy'z' + wxyz' + wxy'z' + w'x'yz + w'x'y'z$ (Postulate 5(a))

$= xy'z\cdot w + xy'z\cdot w' + x'y'z\cdot w + x'y'z\cdot w' + wxy'z + wxy'z' + wxyz' + wxy'z' + w'x'yz + w'x'y'z$ (Postulate 4(a))

$= w\cdot xy'z + w'\cdot xy'z + w\cdot x'y'z + w'\cdot x'y'z + wxy'z + wxy'z' + wxyz' + wxy'z' + w'x'yz + w'x'y'z$ (Postulate 3(b))

Removing the common minterms and placing them in order, we get:

$w'x'y'z + w'x'yz + w'xy'z + wx'y'z + wxy'z' + wxy'z + wxyz'$

$\Sigma(1,3,5,9,12,13,14)$ Product of maxterms: $\Pi(0,2,4,6,8,10,11,15)$

c) $F(A,B,C,D) = (A+B'+C)(A+B')(A+C'+D)(A'+B+C+D')(B+C'+D')$

$= ((A+B'+C)+0)((A+B')+0)((A+C'+D)+0)(A'+B+C+D')((B+C'+D')+0)$ (Postulate 2(a))

$= ((A+B'+C)+D\cdot D')((A+B')+C\cdot C')((A+C'+D)+BB')(A'+B+C+D')((B+C'+D')+A\cdot A')$ (Postulate 5(b))