

A non sequitur: dyadic expansions

A non sequitur: dyadic expansions

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1}$$

A non sequitur: dyadic expansions

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

A non sequitur: dyadic expansions

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

$$\frac{9}{16} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$$

A non sequitur: dyadic expansions

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

$$\frac{9}{16} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$$

$$2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-6} + \cdots = \frac{2^{-2}}{1 - 2^{-2}}$$

A non sequitur: dyadic expansions

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

$$\frac{9}{16} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$$

$$2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-6} + \dots = \frac{2^{-2}}{1 - 2^{-2}}$$

$$\frac{1}{3} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + \dots$$

A non sequitur: dyadic expansions

Number representations in base 2

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

$$\frac{9}{16} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$$

$$2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-6} + \dots = \frac{2^{-2}}{1 - 2^{-2}}$$

$$\frac{1}{3} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + \dots$$

A non sequitur: dyadic expansions

Number representations in base 2

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1} = .1\dot{0}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = .01\dot{0}$$

$$\frac{9}{16} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = .1001\dot{0}$$

$$2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-6} + \dots = \frac{2^{-2}}{1 - 2^{-2}}$$

$$\frac{1}{3} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + \dots = .01010101 \dots$$

A non sequitur: dyadic expansions

Number representations in base 2

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1} = .1\dot{0}$$

$$\frac{1}{4} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = .01\dot{0}$$

$$\frac{9}{16} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = .1001\dot{0}$$

$$2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-6} + \dots = \frac{2^{-2}}{1 - 2^{-2}}$$

$$\frac{1}{3} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + \dots = .01010101\dots$$

$$x = x_1 \cdot 2^{-1} + x_2 \cdot 2^{-2} + x_3 \cdot 2^{-3} + \dots = .x_1x_2x_3\dots \quad (0 \leq x \leq 1; x_n \in \{0, 1\}, n \geq 1)$$

$$x = x_1 \cdot 2^{-1} + x_2 \cdot 2^{-2} + x_3 \cdot 2^{-3} + \cdots = .x_1x_2x_3 \cdots \quad (0 \leq x \leq 1; x_n \in \{0, 1\}, n \geq 1)$$

$$x = x_1 \cdot 2^{-1} + x_2 \cdot 2^{-2} + x_3 \cdot 2^{-3} + \cdots = .x_1x_2x_3\cdots \quad (0 \leq x \leq 1; x_n \in \{0, 1\}, n \geq 1)$$

Every real number x in the unit interval has a dyadic expansion $.x_1x_2x_3\dots$, and conversely.