

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

$$\frac{d}{dx} x^r (1 - x)^{1-r} = rx^{r-1} \cdot (1 - x)^{1-r} + x^r \cdot (1 - r)(1 - x)^{1-r-1}(-1)$$

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^r (1 - x)^{1-r} &= rx^{r-1} \cdot (1 - x)^{1-r} + x^r \cdot (1 - r)(1 - x)^{1-r-1}(-1) \\ &= x^{r-1} (1 - x)^{1-r-1} [r(1 - x) - (1 - r)x] \end{aligned}$$

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

$$\frac{d}{dx} x^r (1 - x)^{1-r} = rx^{r-1} \cdot (1 - x)^{1-r} + x^r \cdot (1 - r)(1 - x)^{1-r-1}(-1)$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{1-r-1} [r(1 - x) - (1 - r)x]$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{-r} [r - rx - x + rx]$$

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

$$\frac{d}{dx} x^r (1 - x)^{1-r} = rx^{r-1} \cdot (1 - x)^{1-r} + x^r \cdot (1 - r)(1 - x)^{1-r-1}(-1)$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{1-r-1} [r(1 - x) - (1 - r)x]$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{-r} [r - rx - x + rx]$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{-r} [r - x]$$

A little calculus

$$f(x) = x^r (1 - x)^{1-r}$$

$$\text{Power rule : } \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1} \quad (\text{constant } a)$$

$$\text{Chain rule : } \frac{d}{dx} g(x)h(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$$

$$\frac{d}{dx} x^r (1 - x)^{1-r} = rx^{r-1} \cdot (1 - x)^{1-r} + x^r \cdot (1 - r)(1 - x)^{1-r-1}(-1)$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{1-r-1} [r(1 - x) - (1 - r)x]$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{-r} [r - rx - x + rx]$$

$$= x^{r-1} (1 - x)^{-r} [r - x]$$

$f'(x) = 0$ if, and only if, $x = r$. Conclude that $f(x)$ achieves its maximum at $x = r$.