

# Método de Gauss

## ¿Qué es la Cuadratura de Gauss?

Es un método numérico avanzado para aproximar integrales definidas de la forma:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx$$

Se basa en evaluar la función en puntos especiales (nodos) dentro del intervalo, pesados con coeficientes  $w_i$ , que maximizan la precisión para polinomios.



## Fórmula general (Gauss-Legendre)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i \cdot f(x_i)$$

Donde:

- $x_i$ : nodos (raíces del polinomio de Legendre de grado  $n$ )
- $w_i$ : pesos (coeficientes optimizados)
- $n$ : número de nodos = grado de la cuadratura

## □ **Ventajas del método**

- Mucha precisión con pocos puntos
- Integra exactamente todos los polinomios hasta grado  $2n - 1$
- No requiere puntos equiespaciados

## ¿Qué es un polinomio de Legendre?

Los polinomios de Legendre  $P_n(x)$  son una familia de funciones ortogonales sobre  $[-1, 1]$ , definidos por la relación de recurrencia:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x$$

$$(n + 1)P_{n+1}(x) = (2n + 1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

También puedes obtenerlos con:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

□ Ejemplos concretos:

Grado $n$	Polinomio $P_n(x)$	Raíces (nodos $x_i$ )
0	$P_0(x) = 1$	—
1	$P_1(x) = x$	0
2	$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$
3	$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$	$0, \pm \sqrt{3/5}$
4	$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$	4 raíces dentro de $[-1, 1]$

□ ¿Qué se hace con ellos?

1. Se calcula o consulta  $P_n(x)$
2. Se resuelven las raíces  $x_i$
3. Se usan esas raíces como los nodos  $x_i$  para la cuadratura de Gauss
4. Los pesos  $w_i$  se calculan usando:

$$w_i = \frac{2}{(1 - x_i^2)[P'_n(x_i)]^2}$$

## □ Transformación del intervalo

Si la integral no está en  $[-1, 1]$ , se transforma:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \cdot \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) dt$$

---



## Ejemplo:

Si quieres integrar en  $[1, 2]$ :

- El cambio es:


$$x = \frac{1}{2}t + \frac{3}{2}$$

- Y:

$$dx = \frac{1}{2}dt$$

Entonces la integral se reescribe:

$$\int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t + \frac{3}{2}\right) dt$$



## Modelos (valores estándar)

◆ Gauss-Legendre con 2 puntos ( $n = 2$ ):

Nodo  $x_i$

Peso  $w_i$

---

$$\pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0.57735$$

1

◆ Gauss-Legendre con 3 puntos ( $n = 3$ ):

Nodo $x_i$	Peso $w_i$
$-\sqrt{3/5} \approx -0.7746$	$\frac{5}{9} \approx 0.5556$
0	$\frac{8}{9} \approx 0.8889$
$+\sqrt{3/5} \approx +0.7746$	$\frac{5}{9} \approx 0.5556$

## ¿Cómo se obtienen los nodos y pesos?

### ◆ 1. Nodos: raíces del **polinomio de Legendre** $P_n(x)$

Cada grado  $n$  tiene un polinomio  $P_n(x)$ , definido por:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

Los nodos  $x_i$  son las raíces reales de  $P_n(x)$  en el intervalo  $[-1, 1]$ .

Ejemplo:

- Para  $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ , resolvemos:

$$3x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0.5774$$

## ◆ 2. Pesos $w_i$ : se derivan de fórmulas especiales

Una fórmula general para los pesos es:

$$w_i = \frac{2}{(1 - x_i^2)[P'_n(x_i)]^2}$$

Donde:

- $x_i$  es el nodo (raíz)
- $P'_n(x)$  es la derivada del polinomio de Legendre

□ Pero en la práctica, estos valores están tabulados, porque:

- Resolver a mano estas derivadas es muy pesado
- Para  $n \leq 6$ , se pueden encontrar en tablas estándar

## Resumen

Paso	Explicación
1. Nodos $x_i$	Se obtienen resolviendo $P_n(x) = 0$
2. Pesos $w_i$	Se calculan con fórmulas derivadas, o se consultan en tablas
3. Intervalo $[-1, 1]$	Siempre se trabaja en el intervalo estándar
4. Si es otro intervalo	Se hace cambio de variable: $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$



## ¿Cuándo usarlo?

- Cuando se necesita alta precisión
- Cuando  $f(x)$  es suave (derivable)
- Mejor que Simpson o Trapecio si tienes pocos puntos



# Ejemplo 1

## ◆ Ejemplo:

Resolvamos:

$$\int_{-1}^1 (3x^2 + 2x + 1) dx$$

Esta es una función polinómica de grado 2, así que con Gauss-Legendre de 2 puntos ( $n = 2$ ) se obtendrá el valor exacto.



## Paso 1: Nodos y pesos para $n = 2$

Nodo $x_i$	Peso $w_i$
$-\frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0.5774$	1
$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx +0.5774$	1

📌 Paso 2: Evaluar la función  $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$

En  $x_1 = -0.5774$ :

$$f(-0.5774) = 3(-0.5774)^2 + 2(-0.5774) + 1 = 3(0.3333) - 1.1548 + 1 \approx 1 - 1.1548 + 1 = 1.8451$$

En  $x_2 = +0.5774$ :

$$f(0.5774) = 3(0.5774)^2 + 2(0.5774) + 1 = 1 + 1.1548 + 1 = 3.1548$$

### Paso 3: Aplicar cuadratura de Gauss

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^2 w_i \cdot f(x_i) = 1 \cdot 1.8451 + 1 \cdot 3.1548 = \boxed{5.000}$$

# Valor exacto



**Resultado exacto por cálculo simbólico:**

$$\int_{-1}^1 (3x^2 + 2x + 1) dx = [x^3 + x^2 + x]_{-1}^1$$

$$= (1 + 1 + 1) - ((-1)^3 + 1 + (-1)) = 3 - (-1 + 1 - 1) = 3 - (-1) = \boxed{5}$$

## Ejemplo 2

### ◆ Ejemplo ampliado:

$$\int_2^5 (3x^2 + 2x + 1) dx$$

Usaremos cuadratura de Gauss-Legendre de 2 puntos, que requiere:

1. Transformar el intervalo  $[2, 5]$  a  $[-1, 1]$
2. Aplicar los nodos y pesos estándar
3. Evaluar la función transformada
4. Multiplicar por el factor de cambio

## Paso 1: Cambio de variable

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} = \frac{5-2}{2}t + \frac{5+2}{2} = \frac{3}{2}t + \frac{7}{2}$$

$$dx = \frac{3}{2}dt$$

Entonces:

$$\int_2^5 f(x) dx = \frac{3}{2} \cdot \int_{-1}^1 f\left(\frac{3}{2}t + \frac{7}{2}\right) dt$$



## Paso 2: Usar nodos y pesos para $n = 2$

$t_i$	$x_i = \frac{3}{2}t + \frac{7}{2}$	Peso $w_i$
$-0.5774$	$\frac{3}{2}(-0.5774) + \frac{7}{2} \approx 2.6349$	1
$+0.5774$	$\frac{3}{2}(0.5774) + \frac{7}{2} \approx 4.3651$	1

□ Paso 3: Evaluar  $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$

En  $x = 2.6349$ :

$$f(2.6349) = 3(6.9416) + 5.2698 + 1 \approx 20.8248 + 5.2698 + 1 = 27.0946$$

En  $x = 4.3651$ :

$$f(4.3651) = 3(19.060) + 8.7302 + 1 \approx 57.18 + 8.7302 + 1 = 66.9102$$

✓ Paso 4: Aplicar cuadratura de Gauss

$$\begin{aligned}\int_2^5 f(x) dx &\approx \frac{3}{2} \cdot (f(x_1) + f(x_2)) = \frac{3}{2} \cdot (27.0946 + 66.9102) \\ &= \frac{3}{2} \cdot 94.0048 \approx \boxed{141.007}\end{aligned}$$

✓ Resultado exacto por cálculo simbólico:

$$\int_2^5 (3x^2 + 2x + 1) dx = [x^3 + x^2 + x]_2^5 = (125 + 25 + 5) - (8 + 4 + 2) = 155 - 14 = \boxed{141}$$

◆ **Ejercicio:**

$$\int_0^{\pi} \sin(x) \, dx$$

Sabemos que la solución exacta es 2, pero vamos a aproximarla con Gauss-Legendre usando  $n = 2$  puntos.

## Paso 1: Cambio de variable

Transformamos  $x \in [0, \pi]$  a  $t \in [-1, 1]$ :

$$x = \frac{\pi - 0}{2}t + \frac{\pi + 0}{2} = \frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}$$

$$dx = \frac{\pi}{2}dt$$

Entonces:

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{\pi}{2} \cdot \int_{-1}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right) dt$$

## □ Paso 2: Gauss-Legendre con $n = 2$

$t_i$	$w_i$
$-\frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0.5774$	1
$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx +0.5774$	1

### □ Paso 3: Evaluar la función transformada

Para  $t = -0.5774$ :

$$x = \frac{\pi}{2}(-0.5774) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}(1 - 0.5774) \approx \frac{\pi}{2}(0.4226) \approx 0.664$$

$$f(x) = \sin(0.664) \approx 0.6156$$

Para  $t = 0.5774$ :

$$x = \frac{\pi}{2}(1 + 0.5774) \approx \frac{\pi}{2}(1.5774) \approx 2.477$$

$$f(x) = \sin(2.477) \approx 0.6173$$



✓ Paso 4: Aplicar fórmula de Gauss

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx \approx \frac{\pi}{2} \cdot [1 \cdot 0.6156 + 1 \cdot 0.6173] = \frac{\pi}{2} \cdot 1.2329 \approx \boxed{1.935}$$



## Resultado:

- Aproximación por Gauss-Legendre (2 puntos): 1.935
- Valor exacto: 2
- Error absoluto:  $\approx 0.065$