

盆底康复评估报告

治疗前后对比

基本情况:

产妇背景: 何女士, 28岁, 主诉右侧肌张力增高, 并存在打喷嚏时压力性尿失禁倾向。

康复方案: 为其制定个性化康复方案, 依托家用生物反馈设备开展治疗, 每完成三次治疗后安排一次远程康复指导, 并根据恢复情况动态调整干预策略。初期以降低高张力、缓解盆底区域紧张与疼痛为主; 后续逐步实施肌肉松弛训练及凯格尔运动, 以增强肌力及盆底稳定性。治疗过程中注重心理支持, 鼓励患者建立信心、保持锻炼依从性, 并持续跟进训练质量与注意事项指导。


康复疗效: 经两个疗程的居家康复干预, 何女士基线高张状态得到显著改善, 肌力有效提升, 整体康复效果良好。

盆底功能 评估报告

姓名	■	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-08-26 18:05:45			总得分	69.31

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.08	2-4μV
	变异性	0.13	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.32	<0.5s
	最大值	66.8	35-45μV
	快速放松	0.52	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	40.07	30-40μV
	变异性	0.41	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	38.06	25-35μV
	变异性	0.3	<0.2
后静息阶段	平均值	2.2	2-4μV
	变异性	0.19	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名	■	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-10-14 23:31:27			总得分	65.75

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.15	2-4μV
	变异性	0.17	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.52	<0.5s
	最大值	71.4	35-45μV
	快速放松	0.33	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	39.61	30-40μV
	变异性	0.4	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	41.57	25-35μV
	变异性	0.27	<0.2
后静息阶段	平均值	2.08	2-4μV
	变异性	0.13	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

盆底功能 评估报告

姓名	■	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-10-24 23:08:19			总得分	74.31

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.25	2-4μV
	变异性	0.58	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.53	<0.5s
	最大值	60.2	35-45μV
	快速放松	0.26	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	37.45	30-40μV
	变异性	0.39	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	33.99	25-35μV
	变异性	0.27	<0.2
后静息阶段	平均值	2.06	2-4μV
	变异性	0.11	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:肌肉高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第二个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名	■	性别	女	年龄	28
评估时间	2024-11-22 22:21:37			总得分	81.26

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.07	2-4μV
	变异性	0.12	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.77	<0.5s
	最大值	36.2	35-45μV
	快速放松	0.44	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	28.06	30-40μV
	变异性	0.29	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	23.79	25-35μV
	变异性	0.29	<0.2
后静息阶段	平均值	2.04	2-4μV
	变异性	0.1	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第二个疗程末次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2024-09-05 17:30:36			总得分	34.84
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	4.1	2-4μV		
	变异性	0.14	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.26	<0.5s		
	最大值	21.4	35-45μV		
	快速放松	0.58	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	7.73	30-40μV		
	变异性	0.36	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	6.52	25-35μV		
	变异性	0.31	<0.2		
后静息阶段	平均值	2.7	2-4μV		
	变异性	0.17	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2024-10-16 14:33:35			总得分	63.09
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	3.38	2-4μV		
	变异性	1.98	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.46	<0.5s		
	最大值	25.6	35-45μV		
	快速放松	0.62	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	21.19	30-40μV		
	变异性	0.28	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	21.84	25-35μV		
	变异性	0.22	<0.2		
后静息阶段	平均值	5.03	2-4μV		
	变异性	0.21	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 许女士, 35岁, 改良牛津肌力分级: 2级, 弱收缩力, 肌肉张力增加但没有任何能感觉到的抬举和挤压感。

康复方案: 为其制定个性化康复方案, 采用家用生物反馈设备实施治疗, 每完成三次治疗即安排一次远程康复指导。方案涵盖盆底肌放松训练及快慢肌模块针对性锻炼, 强调规律训练的重要性。治疗过程中持续跟进执行情况, 并提供注意事项指导。

康复疗效: 经1个月居家康复干预, 许女士肌力显著增强, 整体康复进展良好。

基本情况:

产妇背景: 谢女士, 35岁, 改良牛津肌力分级: 2级, 弱收缩, 肌肉张力增加但没有任何能感觉到的抬举或挤压感。伴有咳嗽引发的压力性尿失禁, 无盆底疼痛主诉。


康复方案: 为其制定个体化康复方案, 依托居家生物反馈设备开展治疗, 每完成三次治疗后安排一次远程康复指导。初期重点实施肌肉松弛干预, 并配合凯格尔自主训练; 后期结合阶段性评估与患者反馈, 动态调整策略, 侧重于压力性尿失禁的改善及慢肌模块训练, 以增强慢肌肌力。全程注重提升患者康复信心与锻炼依从性, 密切跟进训练质量并提供专业指导, 以保障康复效率。

康复疗效: 经1个月居家康复, 患者自觉咳嗽漏尿症状显著减轻, 主观感受改善明显, 遂续租下一疗程。第二疗程结束后肌力提升显著, 复查结果显示恢复良好, 医嘱建议继续使用阴道哑铃进行家庭锻炼, 以维持肌力水平。

盆底功能 评估报告

姓名	谢女士	性别	女	年龄	35
评估时间	2024-10-25 10:33:54			总得分	35.23
阶段	指标	阶段测试值		参考值	
前静息阶段	平均值	3.27		2-4μV	
	变异性	0.3		<0.2	
快速收缩阶段	快速收缩	0.37		<0.5s	
	最大值	24.2		35-45μV	
	快速放松	0.96		<0.5s	
紧张收缩阶段	平均值	10.38		30-40μV	
	变异性	0.5		<0.2	
耐力收缩阶段	平均值	6.14		25-35μV	
	变异性	0.46		<0.2	
后静息阶段	平均值	2.87		2-4μV	
	变异性	0.13		<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:
1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2024-11-15 10:44:36			总得分	40.54
阶段	指标		阶段测试值	参考值	
前静息阶段	平均值		2.82	2-4μV	
	变异性		0.16	<0.2	
快速收缩阶段	快速收缩		0.38	<0.5s	
	最大值		24.2	35-45μV	
	快速放松		0.52	<0.5s	
紧张收缩阶段	平均值		10.77	30-40μV	
	变异性		0.59	<0.2	
耐力收缩阶段	平均值		8.97	25-35μV	
	变异性		0.34	<0.2	
后静息阶段	平均值		2.88	2-4μV	
	变异性		0.13	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:
1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估、第二个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2024-12-10 15:30:29			总得分	76.91
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段		平均值	2.72	2-4μV	
		变异性	0.17	<0.2	
快速收缩阶段		快速收缩	0.31	<0.5s	
		最大值	34.8	35-45μV	
		快速放松	0.48	<0.5s	
紧张收缩阶段		平均值	24.22	30-40μV	
		变异性	0.54	<0.2	
耐力收缩阶段		平均值	26.48	25-35μV	
		变异性	0.31	<0.2	
后静息阶段		平均值	2.58	2-4μV	
		变异性	0.19	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:轻中度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第二个疗程末次评估

患者院内面诊及检查情况:


3次康复后反馈：感觉日常肌底是没有放松的；大便摩擦到，有一点不多，主要肛周会痛多一点。

医助首次训练前提醒用户进行凯格尔和臀桥，后续已停掉。

既往史：2024-9在我院产科顺产（引产，胎儿异常），会阴裂伤，产后出血；如期出院。产后30+天恶露干净，无畏寒、发热、腹痛，无尿失禁，无大便失禁，偶有便秘。

过敏史：否认药物、食物过敏史


检查：一般情况好，BP mmHg，Wt 45Kg，Ht 155cm，BMI；双侧乳房无硬结、红肿，乳头正常；腹部妊娠纹明显；腹直肌分离：2+指；会阴伤口愈合好，阴道前后壁膨出；阴道可容2指，盆底肌松软。改良牛津肌力分级：3级（中等程度收缩——以阴道后壁的抬高和检查手指根部感觉到挤压感，并伴随会阴体向内收为特征）。



盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	32
评估时间	2024-11-18 14:45:59			总得分	45.82
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段		平均值	6.86	2-4μV	
		变异性	0.3	<0.2	
快速收缩阶段		快速收缩	0.32	<0.5s	
		最大值	77.8	35-45μV	
		快速放松	0.29	<0.5s	
紧张收缩阶段		平均值	65.23	30-40μV	
		变异性	0.28	<0.2	
耐力收缩阶段		平均值	31.03	25-35μV	
		变异性	0.48	<0.2	
后静息阶段		平均值	2.34	2-4μV	
		变异性	0.37	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	32
评估时间	2024-12-13 14:24:19			总得分	77.05
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.52	2-4μV		
	变异性	0.2	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.23	<0.5s		
	最大值	37.0	35-45μV		
	快速放松	0.54	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	28.13	30-40μV		
	变异性	0.42	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	21.48	25-35μV		
	变异性	0.35	<0.2		
后静息阶段	平均值	2.36	2-4μV		
	变异性	0.2	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 廖女士, 32岁, 存在腹直肌分离 (约2指以上), 会阴伤口愈合良好, 伴有阴道前后壁轻度膨出; 阴道可容纳2指, 盆底肌张力偏低。改良牛津肌力评级为3级, 表现为中等程度收缩, 以阴道后壁抬高、指根挤压感及会阴体内收为特征。近期曾出现排便时肛门疼痛伴出血, 经增加膳食纤维摄入及活动后缓解。无盆底疼痛或尿失禁症状。。

康复方案: 前期以缓解盆底肌高张为重点, 结合腹式呼吸训练; 后期根据阶段性评估及患者反馈, 动态调整康复策略, 针对盆腔器官脱垂进行干预。指导患者掌握训练要领, 并强调避免增加腹压、改善排便习惯等注意事项。

康复疗效: 经1个月居家康复, 廖女士盆底肌高张状态显著改善, 对康复效果满意, 治疗依从性良好。

基本情况:

产妇背景: 黄女士，30岁，二胎顺产，主诉阴道前后壁膨出，改良牛津肌力分级为3级（表现为中等强度收缩，伴阴道后壁抬高、指根挤压感及会阴体内收）。伴有性交痛及便秘症状。盆底B超检查见右图。

康复方案: 初期以缓解盆底疼痛为主要目标，经三次治疗后，结合评估结果及患者反馈，调整为重度肌肉松弛治疗方案。除设备辅助治疗外，指导其进行凯格尔运动作为自主训练，并明确设备使用与自主训练的注意事项。

康复疗效: 经1个月居家康复，黄女士报告盆底疼痛显著改善，快、慢肌肌力均得到有效提升。

子宫：上下径 47mm 前后径 41mm 左右径 50mm 宫颈 22*23mm 内膜 2.5mm 附件：左侧卵巢 24*14mm 右侧卵巢 22*12mm 子宫后位，大小正常，形态规则，轮廓清晰，子宫肌层回声均匀，子宫内膜不厚，回声均匀。双侧卵巢形态、大小正常，双附件区未见异常回声包块。
盆底三维超声检查：静息状态测量：残余尿 3ml，逼尿肌厚度3mm，尿道内口关闭，膀胱后角153°，尿道周围未见液性暗区及散在钙化点，CDFI：尿道周围见稀疏彩色血流信号，膀胱颈位于耻骨联合水平线上29mm。子宫及直肠壶腹部均位于耻骨联合水平线以上。Valsalva动作：膀胱颈移动度21mm，膀胱位于耻骨联合以上，膀胱后角157°，尿道内口关闭；子宫及直肠壶腹部均位于耻骨联合水平线以上。未见直肠膨出，肛提肌裂孔大小23.86cm²。盆底肌肉收缩状态：未见肛提肌断裂声像，肛门括约肌完整。


检查结论

子宫及双侧卵巢未见明显异常。盆底超声检查提示：前腔室：未见膀胱膨出声像。中腔室：未见子宫脱垂。后腔室：未见直肠膨出声像。未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。肛提肌裂孔轻度扩张。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2024-11-15 10:16:33			总得分	33.8
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	6.11	2-4μV		
	变异性	0.15	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.34	<0.5s		
	最大值	14.4	35-45μV		
	快速放松	0.58	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	11.62	30-40μV		
	变异性	0.21	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	10.73	25-35μV		
	变异性	0.19	<0.2		
后静息阶段	平均值	4.75	2-4μV		
	变异性	0.17	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2024-12-09 22:10:35			总得分	51.99
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	7.52	2-4μV		
	变异性	0.16	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.62	<0.5s		
	最大值	36.6	35-45μV		
	快速放松	0.5	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	21.89	30-40μV		
	变异性	0.31	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	14.48	25-35μV		
	变异性	0.58	<0.2		
后静息阶段	平均值	5.05	2-4μV		
	变异性	0.16	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 郑女士, 36岁, 第3胎剖宫产术后。改良牛津肌力分级2级(弱收缩), 伴阴道前后壁膨出, 阴道可容2指, 盆底肌轻度高张力。主诉咳嗽或打喷嚏时出现漏尿。

盆底超声提示轻度膀胱膨出, 子宫脱垂(位于耻骨联合水平线下2mm)。



医院

彩色多普勒超声诊断报告单

姓名: 郑女士 性别: 女 年龄: 36岁 床号:
门诊号: 住院号: 机器类型: 申请科室: 产科门诊
检查科室: 超声一科 检查部位: BC-三维盆底检查-盆底三维+子宫+经阴道彩色多普勒超声检查

检查所见:

子宫: 上下径 63mm 前后径 55mm 左右径 68mm 宫颈 36*29mm 内膜 8.5mm
附件: 右侧卵巢 36*22mm
子宫后位, 体积增大, 形态规则, 轮廓清晰, 子宫肌层回声均匀, 前壁下段见一低回声区, 大小约15*17*21mm, 边界清, 未见明显血流信号。子宫内膜不厚, 回声稍欠均匀。左侧卵巢显示不清, 右侧卵巢形态、大小正常, 双附件区未见异常回声包块。

盆底三维超声检查:
静息状态测量: 残余尿小于50ml, 逼尿肌厚度3mm, 尿道内口关闭, 膀胱后角完整, 尿道周围未见液性暗区及散在钙化点, CDFI: 尿道周围见稀疏彩色血流信号, 膀胱颈位于耻骨联合水平线上20mm。
子宫位于耻骨联合水平线以上, 直肠壶腹部位于耻骨联合水平线以上。
Valsalva动作: 膀胱颈移动度20mm, 膀胱位于耻骨联合水平, 膀胱后角开放约141度, 尿道旋转约111度; 子宫位于耻骨联合水平线以下2mm, 直肠壶腹部位于参考线以下8mm, 肛提肌裂孔大小23.5cm²。
盆底肌肉收缩状态: 未见肛提肌断裂声像, 肛门括约肌完整。
会阴部皮下见两个无回声囊性结节, 大小约25*19*14mm(右)、17*13*10mm(左), 边界清, CDFI: 结节未见明显血流信号。

检查结论:

子宫前壁下段低回声区, 考虑剖宫产术后改变
双附件区未见异常回声包块
盆底超声检查提示:
前腔室: 膀胱颈移动度正常范围, 轻度膀胱膨出。
中腔室: 子宫见脱垂声像。
后腔室: 直肠未见膨出声像。
未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。
肛提肌裂孔扩张。
会阴部皮下无回声结节, 考虑囊肿。

审核医师:


2024年11月21日

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	37
评估时间	2024-11-21 15:42:10			总得分	45.43

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	5.16	2-4μV
	变异性	0.14	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.45	<0.5s
	最大值	25.2	35-45μV
	快速放松	0.67	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	14.68	30-40μV
	变异性	0.47	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	15.74	25-35μV
	变异性	0.4	<0.2
后静息阶段	平均值	4.28	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	37
评估时间	2024-12-29 22:49:58			总得分	80.06

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.18	2-4μV
	变异性	0.18	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.26	<0.5s
	最大值	37.0	35-45μV
	快速放松	0.36	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	29.12	30-40μV
	变异性	0.52	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	28.3	25-35μV
	变异性	0.42	<0.2
后静息阶段	平均值	2.65	2-4μV
	变异性	0.18	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每3次训练后安排1次远程指导。前期针对盆底肌高张力实施放松方案并配合腹式呼吸训练; 后期根据患者自觉收缩力不足的情况, 增加凯格尔训练模块以增强肌力与耐力维持能力。全程鼓励患者树立信心、保持规律锻炼, 并通过持续随访确保康复质量。

康复疗效: 经1个月居家干预, 郑女士漏尿症状显著改善, 肌力提升明显, 可自主完成收缩并保持稳定, 整体功能进步良好。

基本情况:

产妇背景: 林女士，33岁，第2胎顺产伴会阴撕裂。改良牛津肌力分级2级（弱收缩），伴阴道前后壁膨出，中下段松弛，肛提肌收缩力弱。主诉压力性尿失禁，无便秘，有痔疮及便血史。既往孕产期曾有耻骨联合区疼痛，目前已缓解。无盆底疼痛。

辅助检查: 盆底超声提示膀胱轻度膨出，子宫轻度脱垂。

检查所见

子宫及双侧卵巢未见明显异常。盆底超声检查提示：前腔室：膀胱颈移动度增大，膀胱轻度膨出声像。中腔室：子宫轻度脱垂声像。后腔室：直肠未见膨出声像。未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。肛提肌裂孔轻度扩张。


检查结论

腔内（经阴道）彩超：子宫：上下径 45mm 前后径 46mm 左右径 53mm 宫颈 20*29mm 内膜 3.7mm 附件：左侧卵巢 30*16mm 右侧卵巢 37*16mm 子宫后位，大小正常，形态规则，轮廓清晰，子宫肌层回声均匀，子宫内膜不厚，光滑，回声均匀。双侧卵巢形态、大小正常，双附件区未见异常回声包块。盆底超声检查：静息状态测量：残余尿量约3ml，逼尿肌厚度3mm，尿道内口关闭，膀胱后角完整，尿道周围未见液性区及散在钙化点，膀胱颈位于耻骨联合水平线以上28mm。子宫位于耻骨联合水平线以上31mm。直肠壶腹部位于耻骨联合水平线以上25mm。Valsalva动作：膀胱移动度增大，膀胱颈下降约27mm，膀胱平耻骨联合水平线，膀胱后角开放约138度。尿道内口关闭，尿道旋转约66度；子宫位于耻骨联合水平线以上14mm。直肠壶腹部平耻骨联合水平线。肛提肌裂孔大小25cm2。盆底肌肉收缩状态：未见肛提肌断裂声像，肛门括约肌完整。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	33
评估时间	2024-11-22 11:03:18			总得分	50.27
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	6.91	2-4μV		
	变异性	0.16	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.52	<0.5s		
	最大值	38.0	35-45μV		
	快速放松	0.25	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	18.34	30-40μV		
	变异性	0.4	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	16.47	25-35μV		
	变异性	0.49	<0.2		
后静息阶段	平均值	5.48	2-4μV		
	变异性	0.23	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	33
评估时间	2025-01-08 01:49:36			总得分	70.1
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	4.72	2-4μV		
	变异性	0.22	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.17	<0.5s		
	最大值	47.2	35-45μV		
	快速放松	0.6	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	30.75	30-40μV		
	变异性	0.32	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	35.47	25-35μV		
	变异性	0.28	<0.2		
后静息阶段	平均值	8.27	2-4μV		
	变异性	0.18	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每3次训练后予以1次远程指导。重点针对器官脱垂进行干预, 配合日常腹式呼吸训练以促进盆底肌放松, 后期酌情增加凯格尔模块训练以增强肌力。治疗中注重鼓励患者、规范锻炼行为, 并通过持续跟进保障康复质量。

康复疗效: 经一疗程居家康复, 肌力有所提升。复查后建议继续居家锻炼, 着重加强核心训练、盆底放松及慢肌凯格尔运动, 以进一步巩固疗效。

基本情况:

产妇背景: 郑女士, 30岁, 初产剖宫产。改良牛津肌力分级2级(弱收缩), 盆底肌松弛。产后初期偶有咳嗽诱发漏尿, 近期末再出现; 伴偶尔便秘及痔疮, 无盆底疼痛。

辅助检查:

盆底超声提示膀胱颈移动度增加、尿道内口呈漏斗状开放伴轻度膀胱膨出, 子宫脱垂, 会阴体过度移动, 肛提肌裂孔扩张, 直肠未见膨出。

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每3次训练后安排1次远程指导。以治疗器官脱垂为重点, 配合腹式呼吸训练; 后期依据评估及反馈动态优化方案, 增加慢肌模块以提升肌力稳定性与协调性。全程鼓励患者树立信心、保持锻炼规律, 并通过定期随访确保干预质量。


康复疗效: 经一个疗程居家干预, 郑女士肌力稳定性与协调性均增强, 继续续租下一疗程以进一步巩固康复效果, 加强盆底肌肉力量, 改善脱垂情况。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2024-11-26 11:20:04			总得分	69.93

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	4.91	2-4μV
	变异性	0.17	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.41	<0.5s
	最大值	48.6	35-45μV
	快速放松	0.47	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	26.32	30-40μV
	变异性	0.41	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	25.54	25-35μV
	变异性	0.51	<0.2
后静息阶段	平均值	4.56	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-01-08 10:00:16			总得分	73.32

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.44	2-4μV
	变异性	0.25	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.39	<0.5s
	最大值	39.0	35-45μV
	快速放松	0.65	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	24.39	30-40μV
	变异性	0.48	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	25.07	25-35μV
	变异性	0.44	<0.2
后静息阶段	平均值	4.5	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:混合型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程末次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-01-17 16:10:51			总得分	75.39

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.52	2-4μV
	变异性	0.21	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.36	<0.5s
	最大值	48.0	35-45μV
	快速放松	0.39	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	34.77	30-40μV
	变异性	0.45	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	27.36	25-35μV
	变异性	0.48	<0.2
后静息阶段	平均值	4.88	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第二个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-02-24 16:41:15			总得分	79.2

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.67	2-4μV
	变异性	0.16	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.32	<0.5s
	最大值	47.2	35-45μV
	快速放松	0.35	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	31.84	30-40μV
	变异性	0.38	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	28.07	25-35μV
	变异性	0.36	<0.2
后静息阶段	平均值	4.47	2-4μV
	变异性	0.16	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第二个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景：徐女士，25岁，初产剖宫产双胞胎，主诉经常便秘伴痔疮，盆底区域疼痛及性交痛。改良牛津肌力分级2级，伴阴道前壁轻度膨出，阴道中下段松弛，肛提肌收缩力弱。

辅助检查：盆底超声提示膀胱移动度增加伴膨出，子宫脱垂，直肠膨出，肛提肌裂孔扩张，未见肛提肌及肛门括约肌断裂；另存在腹直肌分离（脐上及脐区）。

宫腔内无回声区，积液？，其他？建议复查 双侧卵巢未见明显异常 盆腔积液 膀胱未见异常 盆底超声检查提示：前腔室：膀胱移动度增大，膀胱膨出。中腔室：子宫脱垂。后腔室：直肠膨出声像。未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。肛提肌裂孔扩张。腹直肌分离（脐上、脐部分离型）。

检查结论

子宫：上下径54 mm 前后径 36mm 左右径 48mm 宫颈27*30 mm 内膜 7mm 附件：左侧卵巢 30*22mm 右侧卵巢 36*23mm 子宫 前位，大小正常，形态规则，轮廓清晰，子宫肌层回声均匀，子宫前壁下段见一混合回声区，范围约 11*16mm，周边见血流信号，子宫内膜不厚，宫腔内见两个无回声区，较大约4*2mm，未见明显血流信号。双侧卵巢形态、大小正常，双附件区未见异常回声包块。盆腔见液性区，范围约20*16mm。盆底三维超声检查：静息状态测量：未见残余尿，逼尿肌厚度3mm，尿道内口关闭，膀胱后角约147度，尿道周围未见液性暗区及散在钙化点，CDFI：尿道周围见少许彩色血流信号，膀胱颈位于耻骨联合水平线以上 25mm。子宫及直肠壶腹部均位于耻骨联合水平线以上。Valsalva动作：膀胱颈移动度30mm，膀胱位于耻骨联合以下5mm，膀胱后角开放约 150度，尿道旋转约39 度；子宫位于耻骨联合水平线以上3mm，直肠壶腹部位于耻骨联合水平线以下7mm。直肠膨出，肛提肌裂孔大小 22cm2。盆底肌肉收缩状态：未见肛提肌断裂声像，肛门括约肌完整。脐上3cm处腹直肌分离宽约16mm。脐部腹直肌分离宽约24mm。脐下3cm处腹直肌未见明显分离。

温馨提示：结果只供临床参考，以医院打印报告为准。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	25
评估时间	2024-12-10 16:42:08			总得分	34.24
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	3.13	2-4μV		
	变异性	0.18	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.35	<0.5s		
	最大值	10.0	35-45μV		
	快速放松	0.67	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	9.03	30-40μV		
	变异性	0.24	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	10.02	25-35μV		
	变异性	0.23	<0.2		
后静息阶段	平均值	2.08	2-4μV		
	变异性	0.14	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	25
评估时间	2025-01-22 23:45:02			总得分	71.48
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.49	2-4μV		
	变异性	0.26	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.77	<0.5s		
	最大值	31.8	35-45μV		
	快速放松	0.66	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	25.11	30-40μV		
	变异性	0.34	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	21.36	25-35μV		
	变异性	0.32	<0.2		
后静息阶段	平均值	2.66	2-4μV		
	变异性	0.19	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每3次训练后安排1次远程指导。前期以缓解疼痛为主旨, 配合腹式呼吸训练; 后期逐步转为脱垂治疗。全程鼓励患者树立信心、保持锻炼规律, 并通过定期随访提升康复质量。

康复疗效: 经1个月居家干预, 徐女士自觉阴道疼痛症状显著缓解, 肌力提升显著, 对康复效果满意, 目前持续进行家庭训练以巩固疗效。

基本情况:

产妇背景: 雷女士, 37岁, 孕3产2, 顺产伴会阴撕裂, 主诉长期尿频及偶发漏尿。改良牛津肌力分级为2级(微弱收缩), 伴阴道前壁轻度膨出。

辅助检查: 盆底超声提示宫腔少量积液, 膀胱颈移动度增大伴膀胱膨出, 直肠膨出, 肛提肌裂孔扩张, 未见肛提肌及肛门括约肌断裂; 子宫未显示脱垂。

检查所见

宫腔少量积血 双侧卵巢未见明显异常 盆底超声
检查提示: 前腔室: 膀胱颈移动度增大, 膀胱膨出。中腔室: 子宫未见脱垂声像。后腔室: 直肠见膨出声像。未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。肛提肌裂孔扩张。

检查结论


子宫: 上下径 53mm 前后径 39mm 左右径 45mm 宫颈 21*24mm 附件: 左侧卵巢 24*16mm 右侧卵巢 23*17mm 子宫前位, 大小正常, 形态规则, 轮廓清晰, 子宫肌层回声均匀, 宫腔内见低回声团, 范围29*5mm, 边界尚欠清, 未见明显血流信号。双侧卵巢形态、大小正常, 双附件区未见异常回声包块。盆底三维超声检查: 静息状态测量: 残余尿10ml, 逼尿肌厚度3mm, 尿道内口关闭, 膀胱后角完整, 尿道周围未见液性暗区及散在钙化点, CDFI: 尿道周围见稀疏彩色血流信号, 膀胱颈位于耻骨联合水平线上28mm。子宫位于耻骨联合水平线以上41mm。直肠壶腹部均位于耻骨联合水平线以上22mm。Valsalva动作: 膀胱颈移动度31mm, 膀胱位于耻骨联合以下 3mm, 膀胱后角约 109度, 尿道旋转约 46度; 子宫位于耻骨联合水平线以上 17mm。直肠壶腹部位于参考线以下 7mm。肛提肌裂孔大小 22.13cm²。盆底肌肉收缩状态: 未见肛提肌断裂声像, 肛门括约肌完整。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	37
评估时间	2025-01-22 16:05:10			总得分	70.12

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	5.63	2-4μV
	变异性	0.19	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.17	<0.5s
	最大值	32.4	35-45μV
	快速放松	0.15	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	24.19	30-40μV
	变异性	0.24	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	24.28	25-35μV
	变异性	0.2	<0.2
后静息阶段	平均值	5.72	2-4μV
	变异性	0.18	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	37
评估时间	2025-03-13 20:35:59			总得分	74.8

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.14	2-4μV
	变异性	0.33	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.38	<0.5s
	最大值	49.6	35-45μV
	快速放松	0.4	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	36.58	30-40μV
	变异性	0.34	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	34.06	25-35μV
	变异性	0.27	<0.2
后静息阶段	平均值	6.18	2-4μV
	变异性	0.19	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估


康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每完成3次训练予以1次远程指导。方案以急迫性尿失禁干预为主, 配合腹式呼吸训练, 后期根据评估及反馈增加凯格尔训练模块。全程鼓励患者规律锻炼, 并通过持续跟进保障康复质量。

康复疗效: 经一疗程居家康复, 患者肌力与稳定性显著增强, 尿频症状明显改善。复查显示肌力提升, 建议继续家庭训练以巩固疗效。

盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	31
评估时间	2024-12-25 15:53:43			总得分	46.1
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段		平均值	4.96	2-4μV	
		变异性	0.18	<0.2	
快速收缩阶段		快速收缩	0.65	<0.5s	
		最大值	24.4	35-45μV	
		快速放松	0.44	<0.5s	
紧张收缩阶段		平均值	16.28	30-40μV	
		变异性	0.26	<0.2	
耐力收缩阶段		平均值	15.48	25-35μV	
		变异性	0.27	<0.2	
后静息阶段		平均值	6.08	2-4μV	
		变异性	0.16	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	31
评估时间	2025-03-27 08:36:04			总得分	74.13
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段		平均值	3.09	2-4μV	
		变异性	0.15	<0.2	
快速收缩阶段		快速收缩	0.5	<0.5s	
		最大值	34.8	35-45μV	
		快速放松	0.6	<0.5s	
紧张收缩阶段		平均值	25.31	30-40μV	
		变异性	0.27	<0.2	
耐力收缩阶段		平均值	22.32	25-35μV	
		变异性	0.26	<0.2	
后静息阶段		平均值	5.36	2-4μV	
		变异性	0.22	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 林女士, 31岁, 孕2产1, 顺产(无撕裂及侧切), 主诉打喷嚏时偶发漏尿, 存在盆底肌功能减弱及腹直肌分离问题。

改良牛津肌力分级为2级(弱收缩), 阴道中下段松弛, 肛提肌收缩力弱, 阴道前壁轻度膨出, 阴道横径可容2指; 腹直肌分离约2指, 程度较深。未行盆底超声检查。

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每3次训练后安排1次远程指导。根据定期评估及患者反馈动态调整治疗策略, 重点针对压力性尿失禁进行干预, 并鼓励患者建立信心、保持锻炼规律, 通过持续跟进保障康复质量。

康复疗效: 经一疗程居家康复, 林女士打喷嚏时未再发生漏尿, 症状明显改善, 已续租下一疗程以巩固疗效。


基本情况:

产妇背景: 张女士, 31岁, 初产妇, 顺产伴会阴撕裂, 主诉偶发便秘与漏尿, 并存在尿频症状。产后50余天, 未恢复同房, 孕前偶有同房相关盆底不适。

面诊与辅助检查:


改良牛津肌力分级2-3级, 阴道前壁 I 度膨出, 中下段松弛, 肛提肌收缩力弱, 阴道横径可容2指。

盆底超声提示: 膀胱颈移动度增加、膀胱后角开放伴轻度膀胱膨出, 轻度子宫脱垂, 肛提肌裂孔扩张, 未见肛提肌及肛门括约肌断裂。



盆底功能 评估报告				
姓名		性别	女	年龄 32
评估时间	2025-02-11 11:43:07		总得分	63.34
阶段	指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段	平均值	9.08	2-4μV	
	变异性	0.14	<0.2	
快速收缩阶段	快速收缩	0.37	<0.5s	
	最大值	36.4	35-45μV	
	快速放松	0.77	<0.5s	
紧张收缩阶段	平均值	26.61	30-40μV	
	变异性	0.22	<0.2	
耐力收缩阶段	平均值	22.89	25-35μV	
	变异性	0.26	<0.2	
后静息阶段	平均值	7.28	2-4μV	
	变异性	0.14	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型


意见:

检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程末次评估

康复方案：制定个体化方案，采用居家生物反馈设备治疗，每3次训练后安排1次远程指导。前期以盆底肌放松结合腹式呼吸训练为主，后期依据评估反馈调整为膀胱过度活动控制方案。

康复疗效：经1个月居家干预，张女士自觉下坠感显著减轻，漏尿症状消失，目前症状改善明显。

盆底功能 评估报告					
姓名		性别	女	年龄	33
评估时间	2025-04-10 23:57:19			总得分	70.9
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段	平均值		2.17	2-4μV	
	变异性		0.17	<0.2	
快速收缩阶段	快速收缩		0.37	<0.5s	
	最大值		35.6	35-45μV	
	快速放松		0.5	<0.5s	
紧张收缩阶段	平均值		22.47	30-40μV	
	变异性		0.32	<0.2	
耐力收缩阶段	平均值		18.26	25-35μV	
	变异性		0.33	<0.2	
后静息阶段	平均值		2.41	2-4μV	
	变异性		0.21	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:中度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程第二次评估

盆底功能 评估报告					
姓名		性别	女	年龄	33
评估时间	2025-04-27 23:58:35			总得分	77.89
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.66	2-4μV		
	变异性	0.18	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.51	<0.5s		
	最大值	48.4	35-45μV		
	快速放松	0.56	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	29.38	30-40μV		
	变异性	0.35	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	22.79	25-35μV		
	变异性	0.34	<0.2		
后静息阶段	平均值	2.34	2-4μV		
	变异性	0.2	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:


产妇背景: 许女士, 33岁, 孕3产3, 顺产伴会阴撕裂, 主诉经常便秘并伴有痔疮。指检提示阴道口闭合不全, 阴道前壁轻度膨出, 可完成凯格尔运动, 肌力评级为2+级。盆底超声显示: 前、中、后腔室分别存在膀胱、子宫及直肠膨出, 肛提肌裂孔扩张, 未见肛提肌及肛门括约肌断裂。

康复方案: 前期以缓解盆底疼痛为主要目标, 配合腹式呼吸训练; 后期根据评估结果及患者反馈, 逐步调整为针对器官脱垂的康复方案。治疗过程中强调树立信心、保持锻炼规律, 并通过持续跟进与专业指导保障康复质量。

康复疗效: 评估显示肌力有所提升, 后续将返院复查脱垂改善情况。

盆底功能 评估报告					
姓名		性别	女	年龄	38
评估时间	2025-04-08 15:34:41			总得分	22.64
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段		平均值	45.36	2-4μV	
		变异性	1.09	<0.2	
快速收缩阶段		快速收缩	0.49	<0.5s	
		最大值	21.2	35-45μV	
		快速放松	0.56	<0.5s	
紧张收缩阶段		平均值	17.11	30-40μV	
		变异性	0.33	<0.2	
耐力收缩阶段		平均值	22.02	25-35μV	
		变异性	0.38	<0.2	
后静息阶段		平均值	35.98	2-4μV	
		变异性	1.28	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:过度活动型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告					
姓名		性别	女	年龄	38
评估时间	2025-05-03 23:31:45			总得分	64.56
阶段		指标		阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值			4.43	2-4μV
	变异性			2.86	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩			0.32	<0.5s
	最大值			27.2	35-45μV
	快速放松			0.74	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值			22.9	30-40μV
	变异性			0.37	<0.2
耐力收缩阶段	平均值			23.31	25-35μV
	变异性			0.37	<0.2
后静息阶段	平均值			2.89	2-4μV
	变异性			0.13	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 许女士, 38岁, 孕5产2, 顺产伴会阴撕裂, 主诉漏尿、尿频及尿急。妇科检查示会阴伤口愈合良好, 阴道前壁轻度膨出, 阴道口未闭合、可容2指, 会阴体过度活动; 改良牛津肌力分级为2-级(弱收缩, 仅肌张力增高, 无抬举或挤压感)。盆底超声提示: 膀胱颈移动度增加伴尿道内口漏斗形成, 轻度膀胱膨出; 中腔室子宫脱垂; 后腔室可见会阴体过度运动; 肛提肌裂孔扩张, 未见肛提肌及括约肌断裂。

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每3次训练后予以1次远程指导。前期以膀胱过度活动调控为主, 配合腹式呼吸训练; 后期依据评估与反馈, 动态调整为急迫性尿失禁干预方案, 并增加凯格尔快慢肌模块训练。全程鼓励患者规律锻炼、增强信心, 并通过定期随访指导提升康复质量。

康复疗效: 经1个月居家康复, 许女士尿频、尿急等症状有所缓解, 后续计划返院进一步复查评估。

基本情况:

产妇背景: 雷女士, 39岁, 孕2产2, 顺产伴侧切, 主诉频发便秘及偶发压力性尿失禁。

盆底超声提示: 前、中、后腔室分别可见膀胱、子宫及直肠膨出表现, 肛提肌裂孔扩张, 未见肛提肌及肛门括约肌断裂。未行指检。

一疗程后复查: 会阴伤口愈合良好, 阴道口闭合不全伴后壁膨出, 阴道可容1指, 改良牛津肌力分级提升至3级。

康复方案: 制定个体化康复方案, 采用居家生物反馈设备治疗, 每完成3次训练安排1次远程指导。前期以压力性尿失禁干预为主, 配合腹式呼吸及放松训练; 后期依据评估反馈, 动态调整并加入快慢肌模块训练。全程鼓励患者树立信心、规范锻炼, 并加强随访指导以保障康复质量。


康复疗效: 经1个月居家康复, 雷女士漏尿症状完全消失, 自觉康复效果显著, 已续租下一疗程以进一步提升盆底肌协调性。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	39
评估时间	2025-04-11 10:58:37			总得分	67.15

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	8.79	2-4μV
	变异性	0.18	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.47	<0.5s
	最大值	48.6	35-45μV
	快速放松	0.53	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	34.8	30-40μV
	变异性	0.38	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	40.79	25-35μV
	变异性	0.3	<0.2
后静息阶段	平均值	3.94	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	39
评估时间	2025-05-14 23:45:44			总得分	74.96

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.23	2-4μV
	变异性	0.33	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.28	<0.5s
	最大值	56.2	35-45μV
	快速放松	0.43	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	32.66	30-40μV
	变异性	0.31	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	31.04	25-35μV
	变异性	0.25	<0.2
后静息阶段	平均值	4.92	2-4μV
	变异性	0.19	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:重度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程末次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	39
评估时间	2025-05-18 09:46:39			总得分	83.91

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.0	2-4μV
	变异性	0.11	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.47	<0.5s
	最大值	43.2	35-45μV
	快速放松	0.38	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	35.07	30-40μV
	变异性	0.29	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	37.36	25-35μV
	变异性	0.26	<0.2
后静息阶段	平均值	3.14	2-4μV
	变异性	0.12	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第二个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	39
评估时间	2025-06-17 02:06:33			总得分	84.76

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.07	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.32	<0.5s
	最大值	36.6	35-45μV
	快速放松	0.26	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	31.2	30-40μV
	变异性	0.32	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	32.33	25-35μV
	变异性	0.22	<0.2
后静息阶段	平均值	4.24	2-4μV
	变异性	0.24	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第二个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 产妇林女士, 33岁, 顺产后 2 个月, 出现混合型尿失禁, 症状表现为尿急、打喷嚏漏尿, 改良牛津肌力分级: 1级。

改良牛津肌力分级: 1级 (检查者的手指感觉到颤动或搏动——非常弱的收缩)

个人情况: 产后2个月, 孕3产2, 顺产【撕裂】, 漏尿【偶尔】

盆底B超: 子宫内膜回声欠均匀, 宫腔内强回声斑, 建议复查 双侧卵巢未见明显异常 盆底超声检查提示: 前腔室: 膀胱膨出。
中腔室: 子宫脱垂声像。 后腔室: 直肠膨出声像。 未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。肛提肌裂孔扩张。

一个疗程结束后复查: 康复后复查改良牛津肌力分级2级+, 只有指检, 没有B超。


康复方案: 制定个性化方案, 使用居家生物反馈设备进行康复治疗, 每三次治疗后进行 1 次远程康复指导。前期制定压力性尿失禁方案, 配合腹式呼吸训练, 后期结合评估情况及最新康复感受, 动态调整方案。鼓励患者增强信心, 继续规律锻炼。及时跟进训练情况, 指导康复注意事项, 确保康复效率。

康复疗效: 经过2个月居家康复, 林女士反馈尿急、打喷嚏漏尿症状明显改善, 复查肌力提升至 2 级+, 表示居家康复疗效明显, 再续租一疗程。

盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-04-21 16:08:36			总得分	33.41
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	6.49	2-4μV		
	变异性	0.17	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.66	<0.5s		
	最大值	22.0	35-45μV		
	快速放松	0.56	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	13.73	30-40μV		
	变异性	0.23	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	11.25	25-35μV		
	变异性	0.28	<0.2		
后静息阶段	平均值	6.9	2-4μV		
	变异性	0.16	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-06-03 23:27:01			总得分	84.29
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.98	2-4μV		
	变异性	0.13	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.48	<0.5s		
	最大值	35.0	35-45μV		
	快速放松	0.57	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	28.72	30-40μV		
	变异性	0.28	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	23.89	25-35μV		
	变异性	0.23	<0.2		
后静息阶段	平均值	2.52	2-4μV		
	变异性	0.2	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-06-10 22:43:22			总得分	86.18
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.95	2-4μV		
	变异性	0.18	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.8	<0.5s		
	最大值	42.8	35-45μV		
	快速放松	0.43	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	29.26	30-40μV		
	变异性	0.26	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	27.38	25-35μV		
	变异性	0.19	<0.2		
后静息阶段	平均值	3.1	2-4μV		
	变异性	0.26	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:


报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-07-13 20:33:41			总得分	83.84
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.89	2-4μV		
	变异性	0.17	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.46	<0.5s		
	最大值	39.4	35-45μV		
	快速放松	0.75	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	26.96	30-40μV		
	变异性	0.3	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	30.01	25-35μV		
	变异性	0.17	<0.2		
后静息阶段	平均值	3.45	2-4μV		
	变异性	0.21	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

第一个疗程末次评估

第二个疗程首次评估

第二个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 周女士, 35岁, 孕3产1, 剖宫产术后, 无漏尿、便秘及盆底疼痛主诉。

初诊检查: 子宫前位伴轻度脱垂, 改良牛津肌力评级2级(微弱收缩), 阴道中下段松弛, 肛提肌收缩力弱, 阴道横径可容2指。

盆底超声示: 中腔室子宫脱垂, 前、后腔室未见明显膨出, 肛提肌及括约肌无断裂, 裂孔未见扩张。

一疗程后复查: 外阴及阴道无异常, 子宫前位、大小正常, 轻度脱垂仍存; 阴道张力II级, 中下段松弛, 牛津评分仍为2级, 肛提肌收缩力弱。

康复方案: 采用居家生物反馈设备康复, 每3次治疗配合1次远程指导。首疗程针对静息张力略高实施放松方案与腹式呼吸训练, 后期依据评估调整, 加入器官脱垂干预并延续放松训练。第二疗程聚焦脱垂治疗, 增加凯格尔慢肌模块及精准训练等进阶内容, 以提升肌耐力与收缩控制。全程鼓励规律锻炼并加强随访指导, 保障康复依从与效果。


康复疗效: 经一疗程居家干预, 周女士肌力提升显著, 续租第二疗程以巩固疗效。两疗程结束后, 可独立完成居家训练, 康复效果良好。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2025-02-26 16:28:59			总得分	39.82

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	6.76	2-4μV
	变异性	0.17	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.56	<0.5s
	最大值	20.4	35-45μV
	快速放松	0.38	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	18.32	30-40μV
	变异性	0.32	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	18.02	25-35μV
	变异性	0.29	<0.2
后静息阶段	平均值	7.39	2-4μV
	变异性	0.21	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2025-04-20 23:29:46			总得分	54.1

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.32	2-4μV
	变异性	0.25	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.28	<0.5s
	最大值	26.2	35-45μV
	快速放松	0.4	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	16.44	30-40μV
	变异性	0.39	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	14.86	25-35μV
	变异性	0.33	<0.2
后静息阶段	平均值	3.05	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:中度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程末次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2025-05-01 10:17:11			总得分	72.74

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.19	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.52	<0.5s
	最大值	33.8	35-45μV
	快速放松	0.42	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	21.91	30-40μV
	变异性	0.41	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	24.33	25-35μV
	变异性	0.33	<0.2
后静息阶段	平均值	4.31	2-4μV
	变异性	0.15	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第二个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	35
评估时间	2025-06-03 23:38:27			总得分	72.3

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	4.65	2-4μV
	变异性	0.27	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.66	<0.5s
	最大值	48.4	35-45μV
	快速放松	0.47	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	30.54	30-40μV
	变异性	0.34	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	28.67	25-35μV
	变异性	0.3	<0.2
后静息阶段	平均值	5.96	2-4μV
	变异性	0.17	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第二个疗程末次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-05-22 21:11:58			总得分	28.04

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.97	2-4μV
	变异性	0.26	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.38	<0.5s
	最大值	12.8	35-45μV
	快速放松	1.01	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	6.33	30-40μV
	变异性	0.31	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	5.48	25-35μV
	变异性	0.21	<0.2
后静息阶段	平均值	2.47	2-4μV
	变异性	0.2	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:重度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。


第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-06-15 09:56:26			总得分	78.63

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.4	2-4μV
	变异性	0.22	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.56	<0.5s
	最大值	43.2	35-45μV
	快速放松	0.38	<0.5s
紧张收缩阶段	平均值	22.95	30-40μV
	变异性	0.33	<0.2
耐力收缩阶段	平均值	24.51	25-35μV
	变异性	0.24	<0.2
后静息阶段	平均值	2.14	2-4μV
	变异性	0.16	<0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 陈女士, 30岁, 孕1产1, 顺产伴会阴撕裂, 产后80天。主诉曾有外阴牵扯感(沟通确认尚未同房, 5月30日反馈不适已缓解), 盆底肌收缩维持困难。妇科检查示阴道张力II级, 中下段松弛, 肛提肌收缩力弱, 阴道横径可容2指; 改良牛津肌力分级为1级, 耐力收缩尤其是60秒持续训练困难。盆底超声提示: 前腔室尿道钙化灶伴膀胱膨出, 中腔室子宫脱垂, 后腔室直肠膨出; 肛提肌及肛门括约肌无断裂, 裂孔未见明显扩张。


康复方案: 采用居家生物反馈设备进行康复, 每完成三次治疗予以一次远程指导。前期实施盆底肌放松方案与腹式呼吸训练, 后期结合评估及患者反馈, 引入脱垂治疗及凯格尔慢肌训练。过程中注重增强信心、规范锻炼及定期跟进, 确保康复质量。

康复疗效: 经2个月居家康复, 陈女士已掌握正确盆底肌收缩方法, 肌力显著提升, 复查后可实现家庭自主锻炼。

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	31
评估时间	2025-05-22 15:30:00			总得分	49.11
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	12.99	2-4μV		
	变异性	1.09	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.32	<0.5s		
	最大值	73.6	35-45μV		
	快速放松	0.4	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	43.59	30-40μV		
	变异性	0.3	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	37.6	25-35μV		
	变异性	0.29	<0.2		
后静息阶段	平均值	4.94	2-4μV		
	变异性	0.23	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:重度高张型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名		性别	女	年龄	31
评估时间	2025-06-15 14:09:56			总得分	85.26
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.92	2-4μV		
	变异性	0.14	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.42	<0.5s		
	最大值	40.6	35-45μV		
	快速放松	0.28	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	29.36	30-40μV		
	变异性	0.32	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	31.33	25-35μV		
	变异性	0.23	<0.2		
后静息阶段	平均值	3.41	2-4μV		
	变异性	0.18	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:


产妇背景:王女士, 31岁, 产后50天, 孕2产2, 顺产伴会阴撕裂, 现主诉偶发漏尿, 伴尿频、尿急。妇科检查显示会阴伤口愈合良好, 阴道口闭合不全, 可容2指。改良牛津肌力评级为2级(弱收缩, 仅可感知肌张力升高, 无抬举或挤压感)。盆底超声提示: 前腔室膀胱膨出, 中腔室子宫脱垂, 后腔室未见异常, 肛提肌及括约肌无断裂, 肛提肌裂孔未见明显扩张。

康复方案:制定个性化康复方案, 依托居家生物反馈设备进行治理, 每三次治疗后安排一次远程指导。前期以缓解盆底肌高张力为主, 后期调整为急迫性尿失禁干预方案, 并配合凯格尔慢肌训练模块及腹式呼吸锻炼。过程中注重增强患者信心, 加强训练跟进, 保障康复质量。

康复疗效:经1个月居家康复, 王女士尿急症状消失, 漏尿情况显著改善, 肌力水平提高, 对康复效果满意, 并表示将继续坚持家庭锻炼。

盆底功能 评估报告					
姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-06-06 13:13:48			总得分	54.12
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段	平均值		3.56	2-4μV	
	变异性		0.16	<0.2	
快速收缩阶段	快速收缩		0.56	<0.5s	
	最大值		18.4	35-45μV	
	快速放松		0.62	<0.5s	
紧张收缩阶段	平均值		20.18	30-40μV	
	变异性		0.35	<0.2	
耐力收缩阶段	平均值		19.52	25-35μV	
	变异性		0.26	<0.2	
后静息阶段	平均值		4.62	2-4μV	
	变异性		0.17	<0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值




诊断:过度活动型
意见:
检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告					
姓名		性别	女	年龄	30
评估时间	2025-07-02 22:25:58			总得分	82.45
阶段		指标	阶段测试值	参考值	
前静息阶段	平均值	3.22	2-4μV		
	变异性	0.23	<0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.48	<0.5s		
	最大值	38.8	35-45μV		
	快速放松	0.25	<0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	33.53	30-40μV		
	变异性	0.37	<0.2		
耐力收缩阶段	平均值	22.87	25-35μV		
	变异性	0.23	<0.2		
后静息阶段	平均值	4.12	2-4μV		
	变异性	0.18	<0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值



诊断:过度活动型
意见:
检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景:张女士, 30岁, 产后3个月, 孕5产2。改良牛津肌力分级1级+, 伴阴道前壁轻度膨出, 阴道壁张力略高, 无明显盆底疼痛, 主诉盆底肌力减弱, 偶有便秘。

康复方案: 采用居家生物反馈设备进行康复治疗, 每完成三次治疗予以一次远程专业指导。初期实施盆底肌高张力缓解方案, 配合腹式呼吸训练; 后续将结合评估结果与患者反馈, 逐步引入器官脱垂针对性训练及快慢肌模块训练。全程指导患者规律锻炼并明确康复注意事项。

康复疗效: 经1个月居家康复, 张女士盆底肌高张力状态显著改善, 肌力水平提高, 自觉康复效果良好。