

适用人群

各类妇科盆腔术后尿潴留患者：

包含宫颈癌根治术、子宫全切术、盆腔淋巴结清扫术等手术后，出现无法自主排尿、下腹部憋胀等尿潴留症状的患者。

拔尿管后残余尿量异常者：

术后拔除尿管后，残余尿量 $\geq 100\text{mL}$ ，膀胱排空功能未恢复的患者。

常规治疗无效者：

已尝试听流水声、腹部热敷、肌肉注射新斯的明等传统诱导排尿方法，但效果不佳的患者。

高风险预防性干预人群：

接受盆腔大型手术（如宫颈癌根治术）的患者，为降低术后尿潴留发生率，提前进行预防性治疗。

禁忌症

- 1) 贴片部位皮肤存在破损、炎症、感染、瘢痕或皮疹时禁用。
- 2) 装有心脏起搏器等电子植入物者禁用。
- 3) 妊娠期女性禁用；月经期女性慎用或需经医生评估后决定。
- 4) 合并恶性肿瘤、泌尿生殖系统活动性感染（如尿道炎、阴道炎）、癫痫等神经系统疾病者禁用。
- 5) 对贴片材料过敏者需避免使用。
- 6) 严重的心律失常、心力衰竭等。
- 7) 急性深静脉血栓或血栓性静脉炎。
- 8) 严重认知障碍或精神疾病无法配合治疗者。
- 9) 术后伤口未愈合、盆腔存在活动性出血的患者。



扫码添加客服企业微信

广州圆爱康生物科技有限公司

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋713室

居家康复 术后尿潴留



居家康复服务：开启康复新模式

在康复过程中，许多患者由于时间、交通或身体状况的限制，难以坚持到医院进行重复性、周期性、规律性的康复治疗。我们紧跟时代的步伐，创新推出“居家康复服务”新模式，将医院优质的医疗资源通过线上平台延伸至患者家中，为广大患者提供更加便捷、高效的康复治疗解决方案。让每一位需要帮助的患者**居家都能享受到个性化、专业的康复服务**。



居家康复服务的优势

- 01 随时随地使用
- 02 医院同原理同效果
- 03 节约时间和成本
- 04 尊享“六师共管”健康管理服务群

在医院下单后，会自动进入专属的“六师共管”健康管理服务群，享受到专科医生、治疗师、专科护理、专业客服、线下督导、设备工程师的贴心服务，同时还可以在线交流病情，实时调整治疗方案。让专业医疗能力平移到居家康复中。

术后尿潴留是妇科手术后常见的排尿功能障碍，许多患者对此感到困惑和担忧。了解这一现象的成因、影响和科学治疗方法，有助于患者更好地配合治疗，加快康复进程。

术后尿潴留康复的原理是什么？

低频电刺激通过温和的电流精准刺激盆底肌肉与膀胱支配神经，一方面增强逼尿肌收缩力，另一方面调整尿道括约肌的松弛协调性，重新激活正常排尿反射，帮助膀胱恢复有效排空功能。



- 1 **神经肌肉激活**：唤起肌肉本体感受器，刺激膀胱逼尿肌、尿道括约肌等，提高神经肌肉敏感性；
- 2 **促进功能恢复**：促使膀胱及有关肌肉的节律性运动，促进膀胱功能恢复；
- 3 **改善血液循环**：加速会阴部淋巴液与血液循环，促进水肿、炎症吸收。
- 4 **放松痉挛肌肉**：帮助盆底失弛缓的肌肉正常松弛。

什么是术后尿潴留？

指盆腔妇科手术后，膀胱充满尿液却无法有效排空，或排尿后残余尿量超100~150mL且伴随尿不尽、尿流细等不适。临床分为两类：



急性尿潴留（术后高危突发型）

尿意强烈却完全无法自主排尿，下腹部剧烈胀痛。伴随烦躁、出汗，部分患者尿道口会溢出少量尿液，但下腹胀痛毫无缓解。若不及时处理，可能引发膀胱肌肉损伤、肾盂肾炎等并发症。



慢性尿潴留（术后隐匿拖延型）

排尿不畅、尿线变细、尿不尽感，排尿后仍觉得膀胱有残留尿液。伴随夜尿次数增多（每晚≥3次），长期发展可能出现腰胀、肾功能损伤。

术后尿潴留的原因有哪些？

神经与肌肉功能异常：

- 1. 腰麻/硬膜外麻醉阻断排尿反射，逼尿肌收缩无力；2. 手术损伤盆丛神经，影响膀胱控制；3. 术前排尿困难者术后症状加重。

机械性梗阻：

- 1. 术后阴道血肿、填塞物压迫尿道；2. 尿失禁手术吊带过紧阻塞尿路；3. 盆腔器官脱垂挤压尿道。

心理与环境因素：

- 1. 术后伤口疼痛，恐惧排尿；2. 卧床不习惯床上排尿；3. 病房隐私不足导致精神紧张。



术后尿潴留对女性有什么不良影响？



- ▶ **不适与疼痛**：膀胱过度充盈导致下腹胀痛、不适感。
- ▶ **泌尿系感染风险增加**：导尿是处理妇科术后尿潴留的主要手段，但导尿本身显著增加尿路感染的风险。
- ▶ **膀胱功能损伤**：长期或反复的尿潴留可能损害膀胱逼尿肌功能，导致排尿困难持续甚至加重。
- ▶ **肾脏损伤风险**：严重尿潴留可能导致膀胱内压过高，引起尿液反流，增加肾积水甚至肾功能损伤的风险。
- ▶ **切口疼痛/愈合**：反复导尿或自行用力排尿可能增加腹部切口张力或疼痛。
- ▶ **心理影响**：焦虑与烦躁、抑郁情绪对康复的信心受挫。
- ▶ **社会与生活影响**：延长住院时间、增加医疗负担、影响生活质量。